

Каким путем можно наиболее точно определить стадию опухолевого процесса при раке молочной железы? {

- = путем маммографии
 - ~ путем гастроскопии
 - ~ путем лапароскопии
 - ~ путем лабораторных исследований
 - ~ путем ларингоскопии
- }

Как по международной классификации (TNM) обозначаются метастазы в регионарные лимфоузлы? {

- ~ N₀
 - ~ N_x
 - = N₁
 - ~ N₂
 - ~ N₃
- }

Как по международной классификации (TNM) обозначить раковую опухоль толстой кишки циркулярно обтурирующую просвет и вызывающую кишечную непроходимость? {

- ~ T₁
 - ~ T₂
 - = T₃
 - ~ T₀
 - ~ T₀₋₁
- }

Одним из характерных признаков доброкачественной опухоли является:

- ~ инфильтрация окружающих тканей {
 - = наличие капсулы
 - ~ быстрый рост
 - ~ склонность к рецидивам
 - ~ плохой аппетит
- }

Для химиотерапии злокачественных опухолей применяется: {

- ~ диоксидин
 - = тиотеф
 - ~ гемодез
 - ~ гепарин
 - ~ аспирин
- }

В диагностике ранних форм рака молочной железы, эффективным исследованием является: {

- ~ обзорная R-графия грудной клетки
- = УЗИ
- ~ маммография
- ~ анализ крови на глюкозу
- ~ анализ крови на билирубин
- }

Одним из характерных признаков рака молочной железы III степени является: {

- ~ метастазы в печени
- ~ распад опухоли
- ~ отсутствие метастазов
- = метастазы в подмышечные лимфоузлы
- ~ метастазы в подчелюстные лимфоузлы
- }

Выполнение радикальной операции при раке невозможно: {

- ~ в I стадии
- ~ во II стадии
- ~ в III стадии
- = в IV стадии
- ~ в V стадии
- }

Лучевая терапия не применяется: {

- ~ при раке молочной железы
- = при раке желудка
- ~ при раке нижней губы
- ~ при раке матки
- ~ при раке гортани
- }

Гормонотерапия применяется при раке: {

- = молочной железы
- ~ поджелудочной железы
- ~ ободочной кишки
- ~ печени
- ~ кожи
- }

Какую операцию можно считать радикальной при раке желудка? {

- ~ гастрозентеростомия
- ~ гастростомия

- ~ илеотрансверзостомия
- = гастрэктомия
- ~ резекция $\frac{1}{3}$ желудка
- }

Какая паллиативная операция показана при стенозе пищевода на почве рака IV стадии? {

- = гастростомия
- ~ холецисто-гастростомия
- ~ колостомия
- ~ гастроэнтеростомия
- ~ холецистэктомия
- }

Одним из признаков злокачественных опухолей является: {

- ~ медленный рост
- ~ наличие капсулы
- ~ отсутствие нарушений обменных процессов в организме
- = склонность к метастазированию
- ~ отсутствие метастазов
- }

Решающим в определении характера опухоли является: {

- ~ общеклиническая симптоматика
- = биопсия
- ~ рентгенологическое исследование
- ~ эндоскопическая картина
- ~ компьютерная томография
- }

В диагностике рака поджелудочной железы эффективным исследованием является: {

- ~ обзорная R-графия брюшной полости
- = УЗИ
- ~ гастроскопия
- ~ анализ крови на глюкозу
- ~ лапароцентез
- }

Одним из характерных признаков рака желудка III стадии является: {

- = метастазы в печень

- ~ перфорации опухоли
 - ~ отсутствие метастазов
 - ~ множественные метастазы в регионарные лимфоузлы
 - ~ увеличение размеров желудка
- }

Что такое метастаз Крукенберга? {

- ~ метастаз в поджелудочную железу
 - ~ метастаз в лимфоузел под ключицей
 - = метастаз в яичник
 - ~ метастаз в селезенку
 - ~ метастаз в печень
- }

Гормонотерапия применяется: {

- ~ при раке желудка
 - ~ при раке поджелудочной железы
 - = при раке молочной железы
 - ~ при раке печени
 - ~ при раке толстой кишки
- }

Какая паллиативная операция показана при стенозе привратника на почве рака желудка IV стадии: {

- ~ гастростомия
 - ~ холецисто-гастростомия
 - ~ колостомия
 - = гастроэнтеростомия
 - ~ спленэктомия
- }

К доброкачественным опухолям относится: {

- ~ лимфосаркома
 - ~ меланома
 - = хондрома
 - ~ семинома
 - ~ карцинома
- }

К злокачественным опухолям относится: {

- ~ невринома
- ~ липома

~ фиброма
 = саркома
 ~

тератома

}

Для злокачественных опухолей характерна: {

~ ограниченный рост
 ~ наличие капсулы
 = прорастание в соседние ткани (органы) и метастазирование
 ~ медленный рост
 ~ местный характер распространения
 }

Что такое абластика? {

~ предупреждение попадания микроорганизмов в рану
 = предупреждение попадания опухолевых клеток в рану
 ~ применение противоопухолевых химиопрепаратов с целью уничтожения опухолевых клеток
 ~ щадящее отношение к опухолевой ткани
 ~ обработка раневой поверхности после удаления опухоли спиртом или йодом
 }

Что такое антибластика? {

~ предупреждение попадания микробов в рану
 = уничтожения опухолевых клеток в ране
 ~ предупреждение попадания клеток в рану
 ~ щадящее отношение к опухолевой ткани
 ~ тщательное обкладывание операционного поля
 }

Для доброкачественной опухоли характерно: {

= четкая граница
 ~ прорастание в окружающие ткани
 ~ метастазирование
 ~ похудание
 ~

рецидивирование

}

Какое лечение применяется при доброкачественной опухоли?

~ гормонотерапия
 ~ химиотерапия
 = хирургическое удаление опухолей

~ физиолечение		
~	УВЧ	терапия
}		

К доброкачественной опухоли из гладкой мышечной ткани относится: {
 = лейомиома
 ~ рабдомиома
 ~ папиллома
 ~ тератома
 ~ фибромиома
 }

К доброкачественным опухолям из хрящевой ткани относится: {
 ~ саркома
 ~ лимфосаркома
 = хондрома
 ~ миома
 ~ остеома
 }

Комплексное лечение злокачественных опухолей включает методы: {
 ~ хирургический + лучевой
 ~ только хирургический
 = хирургический + лучевой + химиотерапия
 ~ только лучевой
 ~ лучевой + химиотерапия
 }

Какой метод не применяется при лечении злокачественных опухолей {
 ~ хирургический
 ~ лучевой
 ~ химиотерапевтический
 = физиотерапевтический
 ~ иммунологический
 }