

Основными эндемичными зонами эхинококкоза являются: {

~ Прибалтика

= Кавказ, Средняя Азия

~ Якутия

~ Комчатка

~

Красноярская

область

}

Основным хозяином эхинококка является один из следующих домашних животных: {

~ овца

~ свинья

~ лошадь

= собака, кошка

~ корова

}

Промежуточным хозяином эхинококка является: {

~ волк

~ лисица

= человек

~ кошка

~ собака

}

Какая географическая зона России не является эндемическим очагом эхинококкоза: {

= Заполярье

~ Кавказ

~ Крым

~ Поволжье

~ Западная Сибирь

}

Инфицирование человека эхинококком происходит при: {

~ употреблении копченной рыбы

~ употреблении сырых яиц

~ проглатывании личинки эхинококка

= проглатывании яиц эхинококка и вдыхании пыли с яйцами эхинококка

~ попадания личинки эхинококка на кожу

}

Распространения эхинококка в организме человека после заражения происходит по: {

- ~ желчевыводящим путям
- ~ лимфатической системе
- ~ кишечнику
- ~ интерстициальным пространствам
- = кровеносным сосудам
- }

Наиболее часто поражаемыми эхинококком органами человека являются: {

- ~ головной мозг
- ~ спинной мозг
- ~ почки, селезенка
- ~ кожа, кишечник, мышцы
- = печень, легкие
- }

Эхинококковый пузырь окружает следующие оболочки: {

- ~ пиогенная
- ~ грануляционная
- = зародышевая и хитиновая
- ~ мезотелиальная
- ~ фиброзная, деморкационная
- }

Длительность развития эхинококка в организме человека составляет: {

- ~ 1-2 месяца
- ~ 6-12 месяцев
- ~ 1-3 года
- = 10-20 лет
- ~ 30-40 лет
- }

Эхинококковые кисты чаще бывают: {

- ~ множественные
- = одиночные
- ~ многополярные
- ~ мультинодулярные
- ~) коллоидные
- }

При больших эхинококковых кистях механическая травма может привести к опасному осложнению {

- ~ нагноению кисти
 - = разрыву кисти, анафилактическому шоку.
 - ~ механическому сдавлению окружающих тканей и органов.
 - ~ лимфорреи
 - ~ кровотечению
- }

Стадиями клинического течения эхинококкоза являются: {

- ~ острая стадия
 - ~ хроническая стадия
 - ~ стадия обострения
 - = стадия начала, разгара и осложнения
 - ~ стадия ремиссии
- }

Клиническими симптомами I стадии эхинококкоза является: {

- ~ боли, недомогание
 - ~ ознобы, неустойчивая гемодинамика
 - ~ аллергические проявления
 - ~ похудание, дефицит веса
 - = клинических симптомов нет
- }

Какие симптомы характерны для первой стадии эхинококкоза печени: {

- ~ высокая лихорадка
 - ~ увеличение селезенки
 - ~ ослабление дыхания, кашель
 - ~ увеличение печени
 - = клинические симптомы отсутствуют
- }

Клиническими симптомами II стадии эхинококкоза печени являются: {

- ~ желтуха
 - ~ гектическая температура
 - ~ асцит
 - ~ выраженная одышка
 - = периодическая субфебрильная температура, слабость, потливость, похудание, дискомфорт в правом подреберье, малое увеличение печени
- }

Клиническими симптомами эхинококкоза печени III стадии являются: {

- = выраженные симптомы интоксикации
- ~ периодическое появление субфебрильной температуры
- ~ боли в груди по типу межреберной невралгии
- ~ сухой кашель
- ~ аллергические реакции

Укажите клинические симптомы эхинококкоза печени в IV стадии: {

- = гектическая температура при нагноении кисты и желтуха
- ~ продуктивный кашель
- ~ периодические аллергические реакции
- ~ боли в груди по типу межреберной невралгии
- ~ гематурия

Ведущая роль в диагностике эхинококкоза принадлежит: {

- ~ клинико-анамнестическим данным
- ~ рентгенологическому исследованию
- = серологическим реакциям и УЗИ
- ~ цистоскопии
- ~ колоноскопии
- }

Специфическими серологическими реакциями для диагностики эхинококкоза являются: {

- ~ проба Оппеля
- ~ реакция манту
- ~ реакция Пирке
- = проба Каццони и реакция Латекс-агглюцинации
- ~ проба Брауна
- }

Проба Каццони заключается в: {

- ~ внутрикожном введении эхинококковых антител с развитием местной аллергической реакции
- = внутрикожном введении эхинококкового антигена с развитием аллергической реакции
- ~ увеличении количества эозинофилов при пальпации живой паразитарной кисты
- ~ увеличении содержания эозинофилов при проведении пункции эхинококковой кисты

- ~ увеличение содержания эозинофилов в крови больного после гемотрансфузии от больного оперированного по поводу эхинококкоза
- }

Проба Анфилюгова заключается в: {

- = увеличении количества эозинофилов в крови после пальпации живой паразитарной кисты
- ~ снижение количество эозинофилов в крови после пальпации паразитарной кисты
- ~ исчезновение эозинофилов из крови после пальпации паразитарной кисты
- ~ внутрикожном введении эхинококкового антигена с развитием общей аллергической реакции
- ~ внутрикожном введении эхинококкового антигена с развитием местной аллергической реакции
- }

Проба Анфилюгова позволяет {

- ~ определить заражение человека эхинококком
- ~ поставить диагноз эхинококкоза
- = определить жизнеспособность паразита
- ~ определить активность клинического течения заболевания
- ~ определить исход заболевания
- }

Какой рентгенологический признак не характерен для эхинококкоза {

- ~ увеличение размеров печени
- ~ высокое стояние и малая подвижность диафрагмы
- ~ тень кисты в проекции печени при кальцификации паразита
- = уменьшение размеров печени
- ~ аваскулярные зоны в печени
- }

Какие методы лечения применяются при эхинококкозе: {

- ~ консервативный
- = хирургический
- ~ лучевая терапия
- ~ химиотерапия
- ~ склеротерапия
- }

Какой вид хирургического вмешательства не применим для лечения эхинококкоза: {

- ~ краевая резекция органов вместе с кистой

- ~ закрытая эхинококкэктомия
- = пункционный метод лечения
- ~ радикальная эхинококкэктомия
- ~ лапароскопическая закрытая эхинококкэктомия
- }

Профилактикой эхинококкоза является: {

- ~ предупреждение микротравм
- ~ повышение санитарно - гигиенических условий населения
- ~ прием антибиотиков
- ~ иммунизация населения
- = санация домашних животных
- }

При локализации эхинококковой кисты вблизи ворот печени могут появиться следующие осложнения: {

- ~ гидроторакс
- ~ тромбоз мезентериальных сосудов
- = механическая желтуха, асцит
- ~ кишечная непроходимость
- ~ гипертонический криз
- }

Первичная инвазия альвеококка происходит в: {

- ~ легком
- = печени
- ~ почке
- ~ селезенке
- ~ головном мозге
- }

Основным хозяином альвеококка является: {

- ~ корова
- ~ овца
- ~ собака
- ~ человек
- = грызуны, лисы, песцы
- }

Источником заражения аскаридозом является: {

- = человек
- ~ кошка

~ собака

~ крупный рогатый скот

~ мелкий рогатый скот

}