

Задачей реанимации является: {

- ~ восстановление сознания
 - ~ восстановление сердечной деятельности
 - ~ восстановление дыхания
 - = восстановление дыхания, сердечной деятельности и обмена веществ
 - ~ восстановление обмена веществ
- }

Клиническая смерть длится: {

- ~ 10-15 мин.
 - ~ до 20 мин.
 - = 3-5 мин.
 - ~ 5-10 мин.
 - ~ до 30 мин.
- }

В преагональном состоянии АД определяется в пределах: {

- ~ 110-115 мм. рт. ст.
 - ~ 100-110 мм. рт. ст.
 - ~ 80-60 мм. рт. ст.
 - ~ 90-70 мм. рт. ст.
 - = АД не определяется
- }

В преагональном состоянии сознание бывает: {

- = спутанное
 - ~ заторможенное
 - ~ возбужденное
 - ~ отсутствует
 - ~ без изменений
- }

В состоянии агонии пульс на периферических артериях определяется в пределах: {

- ~ 90-100 уд. в мин.
 - ~ 100-110 уд. в мин.
 - ~ 100-120 уд. в мин.
 - = отсутствует
 - ~ 130-140 уд. в мин.
- }

В агональном состоянии АД определяется в пределах: {

- ~ 120-130 мм. рт. ст.
- ~ 110-120 мм. рт. ст.
- ~ 80-100 мм.рт.ст.

= не определяется
 ~ 60-30 мм.рт.ст.
 }

Клиническая смерть характеризуется: {
 ~ отсутствием пульса
 ~ отсутствием дыхания
 ~ отсутствием роговичного рефлекса
 ~ отсутствием реакции зрачков на свет
 = отсутствием пульса, дыхания и глазных рефлексов
 }

Реанимационные меры следует начинать с : {
 ~ ИВЛ «рот в рот»
 ~ введения сердечных препаратов
 ~ массажа сердца
 = обеспечение проходимости дыхательных путей
 ~ транспортировки в хирургическое отделение
 }

Эффективным методом ИВЛ на догоспитальном этапе является: {
 ~ Силвестра
 ~ Лаборда
 ~ Шуллера
 = рот в рот
 ~ массаж грудной клетки
 }

В каком соотношении выполняют ИВЛ и массаж сердца, если реанимацию проводит один человек? {
 ~ 1:1
 ~ 1:2
 ~ 1:3
 = 1:5
 ~ 1:10
 }

Наиболее достоверным признаком эффективности реанимационных мероприятий является: {
 ~ появление мышечного тонуса
 ~ появление анизокории
 = появление пульса на крупных артериях
 ~ депонирование крови в нижних конечностях
 ~ появление роговичного рефлекса

}

Шок первой степени характеризуется: {

- = Сохранением сознания
 - ~ снижением А/Д до 80/40 мм.
 - ~ заторможенностью
 - ~ отсутствием дыхания
 - ~ выраженной тахикардией
- }

При шоке второй степени А/Д бывает в пределах: {

- ~ 140-130 мм. рт. ст.
 - ~ 120-110 мм. рт. ст.
 - ~ 90-70 мм. рт. ст.
 - ~ 110-100 мм. рт. ст.
 - ~ 70-60 мм. рт. ст.
- }

Назовите основные клинические признаки травматического шока III степени: {

- ~ сознание отсутствует
 - = сознание спутано, PS более 130 в мин., снижение А/Д до 80мм.
 - ~ пульс 90 в мин. хорошего наполнения
 - ~ больной в контакт не вступает, резко заторможен
 - ~ снижение систолич. артериального давления до 100мм.рт.ст.
- }

Назовите основные клинические признаки травматического шока IV степени: {

- ~ сознание ясное
 - ~ сознание спутано, больной временами возбужден
 - ~ контакт с больным возможен периодически
 - = контакта с больным нет, систолическое А/Д ниже 50мм рт.ст, ps нитевидный
 - ~ пульс удовлетворительный 110 ударов; у больного речевое возбуждение
- }

Пусковым механизмом при шоке является: {

- ~ нарушение функции печени
 - ~ нарушение функции почек
 - ~ нарушение дыхания
 - = увеличение емкости сосудов и нарушение микроциркуляции
 - ~ нарушение функции сердца
- }

Первую помощь при травматическом шоке следует начинать с: {

- = устроения боли и иммобилизации при переломах
- ~ транспортировки в лечебное учреждение

- ~ асептической повязки на рану
- ~ массажа сердца
- ~ восстановления ОЦК
- }

После асистолии (остановки сердца) сознание выключается спустя: {

- ~ 10 минут
- ~ 5 минут
- ~ 20 секунд
- = 10 секунд
- ~ 1 час
- }

После асистолии расширение зрачков возникает через: {

- ~ 15 минут
- = 10 минут
- ~ 1-2 минут
- ~ 30-60 секунд
- ~ 2 часа
- }

Различают следующие виды шока: {

- ~ травматический
- ~ геморрагический
- ~ септический
- = внутрисосудистый
- ~ анафилактическим
- }

В какой последовательности проводят реанимационные мероприятия: {

~

вначале следует ввести препараты возбуждающие дыхательный центр и стимулирующие сердечную деятельность, после восстановить проходимость дыхательных путей

= первым делом необходимо восстановить проходимость дыхательных путей после чего следует незамедлительно приступить к ИВЛ и одновременному массажу сердца

~

вначале ввести сердечные препараты и после начать массаж сердца

~

сначала внутрисердечно ввести адреналин и после приступить, к ИВЛ

~
 соблюдение последовательности не обязательно.
 }

К реанимационным мероприятиям не относится: {

~
 искусственное дыхание
 ~
 массаж сердца
 ~
 внутрисердечные инъекции лекарств
 = ультрафиолетовое облучение крови (УФО)
 ~
 дефибрилляция
 }

Оптимальным при искусственном дыхании является число вдуваний в 1 минуту: {

~
 5-10
 ~
 25-30
 ~
 35-40
 ~
 45-50
 = (10-12) – (12-15)
 }

Дефибрилляция – это {

~
 внутрисердечное введение лекарств
 = проведение разряда электрического тока
 ~
 массаж сердца
 ~
 удаление жидкости из дыхательных путей
 ~
 вентиляция легких
 }

Эффективным при массаже сердца считается сдавление грудины на: {

- ~
- 2-3 см
- = 4-5 см
- ~
- 7-8 см
- ~
- 10-12 см
- ~
- 13-15 см
- }

Непрямой массаж сердца может осложниться: {

- ~
- разрывом нижней полой вены
- ~
- разрывом легкого
- ~
- разрывом сердца
- ~
- переломом грудины
- = переломом ребер
- }

Показанием к открытому массажу сердца у молодых людей является: {

- ~
- перелом ребер
- ~
- перелом грудины
- = отсутствие эффекта при непрямом массаже более 15-20 минут
- ~
- появление трупных пятен
- ~
- проявление трупного окоченения
- }

В каком месте производят сдавление грудной стенки при массаже сердца? {

- ~
- средняя часть грудины
- = левее нижней трети грудины
- ~
- с обеих сторон грудной клетки
- ~
- правая половина грудной клетки
- ~
- левая половина грудной клетки
- }

Признаками биологической смерти считают: {

- ~
- снижение А/Д ниже 60/30мм
- ~
- урежение дыхания до 8 в минуту
- = трупные пятна, трупное окоченение
- ~
- отсутствие движения глазных яблок
- ~
- сужение зрачков
- }

Во время реанимации в первую очередь должно быть восстановлено кровообращение: {

- = мозга и сердца
- ~
- только сердца
- ~
- кишечника
- ~
- легких
- ~
- нижних конечностей
- }