

В каком возрасте чаще развивается острый гематогенный остеомиелит? {

- ~ 1-10 лет
 - = 11-20 лет
 - ~ 21-30 лет
 - ~ 31-40 лет
 - ~ 41-50 лет
- }

Какие кости чаще поражаются при гематогенном остеомиелите? {

- = бедренная кость
 - ~ седалищная кость
 - ~ позвонки
 - ~ малоберцовая кость
 - ~ ключица
- }

Характерным признаком, какого вида остеомиелита является секвестрация кости? {

- ~ абсцесса Броди
 - ~ посттравматического остеомиелита
 - ~ остеомиелита Оллье
 - ~ остеомиелита Гарре
 - = гематогенного остеомиелита
- }

Отличительные признаки абсцесса Броди: {

- ~ многосимптомный анамнез
 - = полость в кости без секвестров
 - ~ слизистый экссудат
 - ~ гнойный экссудат
 - ~ диффузный остеосклероз трубчатой кости
- }

Отличительным признаком остеомиелита Гарре является: {

- ~ полость в метафазе
 - ~ выраженный остеопороз
 - ~ наличие крупных секвестров
 - = выраженный остеосклероз облитерацией костномозгового канала
 - ~ остеолизис
- }

Когда появляются первые рентгенологические признаки острого гематогенного остеомиелита? {

- ~ через 3 дня
- ~ через 3 мес.

- = через 10-15 дней
- ~ через 20-30 дней
- ~ через 30-40 дней
- }

Наиболее характерным признаком хронического остеомиелита является: {

- ~ сильные распирающие боли в конечности
- = наличие секвестра и гнойного свища
- ~ потрясающие ознобы
- ~ высокая лихорадка
- ~ резкая гиперемия и отек тканей
- }

Какие из перечисленных микроорганизмов могут стать этиологическим фактором возникновения остеомиелита? {

- ~ кишечная палочка
- = стафилококк
- ~ палочка столбняка
- ~ дифтерийная палочка Леффлера
- ~ протей
- }

Каков наиболее рациональный объем операции при хроническом остеомиелите? {

- ~ иссечение свищей
- ~ остеоперфорация
- = секвестрэктомия
- ~ вскрытие флегмоны
- ~ пластика костной полости воском
- }

Какие методы наиболее эффективны при санации костной полости после радикальной секвестрэктомии? {

- ~ пломбировка гипсом
- = миоластика
- ~ длительное проточное промывание
- ~ тампонирование
- ~ пластика коллагеновой губкой с антисептиками
- }

Наиболее частым осложнением при длительно текущем хроническом остеомиелите является: {

- ~ цирроз печени
- = амилоидоз почек
- ~ эндокардит
- ~ дистрофия миокарда
- ~ хроническая анемия

}

Остеомиелит это: {

- ~ воспаление нерва
 - ~ воспаление сосудов питающих кость
 - = воспаление костного мозга, всех частей кости, надкостницы и окружающих тканей
 - ~ воспаление мышцы
 - ~ воспаление жировой клетчатки
- }

Укажите теории патогенеза острого гематогенного остеомиелита: {

- ~ нейро-вегетативная
 - ~ врожденная
 - ~ инфекционная
 - = сосудистая, аллергическая
 - ~ асептическая
- }

При остром гематогенном остеомиелите чаще поражаются: {

- ~ плоские кости
 - = длинные трубчатые кости
 - ~ позвоночник
 - ~ тазовые кости
 - ~ опорные кости стопы
- }

Периостит это воспаление: {

- ~ костного мозга
 - ~ компактной части кости
 - = надкостницы
 - ~ хрящей
 - ~ связок
- }

Раневой - травматический остеомиелит возникает на фоне: {

- ~ вывиха
 - ~ растяжении связок
 - ~ разрыва мышц
 - = открытого перелома
 - ~ асептических ран мягких тканей
- }

Назовите ранние рентгенологические признаки острого гематогенного остеомиелита: {

- ~ остеосклероз

- ~ наличие секвестров и секвестральной полости вокруг
- ~ паталогический перелом
- ~ остеофиброз
- = утолщение надкостницы (периостит)
- }

Эмболическую теорию возникновения остеомиелита предложил: {

- ~ Генке
- ~ Дерижанов
- = Лексер
- ~ Леффлер
- ~ Абрикосов
- }

Теорию сенсibilизации в возникновении остеомиелита предложил: {

- ~ Давыдовский
- ~ Абрикосов
- = Дерижанов
- ~ Лексер
- ~ Генке
- }

При остеомиелите, воспалительный процесс начинается с: {

- ~ мышц
- ~ сустава
- = костного мозга
- ~ связок
- ~ кожи
- }

Для уточнения диагноза при подозрении на острый остеомиелит необходимо: {

- ~ произвести визуальную ревизию кости
- = выполнить диагностическую пункцию кости
- ~ выполнить томографию
- ~ выполнить остеотомию
- ~ выполнить доплерографию
- }

Укажите основные методы диагностики хронический остемелита: {

- ~ радиография
- ~ плетизмография
- = фистулография
- ~ реовазография
- ~ сцинтиграфия
- }

К первично-хроническому остеомиелиту относится: {

- ~ фиброзный остеомиелит
 - ~ лимфогенный остеомиелит
 - = альбуминозный остеомиелит Оллье
 - ~ туберкулез костей
 - ~ ятрогенный остеомиелит
- }

Укажите основные симптомы хронического остеомиелита: {

- ~ короткий анамнез заболеваний
 - ~ бессимптомное течение
 - = наличие секвестра и гнойного свища
 - ~ остеопороз
 - ~ наличие флегмоны мягких тканей
- }

Лучшие результаты лечения отмечаются при пломбировке секвестральной полости следующим материалом: {

- ~ пластмассой
 - ~эмбриональной тканью
 - = мышечным лоскутом на ножке
 - ~ гетеротканью
 - ~ брюшиной
- }

Как называется острое воспаление коленного сустава: {

- ~ коксит
 - ~ колит
 - ~ бурсит
 - = гонит
 - ~ омартрит
- }

Назовите способ лечения острого гнойного артрита: {

- = пункция сустава с промыванием антисептиками
 - ~ резекция сустава
 - ~ артротомия
 - ~ ампутация конечности
 - ~ экзартикуляция
- }

Бурсит это —: {

- ~ воспаление сустава
- ~ вывих сустава
- = воспаление околосуставной слизистой сумки

- ~ воспаление синовиальной оболочки сустава
- ~ воспаление околосуставных мягких тканей
- }

Гнойный артрит это—: {

- ~ воспаление синовиальных оболочек сустава
- = воспаление синовиальных оболочек и суставных поверхностей
- ~ воспаление слизистых сумок сустава
- ~ воспаление костных структур сустава
- ~ воспаление мягких тканей в области сустава
- }

Какого характера экссудат не наблюдается при остром гнойном артрите: {

- ~ серозный
- ~ гнилостный
- = гнойный
- ~ фибринозный
- ~ гангренозный
- }