

Что такое гемоперитонеум? {

- ~ скопление крови в полости сустава
 - ~ скопление крови в плевральной полости
 - = скопление крови в брюшной полости
 - ~ скопление крови в тканях
 - ~ скопление крови в забрюшинном пространстве
- }

Характерным признаком артериального кровотечения является: {

- ~ истечение крови постоянной струей
 - = истечение крови алой пульсирующей струей
 - ~ медленное (каплями) истечение крови
 - ~ кровоточивость всей раневой поверхности
 - ~ периодическое истечение крови из сосуда
- }

Причиной ранних вторичных кровотечений является: {

- ~ раневая инфекция
 - = гнойная аррозия сосудов
 - ~ прекращение спазма сосудов
 - ~ распад опухоли
 - ~ нарушение реологии крови
- }

Какие лабораторные анализы позволят Вам предположить наличие кровотечения? {

- ~ биохимический анализ крови
 - ~ общий анализ мочи
 - = общий анализ крови
 - ~ кислотно-щелочное состояние крови
 - ~ исследование крови на билирубин
- }

Признак правильности наложения жгута: {

- ~ синюшность кожи
 - ~ повышение температуры кожи ниже жгута
 - ~ отсутствие чувствительности ниже жгута
 - = исчезновение периферического пульса
 - ~ бледность кожи
- }

Развитие внутричерепной гематомы сопровождается: {

- ~ геморрагическим шоком
- ~ травматическим шоком
- ~ очаговыми нарушениями функций мозга на стороне гематомы

= очаговыми нарушениями функций мозга на противоположной стороне
 ~ нарушением функции внутренних органов
 }

В чем измеряется гематокрит?

~ Ммоль/литр
 ~ Грамм/кг
 ~ в процентах
 = в объемных процентах
 ~ в мм. ртутного столба
 }

Что такое гемоторакс? {

~ скопление крови в полости сустава
 = скопление крови в плевральной полости
 ~ скопление крови в брюшной полости
 ~ скопление крови в тканях грудной стенки
 ~ скопление крови в забрюшинном пространстве
 }

Характерный признак венозного кровотечения: {

= истечение крови постоянной темной струей
 ~ истечение крови пульсирующей струей
 ~ медленное (по каплям) истечение крови
 ~ кровоточит вся раневая поверхность
 ~ прерывистое истечение крови
 }

Наличие гемоперитонеума является показанием к: {

~ динамическому наблюдению
 ~ гемодиализу
 = экстренной операции
 ~ гемостатической терапии
 ~ КТ органов брюшной полости
 }

В чем измеряется гемоглобин крови ? {

~ в процентах
 ~ в литрах
 = Г/л
 ~ Ммоль/л
 ~ в мм
 }

Что такое гематома? {

~ скопление крови в полости сустава

- ~ скопление крови в плевральной полости
- = скопление крови в тканях
- ~ скопление крови в брюшной полости
- ~ скопление крови в перикарде
- }

Характерный признак паренхиматозного кровотечения? {

- ~ медленное (по каплям) истечение крови
- ~ истечение крови пульсирующей струей
- = кровоточит вся раневая поверхность
- ~ истечение крови постоянной (не пульсирующей) струей
- ~ наличие сгустков крови
- }

Какой метод диагностики может подтвердить наличие гемоторакса? {

- = пункция плевральной полости
- ~ пункция брюшной полости
- ~ бронхоскопия
- ~ лапароскопия
- ~ пункция сустава
- }

Какие эндоскопические методы исследования могут уточнить диагноз внутрибрюшного кровотечения? {

- ~ бронхоскопия
- = лапароскопия
- ~ эзофагогастродуоденоскопия
- ~ ректороманоскопия
- ~ колоноскопия
- }

Какой метод диагностики может объективно подтвердить наличие гемоперитонеума? {

- ~ R-скопия брюшной полости
- = лапароскопия
- ~ торакоскопия
- ~ радиоизотопное исследование
- ~ гастроскопия
- }

Использование какого рентгенологического исследования может подтвердить диагноз гемоторакса? {

- ~ R-скопия брюшной полости
- = R -скопия грудной клетки
- ~ контрастная рентгенография желудочно-кишечного тракта
- ~ внутривенная холангиография

~ контрастная урография
}

Максимальное время нахождения жгута на конечности летом: {

~ 15 минут
~ 30 минут
= 60 минут
~ 90 минут
~ 120 минут
}

Причина поздних вторичных кровотечений: {

~ интоксикация
= гнойная аррозия сосудов
~ прекращение спазма сосудов
~ тромбоз сосудов
~ прорастание сосудов опухолью
}

При повреждении подколенной артерии для остановки кровотечения показано: {

~ перевязка артерии
~ электрокоагуляций
= наложение сосудистого **шва**
~ тампонада
~ лазерная коагуляция сосуда
}

Первая помощь при ранении бедра, осложнённом артериальным кровотечением, заключается в: {

~ наложение давящей повязки
~ пальцевом прижатии бедренной артерии
~ пальцевом прижатии подколенной артерии
~ тампонаде раны
= наложение жгута
}

Шоковым индексом Альговера является: {

= отношение пульса к систолическому артериальному давлению
~ отношение систолического артериального давления к пульсу
~ отношение пульса к диастолическому артериальному давлению
~ отношение диастолического артериального давления к пульсу
}

При IV степени кровопотери дефицит ОЦК составляет: {

~ до 10%
~ 10-20%

~ 20-30%
 = свыше 30%
 }

Гемартроз – это: {

~ Кровоизлияние в паренхиматозные органы
 = скопление крови в полости сустава
 ~ пропитывание кровью мягких тканей
 ~ скопление крови в плевральной полости
 ~ скопление крови в брюшной полости
 }

Гемоперикард – это: {

~ кровоизлияние в паренхиматозные органы
 ~ скопление крови в полости сустава
 ~ скопление крови в брюшной полости
 ~ скопление крови в плевральной полости
 = скопление крови в околосердечной сумке
 }

К наиболее характерным признакам кровотечения из пищевода относятся: {

~ рвота цвета «кофейной гущи»
 = рвота неизменной кровью со сгустками
 ~ дегтеобразный стул
 ~ стул темно-вишневого цвета
 ~ выделение алой крови из заднего прохода
 }

Наиболее характерным признаком кровотечения из 12-перстной кишки является: {

~ рвота цвета «кофейной гущи»
 ~ рвота неизменной кровью со сгустками
 = дегтеобразный стул
 ~ стул темно-вишневого цвета
 ~ выделение алой крови из заднего прохода
 }

Пенистая кровь наблюдается при кровотечении из: {

~ носа
 ~ пищевода
 ~ желудка
 = легких
 ~ кишечника
 }

Кровотечение из 12-перстной кишки относится: {

~ внутреннему
 ~ наружному

- ~ смешанному
- = полостному
- }

Укажите причину возникновения диапедезного кровотечения: {

- ~ разрыв сердца
- ~ аррозивный процесс
- = повышение проницаемости мелких сосудов
- ~ изъятие стенки сосуда
- ~ нарушения химического состава крови
- }

Если кровь из плевральной полости не свертывается, это указывает на: {

- ~ повреждение сердца
- = остановку кровотечения
- ~ продолжающееся кровотечение
- ~ повреждение легкого
- ~ открытый пневмоторакс
- }

Укажите максимальное время наложения жгута на нижнюю конечность: {

- ~ 30 минут
- ~ 1 час
- ~ 1,5 час
- = 2 часа
- ~ 2,5 часа
- }

Точкой прижатия височной артерии при ее повреждении является: {

- ~ по верхнему краю ушной раковины к височной кости
- ~ позади ушной раковины
- ~ ниже ушной раковины
- = ниже и спереди от ушной раковины к нижней челюсти
- ~ выше и спереди от ушной раковины к скуловой кости
- }

В каком ответе наиболее полно перечислены способы окончательной остановки кровотечения? {

- ~ механический, биологический, этиологический
- ~ физический, химический, биологический, смешанный
- = механический, физический, химический, биологический, комбинированный
- ~ механический, физический, патологический
- }

Оптимальным способом остановки кровотечения из варикозных вен нижней конечности является: {

- ~ наложение жгута
- = наложение давящей повязки и возвышенное положение нижней конечности
- ~ применение химических веществ
- ~ сосудистый шов
- ~ электрокоагуляция
- }

Оптимальным способом остановки паренхиматозного кровотечения является: {

- ~ давящая повязка
- = тампонада
- ~ наложения сосудистого шва
- ~ лигирование кровотокающих сосудов
- ~ оставление постоянного зажима на кровоточащем сосуде
- }

Сосудистый шов накладывается в следующих случаях: {

- ~ при повреждении капилляров
- ~ при повреждении артериол
- ~ при повреждении венул
- ~ при повреждении любых сосудов
- = при повреждении магистральных сосудов
- }

Гематокритное число – это: {

- ~ разница между систолическим и диастолическим давлением
- ~ разница между показателями гемоглобина больного и в норме
- ~ соотношение между количеством эритроцитов и лейкоцитов
- ~ соотношение объема плазмы и объему форменных элементов
- = соотношения объема форменных элементов к объему плазмы
- }

На начальном этапе лечения острой кровопотери начинают с переливания: {

- ~ эритроцитарной массы
- ~ кристаллоидных растворов
- = коллоидных растворов
- ~ свежзамороженной плазмы
- ~ свежцитратной крови
- }

Таблица Барашкова используется для: {

- ~ определения вязкости крови
- = определения количества потерянной крови по методу Ван Слайка - Филлипса
- ~ определения ОЦК
- ~ определения удельного веса крови
- ~ определения гематокрита

}

Наиболее информативным методом определения кровопотери является: {

~ определения шокового индекса Альговера

~ определение гематокрита

= определения ОЦК

~ определения количества эритроцитов

~ метод Ван Слайка – Филлипса

}