

ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Основной формой транспорта кровью жирорастворимых гормонов к органам- мишеням является их перенос: {

~в свободном виде

=в комплексе со специфическими белками плазмы

~в комплексе с водо-растворимыми витаминами

~ в комплексе с жирами

}

Выделение глюкокортикоидов регулирует гормон: {

~окситоцин

=адренокортикотропный гормон

~лютеинизирующий гормон

~глюкагон

}

Прогестерон синтезируется: {

~в коре надпочечников

=в яичнике

~в гипофизе

~в мозговом веществе надпочечников

}

Окситоцин выделяется: {

~надпочечниками

=нейрогипофизом

~аденогипофизом

~щитовидной железой

}

Вазопрессин вызывает... кроме: {

=сокращение мускулатуры матки

~усиление реабсорбции воды в собирательных трубках почек

~сужение кровеносных сосудов

~увеличение АД

}

Стимулирующее влияние на метаболизм белков оказывает: {

~альдостерон

=тироксин

~паратгормон
~адреналин
}

Тироксин синтезируется: {
~в надпочечниках
=в щитовидной железе
~в гипофизе
~в яичнике
}

Влияние на углеводный обмен преимущественно оказывают: {
~глюкагон, паратгормон
=инсулин, глюкокортикоиды
~инсулин, окситоцин
~адреналин, альдостерон
}

Образование АТФ в работающей мышце усиливается под влиянием: {
~глюкагона
=адреналина
~инсулина
~соматотропного гормона
}

В передней доле гипофиза синтезируется гормон: {
=соматотропный
~окситоцин
~тироксин
~антидиуретический
}

Задней долей гипофиза выделяется гормон: {
~тироксин
=антидиуретический
~меланоцитостимулирующий
~адренокортикотропный
}

Лютеинизирующий гормон стимулирует: {

- ~развитие фолликула
- =развитие желтого тела
- ~гиперплазию матки
- ~развитие молочных желез

}

Преимущественно катаболическое действие оказывают: {

- ~инсулин, глюкагон
- =адреналин, тироксин
- ~глюкагон, АДГ, паратгормон
- ~АКТГ, АДГ паратгормон

}

Удаление паращитовидных желез вызывает: {

- ~гиперкальциемию
- =гипокальциемию
- ~гипокалиемию
- ~гиперкалиемию

}

Повышение основного обмена наблюдается при гиперфункции: {

- ~надпочечников
- =щитовидной железы
- ~половых желез
- ~поджелудочной железы

}

Тремор конечностей наблюдается при гиперпродукции: {

- ~АКТГ
- =тироксина
- ~глюкагона
- ~адреналина

}

Гипергликемия наблюдается при гиперпродукции: {

- =глюкагона
- ~инсулина
- ~тироксина
- ~ АДГ

}

Гипогликемию связывают с действием гормона: {

~альдостерона

=инсулина

~адреналина

~тестостерона

}

Ретенция (задержка) натрия в организме связана с действием гормона: {

~глюкагона

=альдостерона

~АДГ

~инсулина

}

Ретенция (задержка) воды в организме связана с действием гормона: {

~альдостерона

=АДГ

~адреналина

~инсулина

}

К гонадотропным гормонам гипофиза относят... кроме: {

~фоллитропин

=эстрогены

~лютропин

~соматотропин

}

Кора надпочечников выделяет.... кроме: {

~половые гормоны

~минералокортикоиды

=АКТГ

~глюкокортикоиды

}

Вилочковая железа выделяет гормоны... кроме: {

~тимозин

=паратирин

~гомеостатический тимусный гормон

~тимопоэтин I и II

~тимусный гуморальный фактор

}

Инсулярные клетки поджелудочной железы синтезируют гормоны...
кроме: {

- ~инсулин (бета-клетки);
- =окситоцин (паравентрикулярные ядра)
- ~глюкагон (альфа-клетки);
- ~соматостатин (дельта-клетки);

}

Явления, развивающиеся при значительных изменениях функций
щитовидной железы...кроме: {

- ~кретинизм
- ~микседема
- =сахарный диабет
- ~тиреотоксикоз
- ~эндемический зоб

}

Инсулин вызывает...кроме: {

- ~повышение проницаемости клеточных мембран для глюкозы
- ~способствует превращению глюкозы в гликоген в печени и мышцах;
- ~снижение уровня глюкозы в крови;
- =увеличение обратного всасывания воды в почечных канальцах (собирательные трубки).

}

Глюкокортикоиды коры надпочечников

влияют на...кроме: {

- ~усиление глюконеогенеза;
- ~повышение отложения гликогена в печени;
- ~торможение утилизации глюкозы в тканях;
- ~вызывая распад тканевого белка, задерживают формирование грануляций и заживление ран
- =выделение молока

}

В процессе развития стресса различают стадии...кроме: {

~истощения

~тревоги

=деполяризации

~резистентности

}

Выделение глюкокортикоидов регулируют гормоны... кроме: {

~кортиколиберин

~кортикотропин

=АДГ

~кортикостатин

}

Физиологически активные вещества, продукты синтезирующие вне желез внутренней секреции, называются: {

~гормоны

=гормоноиды

~телегроны

~парагормоны

}

Физиологически активные вещества, образующиеся в железах внешней секреции одного организма и влияющие на другие особи (феромоны, алломоны), называются: {

~гормоны

=телегроны

~гормоноиды

~парагормоны

}

Повышенный распад гликогена в печени и мышцах, гипергликемия - симптомы увеличения активности какого гормона: {

~инсулина

=глюкагона

~АДГ

~адреналина

}

Кретинизм - чаще синдром заболевания какой железы: {

~паращитовидной

=щитовидной
~гипофиза
~мозгового вещества надпочечников
}

Какой из обозначенных гормонов подавляет распад жира и активирует окисление кетоновых тел в печени: {
~соматотропный
=инсулин
~глюкокортикоиды
~клюкагон
}

Тестостерон вызывает: {
~сокращение мускулатуры матки;
=повышает libido
~снижает уровень кальция в крови
~снижает уровень калия в крови
}

Мелатонин обладает свойствами
.....кроме: {
~обесцвечивать меланофоры
~тормозить развитие половых функций у
молодого организма
~угнетать действие гонадотропных
гормонов у взрослых
=снижать глюкозу в крови
~прямо действовать на гипоталамус,
блокируя выброс люлиберина, и на
аденогипофиз через люлиберин, уменьшая
освобождение лютропина
}

Первично пол программируется в основном: {
~на гормональном уровне
=на генетическом уровне
~на стадии эмбриогенеза
~на стадии образовании зиготы
}

Какой из названных гормонов тормозит через гипоталамус развитие половых функций у молодого организма и угнетает действие гонадотропинов у взрослого: {

=мелатонин

~гормон сетчатой зоны коры надпочечников

~пролактин

~тимозин

}

Гормоны какой из названных желез внутренней секреции регулируют иммунологические защитные реакции, развитие и распределение лимфоцитов, выработку антител, дифференциацию Т- лимфоцитов: {

~эпифиз

=вилочковая железа

~кора надпочечников

~щитовидная железа

}

К стероидным гормонам плаценты относят: {

~плацентарный лактогенный гормон и релаксин

=прогестерон и эстрогены

~хорионический гонадотропин

~пролактин

}

В какой из желез внутренней секреции много витамина С (в этом отношении она уступает только коре надпочечников): {

~гипофиз

~эпифиз

=вилочковая железа

~паращитовидные железы

}

Какой термин неверно приведен в перечне гуморальных влияний: {

~гормональное

~паракринное

~изокринное

~аутокринное

=рефлекторное

}

Какие из перечисленных эффектов
инсулина обозначают как очень быстрые: {
~увеличение поглощения клетками
аминокислот
~подавление катаболизма и усиление
анаболизма
=увеличение проницаемости мембран
для глюкозы, активация Na, K- АТФ-азы
~активация митогенеза и размножения
Клеток
}

Концентрация какого из названных гормонов возрастает при значительном
повышении кальция в крови, облегчая минерализацию и подавляя
резорбцию костной ткани: {
~паратирин
=кальцитонин
~тироксин
~тиреотропин
}

Какие из названных клеток синтезируют йод содержащие тиреоидные
гормоны: {
=а - клетки щитовидной железы
~к - клетки щитовидной железы
~клетки паращитовидной железы
~клетки вилочковой железы
}

Выделите внутриклеточные мишени тиреоидных гормонов: {
~рибосомы
~аппарат Гольджи
=ядро и митохондрии
~ мембрана клетки
}

Какая ткань яичника вырабатывает гормон эстрадиол, эстрон: {
=клетки гранулезы фолликулов
~желтое тело
~фолликулы
~корковое вещество яичника

