

ФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ И ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

В переднем отделе гипоталамуса находится центр: {

- ~химической терморегуляции
- ~жажды
- ~сна и пробуждения
- =физической терморегуляции

}

В заднем отделе гипоталамуса находится центр: {

- ~жажды
- ~физической терморегуляции
- ~насыщения и голода
- =химической терморегуляции

}

Зоной комфорта называется температура окружающей среды: {

- ~16-18с
- ~22-24с
- =18-20с
- ~26-28с

}

Теплообразование в мышцах при тяжелой мышечной работе повышается: {

- ~на 10%
- ~на 50-80%
- =на 400-500%
- ~на 1-2%

}

Суточная температура тела у человека в норме колеблется в пределах: {

- ~35.6-36.6с
- ~36.4-37.5с
- =36.5-36.9с
- ~35.9-36с

}

Тепловой удар может возникнуть при температуре тела: {

- ~37-38с

~38-39с
=40-41с
~35-38с
}

Наибольшее количество тепла образуется: {
~в легких
~в почках
~в соединительной ткани
=в работающей скелетной мышце
}

Отдача тепла при температуре комфорта идет интенсивнее путем: {
~конвекции
~испарения
=излучения
~теплопроводения
}

При понижении температуры окружающей среды сосуды внутренних органов: {
~сужаются
~не изменяют просвета
=расширяются
~ не участвуют в процессе терморегуляции
}

При повышении температуры окружающей среды кожные капилляры: {
~сужаются
~не изменяют просвета
=расширяются
~не участвуют в процессе терморегуляции
}

Самая низкая температура тела человека наблюдается в области кожи: {
~щек
~спины
=пальцев ног и рук
~волосистой части головы
}

Наиболее высокая температура тела человека наблюдается: {

~в 7 ч

~в 13 ч

~в 19 ч

=в 18 - 20 ч

~в 15 ч

}

Наиболее низкая температура тела здорового человека наблюдается: {

~в 7 ч

~в 13 ч

~в 19 ч

=в 4- 6 ч

}

Под влиянием тироксина температура тела: {

~понижается

~не изменяется

=повышается

~повышается утренние часы

}

Изотермия свойственна животным: {

~пойкилотермным

~гетеротермным

=гомойотермным

~свойственно новорожденным

}

Наиболее высокую температуру в организме имеет: {

~головной мозг

~желудок

=печень

~кожа

}

Отдача тепла у человека, находящегося в воде, идет путем: {

~испарения

~излучения

=теплопроводения

~конвекции

}

Основные центры терморегуляции расположены: {

~в таламусе

~в коре больших полушарий

=в гипоталамусе

~в продолговатом мозге

}

Постоянство температуры тела называется: {

~гипертермией

~гипотермией

=изотермией

~гомеостазом

}

Процессы образования тепла в организме объединяют понятием: {

~термостабилизация

~теплоотдача

=теплопродукция

~теплопроводения

}

Наибольшая доля тепла в организме образуется: {

~в сердце, почках

~в соединительной ткани, мышцах

~в костной ткани, печени

=в мышцах, печени, почках

}

В условиях холода теплообразование в мышцах: {

~возрастает постепенно

~не изменяется

~снижается

=резко возрастает

}

Процессы отдачи тепла организмом объединяют понятием терморегуляции: {

~химической

~метаболической

=физической
~мышечной дрожю
}

Отдача тепла организмом осуществляется путем: {
~повышения тонуса мышц и дрожи
~мышечной деятельности
~изменения основного обмена
=теплоизлучения, конвекции, теплопроводения, испарения
}

Повышение температуры тела выше 37с называется: {
~гипотермией
~изотермией
=гипертермией
~конвекцией
}

Охлаждение организма до 35 с называется: {
~гетеротермией
~гипертермией
~изотермией
=гипотермией
}

Наибольшее количество центральных терморецепторов находится: {
~в продолговатом мозге
~в спинном мозге
=в гипоталамусе
~в коре больших полушарий
}

Отдача тепла организмом путем контакта с потоками воздуха или жидкости называется: {
~теплоизлучением
~испарением
=конвекцией
~теплопроводением
}

Отдача тепла предмету при его соприкосновении с поверхностью тела

называется: {
~теплоизлучением
~испарением
~конвекцией
=теплопроводением
}

Отдача тепла испарением при 100% относительной влажности: {
~высокая
~низкая
=полностью отсутствует
~не значительно снижается
}

Наиболее интенсивный путь теплоотдачи при температуре комфорта: {
~конвекция
~теплопроводение
=излучение
~испарение
}

В терморегуляции преимущественно участвуют гормоны желез внутренней секреции: {
~поджелудочной железы, надпочечников
~гипофиза, щитовидной железы
~околощитовидной железы, половых желез
=щитовидной железы, надпочечников
}

Под влиянием тироксина и адреналина теплообразование: {
~не изменяется
~уменьшается
=увеличивается
~уменьшается и увеличивается
}

При снижении температуры внешней среды количество тироксина и адреналина в крови: {
~снижается
~не изменяется
=повышается

~повышается незначительно
}

Суточная потребность человека среднего возраста в углеводах равна: {
~70-100 г
~150-200 г
=400-450 г
~более 450г
}

Суточная потребность человека среднего возраста в белках равна: {
~150-200 г
~400-450 г
=80-120 г
~менее 80г
}

Суточная потребность человека среднего возраста в жирах равна: {
~100-150 г
~400-450 г
=70-100 г
~более 450г
}

Преимущественное действие на углеводный обмен оказывает гормон: {
~тироксин
~альдостерон
~антидиуретический
=глюкагон
}

Преимущественное действие на белковый обмен оказывает гормон: {
~инсулин
~адреналин
~антидиуретический
=тироксин
}

Усиливают распад белков в тканях гормоны: {
~вазопрессин, соматотропин
=адреналин, норадреналин

~инсулин, соматостатин
~АДГ и окситоцин
}

Стимулирует синтез белка в тканях гормон: {
~гидрокортизон
~адреналин
=соматотропин
~вазопресин
}

К жирорастворимым относятся витамины: {
~группы В
~С, Р
=А, Е, Д
~ Е, К, Р
}

При отсутствии в потребляемой пище незаменимых аминокислот наблюдается: {
~положительный азотистый баланс
~азотистое равновесие
=отрицательный азотистый баланс
~не влияет на азотистый баланс
}

К водорастворимым относятся витамины: {
~А, Д, Е
~Е, К, Р
=В, С, Р
~группы В и А
}

Образование сложных органических соединений из простых с затратой энергии называется: {
~основным обменом
~диссимиляцией
=ассимиляцией
~биосинтез
}

Распад сложных органических соединений до простых с выделением энергии называется: {

~ассимиляцией

~основным обменом

=диссимиляцией

~метаболизм

}

Соотношение количества азота, поступившего в организм с пищей и его количества, выведенного из организма, называется: {

~ретенцией (задержкой) азота

~белковым минимумом

=азотистым балансом

~отрицательным азотистым балансом

}

Единство организма и среды проявляется в непрерывном: {

~обмене энергией между организмом и средой

~обмене веществ между организмом и средой

=обмене веществами, энергией,

информацией между организмом и средой

~поступлении в организм веществ и выделении токсических веществ

}

Энергозатраты организма можно определить путем измерения: {

~ЧСС и АД

~уровня глюкозы и свободных жирных кислот в крови

=количества выделяемого тепла

~ЧСС и ПД

}

Затраты энергии на выполнение мышечной нагрузки: {

~основной обмен энергии

~валовый обмен энергии

=рабочий обмен энергии

~рабочий и основной обмен энергии

}

Зная объем поглощенного кислорода, можно определить величину основного обмена методом: {

~прямой калориметрии

~полного газоанализа
=неполного газоанализа
~не прямой калориметрии
}

Отношение объема выделенного углекислого газа к объему поглощенного кислорода называется: {
~калорической ценностью питательных вещества
~калорическим эквивалентом кислорода
=дыхательным коэффициентом
~калорическим эквивалентом кислорода и дыхательным коэффициентом
}

Общий обмен после приема белковой пищи: {
~уменьшается на 15%
~не изменяется
=увеличивается на 30 %
~увеличивается на 18 %
}

Общий обмен после приема углеводной пищи: {
~уменьшается на 15%
~не изменяется
=увеличивается на 15%
~увеличивается на 30 %
}

Состояние, при котором количество выведенного азота меньше количества азота, поступившего в организм, называется: {
~отрицательным азотистым балансом
~азотистым балансом
~азотистым равновесием
=положительным азотистым балансом
}

