

Причиной паренхиматозной дыхательной недостаточности может быть: {

~стеноз в/дыхательных путей

~аспирация инородных тел

~опухоль головного мозга

=ателектаз легочной ткани

~все перечисленное

}

Нормобарическая форма гипоксии возникает: {

~при подъеме на высоту

~при быстром подъеме водолазов

=при нахождении человека в замкнутых пространствах

~при резком снижении общего барометрического давления в барокамерах

~все перечисленное

}

Внешнее дыхание включает: {

=обмен газов альвеол и кровью малого круга кровообращения

~транспорт CO₂ и O₂

~утилизация O₂ тканями

~сочетание (транспорт CO₂ и O₂), (утилизация O₂ тканями)

~все перечисленное

}

Как вы понимаете пневмоторакс: {

~скопление крови в плевральной полости

~накопление экссудата в плевральной полости

=попадание воздуха в плевральную полость

~образование спаек между париетальной и висцеральной плеврой

~попадание инородного тела в плевральную полость

}

Какие приспособительные реакции возникают при гипоксической гипоксии: {

~увеличивается скорость кровотока

=учащается дыхание и увеличивается

минутный объем крови

~повышается внутри - альвеолярное давление

~уменьшается масса циркулирующей крови

~увеличивается диастолический приток Крови

}

Какое влияние на дыхание оказывает внезапное повышение кровяного давления: {

~учащает дыхание

~углубляет вдох

~уменьшается легочная вентиляция

=возникает остановка дыхания (апноэ)

~увеличивается легочная вентиляция

}

Какой вид гипоксии характеризуется уменьшенной способностью использовать кислород: {

~анемическая (кровяная) гипоксия

~циркуляторная гипоксия

~гипоксическая гипоксия

=тканевая (гистотоксическая) гипоксия

~смешанная гипоксия

}

Чаще всего одышка проявляется в виде: {

~глубокого замедленного дыхания

~глубокого и частого дыхания

=поверхностного и учащенного дыхания

~поверхностного и уряженного дыхания

~периодического дыхания

}

Чем характеризуется первый период асфиксии: {

~кратковременной остановкой дыхания

~замедлением сердечной деятельности

~угасанием основных рефлексов

~урежением дыхания

=возбуждением дыхательного центра

}

В чем заключается защитная роль Кашля: {

~усиливается присасывающая сила грудной клетки

~улучшается приток крови к правому сердцу

=удаляется из дыхательных путей мокрота

~усиливаются дыхательные движения

~способствует усилению легочной Вентиляции

}

К чему может привести хронический кашель в пожилом возрасте: {

=к эмфиземе легких

~к ателектазу легких

~к пневмотораксу

~к отеку легких

~к поражению дыхательных мышц

}

Что лежит в основе возникновения периодического дыхания: {

~нехватка углекислоты

~избыток CO_2 и повышенная возбудимость дыхательного центра

~недостаток CO_2

~повышенная возбудимость дыхательного центра

⇒понижение возбудимости дыхательного центра и дефицит O₂

}

В чем состоит благоприятное влияние замедленного и глубокого дыхания: {

~в усилении энергетических затрат и уменьшении легочной вентиляции

~в недостаточном использовании дыхательной поверхности

~в увеличении остаточного объема воздуха

⇒в увеличении альвеолярной вентиляции и уменьшении энергетических затрат

~в уменьшении энергетических затрат на работу дыхательных мышц

}

Чем характеризуется дыхание Биота: {

~нарастанием глубины дыхания с постепенным уменьшением и паузой

~уреженным (единичным) и усиленным дыханием с продолжительными паузами

⇒наличием пауз при усиленном и равномерном дыхании

~чередованием усиленного и ослабленного дыхания

~чередованием частых и редких дыхательных движений

~раздражение поверхности альвеол

}

В чем причина кашля: {

~раздражение слизистой носа

~сдавление мелких бронхов

~нарушение кровообращения в дыхательном центре

⇒раздражение слизистой трахеи, бронхов

}

Характеристика дыхания Куссмауля: {

⇒уреженное (единичное) и усиленное дыхание с продолжительными паузами

~нарастание глубины дыханий сменяется постепенным уменьшением и паузой

~наличие пауз при усиленном и равномерном дыхании

~чередование усиленного и ослабленного дыхания

~чередование частых и редких дыхательных движений

}

К чему приводит раздражение легочных ветвей блуждающего нерва: {

~к учащению дыхания

~к урежению дыхания

~не оказывает никакого влияния

=к преждевременному торможению вдоха

~к преждевременному торможению выдоха

}

Как изменяется газовый состав крови при замедлении кровотока: {

~содержание углекислоты увеличивается

~содержание углекислоты уменьшается

~содержание кислорода уменьшается

~увеличивается содержание CO₂ и увеличивается O₂

=увеличивается содержание CO₂ и уменьшается O₂

}

Как изменяется дыхание при скоплении жидкости в плевральной полости: {

=дыхание становится поверхностным и частым

~возникает стенотическое дыхание

~дыхание становится глубоким и частым

~дыхание становится глубоким и редким

~возникает инспираторная одышка

}

Основная причина нарушения кровообращения при кашле: {

~ослабление присасывающей силы грудной клетки

=затруднение оттока крови к правому сердцу по венам

~сдавление легочных сосудов

~ослабление диастолического опорожнения сердца

~уменьшение силы сердечных сокращений

}

Какие гуморальные факторы играют основную роль в патогенезе одышки: {

=нарушение газового состава крови

~накопление в крови биологически активных веществ

~увеличение щелочных резервов крови

~повышение артериального давления

~накопление в крови недоокисленных продуктов

}

Как вы понимаете пневмоторакс: {

~скопление крови в плевральной полости

~накопление экссудата в плевральной полости

=попадание воздуха в плевральную полость

~образование спаек между париетальной и висцеральной плеврой

~попадание инородного тела в плевральную полость

}

Чем обусловлено замедление сердечной деятельности во втором периоде

асфиксии: {

~раздражением симпатических нервов

=раздражением центра вагуса

~угасанием всех рефлексов

~резким торможением коры головного мозга

~угнетением деятельности вазомоторного центра

}

Укажите признаки, характерные для гипоксии циркуляторного типа: {

=снижение линейной скорости кровотока

~уменьшение артериовенозной разности по кислороду

~уменьшение содержания кислорода в артериальной крови

~алкалоз

~увеличение объемной скорости капиллярного кровотока

}

Укажите возможную причину гипоксии тканевого типа: {

~отравление метгемоглобинообразователями

=отравление цианидами

~острая кровопотеря

~образование карбоксигемоглобина

~повышение активности ферментов тканевого дыхания

}

Укажите, при какой патологии возникает острая недостаточность внешнего дыхания:

{

~гидротораксе

~экссудативном плеврите

=приступе бронхиальной астмы

~обструктивной эмфиземе легких

~все перечисленное

}

Какие Вы знаете метгемоглобино - образователи: {

~мышьяковистые препараты

~антибиотики

=сульфаниламиды

~витамины группы В

~сочетание (мышьяковистые препараты), (антибиотики)

}

Укажите механизмы, ведущие к увеличению кислородной емкости крови при умеренной повторной гипоксии: {

~увеличение сердечного выброса

=усиление эритропоэза

~выход депонированных эритроцитов

~повышение объема альвеолярной вентиляции

~сдвиг кривой диссоциации Нв вправо

}

Укажите причины гемического типа гипоксии: {

~отравление СО

~гиповитаминоз В12

~хроническая кровопотеря

=отравление СО и хроническая кровопотеря

~снижение pO_2 в воздухе

}

Укажите причины дыхательного типа гипоксии: {

~снижение pO_2 в воздухе

~отравление СО

=эмфизема легких

~отравление нитратами

~недостаточность митральных клапанов

}

Укажите причину циркуляторного типа гипоксии: {

~травматический шок

=миокардит

~хроническая кровопотеря

~отравление нитратами

~острая массивная кровопотеря

}

В каких случаях сродство гемоглобина к кислороду уменьшается: {

~гипокапнии

=повышении температуры тела

~метаболическом алкадозе

~снижении температуры тела

~уменьшении в эритроцитах 2,3 –дифосфоглицерата

}

Какие изменения с наибольшей вероятностью могут наблюдаться у человека, длительное время проживающего высоко в горах: {

~ повентиляция легких

=гипертрофия сердца

~торможение синтеза нуклеиновых кислот и белков

~уменьшение гематокрита

~активация выброса депонированной крови

}

При каких патологических состояниях возникает экспираторная одышка: {

=при астматоидном бронхите

~при стенозе верхних дыхательных путей

~при асфиксии в 1-ю стадию

~при обструкции дыхательных путей жидкой пищей

~сочетание (при стенозе верхних дыхательных путей), (при асфиксии в 1-ю стадию)

}

Какой вид одышки возникает при приступах аллергической бронхиальной астмы: {

~частая поверхностная

~частая глубокая

~редкая глубокая

=с преимущественным нарушением выдоха

~с преимущественным нарушением вдоха

}

Укажите, когда наблюдается инспираторная одышка: {

~эмфизема легких

~приступ бронхиальной астмы

=отек гортани

~2-я стадия асфиксии

~фиброз легких

}

Укажите состояние, при котором в большинстве случаев наблюдается экспираторная одышка: {

=приступ бронхиальной астмы

~1-я стадия асфиксии

~сужение трахеи

~фиброз легких

~сочетание (1-я стадия асфиксии), (сужение трахеи)

}

Какой тип дыхания характерен для крупозной пневмонии: {

~частое глубокое дыхание (гиперпноэ)

~глубокое редкое дыхание

~дыхание Биота

=частое поверхностное дыхание (полипноэ)

~дыхание Куссмауля

}

Какие характерные изменения проявляются при недостаточности дыхания первой степени: {

~одышка в покое

~цианоз

=тахипноэ при нагрузке

~тахикардия

~все перечисленное

}

При каких заболеваниях нарушения вентиляция легких развиваются по рестриктивному типу: {

~эмфиземе

=пневмонии

~сухом плеврите

~бронхите

~поражении диафрагмального нерва

}

При каких заболеваниях нарушения вентиляции легких развиваются по обструктивно-рестриктивному (смешанному) типу: {

~крупозной пневмонии

~хроническом обструктивном бронхите

~плеврите

=эмфиземе легких

~ателектазе легких

}

Какой тип дыхания развивается при стенозе гортани: {

~частое поверхностное дыхание (полипноэ)

~частое глубокое дыхание (гиперпноэ)

~дыхание Биота

=редкое глубокое дыхание с затрудненным входом

~дыхание Чейн-Стокса

}

Почему при гипервентиляционном синдроме нередко развиваются судороги: {

~потому что возникает гиперкальциемия

=потому что возникает гипокальциемия

~потому что возникает гипонатриемия

~потому что возникает гипокалиемия

~сочетание (потому что возникает гипонатриемия), (потому что возникает гипокалиемия)

}

Что является непосредственной причиной включения рефлекса Швачко-Парина: {

~резкое падение давления в легочном стволе

=резкое повышение давления в легочном стволе

~недостаточность левожелудочкового типа

~нарушение функций правого желудочка

~гиповолемия

}

Как изменится индекс Тиффно при эмфиземе легких: {

~увеличится

=уменьшится

~не изменится

~незначительно увеличится

~незначительно уменьшится

}

Какой тип дыхания может развиваться при понижении возбудимости дыхательного центра: {

~полипноэ

=дыхание Биота

~олигопноэ

~гиперпноэ

~гаспинг-дыхание

}

Появление у больного дыхания Куссмауля с наибольшей вероятностью свидетельствуют о развитии у него: {

~респираторного алкалоза

~метаболического алкалоза

~респираторного ацидоза

=метаболического ацидоза

~торможения дыхательного центра

}

В патогенезе стенотического дыхания главную роль играет: {

~понижение возбудимости дыхательного центра

=запаздывание рефлекса Геринга-Брейера

~ускорение рефлекса Геринга-Брейера

~повышение возбудимости дыхательного центра

~понижение возбудимости дыхательного Центра

}

Укажите наиболее вероятные причины тахипноэ. :{

~гипероксия

~ацидоз декомпенсированный

~понижение возбудимости дыхательного центра

=повышение возбудимости дыхательного центра

~гипероксия, ацидоз декомпенсированный и понижение возбудимости дыхательного центра

}

Наиболее вероятные причины брадипноэ: {

~гипоксия

=понижение возбудимости дыхательного центра

~гипоксимия

~ацидоз компенсированный

~все перечисленное

}

Рестриктивная недостаточность внешнего дыхания возникает: {

~при возбуждении дыхательного центра

~при снижении возбудимости дыхательного центра

~при стенозе верхних дыхательных путей

=при дефиците сурфактанта

~при поражении мотонейронов

}

Когда возникает дефицит сурфактанта: {

~при вдыхании высоких концентраций кислорода

~при заболеваниях верхних дыхательных путей

~при гиалиновом мембранозе

~при алкалозе

=при вдыхании высоких концентраций кислорода и при гиалиновом мембранозе

}

Чем характеризуется первый период асфиксии: {

~расширением зрачков

~понижением А/Д

~брадикардией

=инспираторной одышкой

~экспираторной одышкой

}

Чем характеризуется второй период асфиксии: {

~общим возбуждением

~тахикардией и снижением А/Д

~сужением зрачков

=брадикардией и снижением А/Д

~инспираторной одышкой

}

Брадипноэ может развиваться при : {

~воспалении легких

~эмфиземе

~пневмотораксе

=длительной гипоксии

~бронхиальной астмы

}

Гиперпноэ характеризуется: {

~частым поверхностным дыханием

=частым глубоким дыханием

~редким глубоким дыханием

~с преимущественным нарушением выдоха

~сочетание (частым поверхностным дыханием), (с преимущественным нарушением выдоха)

}

При какой патологии внешнего дыхания возникает экспираторная одышка: {

=во второй стадии асфиксии

~эмфиземе легких

~воспалении легких

~ателектазе легких

~все перечисленное

}

При какой патологии возникает нарушение диффузии газов через альвеолокапиллярную мембрану: {

=интерстициальном отеке легкого

~пневмотораксе

~возбуждении дыхательного центра

~гипервентиляции

~все перечисленное

}

Чем отличается утомление дыхательных мышц от их слабости: {

=обратимостью процесса

~необратимостью процесса

~возникает при повреждении мотонейронов грудного отдела спинного мозга

~возникает при полимиозитах

~возникает при мышечной дистрофии

}

Укажите возможную причину развития посткапиллярной формы легочной гипертензии:

{

=левожелудочковая недостаточность сердца

~правожелудочковая недостаточность сердца

~сочетание (правожелудочковая недостаточность сердца), (тромбоз легочной артерии)

~тромбоз легочной артерии

~гиповолемия

}

Гипервентиляция легких возникает при: {

~газовом алкалозе

~метаболическом алкалозе

=ушибе или сотрясении мозга

~стенозе верхних дыхательных путей

~бронхиолитах

}

Какие нарушения возникают при гипоксии в организме: {

=снижается мозговой кровоток

~повышается мозговой кровоток

~повышается внутричерепное давление

~повышается А/Д

~все перечисленное

}

Какие нарушения возникают при гипокании в организме: {

~повышается мозговой кровоток

=снижается коронарный кровоток

~повышается внутричерепное давление

~повышается А/Д

~все перечисленное

}

Назовите возможную причину развития дыхательной недостаточности преимущественно рестриктивного типа: {

~отечно-воспалительное поражение бронхов

=обширное воспаление легких

~спазм бронхиол

~сухой плеврит

~эмфизема легких

}

В патологии одышку могут вызвать: {

~гипероксимия

~алкалоз

~понижение обмена веществ

=энцефалит

~все перечисленное

}

Гаспинг-дыхание характеризуется: {

=единичными, редкими, убывающими по силе "вздохами"

~судорожными непрекращающимся усилием вздохнуть, изредка прерываемым выдохом

~периферическими дыхательными движениями с постоянной амплитудой

~все перечисленное

~циклическим изменением дыхания

}

При каком патологическом состоянии наиболее часто проявляется дыхание Куссмауля:

{

~тепловом ударе

~горной болезни

~гипертермии 2 степени

=диабетической коме

~все перечисленное

}

Назовите вид патологии, при котором нарушается перфузия легких, ведущая к дыхательной недостаточности: {

~бронхиальная астма

~миастения

~истерия

=левожелудочковая сердечная недостаточность

~гиперволемиа

}

Для альвеолярной гиповентиляции характерны: {

=гипоксемия, гиперкапния, ацидоз

~гипоксемия, гипокапния, ацидоз

~гипоксемия, гиперкапния, алкалоз

~гипоксемия, гипокапния, алкалоз

}

Какие изменения в организме возникают при гипокапнии: {

~повышается А/Д

~диссоциации оксигемоглобина увеличивается

~увеличивается мозговой кровоток

=снижается мозговой и коронарный кровоток

~все перечисленное

}

Чему равна эффективная альвеолярная вентиляция в покое у здорового человека: {

~2,5-3,5 л

~3,5-4 л

=4-5 л

~более 5 л

}

При поражении диафрагмального нерва возникает: {

=парадоксальное дыхание

~брадиное

~тахипное

~полипное

~дыхание с затруднением выдох

}

Длительные приступы кашля приводят: {

~ к снижению внутригрудного давления

=к повышению внутригрудного давления

~к повышению системного А/Д

~к снижению венозного давления

}

При поражениях грудного протока в плевральной полости определяется: {

~серозная жидкость

~катаральный экссудат

=хилезная жидкость

~жидкость с содержанием фибриногена

~все перечисленное

}

При прорыве абсцесса легких в бронх и в плевральную полость, возникают: {

~пневмоторакс

~гидроторакс

=гидропневмоторакс

~эмпиема плевры

~гемоторакс

}

Рефлекс Эйлера-Лилестранда возникает: {

~при уменьшении напряжения CO_2 в альвеолярном воздухе

~при увеличении напряжения CO_2 в альвеолярном воздухе

=при уменьшении напряжения O_2 в альвеолярном воздухе

~сочетание (при уменьшении напряжения CO_2 в альвеолярном воздухе), (при гипервентиляции)

~при гипервентиляции

}

Клинически отек легких проявляется: {

~тяжелой экспираторной одышкой

=тяжелой инспираторной одышкой

~периодическим дыханием

~патологическим дыханием Куссмауля

}

Нормальная кислородная емкость крови составляет: {

~15-16 объем %

~17-18 объем %

=19,3-21,3 объем %

~выше 21,3 объем %

}

Причиной паренхиматозной дыхательной недостаточности может быть: {

~стеноз в/дыхательных путей

~аспирация инородных тел

~опухоль головного мозга

=ателектаз легочной ткани

~все перечисленное

}

Нормобарическая форма гипоксии возникает: {

~при подъеме на высоту

~при быстром подъеме водолазов

=при нахождении человека в замкнутых пространствах

~при резком снижении общего барометрического давления в барокамерах

~все перечисленное

}

Внешнее дыхание включает: {

=обмен газов альвеол и кровью малого круга кровообращения

~транспорт CO₂ и O₂

~утилизация O₂ тканями

~сочетание (транспорт CO₂ и O₂), (утилизация O₂ тканями)

~все перечисленное

}

Как вы понимаете пневмоторакс: {

~скопление крови в плевральной полости

~накопление экссудата в плевральной полости

=попадание воздуха в плевральную полость

~образование спаек между париетальной и висцеральной плеврой

~попадание инородного тела в плевральную полость

}

Какие приспособительные реакции возникают при гипоксической гипоксии: {

~увеличивается скорость кровотока
=учащается дыхание и увеличивается минутный объем крови
~повышается внутри- альвеолярное давление
~уменьшается масса циркулирующей крови
~увеличивается диастолический приток Крови
}

Какое влияние на дыхание оказывает внезапное повышение кровяного давления: {

~учащает дыхание
~углубляет вдох
~уменьшается легочная вентиляция
=возникает остановка дыхания (апноэ)
~увеличивается легочная вентиляция
}

Какой вид гипоксии характеризуется уменьшенной способностью использовать кислород: {

~анемическая (кровяная) гипоксия
~циркуляторная гипоксия
~гипоксическая гипоксия
=тканевая (гистотоксическая) гипоксия
~смешанная гипоксия
}

Чаще всего одышка проявляется в виде: {

~глубокого замедленного дыхания
~глубокого и частого дыхания
=поверхностного и учащенного дыхания
~поверхностного и уреженного дыхания
~периодического дыхания
}

Чем характеризуется первый период асфиксии : {

~кратковременной остановкой дыхания

~замедлением сердечной деятельности

~угасанием основных рефлексов

~урежением дыхания

=возбуждением дыхательного центра

}

В чем заключается защитная роль кашля: {

~усиливается присасывающая сила грудной клетки

~улучшается приток крови к правому сердцу

=удаляется из дыхательных путей мокрота

~усиливаются дыхательные движения

~способствует усилению легочной вентиляции

}

К чему может привести хронический кашель в пожилом возрасте: {

=к эмфиземе легких

~к ателектазу легких

~к пневмотораксу

~к отеку легких

~к поражению дыхательных мышц

}

Что лежит в основе возникновения периодического дыхания: {

~нехватка углекислоты

~избыток CO_2 и повышенная возбудимость дыхательного центра

~недостаток CO_2

~повышенная возбудимость дыхательного центра

=понижение возбудимости дыхательного центра и дефицит O_2

}

В чем состоит благоприятное влияние замедленного и глубокого дыхания: {

~в усилении энергетических затрат и

уменьшении легочной вентиляции

~в недостаточном использовании дыхательной поверхности

~в увеличении остаточного объема воздуха

=в увеличении альвеолярной вентиляции и уменьшении энергетических затрат

~в уменьшении энергетических затрат на работу дыхательных мышц

}

Чем характеризуется дыхание Биота: {

~нарастанием глубины дыхания с постепенным уменьшением и паузой

~уреженным (единичным) и усиленным дыханием с продолжительными паузами

=наличием пауз при усиленном и равномерном дыхании

~чередованием усиленного и ослабленного дыхания

~чередованием частых и редких дыхательных движений

}

В чем причина кашля: {

~раздражение поверхности альвеол

~раздражение слизистой носа

~сдавление мелких бронхов

~нарушение кровообращения в дыхательном центре

=раздражение слизистой трахеи, бронхов

}

Характеристика дыхания Куссмауля: {

=уреженное (единичное) и усиленное дыхание с продолжительными паузами

~нарастание глубины дыханий сменяется постепенным уменьшением и паузой

~наличие пауз при усиленном и равномерном дыхании

~чередование усиленного и ослабленного дыхания

~чередование частых и редких дыхательных движений

}

К чему приводит раздражение легочных ветвей блуждающего нерва: {

~к учащению дыхания

~к урежению дыхания

~не оказывает никакого влияния

=к преждевременному торможению вдоха

~к преждевременному торможению выдоха

}

Как изменяется газовый состав крови при замедлении кровотока: {

~содержание углекислоты увеличивается

~содержание углекислоты уменьшается

~содержание кислорода уменьшается

~увеличивается содержание CO₂ и увеличивается O₂

=увеличивается содержание CO₂ и уменьшается O₂

}

Как изменяется дыхание при скоплении жидкости в плевральной полости: {

=дыхание становится поверхностным и частым

~возникает стенотическое дыхание

~дыхание становится глубоким и частым

~дыхание становится глубоким и редким

~возникает инспираторная одышка

}

Основная причина нарушения кровообращения при кашле: {

~ослабление присасывающей силы грудной клетки

=затруднение оттока крови к правому сердцу по венам

~сдавление легочных сосудов

~ослабление диастолического опорожнения сердца

~уменьшение силы сердечных сокращений

}

Какие гуморальные факторы играют основную роль в патогенезе одышки: {

=нарушение газового состава крови

~накопление в крови биологически активных веществ

~увеличение щелочных резервов крови

~повышение артериального давления

~накопление в крови недоокисленных продуктов

}

Как вы понимаете пневмоторакс: {

~скопление крови в плевральной полости

~накопление экссудата в плевральной полости

=попадание воздуха в плевральную полость

~образование спаек между париетальной и висцеральной плеврой

~попадание инородного тела в плевральную полость

}