

Что такое дегидратация - :{

~Увеличение общего содержания воды в организме.

=Уменьшение общего содержания воды в организме

~Отсутствие изменений.

~Уменьшение воды в сосудистом секторе.

~все верно

}

Что такое гипотоническая дегидратация - :{

=Обезвоживание, когда потеря электролитов превышает потерю воды

~Потеря воды с малым количеством электролитов.

~Равномерное снижение количества воды и электролитов

~Уменьшение воды в экстрацеллюлярном русле.

~Уменьшение воды в клеточном секторе.

}

Что такое гипертоническая

Дегидратация - :{

~Дегидратация с преимущественной потерей электролитов.

=Дегидратация с преимущественной потерей воды.

~Равномерное снижение количества воды и электролитов.

~Уменьшение воды в экстрацеллюлярном русле.

~Уменьшение воды в клеточном секторе

}

Что такое изотоническая дегидратация - :{

~Дегидратация с преимущественной потерей электролитов.

~Дегидратация с преимущественной потерей воды.

=Равномерное снижение количества воды и электролитов

~Уменьшение воды в экстрацеллюлярном русле.

~Уменьшение воды в клеточном секторе.

}

Какие изменения возникают в организме со стороны ССС при обезвоживании - : {

~Увеличение минутного объема сердца.

~Увеличение ОЦК

=Уменьшение артериального давления

~Повышение артериального давления.

~Увеличение ЧСС.

}

Какие изменения со стороны крови происходят при обезвоживании —: {

=Сгущение крови

~Понижение свертывающей способности крови.

~Разжижение крови.

~Гипокоагуляция.

~Ускорение кровотока.

}

Укажите начальное звено патогенеза отеков при сердечной недостаточности - : {

~Повышение содержания АДГ в крови.

~Повышение секреции ренина в ЮГА почек.

~Повышение проницаемости сосудов

=Снижение минутного объема сердца

~Повышение реабсорбции Na и H<sub>2</sub>O в почечных канальцах.

}

Какой фактор является ведущим в развитии аллергических отеков - : {

=Мембраногенный.

~Онкотический.

~Осмотический.

~Смешанный.

~Гемодинамический.

}

Какой фактор является ведущим в механизме развития кахектических отеков - : {

~Мембраногенный.  
=Онкотический.  
~Осмотический.  
~Гемодинамический.  
~Смешанный.  
}

Какой фактор является инициальным в механизме развития сердечного отека  
- : {  
~Мембраногенный.  
~Онкотический.  
~Осмотический.  
=Гемодинамический.  
~Смешанный.  
}

Какой фактор является основным в развитии нефритических отеков - : {  
~Онкотический.  
=Осмотический.  
~Мембраногенный.  
~Гидростатический.  
~Смешанный.  
}

Какой фактор является основным в развитии нефротических отеков -: {  
=Онкотический.  
~Мембраногенный.  
~Смешанный.  
~Осмотический.  
~Гидростатический.  
}

Какой фактор является основным в механизме развития застойных отеков - : {  
~Онкотический.

~Мембраногенный.  
~Осмотический.  
=Гидростатический.  
~Смешанный.  
}

Какой фактор является основным в механизме развития отеков при циррозе печени - :{

~Онкотический.  
~Мембраногенный.  
~Осмотический.  
=Смешанный.  
~Гидростатический.  
}

Какие отеки по патогенезу развиваются при белковом голодании – :{

~Осмотические.  
=Онкотические.  
~Застойные.  
~Мембраногенные.  
~Смешанные.  
}

Какие отеки по патогенезу развиваются при сердечной недостаточности-: {

=Осмотические.  
~Онкотические.  
~Мембраногенные.  
~Застойные.  
~Смешанные.  
}

Какие отеки по патогенезу развиваются при гломерулонефрите - :{

~Онкотические.  
=Осмотические.  
~Мембраногенные.  
~Смешанные.

~Застойные.

}

Какие отеки по патогенезу развиваются при аллергических реакциях - : {

~Онкотические.

~Осмотические.

=Мембраногенные.

~Застойные.

~Смешанные.

}

Укажите начальное звено в механизме развития нефротического отека-: {

~Увеличение секреции альдостерона .

~Увеличение реабсорбции Na и воды в канальцах почек

~Гиповолемия.

=Протеинурия.

~Гипопротеинемия.

}

Последствия гиповолемии для организма – : {

~Гиперволемия.

=Гиповолемия

~Понижение активности свертывающей системы.

~Увеличение скорости кровотока.

~Повышение минутного объема сердца.

}

Дайте характеристику отека - : {

~Скопление жидкости в серозных полостях.

=Избыточное накопление жидкости в межклеточных пространствах.

~Скопление жидкости в брюшной полости.

~Скопление жидкости в плевральной полости

~все верно

}

Приведите примеры осмотических отеков - : {

- ~Отеки при нефрозах.
  - ~Воспалительные.
  - ~При циррозах печени.
  - =Сердечные.
  - ~Аллергические.
- }

Приведите примеры онкотических отеков — : {

- ~Сердечные.
  - ~Аллергические.
  - ~Воспалительные.
  - =При голодании
  - ~При циррозах печени
- }

Приведите примеры мембраногенных отеков — : {

- ~При циррозе печени.
  - =При аллергических реакциях
  - ~Сердечные.
  - ~При нефритах
  - ~При нефрозах.
- }

Экцикоз возникает, если - : {

- ~Потеря воды не превышает поступление ее в организм
  - ~Поступление воды в организм намного превышает ее потерю.
  - =Потеря воды намного превышает ее поступление
  - ~При развитии положительного водного баланса.
- }

Интерстициальная жидкость- это - :{  
~Жидкость внутриклеточного пространства  
=Жидкость внеклеточного пространства  
~Вода плазмы крови.  
}

Камерная влага глаз относится - :{  
~К интерстициальной жидкости.  
~К внутриклеточной жидкости  
~К жидкости внесосудистых пространств.  
=К трансцеллюлярной жидкости  
}

Спинномозговая жидкость относится - :{  
~К интерстициальной жидкости.  
~К внутриклеточной жидкости  
~К жидкости внесосудистых пространств  
=К трансцеллюлярной жидкости  
}

Суставная жидкость относится - :{  
~К интерстициальной жидкости.  
~К внутриклеточной жидкости.  
~К жидкости внесосудистых пространств  
=К трансцеллюлярной жидкости  
}

Пищеварительные соки относятся -: {  
~К интерстициальной жидкости.

~К внутриклеточной жидкости  
~К жидкости внесосудистых пространств.  
=К трансцеллюлярной жидкости  
}

Жидкость почечных канальцев относится - : {  
~К интерстициальной жидкости.  
~К внутриклеточной жидкости  
~К жидкости внесосудистых пространств.  
=К трансцеллюлярной жидкости.  
}

Раздражение каких рецепторов сосудов ведет к гиперсекреции альдостерона -  
: {  
~Хеморецепторов.  
~Осморецепторов.  
~Адренорецепторов.  
=Волюморецепторов.  
}

Что собой представляет изоосмолярная Дегидратация - : {  
~Дегидратация с преимущественной потерей электролитов.  
~Дегидратация с преимущественной потерей воды.  
~Снижение воды в экстрацеллюлярном русле.  
~Снижение воды в клеточном секторе.  
=Равномерное снижение H<sub>2</sub>O и Электролитов  
}

Что собой представляет гиперосмолярная дегидратация - : {  
~Дегидратация с преимущественной потерей электролитов  
=Дегидратация с преимущественной потерей воды.  
~Равномерное снижение H<sub>2</sub>O и электролитов  
~Снижение воды в экстрацеллюлярном русле  
~Снижение воды в ключевом секторе.



}

Что собой представляет гипоосмолярная

Дегидратация - : {

=Дегидратация с преимущественной потерей электролитов.

~Дегидратация с преимущественной потерей воды

~Равномерное снижение  $H_2O$  и электролитов

~Снижение воды в экстрацеллюлярном русле.

~Снижение воды в клеточном секторе

}

Укажите проявления синдрома общей дегидратации – : {

~Увеличение АД.

=Увеличение вязкости крови

~Уменьшение вязкости крови.

~Увеличение суточного диуреза.

~Снижение активности свертывающей системы крови.

}

Какие изменения возникают на месте контакта с электродом: {

=Ожоги

~Расслоение ткани

~все верно

~Явление электролиза

~Отрыв тканей или органов

}

Почему при электротравме не ощущается боль: {

=Парабиотические изменения в рецепторах

- ~Парезы, параличи
- ~Деструкция нейронов
- ~Дегенеративные изменения в тканях
- ~Гиперстезия

}

Какие токи используются с лечебной целью: {

=Токи высокой частоты

- ~Низкочастотные токи

- ~Переменный ток при напряжении до 100 вольт

- ~Постоянный ток при напряжении до 100 вольт

}

Какими болезнетворными свойствами обладает электрический ток: {

- ~Оказывает умеренное тепловое действие

=Электротермическим эффектом

- ~Биологическим действием

- ~Снижает обмен веществ в тканях

- ~Повышает обмен веществ в тканях

}

В чем заключается механизм электротермического действия электрического тока: {

- ~Повышается контактное сопротивление

- ~Нагревательный эффект

=Образованием Джоулевого тепла

- ~Вращением биополей в вязкой среде

- ~все верно

}

Каков механизм электромеханического действия тока: {

=Расслаивается ткань вследствие

перехода электрической энергии в  
механическую  
~Действие паров и газов на ткани, вызывая  
их разрыв  
~Перехода электрической энергии в  
тепловую  
~Перемещением ионов к аноду и катоду  
~все верно  
}

При каких условиях человек сталкивается с пониженным барометрическим давлением: {  
=При подъеме на высоту  
~В шахтах  
~В тесном помещении  
~При водолазных работах  
}

Какие компенсаторные механизмы возникают в первой стадии горной болезни: {  
~Усиление эритропоэза  
~Брадикардия  
=Тахикардия  
~Брадипное  
}

Почему возникает угнетение и состояние сонливости при горной болезни: {  
~Перераспределение крови  
~Повышение  $\text{CO}_2$  в крови  
~Уменьшение  $\text{O}_2$  в крови  
=Запредельное торможение в ЦНС из-за перераздражения кислыми продуктами

}

Почему возникает эритроцитоз и увеличение Нв в первый период горной болезни: {

- ~Перераспределение крови
  - ~Усиливается эритропоэз
  - ~За счет сгущения крови
  - =Мобилизация крови из депо
- }

Какие приспособительные явления возникают в позднем периоде горной болезни: {

- =Усиление эритропоэза
  - ~Запредельное торможение
  - ~Возбуждение ЦНС
  - ~Выброс крови из депо
- }

Каков механизм эритроцитоза в поздние сроки горной болезни: {

- ~Гиперкапния рефлекторно стимулирует образование Эр в костном мозге
  - ~Гипоксемия рефлекторно возбуждает костный мозг
  - ~Гипоксемия непосредственно возбуждает костный мозг
  - =Эритропоэтины стимулируют костный мозг
- }

Объясните причину цианоза при горной болезни: {

- ~Образованием карбгемоглобина
  - ~Образованием метгемоглобина
  - ~Образованием оксигемоглобина
  - =Повышенным содержанием восстановленного гемоглобина
- }

Какие виды излучения обладают проникающей способностью: {

~Альфа лучи

~Бета лучи

=Гамма лучи

~Инфракрасные лучи

}

Какие виды излучения обладают ионизирующей способностью: {

=Альфа лучи

~Нейтроны

~Позитроны

~Гамма лучи

~Инфракрасные лучи

}

При каком излучении плотность ионизации наименьшая: {

=Гамма лучей

~Фотонов

~Инфракрасных лучей

~Бета лучей

~Альфа лучей

}

Какие ткани наиболее чувствительны к действию ионизирующего излучения: {

~Хрящи

~Мышцы

~Нервная ткань

~Покровный эпителий

=Лимфоидная ткань

}

Какая ткань наиболее чувствительна к действию ионизирующего излучения:

- {
- ~Хрящи
- ~Мышцы
- ~Нервная ткань
- ~Покровный эпителий
- =Кровотворная ткань
- }

Почему возникает при лучевой болезни геморрагический синдром: {

- ~Способность тромбоцитов к адгезии снижается
- =Тромбоцитопения
- ~Способность тромбоцитов к склеиванию снижается
- ~Снижается активность фибринолиза
- }

Какой первый клинический период наблюдается при острой костномозговой форме лучевой болезни: {

- ~"Период мнимого благополучия"
- = "Период рентгеновского похмелья"
- ~Период разгара болезни
- }

Какова продолжительность первого периода острой лучевой болезни: {

- ~4-5 дней
- =1-2 дня
- ~Больше недели
- ~10-15 дней
- ~Несколько недель
- }

Какие изменения в крови возникают в первый период острой лучевой болезни: {

- ~Лейкопения
- ~Нейтропения
- =Лимфоцитопения

~Тромбоцитопения  
~Эритропения  
}

Какие характерные изменения возникают в ЖКТ в первом периоде острой лучевой болезни: {

~Понижение моторики кишечника  
~Увеличение секреции желудочного сока  
=Повышение перистальтики кишечника  
~Десквамация кишечного эпителия  
~Развитие колита  
}

Какие ионизирующие излучения относятся к электромагнитным: {

~Альфа лучи  
~Бета лучи  
~Протоны  
=Гамма лучи  
~все верно  
}

Какие ионизирующие излучения относятся к корпускулярным: {

~Гамма лучи  
=Альфа лучи  
~Рентгеновские лучи  
~Инфракрасные лучи  
~все верно  
}

Ожоги кожи вызывают: {

~Гамма-излучения  
~Нейтроны  
=Рентгеновское излучение  
~Альфа излучения  
}

В развитии точечных наружных кровоизлияний преимущественное значение имеет: {

~Тромбоцитопатия

~Тромбоцитоз  
~Активизация гиалуронидазы  
=Тромбоцитопения  
~все верно  
}

Почему нервные клетки при прямом  
облучении гибнут в последнюю очередь: {  
~Так как обладают интенсивным обменом  
=Так как не обладают способностью к  
делению  
~Так как являются  
высокодифференцированными  
образованиями  
~Так как нарушается биоэлектрическая  
активность головного мозга  
}

Стресс-реакция при выраженном перегревании сопровождается: {  
~Пониженным выбросом тиреолиберина  
~Увеличением тиреолиберина  
=Увеличением катехоламинов  
~Уменьшением глюкокортикоидов  
}

Какой признак является важным для нарастающей гипотермии: {  
~Прекращается мышечная дрожь  
=Расширяются периферические кровеносные сосуды и прекращается  
мышечная дрожь  
~Сухость кожи  
~Возникает спазм сосудов  
~все верно  
}



Интоксикация организма при тепловом ударе сопровождается: {

~Понижением проницаемости стенок микрососудов

~Относительным эритроцитозом

=Гемолизом эритроцитов

~Гипокоагуляцией

~Абсолютным эритроцитозом

}

Какие сосудистые изменения возникают при солнечном ударе в головном мозге? {

~Понижение внутричерепного давления

=Гиперемия и точечные кровоизлияния в мозговой ткани

~Обширное кровоизлияние

~Нарушение оттока крови по венам

~Развитие гематомы

}

Причина эритроцитоза при ожогах: {

~Олигоцитемическая гиперволемиа

~Гиперкоагуляция

~Гипокапния

=Сгущение крови

~все верно

}

Реакция сосудов на действие холода в первой стадии гипотермии: {

~Замедление тока крови

~Расширение сосудов

=Спазм

~Агрегация эритроцитов

~Стаз

}

Механизм усиления теплопродукции при охлаждении: {

- ~Спазм сосудов
- =Усиление мышечной дрожи, обмена веществ
- ~Повышение АД
- ~Усиление функции эндокринных желез
- ~Усиление потребления кислорода
- }

Признаки второй степени отморожения: {

- =Появление пузырей и развитие воспаления
- ~Венозная гиперемия
- ~Феномен сладжа
- ~Некроз
- ~Гиперемия

}

Признаки третьей степени отморожения: {

- ~Гиперемия
- =Некроз тканей
- ~Появление пузырей
- ~Плазмопотеря
- ~Стаз

}

Назовите первую фазу в течении ожоговой болезни: {

- ~Ожоговая токсемия
- ~Ожоговое истощение
- =Ожоговый шок
- ~Выпадение функции кожи
- ~Аутоинтоксикация

}

Каковы последствия хронических отморожений: {

- ~Развивается острое воспаление кожи
- ~Потеря чувствительности
- =Развивается хроническое воспаление
- ~Появление гиперемии
- ~все верно

}

Причина быстрого охлаждения детей  
грудного возраста: {

- ~Недостаточное развитие ЦНС
  - ~Недостаточное развитие барьерных систем
  - ~Несовершенная функция химической терморегуляции
  - =Несовершенная функция терморегуляции
  - ~Несовершенная функция физической терморегуляции
- }

Назовите первый период развития переохлаждения: {

- ~Кислородное голодание
  - ~Угнетение функции щитовидной железы
  - ~Повышение тонуса парасимпатической системы
  - =Компенсации
- }

Как изменяется обмен веществ в первую стадию гипотермии: {

- ~Увеличивается в крови холестерин
  - ~Уменьшается липолиз
  - =Увеличивается содержание глюкозы в крови
  - ~Активируется водно-солевой обмен
- }

Как изменяется дыхание в первом периоде гипотермии: {

- ~Наблюдается брадипноэ
  - =Возникает одышка
  - ~Учащается дыхание с преимущественным нарушением выдоха
  - ~Учащается дыхание с преимущественным нарушением вдоха
  - ~все верно
- }

Как изменяется АД в первый период гипотермии: {

- ~Понижается

- =Повышается
- ~Не изменяется
- ~Незначительно повышается
- ~Незначительно понижается
- }

Какова основная причина расширения сосудов во втором периоде гипотермии: {

- ~Повышение тонуса вазомоторного центра
- ~Активация симпатической системы
- ~Активация парасимпатической вегетативной системы
- =Парез или паралич вазоконстрикторов
- }

Как изменяется состояние ЦНС во втором периоде охлаждения: {

- =Преобладают процессы торможения
- ~Развивается парабиоз
- ~Преобладают процессы возбуждения
- ~Развивается доминанта по Ухтомскому
- }

Назовите ведущий механизм в патогенезе ожоговой болезни: {

- =Нарушение функции кожи
- ~Интоксикация
- ~Нарушение нервной системы
- ~Аутоинтоксикация
- ~все верно
- }

Чем объясняется нарушение сократительной способности миокарда при ожоговой болезни: {

- ~Гипокалиемией
- ~Гипернатриемией
- =Гиперкалиемией
- ~Гипокальциемией
- ~Гиперхолестеринемией
- }

Какая функция сердца страдает при гиперкалиемии: {

~Возбудимость

=Автоматизм

~Проводимость

~Сократимость

}

Как изменяется проницаемость кишечной стенки при ожоговой болезни: {

~Практически не меняется

~Изменяется незначительно

=Резко повышается

~Резко понижается

~Незначительно понижается

}

Как изменяется ритм сердца во второй стадии гипотермии: {

~70-80 в 1 мин

~60-70 в 1 мин

=Не более 40 в 1 мин

~50-80 в 1 мин

~Более 80 в 1 мин

}

Какие характерные изменения со стороны кровообращения возникают во второй стадии гипотермии: {

~Увеличение сердечного выброса

~Уменьшение сердечного выброса

=Понижение АД, уменьшение сердечного выброса

~Понижение АД

}

