

Структурными компонентами митохондрий являются: {
~%33.33333%ворсинки
~%33.33333%микроворсинки
=%50%кристы
=%50%матрикс
~%33.33333%микротельца
}

Ферменты цикла Кребса в митохондриях располагаются: {
~на поверхности частиц наружной мембраны
~на внутренней поверхности наружной мембраны
~на наружной поверхности внутренней мембраны
~на частицах внутренней мембраны
=в матриксе
}

Эндоплазматическая сеть выполняет функции: {
~%33.33333%защитную
=%50%синтеза белков
=%50%синтеза небелковых соединений
~%33.33333%синтеза АТФ
~%33.33333%выведения секрета
}

В составе гликокаликса имеются: {
~%33.33333%холестерин
~%33.33333%белковые части гликопротеидов
=%50%углеводные части гликопротеидов
~%33.33333%легкоотделяемые белки
=%50%ферменты
}

В составе плазматической мембраны имеются: {
~%33.33333%хромопротеиды
=%50%фосфолипиды
=%50%холестерин
~%33.33333%ренин
~%33.33333%простагландины
}

В составе митохондрий имеются: {
~%33.33333%гидролитические ферменты
=%50%окислительные ферменты
~%33.33333%сурфактант
~%33.33333%хромопротеиды
=%50%РНК
}

Гликокаликс располагается на: {
~поверхности митохондрий
~кристах
~мембранах гранулярной эндоплазматической сети
~внутренней поверхности плазматической мембраны
=наружной поверхности плазматической мембраны
}

Цитохромы в митохондриях располагаются: {
~на поверхности частиц наружной мембраны
~на внутренней поверхности наружной мембраны
~в межмембранной щели
= на частицах внутренней мембраны
~в матриксе
}

Митохондрии выполняют функции: {
~защитную
~секреции белков
~синтеза гликогена
~синтеза липидов
=синтеза АТФ
}

Компонентами эндоплазматической сети являются: {
=%50%мембраны
~%33.33333%кристы
=%50%рибосомы
~%33.33333%матрикс
~%33.33333%микротрубочки
}

Гликокаликс выполняет функции: {
~%33.33333%защитную
~%33.33333%секреторную
=%50%склеивающего фактора
=%50%способствует узнаванию однотипных клеток
~%33.33333%участия в гормональной регуляции
}

Гранулярная эндоплазматическая сеть выполняет функции: {
~защитную
=синтеза белков
~синтеза небелковых соединений
~синтеза АТФ
~выведения секрета
}

В составе аппарата Гольджи имеются: {
=%50%мембраны
~%33.33333%кристы
~%33.33333%рибосомы
~%33.33333%межмембранная щель
=%50%мешочки
}

Аппарат Гольджи выполняет функции: {
~%33.33333%защитную
=%50%компановки секрета
=%50%выведения секрета
~%33.33333%всасывательную
~%33.33333%проведения нервного импульса
}

В составе лизосом имеются: {
~%33.33333%кристы
=%50%оболочка
~%33.33333%рибосомы
~%33.33333%межмембранная щель

=%50%гомогенное содержание
}

В составе содержимого лизосом много: {
~окислительных ферментов
=гидролитических ферментов
~АТФ
~гликогена
~жиров
}

Лизосомы выполняют функции: {
~%33.33333%синтеза белков
~%33.33333%синтеза АТФ
=%50%внутриклеточного переваривания
~%33.33333%выведения секрета
=%50%аутофаговую
}

Белки на "экспорт" синтезируются в: {
=гранулярной ЭПС
~гладкой ЭПС
~комплексе Гольджи
~лизосомах
~ядрышках
}

Новые митохондрии в клетках образуются в: {
~комплексе Гольджи
~гладкой ЭПС
~гранулярной ЭПС
=результате фрагментации митохондрий
~результате фагоцитоза
}

Процесс синтеза липидов осуществляется с участием: {
=гладкой ЭПС
~гранулярной ЭПС
~свободных рибосом

- ~комплекса Гольджи
- ~митохондрий

}

Процесс синтеза белков гиалоплазмы осуществляется с участием: {

- ~гранулярной ЭПС
- =свободных рибосом
- ~лизосом
- ~гладкой ЭПС
- ~комплекса Гольджи

}

Функциями гранулярной эндоплазматической сети являются: {

- =синтез экспортируемых белков
- ~изоляция их от гиалоплазмы
- ~синтез белков мембран
- ~химическая модификация синтезируемых белков
- ~синтез стероидов

}

Цитоскелет клетки представлен: {

- ~актиновыми филаментами
- =микротрубочками
- ~промежуточными филаментами
- ~системной внутриклеточных мембран
- ~миозиновыми филаментами

}

Наличие в клетке большого количества свободных рибосом свидетельствует о синтезе ею: {

- =белков цитозоля (для себя)
- ~небелковых продуктов
- ~гормонов
- ~секретируемых белков
- ~гликозамингликонов

}

В образовании ферментов лизосом и их мембран участвуют органеллы: {

- =%50%гранулярная ЭПС

~%33.33333%гладкая ЭПС
=%50%комплекс Гольджи
~%33.33333%лизосомы
~%33.33333%митохондрии
}

Межклеточные соединения, при котором слои двух плазмолемм сближены до слияния, называется: {
=плотным запирающим
~простым
~щелевым
~десмосомой
~полудесмосомой
}

В состав клеточной мембраны входят все соединения, кроме: {
~фосфолипидов
~холестерина
=гликозаминогликанов
~белков-ферментов
~белков-переносчиков
}

К немембранным органеллам относятся: {
~аппарат Гольджи
=рибосомы
~эндоплазматическая сеть
~митохондрии
~лизосомы
}

Рецепторные функции плазмолеммы связаны с локализацией на ней: {
=гликопротеидов и гликолипидов
~ресничек
~микроворсинок
~тонофибрилл
~интегральных белков
}

Какой из перечисленных контактов обеспечивает ионное и метаболическое сопряжение клеток? {

~десмосомы

~плотные контакты

=щелевые контакты

~синапсы

~адгезивный пояс

}

Формирование клеточных лизосом осуществляется: {

=в аппарате Гольджи

~в гладкой ЭПС

~в гранулярной ЭПС

~в митохондриях

~в пероксисомах

}

В клетках нарушены процессы синтеза полисахаридов, выведения готовых секретов за пределы клетки, образования лизосом. С какими органеллами связаны эти нарушения? {

~гранулярной ЭПС

~агранулярной ЭПС

=с аппаратом Гольджи

~митохондриями

~пероксисомами

}

Каталаза является маркерным ферментом для: {

~аппарата Гольджи

~ядрышка

~гладкой ЭПС

~гранулярной ЭПС

=пероксисом

}

Известно, что гормоны, медиаторы, действующие на клетки, связываются с рецепторами на плазмолемме. Что может выступать в роли рецепторов? {

~фосфолипиды

- =гликопротеины и гликолипиды
- ~холестерин
- ~аминокислоты
- ~интегральные белки
- }

При так называемых болезнях накопления во многих клетках происходят необычные отложения различных веществ, муцинов и др. С дефектностью каких структур связаны такие формы клеточной патологии? {

- =лизосомы
- ~митохондрии
- ~ядрышек
- ~рибосом
- ~ЭПС
- }

Какие структуры клетки синтезируют белки, предназначенные для выведения из клетки? {

- ~свободные рибосомы
- =полирибосомы гранулярной ЭПС
- ~рибосомы митохондрий
- ~агранулярная ЭПС
- ~комплекс Гольджи
- }

Специфичность функций биологических мембран обеспечена: {

- ~липидным составом;
- ~поверхностным зарядом;
- =белками и углеводами;
- ~рН среды;
- ~насыщением среды кислородом
- }

Пищеварительной вакуолью в животной клетке называют: {

- ~пиноцитозный пузырек
- ~лизосому
- ~фагосому
- =слившиеся фагосому с лизосомой
- ~остаточное тельце

}

Межклеточное соединения в виде площадки, где со стороны цитоплазмы имеются две уплощенные зоны с фибриллами, называется: {

~простым

~плотным запирающим

=десмосомой

~нексусом

~синапсом

}

Общим для всех клеточных мембран является: {

=липопротеидное строение

~состав липидов

~ состав белков

~ одинаковый поверхностный электрический заряд

~ состав гликокаликса

}

Диффузная базофилия характерна для клеток: {

~активно секретирующих белки

=молодых растущих

~активно секретирующих слизи

~накапливающих липиды

~имеющих реснички

}

Пластинчатый комплекс участвует в ряде процессов, кроме: {

~образования лизосом

~образования белково-полисахаридных комплексов

=обезвреживания перекисей

~накопления секретов

~выведения секретов

}

От избыточного накопления жиров, углеводов и метаболитов клетку предохраняют: {

~митохондрии

~гладкая ЭПС

~гранулярная ЭПС
~комплекс Гольджи
=лизосомы
}

Белки внутриклеточных мембран синтезируются в: {
=гранулярной ЭПС
~гладкой ЭПС
~комплексе Гольджи
~лизосомах
~ядрышках
}

Ионы кальция депонируются в: {
=гладкой ЭПС
~гранулярной ЭПС
~комплексе Гольджи
~лизосомах
~пероксисомах
}

Субъединицы рибосом образуются в: {
~гладкой ЭПС
~гранулярной ЭПС
~комплексе Гольджи
=ядрышковых организаторах
~результате почкования имеющихся рибосом
}

Ядрышко – это участок хромосомы, где образуется: {
~иРНК
=рРНК
~тРНК
~ДНК
~АТФ
}

Гетерохроматин, видимый в ядре при световой микроскопии, является: {
~активно работающей частью хромосом
=неактивной частью хромосом
~ядрышковым организатором
~скоплением рибонуклеопротеидов
~артефактом
}