

Укажите факторы, обуславливающие боль при воспалении: {

~Простагландины

~Повышение температуры ткани

= Н⁺- гиперемия

~Действие адреналина

}

Какие признаки могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в организме: {

~Гипопротеинемия

~Ацидоз

= Лихорадка

~Расширение сосудов

~Эритроцитоз

}

Какая из указанных клеток относится к "клеткам хронического воспаления»:
{

~Тучные клетки

= Макрофаги

~Нейтрофилы

~Базофилы

~Эозинофилы

}

Какие факторы способствуют развитию отека в очаге воспаления: {

~Повышение онкотического давления крови

~Снижение онкотического давления

межклеточной жидкости.

~Снижение осмотического давления

межклеточной жидкости.

= Повышение онкотического давления

межклеточной жидкости

~Алкалоз.

}

Какие признаки могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в организме: {

~Эритроцитоз.

= Лихорадка.

~Гипопротеинемия.

~Ишемия

~Стаз

}

Какие физико-химические изменения наблюдаются в очаге острого асептического воспаления: {

= Ацидоз.

~Алкалоз.

~Гипоосмия.

~Гипоонкия.

~Гипокалемия.

}

Какие из перечисленных веществ принято относить к медиаторам воспаления:

{

~Na⁺

~H⁺

~K⁺

~Нуклеиновые кислоты

= Лимфокины.

}

Хроническое воспаление характеризуется: {

= Образованием воспалительных гранул

~Снижение проницаемости сосудистой стенки.

- ~Повышением проницаемости стенки сосудов
- ~Накопление в очаге воспаления нейтрофилов
- ~Эозинофилией.

}

Каковы возможные причины развития асептического воспаления: {

- ~Ишемия.
- ~Ожоги.
- ~Травмы.
- = Некроз ткани
- ~Поступление биологических агентов

}

Запуск острого воспаления происходит: {

- ~С территории соединительной ткани.
- = "От сосудов".
- ~С территории эпителиальной ткани
- ~С территории нервной ткани
- ~С территории костно-мозговой ткани

}

Что является цитотоксигенами для нейтрофилов: {

- ~Компоненты комплемента (C3a, C5a).
- ~Микробный фактор.
- ~Денатурированные белки.
- ~Казеин.
- = Плазмин.

}

В каких органах развивается экссудативное воспаление: {

- ~В паренхиматозных
- ~В плотной соединительной ткани

- ~В нервной ткани
- ~В бессосудистых органах
- = В органах богатых сосудами
- }

Причины повышения венозного давления в поздние сроки воспаления: {

- ~Усиление притока
- ~Сужение просвета сосудов.
- = Нарушение оттока
- ~Расширение просвета сосудов
- ~Ускорение притока и оттока
- }

Причины болезненности при воспалении: {

- ~Повышение чувствительности болевых рецепторов
- = Раздражение рецепторов кислыми продуктами и сдавливание их отеочной жидкостью
- ~Повышенная возбудимость ЦНС.
- ~Парабиотические изменения в рецепторах
- ~Возбуждение чувствительных корешков
- }

Экссудат, содержащий много эритроцитов: {

- ~Серозный
- ~Гнилостный.
- ~Фибринозный.
- = Геморрагический.
- ~Гнойный.
- }

Причины повышения кровяного давления в зоне артериальной гиперемии: {

- = Усиленный приток крови
- ~Застой крови.

~Возбуждение сосудодвигательного центра.
~Спазм сосудов.
~Потеря эластичности стенки сосуда.
}

Какие белки выходят в первую очередь из сосудов при экссудации: {
= Альбумины.
~Глобулины.
~Фибриноген.
~С-реактивный белок
}

Как называется жидкость, вышедшая из сосудов при воспалении: {
~Отечная жидкость.
~Геморрагическая жидкость
~Серозная жидкость
= Экссудат.
~Транссудат.
}

Чем характеризуется альтеративное воспаление: {

~Преимущественными явлениями экссудации и инфильтрации
= Преимущественно явлениями дистрофии, некробиоза и некроза
~Преимущественно пролиферативными явлениями.
~Выраженной сосудистой реакцией
~Выраженными дистрофическими и пролиферативными явлениями
}

Чем характеризуется гиперергическое воспаление: {
~Слабыми проявлениями, не соответствующими силе действующего агента.
~Адекватностью проявлений силе раздражителя.
~Отсутствием реакций на действие агента.
= Чрезмерно сильной реакцией организма.
}

Что приводит к припухлости (отеку): {
~Застой крови.
~Набухание ткани.
~Замедление лимфооттока
= Выход жидкости из сосудов
~Пролиферация клеточных элементов
}

Какие процессы наиболее интенсивно выражены при хроническом воспалении: {
~Альтеративные.
~Альтеративные и пролиферативные
~Экссудативные.
= Пролиферативные.
~Альтеративные и экссудативные

}

Какие лейкоциты эмигрируют из сосудов в ранний период воспаления: {

~Лимфоциты.

~Моноциты.

~Эозинофилы.

~Базофилы.

= Нейтрофилы.

}

Течение воспалительной реакции в сенсibilизированном организме: {

~Нормергическое.

~Гипоергическое (положительная реакция).

= Гиперергическое.

~Гипоергическое (отрицательная реакция).

}

Что такое экссудация: {

~Выпотевание жидкости.

= Выход жидкой части крови при воспалении

~Выход крови из сосудов.

~Накопление серозной жидкости

~Выход лимфы в воспалительную ткань.

}

При каком виде воспаления проницаемость сосудов выражена больше: {

~Серозном.

~Гнойном.

= Геморрагическом.

~Фибринозном.

}

Экссудат, содержащий мало белка и клеточных элементов: {

~Гнойный.

= Серозный.

~Геморрагический.

~Фибринозный.

~Гнилостный.

}

При каком виде воспаления в экссудате много фибриногена: {

~Серозном.

~Геморрагическом.

~Гнойном.

= Фибринозном.

}

Вид экссудата, содержащий большое количество лейкоцитов: {

~Серозный

~Фибринозный

~Геморрагический

= Гнойный.

}

Что такое эмиграция: {

~Выход жидкости из сосудов.

~Выход эритроцитов

= Выход лейкоцитов

~Выход белков плазмы.

~Выход тромбоцитов

}

Причины местного повышения температуры: {

~Артериальная гиперемия

= Усиление обмена веществ и притока артериальной крови

~Образование гноя

~Увеличение потребления O₂.

}

Чем отличается экссудат от транссудата: {

~Большим содержанием белка в транссудате.

~Отсутствием форменных элементов

~Большим удельным весом транссудата

= Большим содержанием белка и форменных элементов

}

Какой вид белка в экссудате указывает на резкое нарушение проницаемости сосудов: {

~Альбумины.

~ альфа - глобулины.

~ бетта - глобулины.

= Фибриноген

}

Воспалительные реакции в состоянии зимней спячки: {

~Протекает также, как и в норме

= Протекает медленно

~Приобретает гиперэргический характер

}

Какова причина вторичной альтерации: {

= Действие лизосомальных ферментов

~Действие медиаторов воспаления

~Действие модуляторов воспаления.

~Действие цитокинов

}

Укажите последовательность эмиграции лейкоцитов в очаг острого воспаления: {

~Моноциты, лимфоциты, нейтрофилы

~Нейтрофилы, лимфоциты, моноциты

~Лимфоциты, нейтрофилы, моноциты

~Моноциты, нейтрофилы, лимфоциты

=Нейтрофилы, моноциты, лимфоциты

}

Укажите факторы, обуславливающие боль при воспалении: {

~Действие катионных белков

=Механическое раздражение нервных окончаний экссудатом

~Гиперонкия

~Простагландины

~Повышение температуры тела

}

Какие признаки могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в организме: {

~Гипопротеинемия

~Ацидоз

=Лихорадка

~Расширение сосудов

~Эритроцитоз

}

Какие из перечисленных клеток являются источниками медиаторов острого воспаления: {

=Тучные клетки

~Тромбоциты

~Гистиоциты

~Эритроциты

~Мерцательный эпителий

}

Какие факторы способствуют развитию отека в очаге воспаления: {

~Повышение онкотического давления крови

~Снижение онкотического давления межклеточной жидкости.

~Снижение осмотического давления межклеточной жидкости.

=Повышение онкотического давления межклеточной жидкости

~Алкалоз.

}

Какие признаки могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в организме: {

~Эритроцитоз.

=Лихорадка.

~Гипопротеинемия.

~Ишемия

~Стаз

}

Какие из перечисленных веществ принято относить к медиаторам воспаления:

{

~Na⁺

~H⁺

~K⁺

~Нуклеиновые кислоты

=Лимфокины

}

Острое воспаление характеризуется: {

~Образованием гранулемы

~Эмиграцией в очаг эозинофилов.

=Эмиграцией в очаг нейтрофилов

~Инфильтрацией очага мононуклеарными лейкоцитами

~Эмиграцией лимфоцитов

}

Хроническое воспаление характеризуется: {

=Образованием воспалительных гранул

~Снижение проницаемости сосудистой стенки.

~Повышением проницаемости стенки сосудов

~Накопление в очаге воспаления нейтрофилов

~Эозинофилией

}

Какие процессы преобладают при хроническом воспалении: {

=Пролиферативные.

~Альтеративные.

~Сосудистые.

~Сосудисто-экссудативные

~Экссудативные.

}

Запуск острого воспаления происходит: {

~С территории соединительной ткани.

= "От сосудов"

~С территории эпителиальной ткани

~С территории нервной ткани

~С территории костно-мозговой ткани

}

Какая клетка является ведущей в развитии острого воспаления: {

~Активный макрофаг.

=Нейтрофил.

~Тучная.

~Лимфоцит.

~Эозинофил.

}

Как изменяется скорость кровотока в очаге воспаления в начальный период:

{

~Развивается стаз.

=Временно уменьшается

~Замедляется.

~Усиливается.

~Не изменяется.

}

В каких органах развивается экссудативное воспаление: {

~В паренхиматозных

~В плотной соединительной ткани

~В нервной ткани

~В бессосудистых органах

=В органах богатых сосудами

}

Причины повышения венозного давления в поздние сроки воспаления: {

~Усиление притока

~Сужение просвета сосудов.

=Нарушение оттока

~Расширение просвета сосудов

~Ускорение притока и оттока

}

Причины боли при воспалении: {

~Понижение чувствительности болевых рецепторов

=Раздражение рецепторов кислыми продуктами и сдавливание их отечной жидкостью

~Повышенная возбудимость ЦНС.

~Парабиотические изменения в рецепторах

}

Какая теория в патогенезе воспаления отводит основную роль явлениям фагоцитоза: {

~Конгейма.

~Вирхова.

~Шаде.

=Мечникова.

~Риккера.

}

Экссудат, содержащий много эритроцитов: {

~Серозный

~Гнилостный.

~Фибринозный.

=Геморрагический.

~Гнойный.

}

Чем характеризуется нормергическое воспаление: {

=Соответствием проявлений воспаления силе раздражителя.

~Преобладанием проявлений воспаления над силой агента.

~Слабыми, не соответствующими силе действия агента, проявлениями

~Отсутствием реакции на действие агента.

}

Какой из перечисленных процессов относится к гиперергическому воспалению: {

~Воспаление легких у людей среднего
возраста.

~Воспаление легких в детском возрасте.

=Феномен Артюса

~Реакция на внутрикожное введение дифтерийного токсина в иммунном
организме.

~Фурункул в нормальном организме

}

Причины повышения кровяного давления в зоне артериальной гиперемии: {

=Усиленный приток крови

~Застой крови.

~Возбуждение сосудодвигательного центра.

~Спазм сосудов.

~Потеря эластичности стенки сосуда.

}

Укажите ранние признаки, характеризующие артериальную гиперемию :{

=Покраснение органа или ткани

~Цианоз ткани

~Выраженный отёк ткани.

~Понижение температуры поверхностно расположенных тканей.

~Снижение пульсации.

}

Какой вид артериальной гиперемии возникает при наложении медицинских банок :{

~Нейротоническая.

~Постанемическая.

=Вакатная.

~Перераспределительная.

}

Какие изменения микроциркуляции характерны для артериальной гиперемии :{

=Увеличение количества функционирующих капилляров.

~Уменьшение внутрикапиллярного давления

~Уменьшение фильтрации жидкости из сосудов в ткань

~Ослабление лимфотока из ткани

}

Назовите фактор, который может привести к развитию артериальной гиперемии :{

~Закрытие просвета артерии тромбом.

=Действие горчичников на кожу

~Компрессия приносящих сосудов

~Повышение тонуса сосудосуживающих нервов
}

Чем обусловлена алая окраска органа при артериальной гиперемии :{
=Увеличением содержания оксигемоглобина в крови
~Уменьшением содержания оксигемоглобина в крови
~Увеличением артериовенозной разницы по кислороду
~Уменьшением объемной скорости кровотока
~Увеличением содержания восстановленного гемоглобина в крови
}

Повышение температуры органа или ткани в области артериальной гиперемии обусловлено :{
=Усилением окислительных процессов
~Усилением лимфообразования
~Увеличением артериовенозной разницы по кислороду
~Усилением лимфотока из ткани
~Повышением линейной скорости кровотока
}

При каких состояниях может развиваться венозная гиперемия :{
~Увеличении минутного выброса крови.
=Сердечной недостаточности
~Компрессии приносящих сосудов
~Ангиоспазме.
~Атеросклеротических изменениях сосудов
}

Укажите возможные последствия артериальной гиперемии :{
~Разрастание соединительной ткани
~Ослабление функции органа
=Кровоизлияние.
~Дистрофия тканей.
~все верно
}

Назовите изменения микроциркуляции, характерные для венозной гиперемии :{

- ~Усиление лимфотока из ткани
 - =Замедление кровотока в мелких артериях и венах
 - ~Ламинарный кровоток
 - ~Увеличение артерио-венозной разницы давлений
 - ~все верно
- }

Укажите признаки венозной гиперемии :{

- ~Увеличение количества функционирующих капилляров
 - =Цианоз органа или ткани
 - ~Понижение тургора тканей
 - ~Понижение температуры внутренних органов
 - ~все верно
- }

Укажите признаки, характерные для ишемии :{

- ~Цианоз органа.
 - ~Побледнение органа или ткани
 - ~Повышение температуры поверхностных тканей
 - =Боль и побледнение органа или ткани
- }

Какие изменения микроциркуляции характерны для ишемии :{

- ~Повышение артериовенозной разницы давлений
 - ~Повышение внутрисосудистого давления
 - ~Повышение линейной скорости кровотока
 - =Уменьшение числа функционирующих капилляров
- }

Назовите фактор, который может привести к развитию ишемии :{

- ~Сдавление вен рубцующейся тканью
 - =Ангиоспазм.
 - ~Перерезка периферических нервов.
 - ~Снятие эластического жгута с конечностей
 - ~Механическое раздражение ткани или органа.
- }

- Укажите эмболы эндогенного происхождения : {
- =Капельки жира при переломах трубчатых костей
 - ~Скопление паразитов
 - ~Пузырьки воздуха.
 - ~Внутримышечные инъекции масляных растворов
- }

- Термин "ретроградная эмболия применяется при : {
- ~Переходе эмбола из одного круга кровообращения в другой, минуя капиллярное русло
 - =Движение эмбола против тока крови
 - ~Движение эмбола через артериовенозные шунты
 - ~Движение эмбола через незаращенную межпредсердную перегородку
 - ~Движение эмбола через незаращенный Боталлов проток
- }

- Какая причина может вызвать возникновение воздушной эмболии : {
- ~Быстрый подъем на высоту
 - =Повреждение крупных вен шеи
 - ~Разгерметизация кабины летательного аппарата
 - ~Перепад атмосферного давления от повышенного к нормальному у водолазов
 - ~Быстрое повышение барометрического давления
- }

Какая причина может вызвать возникновение жировой эмболии : {

~Перелом позвоночника и ребер

~Внутримышечные инъекции масляных растворов

=Перелом трубчатых костей и костей таза

~Перепад атмосферного давления от повышенного к нормальному

~все верно

}

Каковы возможные последствия артериальной гиперемии : {

~Тромбоз сосудов гиперемизованного участка

=Микро- и макрокровоизлияния в окружающие ткани

~Стаз в капиллярах гиперемизованного участка

~Снижение оксигенации тканей

~Торможение обменных процессов

}

Назовите первую стадию ДВС-синдрома : {

~Коагулопатия потребления

=Гиперкоагуляция

~Дефибриногенолиз

~Восстановление

~все верно

}

Назовите вторую стадию ДВС-синдрома : {

=Коагулопатия потребления

~Гиперкоагуляция

~Дефибриногенонация

~Восстановление

~все верно

}

Какой вид местных расстройств кровообращения возникает вследствие затруднения оттока крови : {

~Артериальная гиперемия

=Венозная гиперемия

~Ишемия

~Стаз

~Геморрагия

}

Что может вызвать ишемию : {

~Нарушение венозного кровообращения

~Тромбоз вен

=Спазм артерий

~Стаз

~Падение кровяного давления

}

Причина местного повышения температуры при артериальной гиперемии : {

~Остановка кровотока

=Усиление обмена веществ и притока теплой артериальной крови

- ~Образование гноя
- ~Увеличение потребления O₂
- ~Увеличение образования CO₂
- }

Какой из приведенных видов эмболии является экзогенным : {

- ~Жировая
- ~Тканевая
- ~Тромботическая
- =Воздушная
- ~все верно
- }

Как называется выделение крови из матки : {

- ~Haemaptoe
- ~Haematuria
- ~Melaena
- =Metrorrhagia
- ~Haematomesis
- }

Как называется кровотечение из легких : {

- ~Melaena
- =Haemaptoe
- ~Haematuria
- ~Metrorrhagia
- ~Haematomesis
- }

Каков механизм кровотечения при травматическом повреждении : {
=Per rhexin
~Per diapedesin
~Per diabrosin
~Melaena
~Haemartoe
}

Как называется выделение крови из желудка : {
~Melaena
~Haemartoe
~Haematuria
~Metrorrhagia
=Haematomesis
}

При каком виде местных расстройств кровообращения наблюдается побледнение тканей : {
~Артериальной гиперемии
~Венозной гиперемии
~Стазе
=Ишемии
~Геморрагии
}

Какие изменения могут вызвать ишемию : {
~Стаз
=Тромбоз артерий
~Тромбоз вен
~Нарушение венозного кровообращения
~Истинный стаз
}

Для венозной гиперемии характерно :{

~Уменьшение кровенаполнения органа или ткани

~Увеличение количества протекающей через орган или ткань крови

=Затруднение оттока крови по венам

~Побледнение ткани

~все верно

}

Для ишемии характерно :{

~Нарушение оттока крови по венам

~Увеличение объемной скорости кровотока

=Побледнение ткани

~Расширение артериальных сосудов

~все верно

}

Укажите возможные причины ишемии :{

~Эмболия вены

=Облитерация артерии

~Сердечно-сосудистая недостаточность

~Компрессия венулы

~все верно

}

Как необходимо проводить пункцию брюшной полости для выведения асцитической жидкости :{

~Медленно

=Медленно, с небольшими перерывами

~Быстро

~Быстро, с перерывами

~Слишком быстро
}

К первичному стазу относится :{
~Ишемический
~Застойный
=Истинный
~все верно
}

Каковы последствия венозной гиперемии :{
~Гипертрофия и гиперплазия структурных элементов тканей и органов
~Повышение специфических функций органов или тканей
~Повышение неспецифических функций органов и тканей
=Склероз или цирроз в органах
~все верно
}

Какие последовательные изменения происходят в капиллярах при венозном стазе :{
~Фрагментация, агрегация, феномен сладжа
=Агрегация, фрагментация, феномен сладжа
~Феномен сладжа, агрегация, фрагментация
~Агрегация, феномен сладжа, фрагментация
~Фрагментация, феномен сладжа, агрегация.
}

Как называется первый период в течении болезни: {

~Продромальный

~Период выраженных проявлений

~Завершающий

=Латентный

}

Как называется первый период в течении инфекционных заболеваний? {

~Продромальный

~Период выраженных проявлений

~Завершающий

=Инкубационный

}

Клиническая смерть характеризуется: {

~Необратимыми изменениями в
организме

~Полным прекращением дыхания и
кровообращения

~Продолжением на минимальном уровне
обмена веществ

=Полным прекращением дыхания,
кровообращения и продолжением на
минимальном уровне обмена веществ

}