

Источник и тканевые элементы тимуса развиваются из: {
=50%эктодермы
~33.33333%энтодермы
=50%мезенхимы
~33.33333%висцерального листка мезодермы
~33.33333%сомитов
}

Клетки стромы тимуса называются: {
~эндотелиоциты
~панкреоциты
~хондроциты
~эпителиоциты
=эпителиоретикулоциты
}

В мозговом веществе тимуса имеются: {
~33.33333%строма из РСТ
~33.33333%строма из жировой ткани
=50%строма из эпителио-ретикулоцитов
~33.33333%в ячейках стромы нейтрофилы
=50%в ячейках стромы лимфоциты
}

В состав телец Гассала входят: {
~слои из эндотелиальных клеток
=слои из эпителиальных клеток
~слои из гладкомышечных клеток
~слой из эластических мембран
~скопления макрофагов
}

В состав гемато-тимусного барьера входят: {
=50%слой эпителиальных клеток
=50%слой сплошного эндотелия
~33.33333%слой гладкомышечных клеток
~33.33333%прерывистая базальная мембрана
~33.33333%субарахноидальные пространства

}

В корковой части тимуса происходит: {

~гибель эритроцитов

~гибель лимфоцитов

~разрушение специфических рецепторов Т-лимфоцитов

=образование специфических рецепторов на Т-лимфоцитах

~образование специфических рецепторов на В-лимфоцитах

}

Акцидентальная инволюция тимуса имеет место при: {

~инфарктах миокарда

~тяжелых инсультах мозга

=тяжелых формах токсико-инфекционных заболеваний

~тяжелых формах панкреатита

~тяжелых аллергических заболеваниях

}

Причиной гибели лимфоцитов, нацеленных на собственные антигены, является: {

=ранний контакт Т-лимфоцитов с собственными антигенами

~поздний контакт Т-лимфоцитов с собственными антигенами

~ранний контакт В-лимфоцитов с собственными антигенами

~поздний контакт В-лимфоцитов с собственными антигенами

~поздняя активация Т-лимфоцитов

}

Эффект удаления тимуса у новорожденных животных: {

~%33.33333%слабо выраженный иммунитет

~%33.33333%слабо выраженная реакция отторжения трансплантата

=%50%отсутствие реакции отторжения трансплантата

~%33.33333%усиление иммунологической реакции

=%50%отсутствие иммунологической реакции

}

Корковым веществом тимуса выполняются функции: {

=%50%выработка тимопоэтина

~%33.33333%образование тромбоцитов

~%33.33333%образование В-лимфоцитов
=%50%образование Т-лимфоцитов
~%33.33333%выработка эритропоэтина
}

Капсулу лимфатических узлов образует: {
~РСТ
~ретикулярная ткань
=плотная соединительная ткань
~эпителиальная ткань
~гладкомышечная ткань
}

Строму лимфатических узлов образует: {
~РСТ
~плотная не оформленная соединительная ткань
=ретикулярная ткань
~эпителио-ретикулярные клетки
~миелоидная ткань
}

В состав фолликулов лимфатических узлов входят: {
~%33.33333%РСТ
=%50%ретикулярная ткань
~%33.33333%эпителиальная ткань
~%33.33333%скопления эритробластов
=%50%скопления лимфоцитов
}

В состав мозговых тяжей лимфатических узлов входят: {
~%33.33333%РСТ
=%50%ретикулярная ткань
~%33.33333%скопления нейтрофилов
~%33.33333%скопления эритробластов
=%50%скопление лимфоцитов
}

Краевой синус лимфатических узлов располагается: {
~между капсулой и трабекулами

=между капсулой и фолликулами
~между капсулой и мягкотными тяжами
~между трабекулами и фолликулами
~между трабекулами и мягкотными тяжами
}

Промежуточный мозговой синус располагается: {
~между капсулой и трабекулами
~между капсулой и фолликулами
~между капсулой и мягкотными тяжами
~между трабекулами и фолликулами
=между трабекулами и мягкотными тяжами
}

Промежуточный корковый синус лимфоузлов располагается: {
~между капсулой и трабекулами
~между капсулой и фолликулами
~между капсулой и мягкотными тяжами
=между трабекулами и фолликулами
~между трабекулами и мягкотными тяжами
}

Т-зона лимфатических узлов располагается: {
~на периферии фолликулов
~в центральной части фолликулов
=на границе между фолликулами и мягкотными тяжами
~в мягкотных тяжах ближе к центральному синусу
~на периферии фолликулов
}

В-зоны лимфатических узлов располагаются в: {
~%33.33333%краевом синусе
=%50%фолликулах
~%33.33333%промежуточном синусе
~%33.33333%центральному синусу
=%50%мягкотных тяжах
}

В составе неинкапсулированных скоплений лимфоидной ткани имеются: {

~%33.33333%эластические мембраны
~%33.33333%скопления эритроцитов
~%33.33333%скопления миелоцитов
=%50%скопление лимфоцитов
=%50%макрофаги
}

Неинкапсулированные скопления лимфоидной ткани располагаются в: {
=%50%РСТ слизистой оболочки полостных органов
=%50%РСТ подслизистой оболочки полостных органов
~%33.33333%мышечной оболочке полостных органов
~%33.33333%наружной оболочке полостных органов
~%33.33333%толще многослойного эпителия полостных органов
}

В составе капсулы селезенки имеются: {
~%33.33333%однослойный кубический эпителий
=%50%плотная соединительная ткань
~%33.33333%рыхлая волокнистая соединительная ткань
~%33.33333%эластические мембраны
=%50%гладкомышечные клетки
}

В составе трабекул селезенки имеются: {
~%33.33333%однослойный плоский эпителий
=%50%гладкомышечные клетки
~%33.33333%эластические мембраны
~%33.33333%очаги лимфоидной ткани
=%50%вены безмышечного типа
}

В составе белой пульпы селезенки имеются: {
~%33.33333%строма из эпителиальной ткани
~%33.33333%строма из РСТ
=%50%строма из ретикулярной ткани
=%50%лимфоидная ткань
~%33.33333%синусоидные капилляры
}

В составе красной пульпы селезенки имеются: {
~%33.33333%stroma из PCT
=%50%stroma из ретикулярной ткани
~%33.33333%между клетками стромы скопления лимфоидной ткани
~%33.33333%большое количество тучных клеток
=%50%между клетками стромы все форменные элементы крови
}

Для трабекулярных вен селезенки характерно: {
~%33.33333%хорошо выраженная средняя оболочка
~%33.33333%слабо выраженная средняя оболочка
=%50%отсутствие средней оболочки
~%33.33333%стенка вен не связана с окружающими элементами
=%50%стенка вен плотно сращена с окружающими элементами
}

Т-зона белой пульпы селезенки называется: {
~паракортикальная
~маргинальная
=периартериальная
~перивазальная
~краевая
}

Белая пульпа селезенки выполняет функции: {
~%33.33333%разрушение эритроцитов
=%50%образование лимфоцитов
=%50%контакт Т и В лимфоцитов с антигенами
~%33.33333%образование тучных клеток
~%33.33333%образование эритроцитов
}

Красная пульпа селезенки выполняет функции: {
=%50%разрушение эритроцитов
~%33.33333%образование клеток миелоидного ряда
~%33.33333%образование кровяных пластинок
~%33.33333%депо лимфы
=%50%депо крови
}

Для кроветворных органов характерно наличие: {

- ~%33.33333%стромы из РСТ
 - ~%33.33333%стромы из жировой ткани
 - =%50%стромы из ретикулярной ткани
 - ~%33.33333%сплошных капилляров
 - =%50%синусоидных капилляров
- }

Местом расположения красного мозга является: {

- ~гиалиновый хрящ
 - ~эластический хрящ
 - ~компактная кость
 - =губчатая кость
 - ~грубоволокнистая костная ткань
- }

В миелоидной ткани красного костного мозга образуются: {

- =%50%эритроциты
 - =%50%моноциты
 - ~%33.33333%макрофаги
 - ~%33.33333%плазматические клетки
 - ~%33.33333%эндотелио-ретикулоциты
- }

Тимопоэтин вырабатывают: {

- ~макрофаги тимуса
 - ~Т-Лимфоциты
 - ~слоистые эпителиальные тельца
 - =эпителиоретикулоциты
 - ~адипоциты
- }

Т- и В-лимфоциты попадают в ткань лимфоузлов преимущественно из: {

- ~артериол
- ~гемокапилляров
- =посткапиллярных венул
- ~приносящих лимфатических сосудов
- ~лимфатических капилляров

}

При клеточном иммунитете эффекторными клетками являются:

- ~В-лимфоциты
 - =Т-лимфоциты цитотоксические
 - ~Т-супрессоры
 - ~Т-хелперы
 - ~плазмоциты
- }

Иммунный контроль и защита обеспечиваются: {

- ~Т-лимфоцитами
 - ~В-лимфоцитами
 - ~макрофагами
 - ~плазмócитами
 - =всеми клетками
- }

Эмбриональным источником селезенки являются: {

- =мезенхима
 - ~эктодерма
 - ~кишечная энтодерма
 - ~сомиты
 - ~желточная энтодерма
- }

В ряду развивающихся гранулоцитов специфические гранулы появляются на стадии: {

- ~миелобласта
 - ~промиелоцита
 - =миелоцита
 - ~метамиелоцита
 - ~палочкоядерного гранулоцита
- }

Иммунологическую защиту в организме осуществляют все клетки, кроме: {

- ~моноцитов
- ~В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов
- ~макрофагов

~плазмоцитов
=ретикулярных клеток
}

В каком органе осуществляется интраваскулярное образование мегалоцитов?: {
=желточном мешке
~печени
~тимусе
~селезенке
~красном костном мозге
}

Красный костный мозг в эмбриогенезе развивается из: {
~эктодермы
~энтодермы
~париетального листка мезодермы
=мезенхимы
~висцерального листка мезодермы
}

Органами кроветворения в эмбриогенезе являются: {
~желточный мешочек
~печень
~вилочковая железа
~селезенка
=все названные органы
}

В препарате видна красная и белая пульпа. Какой орган изучает студент?: {
~вилочковую железу
~красный костный мозг
=селезенку
~гемолимфатический узел
~лимфатический узел
}

Изучая орган кроветворения, студент видит среди гемопоэтических клеток эпителиальные. Какой это орган кроветворения?: {

=вилочковая железа
~селезенка
~лимфатический узел
~гемолимфатический узел
~красный костный мозг
}

Для диагностики студенту предложили препарат, на котором видны четко выраженные дольки, имеющие более темную окраску по периферии и более светлые внутри, где видны слоистые эпителиальные тельца. Какой препарат изучает студент? {

~красный костный мозг
=вилочковую железу
~селезенку
~лимфатический узел
~гемофалитический узел
}

Какой орган удалили у экспериментального животного для предотвращения отторжения трансплантированного органа?: {

~селезенку
~красный костный мозг
~лимфатические узлы
=вилочковую железу
~гемолимфатические узлы
}

Студенту предложили изучить два препарата органов кроветворения. На обоих препаратах видны лимфатические узелки, но на одном из препаратов в лимфатических узелках видны артериальные сосуды. Это препарат {

=селезенки
~вилочковой железы
~красного костного мозга
~лимфатического узла
~гемолимфатического узла
}

Какая из приведенных ниже структур отсутствует в селезенке? {

~капсула

~трабекула
=дольки
~красная пульпа
~белая пульпа
}

Лимфатический узелок селезенки не содержит: {
~периартериальной зоны
~центра размножения
~мантийной зоны
=слоистого эпителиального тельца
~маргинальной зоны
}

При стресс-реакции происходит быстрая и сильная акцидентальная инволюция какого органа?: {
~красной пульпы селезенки
~коркового вещества лимфатического узла
~красного костного мозга
~белой пульпы селезенки
=вилочковой железы
}