

Источниками развития передней доли гипофиза являются: {
=50%эктодерма
=50%нейроэктодерма
~33.33333%мезодерма
~33.33333%спланхнотомы
~33.33333%энтодерма
}

В передней доле гипофиза имеются клетки: {
~33.33333%хромаффинные
~33.33333%норадреноциты
=50%хромфильные
~33.33333%тиреоциты
=50%хромобные
}

Для базофильных клеток передней доли гипофиза характерно: {
~цилиндрическая форма
~гранулы окрашиваются кислыми красителями
~гранулы окрашиваются кислыми и основными красителями
~отсутствие гранул
=гранулы окрашиваются основными красителями
}

Для ацидофильных клеток передней доли гипофиза характерно: {
~цилиндрическая форма
~наличие большого количества микроворсинок
~наличие гранул окрашенных основными красителями
=наличие гранул окрашенных кислыми красителями
~отсутствие гранул
}

Для хромофобных клеток гипофиза характерно: {
~33.33333%наличие ацидофильных гранул
~33.33333%наличие базофильных гранул
=50%отсутствие окрашенных гранул
~33.33333%наличие контакта с капиллярами
=50%отсутствие контакта с капиллярами
}

Ацидофильные клетки передней доли гипофиза вырабатывают: {

~%33.33333%глюкокортикоиды

~%33.33333%минералокортикоиды

~%33.33333%альдостерон

=%50%гормон роста

=%50%лактогенный гормон

}

Базофильные клетки передней доли гипофиза вырабатывают: {

=%50%тиротропный гормон

~%33.33333%лактотропный гормон

~%33.33333%соматотропный гормон

=%50%адренокортикотропный гормон

~%33.33333%минералокортикоиды

}

Адренокортикотропный гормон гипофиза выполняет функцию: {

~стимулирует функцию фолликулярных клеток яичника

~стимулирует функцию фолликулярных тироцитов щитовидной железы

~стимулирует функцию эпителиальных клеток паращитовидной железы

=стимулирует функцию эпителиальных клеток коры надпочечников

~стимулируют функцию поддерживающих клеток семенников

}

Соматотропный гормон гипофиза выполняет функцию: {

~стимулирует функцию фолликулярных тироцитов

~стимулирует функцию эпителиальных клеток коры надпочечников

~стимулирует функцию паратироцитов

~тормозит размножение остеогенных клеток

=стимулирует размножение хрящевых эпифизарных пластинок

}

Клетками-мишенями гормона роста гипофиза являются: {

~остеогенные клетки диафиза

~остеоциты

=хондроциты эпифизарных хрящевых пластинок роста

~кардиомиоциты

~эпителиальные клетки яйцеводов

}

Клетками-мишенями лактогенного гормона гипофиза являются: {

- ~гладкомышечные клетки стенки матки
 - ~гладкомышечные клетки выводных протоков печени
 - ~эпителиальные клетки эндометрия
 - ~эпителиальные клетки слизистой оболочки яйцеводов
 - =эпителиальные клетки молочных желез
- }

Клетками-мишенями адренокортикотропного гормона гипофиза являются:

- ~хромаффинные клетки надпочечника
 - ~фолликулярные тироциты
 - ~парафолликулярные клетки щитовидной железы
 - =эпителиальные клетки надпочечника
 - ~парафолликулярные тироциты
- }

Клетками-мишенями тиротропного гормона гипофиза являются: {

- ~эпителиальные клетки
 - ~паращитовидная железа
 - ~эпителиальные клетки надпочечников
 - ~парафолликулярные клетки щитовидной железы
 - =фолликулярные тироциты щитовидной железы
- }

Клетками-мишенями гонадотропных гормонов гипофиза являются: {

- ~33.33333%гладкомышечные клетки миометрия
 - ~33.33333%миоэпителиальные клетки молочных желез
 - =50%фолликулярные клетки яичников
 - =50%поддерживающие клетки семенников
 - ~33.33333%эпителиальные клетки яйцеводов
- }

В задней доле гипофиза накапливаются: {

- ~33.33333%соматотропин
- =50%окситоцин
- ~33.33333%тиреотропин
- =50%вазопресин

~%33.33333%гонадотропин
}

Клетками - мишенями вазопрессина являются: {
~гладкомышечные клетки семявыносящих путей
~эпителиальные клетки слизистой оболочки яйцеводов
~эпителиальные клетки желчных протоков печени
=эпителиальные клетки канальцев почек
~кардиомиоциты
}

Структурной единицей щитовидной железы являются: {
~трабекулы
~эпителиальные тяжи
=фолликулы
~скопление эпителиальных клеток кубической формы
~эпителиальные островки
}

В стенке фолликулов щитовидной железы имеются: {
~%33.33333%интерфолликулярные тироциты
~%33.33333%кардиомиоциты
~%33.33333%фиброциты
=%50%парафолликулярные тироциты
=%50%фолликулярные тироциты
}

Фолликулярные клетки щитовидной железы вырабатывают: {
~%33.33333%тиреотропный гормон
~%33.33333%тиреокальцитонин
~%33.33333%паратгормон
=%50%тироксин
=%50%трийодтиронин
}

Парафолликулярные клетки щитовидной железы вырабатывают: {
~тиреотропин
=тиреокальцитонин
~паратгормон

~тироксин
~трийодтиронин
}

Действия тирокина: {
~%33.33333%способствует сокращению мускулатуры матки
~%33.33333%регулирует функцию надпочечников
=%50%регулирует основной обмен
~%33.33333%регулирует обмен холестерина
=%50%стимулирует нервную систему
}

Для клубочковой зоны надпочечника характерно: {
~%33.33333%эпителиальные клетки полигональной формы
=%50%эпителиальные клетки цилиндрической формы
~%33.33333%эпителиальные клетки кубической формы
~%33.33333%эпителиальные тяжи располагаются параллельными рядами
=%50%эпителиальные тяжи дугообразно изгибаются
}

Для пучковой зоны надпочечника характерно: {
~%33.33333%эпителиальные клетки цилиндрической формы
=%50%эпителиальные тяжи располагаются параллельными рядами
~%33.33333%эпителиальные тяжи дугообразно изгибаются
=%50%в цитоплазме много липидных капелек
~%33.33333%в цитоплазме мало липидных капелек
}

Для сетчатой зоны надпочечника характерно: {
=%50%эпителиальные клетки полигональной формы
~%33.33333%эпителиальные клетки цилиндрической формы
~%33.33333%эпителиальные тяжи располагаются параллельными рядами
~%33.33333%эпителиальные тяжи дугообразно изгибаются
=%50%эпителиальные тяжи располагаются без определенного порядка
}

Действия глюкокортикоидов: {
~%33.33333%снижают сопротивляемость организма
=%50%повышают уровень глюкозы в крови

=%50%подавляют воспалительную реакцию
~%33.33333%усиливают воспалительную реакцию
~%33.33333%усиливают аллергическую реакцию
}

Клетками-мишенями альдостерона являются эпителий: {
~семявыносящих путей
~проксимальных канальцев
~петли Генли
~дистальных канальцев
=собирательных трубок
}

В мозговом веществе надпочечника образуются: {
~%33.33333%альдостерон
~%33.33333%фолликулин
=%50%норадреналин
~%33.33333%гидрокортизон
=%50%адреналин
}

Для одиночных гормонпродуцирующих клеток характерно всё, кроме: {
~секреции олигопептидных гормонов
=высокой пролиферативной активности
~наличия плотных секреторных гранул
~способности окрашиваться солями тяжёлых металлов
~образования нейроаминов
}

К крупноклеточным нейросекреторным ядрам гипоталамуса относится: {
~вентромедиальное
~аркуатное
=супраоптическое
~дорзомедиальное
~перивентрикулярное
}

В аденогипофизе локализованы все клетки, кроме: {
~соматотропоцитов
~тиротропоцитов

~лактотропоцитов
=адреноцитов
~гонадотропоцитов
}

Специфичность действия гормонов зависит от: {
~химического состава
~концентрации в крови
~связывания с белком-носителем
~скорости метаболизирования в тканях
=наличия рецепторов на клетках-мишенях
}

При недостатке в организме йода нарушается образование гормонов: {
~эпифиза
~аденогипофиза
~надпочечников
=щитовидной железы
~околощитовидных желёз
}

В передней доле гипофиза имеются все клетки, кроме: {
~тиротропоцитов
~гонадотропоцитов
=пинеалоцитов
~соматотропоцитов
~лактотропоцитов
}

Йодосодержащие гормоны вырабатываются: {
~в мозговой части надпочечника
~в эпифизе
=в щитовидной железе
~в задней доле гипофиза
~в корковой части надпочечников
}

Действие гормонов осуществляется при условии: {
=наличия рецептора в клетках-мишенях

- ~активизации комплекса ферментов
- ~приведения клетки-мишени в состояние функционального возбуждения
- ~всего комплекса процессов
- ~ничего из перечисленного

}

Гормон, повышающий уровень калия в крови, вырабатывается: {

- ~в щитовидной железе
- ~в передней доле гипофиза
- =в эпифизе
- ~в задней доле гипофиза
- ~в мозговом веществе надпочечников

}

Базофильные клетки гипофиза вырабатывают все гормоны, кроме: {

- ~лютеинизирующего гормона
- ~тиротропного гормона
- =лактотропного гормона
- ~фолликулостимулирующего гормона
- ~адренокорикотропного гормона

}

Секреторные нейроны, совмещающие свойства нервных и эндокринных клеток, находятся: {

- ~в надпочечниках
- ~в эпифизе
- ~в передней доле гипофиза
- =в гипоталамусе
- ~в задней доле гипофиза

}

В передней доле гипофиза имеются разновидности хромофильных клеток: {

- ~гонадотропоциты
- ~тиротропоциты
- ~соматотропоциты
- ~лактотропоциты
- =все указанные клетки

}

Гормон, понижающий содержание кальция в крови, синтезируется: {
=в щитовидной железе
~в надпочечниках
~в околощитовидной железе
~в передней доле гипофиза
~в эпифизе
}

Накопительные тельца Херринга находятся: {
~в передней доле гипофиза
~в средней доле гипофиза
~в туберальной части гипофиза
=в задней доле гипофиза
~в мозговом веществе надпочечников
}

При гибели базофильных клеток передней доли гипофиза нарушается функция желез: {
~щитовидной железы
~коры надпочечников
~яичников
=всех указанных желез
~ничего из перечисленного
}

При удалении передней доли гипофиза у экспериментального животного нарушается функция: {
~околоушной железы
~мозгового вещества надпочечников
=щитовидной железы
~островков поджелудочной железы
~клубочковой зоны коры надпочечников
}

Внутривенное введение радиоактивного йода используется для исследования: {
=щитовидной железы
~эпифиза
~надпочечников

~околощитовидной железы

~передней доли гипофиза

}

При обработке гистологического среза надпочечников солями хрома

выявляются клетки: {

= клетки мозгового вещества

~клетки клубочковой зоны

~клетки пучковой зоны

~клетки соединительной ткани

~клетки сетчатой зоны

}

Задержка роста может быть связана с нарушением синтетической активности

клеток гипофиза: {

~кортикотропных

~хромофобных

=соматотропоцитов

~питуицитов

~лактотропоцитов

}

При импергнации серебром среза щитовидной железы в стенке фолликулов и между ними обнаруживаются клетки с аргирофильной зернистостью: {

~соматотропоциты

~пинеалоциты

~тироциты

~паратироциты

=парафолликулярные клетки

}

В цитоплазме клеток железы, синтезирующей стероидные гормоны, хорошо развиты: {

~лизосомы

~центросома

~гранулярная эндоплазматическая сеть

~аппарат Гольджи

=агранулярная эндоплазматическая сеть

}

