

Собственную пластинку слизистой оболочки образует ткань: {

~ретикулярная

~фиброзная

~жировая

~плотная неоформленная ткань

=рыхлая соединительная

}

В подслизистой оболочке имеются: {

~ретикулярная ткань

~плотная неоформленная соединительная ткань

=лимфоидные фолликулы

~ауэрбаховское сплетение

=РСТ

}

Подслизистая оболочка отсутствует в: {

~нижней поверхности языка

=спинке языка

~щеки

=деснах

~миндалинах

}

В серозной оболочке имеются: {

=рыхлая неоформленная соединительная ткань

~жировая ткань

~ретикулярная ткань

~однослойный кубический эпителий

=однослойный плоский эпителий

}

Спинка языка имеет особенности строения: {

~наличие складок

=наличие сосочков

~наличие мышечной пластинки

~%33.33333%наличие подслизистой оболочки
=%50%отсутствие подслизистой оболочки

Вкусовые луковицы располагаются: {
~на поверхности эпителия
=в толще эпителия
~под эпителиальным пластом
~в рыхлой соединительной ткани
~под рыхлой соединительной тканью
}

В состав вкусовых луковиц входят: {
~%33.33333%секреторные клетки
=%50%опорные клетки
~%33.33333%ацинарные клетки
=%50%рецепторные клетки
~%33.33333%аргентаффиновые
}

В состав листовидных сосочков входят: {
~%33.33333%плотная неоформленная соединительная ткань
~%33.33333%ретикулярная ткань
=%50%РСТ
=%50%многослойный плоский неороговевающий эпителий
~%33.33333%многослойный плоский ороговевающий эпителий
}

В состав околоушной железы входят: {
~%33.33333%прослойка ретикулярной ткани
~%33.33333%прослойка мышечной ткани
=%50%прослойка РСТ
~%33.33333%мякотные тяжи
=%50%концевые отделы
}

Стенку выводных протоков слюнных желез образует эпителий: {
=%50%однослойный плоский
~%33.33333%многорядный цилиндрический
~%33.33333%многослойный плоский ороговевающий

~%33.33333%цилиндрический каемчатый
=%50%многослойный кубический не ороговевающий
}

Подъязычная железа по строению:

~простая разветвленная
~сложная неразветвленная
~сложная альвеолярная разветвленная
~сложная трубчатая разветвленная
=сложная альвеолярно-трубчатая разветвленная
}

Концевые отделы подчелюстной слюнной железы имеют клетки: {

=%50%слизистые
~%33.33333%серозные
=%50%белковые
~%33.33333%гладкомышечные
~%33.33333%бокаловидные
}

В небных миндалинах имеются: {

~%33.33333%многослойный плоский ороговевающий эпителий
~%33.33333%плотная соединительная ткань
=%50%РСТ
~%33.33333%скопление тучных клеток
=%50%скопления лимфоцитов
}

В слизистой оболочки пищевода имеются: {

~%33.33333%однослойный многоядный мерцательный эпителий
=%50%многослойный плоский неороговевающий эпителий
~%33.33333%плотная соединительная ткань
=%50%РСТ
~%33.33333%поперечно-полосатая мышечная ткань
}

В собственной пластинки слизистой оболочки пищевода имеются: {

~ретикулярная ткань
~жировая ткань

~плотная соединительная ткань
=РСТ
~скопления плазматических клеток
}

В составе подслизистой оболочки пищевода имеются: {
~%33.33333%прослойки из плотной неоформленной соединительной ткани
=%50%РСТ
~%33.33333%белковые железы
=%50%слизистые железы
~%33.33333%смешанные железы
}

Кардиальные железы пищевода располагаются: {
~%33.33333%в начальной части
=%50%на уровне перстневидного хряща
~%33.33333%на уровне бифуркации трахеи
~%33.33333%на уровне 10 - кольца трахеи
=%50%у входа в желудок
}

Наибольшие скопления собственных желез пищевода располагаются: {
=в верхней трети
~между верхней и средней третью
~в средней трети
~на границе между средней и нижней третью
~в нижней трети
}

В составе мышечной оболочки пищевода имеются: {
=%50%РСТ
~%33.33333%плотная соединительная ткань
=%50%гладкая мышечная ткань
~%33.33333%мейснеровское сплетение
~%33.33333%концевые отделы желез

В верхней трети мышечной оболочки пищевода имеются: {
~%33.33333%гладкомышечная ткань
=%50%поперечно - полосатая мышечная ткань

~%33.33333%ретикулярная ткань
~%33.33333%плотная неоформленная соединительная ткань
=%50%РСТ
}

В средней трети мышечной оболочки пищевода имеются: {
=%50%гладкая мышечная ткань
=%50%поперечно-полосатая мышечная ткань
~%33.33333%прослойки ретикулярной ткани
~%33.33333%плотная неоформленная соединительная ткань
~%33.33333%плотная оформленная соединительная ткань
}

В нижней трети мышечной оболочки пищевода имеются: {
=%50%гладкая мышечная ткань
~%33.33333%поперечно-полосатая мышечная ткань
~%33.33333%прослойка ретикулярной ткани
~%33.33333%плотная неоформленная соединительная ткань
=%50%РСТ
}

В составе адвентициальной оболочки пищевода имеется: {
~плотная неоформленная соединительная ткань
~плотная оформленная соединительная ткань
=РСТ
~прослойка ретикулярной ткани
~однослойный плоский эпителий
}

Эпителий слизистой оболочки желудка однослойный: {
~кубический железистый
~цилиндрический
~цилиндрический каемчатый
~цилиндрический реснитчатый
=цилиндрический железистый
}

Клетки эпителия слизистой оболочки желудка секретируют: {
~%33.33333%белковый секрет

~%33.33333%хлориды
=%50%бикарбонаты
=%50%слизь
~%33.33333%соляную кислоту
}

Железы желудка располагаются в: {
~мышечной пластинке
~подслизистой оболочке
~толще эпителия
=собственной пластинке
~мышечной оболочке
}

Слизисто-бикарбонатный барьер желудка выполняет функцию: {
~выделительную
~всасывательную
~экскреторную
~угнетения секреторной активности
=защитную
}

В собственной пластинке слизистой оболочки желудка имеются: {
~%33.33333%плотная неоформленная соединительная ткань
~%33.33333%ретикулярная ткань
=%50%РСТ
=%50%железы
~%33.33333%тельца Гассала
}

Железы желудка имеют клетки: {
~%33.33333%ацинарные
~%33.33333%белковые
=%50%обкладочные
~%33.33333%аппикально-зернистые
=%50%главные
}

Для главных клеток желудка характерно: {

~%33.33333%оксифильная цитоплазма
=%50%базофильная цитоплазма
=%50%хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть
~%33.33333%слабо развита гранулярная эндоплазматическая сеть
~%33.33333%в цитоплазме пластинчатые тельца
}

Для обкладочных клеток желудка характерно: {
=%50%оксифильная цитоплазма
~%33.33333%базофильная цитоплазма
=%50%хорошо развита агранулярная эндоплазматическая сеть
~%33.33333%хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть
~%33.33333%в цитоплазме пластинчатые тельца
}

Аргентафинные клетки желудка вырабатывают: {
~гистамин
=серотонин
~гепарин
~гастрин
~фактор роста
}

В подслизистой оболочке желудка имеются: {
~%33.33333%прослойка плотной неоформленной соединительной ткани
=%50%РСТ
~%33.33333%ретикулярная ткань
~%33.33333%ауэрбаховское сплетение
=%50%мейснеровское сплетение
}

В мышечной оболочке желудка имеются: {
~%33.33333%прослойки плотной неоформленной соединительной ткани
~%33.33333%ретикулярная ткань
=%50%прослойка РСТ
~%33.33333%прослойки жировой ткани
=%50%слои из гладкомышечных клеток
}

В состав серозной оболочки желудка входят: {

~%33.33333%прослойка из плотной неоформленной соединительной ткани

~%33.33333%прослойка из ретикулярной ткани

~%33.33333%однослойный кубический эпителий

=%50%прослойка из РСТ

=%50%однослойный плоский эпителий

}

Складки кишечника это: {

~выпячивание слизистой оболочки

~выпячивание слизистой, подслизистой и мышечной оболочек

=выпячивание слизистой и подслизистой оболочек

~выпячивание подслизистой оболочки

~выпячивание эпителия в собственную пластинку

}

Ворсинки кишечника это: {

~углубления эпителия в собственную пластинку

~выпячивание подслизистой оболочки

~выпячивание слизистой и подслизистой оболочек

~выпячивание слизистой, подслизистой и мышечной оболочек

=выпячивание слизистой оболочки

}

Крипты кишечника это: {

~выпячивание слизистой в подслизистую оболочку

~выпячивание эпителия в собственную пластинку

~выпячивание подслизистой оболочки

~выпячивание слизистой и подслизистой оболочек

=углубления эпителия в собственную пластинку

}

В составе эпителия ворсинок кишечника имеются клетки: {

~%33.33333%цилиндрические железистые

=%50%цилиндрические каемчатые

~%33.33333%цилиндрические реснитчатые

~%33.33333%обкладочные

=%50%бокаловидные

}

В составе мышечной оболочки кишечника имеются: {
~%33.33333%прослойка плотной неоформленной соединительной ткани
~%33.33333%ретикулярная ткань
=%50%РСТ
~%33.33333%мейснеровское сплетение
=%50%слои из гладкомышечной ткани
}

12-перстный отдел кишечника имеет особенности: {
~%33.33333%ворсинки отсутствуют
~%33.33333%ворсинки длинные, узкие
=%50%ворсинки короткие, толстые
~%33.33333%в подслизистой оболочке нет желез
=%50%в подслизистой оболочке имеются железы
}

Толстая кишка имеет особенности: {
~%33.33333%ворсинки короткие, толстые
=%50%ворсинки отсутствуют
~%33.33333%лимфоидных скоплений мало
~%33.33333%лимфоидных скоплений нет
=%50%лимфоидных скоплений много
}

В составе поджелудочной железы из энтодермы развиваются: {
=%50%железистые клетки ацинусов
=%50%железистые эндокринные клетки
~%33.33333%капсула
~%33.33333%соединительная ткань
~%33.33333%нервное сплетение
}

В составе поджелудочной железы из мезенхимы развивается: {
~железистые клетки ацинусов
~железистые эндокринные клетки
~эпителий выводных протоков
=РСТ
~центроакинозные клетки

}

Базофилию базальной части панкреатического экзокриноцита обуславливает: {

=%50%наличие большого количества рибосом

~%33.33333%наличие хорошо развитого комплекса Гольджи

=%50%наличие хорошо развитой гранулярной эндоплазматической сети

~%33.33333%наличие хорошо развитой агранулярной эндоплазматической сети

~%33.33333%обилие митохондрий

}

Оксифилию апикальной части ацинозных клеток поджелудочной железы определяет: {

~хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть

~хорошо развитая агранулярная эндоплазматическая сеть

~обилие митохондрий

~обилие лизосом

=гранулы секрета

}

Б - клетки панкреатического островка: {

~стимулирует образование желчи

~повышает уровень сахара в крови

~повышает уровень кальция в крови

~повышает уровень натрия в крови

=понижает уровень сахара в крови

}

А - клеток панкреатического островка: {

~стимулируют образование желчи

~угнетают выделение панкреатического сока

=повышают уровень глюкозы в крови

~понижает уровень глюкозы в крови

~повышает уровень кальция в крови

}

РР - клетки поджелудочной железы: {

~стимулируют выделение желчи

- ~угнетают выделение желчи
- ~стимулируют выделение желудочного сока
- =стимулируют выделение панкреатического сока
- ~угнетают выделение желудочного сока

}

Диабетогенным действием обладают: {

- ~%33.33333%альдостерон
- ~%33.33333%андроген
- =%50%глюкокортикоиды
- ~%33.33333%адренокортикотропный
- =%50%гормон роста

}

Симптомы, имеющие место при удалении поджелудочной железы у подопытных животных: {

- ~%33.33333%повышение артериального давления
- ~%33.33333%понижение артериального давления
- ~%33.33333%нарушение реабсорбции первичной мочи
- =%50%нарушение пищеварения
- =%50%появление сахара в моче

}

Железы встречаются в подслизистой основе: {

- ~дна желудка
- ~пилорического отдела желудка
- ~тощей кишки
- =двенадцатиперстной кишки
- ~подвздошной кишки

}

Камбинальными клетками в эпителии тонкой кишки являются: {

- ~каемчатые энтероциты ворсин
- =бескаемчатые энтероциты крипт
- ~бокаловидные энтероциты
- ~апикально-зернистые энтероциты
- ~эндокриноциты

}

Гладкие миоциты в мышечной оболочке желудка образуют: {
~один продольный слой
~один поперечный слой
~два слоя - продольный и поперечный
=три слоя - продольный, поперечный и косонаправленный
~четыре чередующихся продольно и поперечно слоя
}

Слизистая оболочка толстой кишки отличается от слизистой оболочки тонкой кишки: {
~%33.33333%большим количеством ворсинок
~%33.33333%меньшим количеством ворсинок
=%50%наличием глубоких, хорошо выраженных крипт
~%33.33333%отсутствием крипт
=%50%отсутствием ворсинок
}

Для стенки червеобразного отростка характерно: {
~наличие переходного эпителия в слизистой оболочке
~множество крипт и ворсинок
~отсутствие мышечной оболочки
~наличие желез в подслизистой оболочке
=наличие большого скопления лимфоидной ткани
}

К макрофагической системе в печени относятся: {
~липоциты
~ямочные клетки (Р-клетки)
=звездчатые клетки
~эндотелиоциты
~гепатоциты
}

Перисинусоидальные пространства Диссе в печеночных дольках располагаются: {
~между печеночными балками
~внутри печеночных балок
~между гепатоцитами
=между стенкой гемокапилляров и печеночными балками

~вокруг центральных вен
}

Капсулу печени образует: {

~РСТ

=плотная соединительная ткань

~жировая ткань

~гладкомышечная ткань

~поперечно полосатая мышечная ткань

}

В состав печеночной дольки входят: {

~%33.33333%междольковая артерия

~%33.33333%междольковая вена

~%33.33333%междольковая капиллярная сеть

=%50%синусоидные капилляры

=%50%печеночные балки

}

Стенку желчных капилляров образуют: {

~эндотелий

~клетки Купфера

~ретикулоциты

~панкреоциты

=гепатоциты

}

В состав стенки синусоидных капилляров печени входят: {

~%33.33333%гепатоциты

=%50%эндотелиоциты

~%33.33333%панкреоциты

=%50%клетки Купфера

~%33.33333%миоэпителиальные клетки

}

Центральная вена печеночной дольки по строению является: {

~венной с хорошо развитыми мышечными элементами

~со слабо развитыми мышечными элементами

~венной мышечного типа

=веной безмышечного типа
~веной мышечно-эластического типа
}

Васкулярный полюс гепатоцитов выполняет функцию синтеза: {
=%50%гликогена
~%33.33333%жиров
=%50%белков плазмы крови
~%33.33333%желчи
~%33.33333%гормонов
}

Пространства Дисса располагаются между:
~гепатоцитами внутри балок
~синусоидными капиллярами
=синусоидными капиллярами и гепатоцитами
~липоцитами и гепатоцитами
~клетками Купфера и липоцитами
}

Васкулярный полюс гепатоцитов имеет: {
~%33.33333%пластинчатые телеца
~%33.33333%липидные включения
~%33.33333%агранулярную эндоплазматическую сеть хорошо развита
=%50%гранулярную эндоплазматическую сеть хорошо развита
=%50%много микроворсинок
}

Для печени человека характерно между дольками: {
~густая сеть эластических волокон
~густая сеть коллагеновых волокон
~густая сеть ретикулярных волокон
~хорошо развитые соединительнотканые прослойки
=слабо развитые соединительнотканые прослойки
}

Барьер между желчью и кровью в печеночных дольках образуют: {
~липоциты
=гепатоциты

- ~эндотелиоциты
- ~клетки Купфера
- ~эпителий стенки желчных протоков

}

Синусоидные капилляры печени образуются путем слияния ветвей: {

- ~междольковых артерий и вен
- =вокруг дольковых артерий и вен
- ~центральной вены и междольковой артерии
- ~центральной вены и междольковой вены
- ~междольковых артерий и вен

}

Пространства Дрисса печеночных долек заполнены: {

- ~кровью
- ~лимфой
- ~только форменными элементами крови
- =только плазмой крови
- ~тканевой жидкостью

}

Печень выполняет функции синтеза: {

- ~%33.33333%сурфактанта
- =%50%гликогена
- =%50%глобулинов
- ~%33.33333%аммиака
- ~%33.33333%гликокаликса

}

Пепсиноген вырабатывается в железах желудка клетками: {

- =главными
- ~париетальными
- ~щечными
- ~эндокринными
- ~мукоцитами

}

Ворсинки тонкой кишки – это: {

- =выросты слизистой оболочки

- ~выросты покровного эпителия
- ~совокупность микроворсинок
- ~складки слизистой и подслизистой оболочек
- ~углубление эпителия в собственную пластину слизистой оболочки
- }

В слизистой оболочке пищевода обнаруживаются все структурные элементы, кроме: {

- ~многослойного эпителия
- ~собственной пластинки слизистой оболочки
- ~мышечной пластинки слизистой оболочки
- ~кардиальных желёз
- =однослойного эпителия
- }

В гистологическом препарате дна желудка характерным признаком париетальных клеток является: {

- ~расположение в доньшках желёз
- ~базофильная окраска цитоплазмы
- ~цилиндрическая форма клеток
- =оксифильная окраска цитоплазмы
- ~расположение ядра в базальной части клеток

Защитная функция червеобразного отростка проявляется благодаря: {

- ~наличию в эпителии бокаловидных клеток
- ~присутствию желёз в подслизистой основе
- =наличию лимфоидных узелков в слизистой оболочке и подслизистой основе
- ~наличию крипт в слизистой оболочке
- ~присутствию мышечной оболочки
- }

Подвижность слизистой оболочки пищевода, желудка и кишечника обеспечивается: {

- ~собственной пластинкой слизистой оболочки
- ~мышечной пластинкой слизистой оболочки
- ~эпителием слизистой оболочки
- =подслизистой основой
- ~мышечной пластинкой слизистой оболочки

}

В тонкой кишке при обследовании в результате травмы повреждён эпителий слизистой оболочки. Назовите клетки, обеспечивающие регенерацию этого эпителия: {

~апикальнозернистые

~эндокринные

~бокаловидные

=бескаёмчатые

~каёмчатые

}

Назовите источник развития эпителия слизистой оболочки желудка и тонкой кишки: {

~целомический эпителий

~эктодерма

~мезодерма

~сомиты

=энтодерма

}

У обследуемого больного в анализе желудочного сока обнаружено пониженное содержание соляной кислоты. Назовите клетки, вырабатывающие соляную кислоту: {

~главные

=париетальные

~шеечные

~добавочные

~эндокринные

}

В двух биопсийных препаратах представлены два отдела кишечника: толстый и тонкий. Для дифференциальной диагностики толстой кишки необходимо указать основной решающий признак: {

~наличие ворсин и крипт

~отсутствие ворсин

~отсутствие крипт

=наличие только крипт

~наличие только ворсин

}

Студенту предложено из двух биопсийных гистологических препаратов – нёбной миндалины и червеобразного отростка – выбрать для детального описания препарат миндалины. Укажите на какие признаки отличия необходимо опираться? {

- ~более глубокие крипты
 - ~выстилка многослойным эпителием
 - ~отсутствие мышечной и серозной оболочек
 - =всё перечисленное верно
 - ~всё перечисленное неверно
- }

В образовании желчи участвуют: {

- ~перисинусоидальные липоциты
 - ~звездчатые клетки
 - ~эндотелиоциты
 - =гепатоциты
 - ~ациноциты
- }

Желчные капилляры располагаются: {

- ~между печеночными балками
 - ~вокруг центральной артерии
 - ~входят в состав триады
 - =внутри печеночных балок
 - ~по периферии долек
- }

Синусоидные капилляры располагаются: {

- ~внутри печеночных балок
 - =между печеночными балками
 - ~в центре дольки
 - ~по периферии дольки
 - ~входят в состав триады
- }

Экзокринная часть поджелудочной железы состоит из следующих частей, кроме: {

~панкреатических ацинусов
~вставочных и внутридольковых протоков
~междольковых протоков
~общего панкреатического протока
=островков
}

Ациноциты входят в состав: {
~островков
~междольковых выводных протоков
~внутридольковых выводных протоков
=ацинусов
~соединительнотканной капсулы
}

В образовании инсулина участвуют: {
~А-клетки островков
~Д-клетки островков
~Р-клетки островков
~ациноциты
=В-клетки островков
}

Глюкагон секретируют: {
~В-клетки
~Д-клетки
~ациноциты
=А-клетки
~Д1-клетки
}

Соматостин секретируют: {
~В-клетки
~А-клетки
~Д1-клетки
=Д-клетки
~эндокриноциты выводных протоков
}

Вазоактивный интестинальный полипептид секретируют: {

~А-клетки

~В-клетки

~ациноциты

~эндокриноциты выводных протоков

=Д1-клетки

}

При введении в венозное русло печени красителя его можно обнаружить: {

~в гепатоцитах

=в клетках Купфера – звездчатых макрофагах

~в эндотелиоцитах синусоидных капилляров

~в клетках междолькового желчного капилляра

~в трабекулах

}

Для экзокринного отдела поджелудочной железы характерно все, кроме: {

~наличия ацинусов

=отсутствия выводных протоков

~наличия долек

~наличия выводных протоков

~наличия центроациназных клеток

}