

В стенке носовой полости имеются оболочки: {

=слизистая

~подслизистая

~волокнуисто-хрящевая

~мышечная

~адвентициальная

}

В слизистой оболочке носовой полости имеются: {

=%50%эпителий

~%33.33333%жировая ткань

~%33.33333%плотная неоформленная соединительная ткань

=%50%рыхлая соединительная ткань

~%33.33333%слой гладкомышечных клеток

}

Орган обоняния имеет клетки: {

~%33.33333%Меркеля

=%50%базальные

~%33.33333%столбчатые

~%33.33333%секреторные

=%50%рецепторные

}

Для обонятельных рецепторных клеток характерно: {

~%33.33333%наличие микроворсинок

=%50%наличие ресничек

~%33.33333%имеет один отросток

=%50%имеет два отростка

~%33.33333%не имеет отростков

}

Базальные клетки органа обоняния выполняют функцию: {

~секреторная

~экскреторная

~опорная

~трофическая

=участие в регенерации

}

В стенке трахеи имеются оболочки: {

~%33.33333%серозная

=%50%слизистая

~%33.33333%мышечная

~%33.33333%волокнистая

=%50%волокнисто-хрящевая

}

В составе эпителия трахеи имеются клетки: {

~%33.33333%опорные

=%50%бокаловидные

~%33.33333%каемчатые

=%50%реснитчатые

~%33.33333%альвеолярные

}

Щеточные клетки эпителия воздухоносных путей выполняют функцию: {

~секреторную

~экскреторную

=хеморецепторную

~выделительную

~защитную

}

В составе собственной пластинке трахеи имеются: {

~%33.33333%плотная не оформленная соединительная ткань

~%33.33333%жировая ткань

=%50%рыхлая соединительная ткань

~%33.33333%железы

=%50%скопление лимфоидной ткани

}

В составе подслизистой оболочке трахеи имеются: {

~%33.33333%многорядный эпителий

=%50%железы

~%33.33333%ретикулярная ткань

=%50%рыхлая соединительная ткань

~%33.33333%плотная соединительная ткань

}

В составе волокнисто-хрящевой оболочке трахеи имеются: {

~%33.33333%многорядный эпителий

~%33.33333%железы

~%33.33333%рыхлая соединительная ткань

=%50%гиалиновый хрящ

=%50%плотная неоформленная соединительная ткань

}

В составе адвентициальной оболочке трахеи имеются: {

=%50%сосуды

~%33.33333%железы

~%33.33333%эластические мембраны

~%33.33333%ретикулярная ткань

=%50%рыхлая соединительная ткань

}

Источниками развития клеточных элементов стенки альвеол являются: {

=%50%энтодерма

~%33.33333%мезодерма

=%50%мезенхима

~%33.33333%сомиты

~%33.33333%сегментные ножки

}

В стенке альвеол имеются клетки: {

~%33.33333%плазмоциты

~%33.33333%B-лимфоциты

=%50%макрофаги

~%33.33333%щеточные клетки

=%50%пневмоциты

}

Для пневмоцитов первого порядка характерно: {

~%33.33333%поверхность клеток ровная

~%33.33333%на поверхности единичные реснички

=%50%на поверхности микроворсинки

~%33.33333%хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть

=%50%в цитоплазме имеются микропузырьки

}

Для пневмоцитов второго порядка характерно: {
~%33.33333%в цитоплазме хорошо развитая агранулярная
эндоплазматическая сеть
=%50%в цитоплазме хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть
~%33.33333%гранулярная эндоплазматическая сеть развита слабо
~%33.33333%в цитоплазме много микропузырьков
=%50%в цитоплазме пластинчатые тельца
}

Пневмоциты 1-порядка выполняют функцию: {
~защитную
~секреторную
~экскреторную
~эндокринную
=газообмена
}

Пневмоциты второго порядка выполняют функцию: {
~защитную
~секреторную
~эндокринную
=секреции сурфактанта
~газообмена
}

Сурфактант выполняет функции: {
~%33.33333%препятствует расправлению альвеол
=%50%способствует расправлению альвеол
=%50%уменьшает силу поверхностного натяжения стенки альвеол
~%33.33333%увеличивает силу поверхностного натяжения альвеол
~%33.33333%способствует усилению кровотока
}

В межалвеолярных промежутках имеются: {
~%33.33333%синусоидные капилляры
=%50%густая сеть эластических волокон
=%50%густая сеть капилляров
~%33.33333%эластические мембраны

~%33.33333%концевые отделы желез
}

Для главных бронхов характерно: {
~%33.33333%наличие эластического хряща
~%33.33333%наличие хрящевых полуколец
=%50%наличие хрящевых колец
~%33.33333%отсутствие подслизистой оболочки
=%50%наличие мышечной пластинки
}

Для крупных бронхов характерно: {
~%33.33333%наличие хрящевых колец
~%33.33333%наличие хрящевых островков
=%50%наличие хрящевых пластинок
~%33.33333%отсутствие мышечной пластинки
=%50%наличие мышечной пластинки
}

Для средних бронхов характерно: {
~%33.33333%наличие хрящевых полуколец
=%50%наличие хрящевых островков
~%33.33333%отсутствие хряща в волокнистой хрящевой оболочке
~%33.33333%слабо выраженная мышечная пластинка
=%50%хорошо выраженная мышечная пластинка
}

В составе слизистой оболочки среднего бронха имеются: {
~%33.33333%многорядный цилиндрический каемчатый эпителий
=%50%многорядный цилиндрический мерцательный эпителий
~%33.33333%ретикулярная ткань
=%50%РСТ
~%33.33333%железы
}

В составе волокнистой хрящевой оболочки среднего бронха имеются: {
~%33.33333%многорядный цилиндрический эпителий
~%33.33333%РСТ
=%50%плотная неоформленная соединительная ткань

~%33.33333%железы
=%50%хрящевые островки
}

В составе подслизистой оболочки среднего бронха имеются: {
~%33.33333%многорядный цилиндрический эпителий
~%33.33333%ретикулярная ткань
~%33.33333%плотная неоформленная соединительная ткань
=%50%РСТ
=%50%железы
}

Для малых бронхов характерно: {
~%33.33333%наличие хрящевых пластинок
~%33.33333%отсутствие мышечной пластинки
=%50%хорошо выраженная мышечная оболочка
~%33.33333%слабо выраженная подслизистая оболочка
=%50%нет подслизистой оболочки
}

Для терминальных бронхиол характерно: {
~%33.33333%наличие многорядного мерцательного эпителия
=%50%наличие однослойного кубического реснитчатого эпителия
~%33.33333%наличие однослойного цилиндрического эпителия без ресничек
~%33.33333%хорошо развитая мышечная пластинка
=%50%слабо развитая мышечная пластинка
}

В составе многорядного призматического эпителия трахеи имеются все клетки, кроме: {
~реснитчатых
~бокаловидных
~эндокринных
~базальных
=апикально-зернистых
}

В состав аэрогематического барьера входят все элементы, кроме: {
~цитоплазмы эпителиоцита 1 типа

- ~сурфактанта
- ~цитоплазмы эндотелиоцита
- ~базальных мембран эпителиоцита и эндотелиоцита
- =цитоплазмы эпителиоцита 2 типа

Легкие снаружи покрыты: {
=мезотелием
~мерцательным эпителием
~соединительнотканной капсулой
~многослойным плоским эпителием
~эластической мембраной
}

Легкие выполняют ряд нереспираторных функций,
кроме: {
~депонирования крови
~инактивация вазоактивных веществ
~выделения из организма летучих веществ
=регуляции углеводного обмена
~участия в регуляции свертывания крови
}

Слизистая оболочка надгортанника выстлана эпителием: {
~однослойным плоским
=многослойным плоским
~многорядным реснитчатым
~многорядным со стороны гортани и многослойным со стороны глотки
~переходным
}

В трахее, крупных и средних бронхах различают все оболочки, кроме: {
~слизистой
~подслизистой
=мышечной
~фиброзно-хрящевой
~адвентициальной
}

Основной тканью сетчатого слоя дермы кожи является: {
~рыхлая соединительная

~плотная оформленная
=плотная неоформленная
~гладкая мышечная
~поперечнополосатая мышечная
}

Эпидермис представлен всеми дифферонами клеток, кроме: {
~кератиноцитов
~меланоцитов
=внутриэпидермальных фибробластов
~осязательных клеток Меркеля
~внутриэпидермальных макрофагов (клетки Лангенгарса)
}

Околоносовые пазухи выстланы: {
~адвентициальной оболочкой
~надкостницей
~слизистой оболочкой с многослойным плоским эпителием
=слизистой с многорядным реснитчатым эпителием
~серозной оболочкой
}

Слизисто-белковые и белково-слизистые железы имеются во всех отделах, кроме: {
~носовой полости и гортани
~трахеи
~крупных бронхов
~средних бронхов
=мелких бронхов
}

В препарате легкого курильщика видны клетки, содержащие большое количество частичек дыма и пыли. Что это за клетки?: {
~тучные клетки межалвеолярных перегородок
=макрофаги альвеол
~эпителиоциты сосудов
~реснитчатые эпителиоциты
~бокаловидные клетки
}

В воздухоносных путях происходит все, кроме: {

~голособразования

~проведения воздуха к респираторному отделу

=газообмена

~очистки воздуха

~обоняния

}

Конечные (терминальные) бронхиолы легко растяжимы при вдохе и легко возвращаются в исходное положение при выдохе. Какие морфологические структуры ответственны за это?: {

~эластические волокна

=гладкие миоциты

~эпителиоциты I типа

~макрофаги

~эпителиоциты II типа

}

Железы, секретирующие слизь в стенке воздухоносных путей, отсутствуют: {

~в трахее

~в носовой полости

~в гортани

~в крупных и средних бронхах

=в мелких бронхах

}

Слизистая оболочка гортани выстлана эпителием: {

=многорядным реснитчатым

~однослойным кубическим

~переходным

~многослойным плоским неороговевающим

~однослойным каемчатым

}

Внешнее дыхание, т.е. поглощение из вдыхаемого воздуха O₂ и снабжение им крови, а также удаление из организма CO₂, является основной функцией дыхательной системы. Где осуществляется эта функция?: {

~в трахее

~в гортани

~во внелегочных бронхах
=в ацинусе
~в легочных бронхах
}

Пищевые комки, проходящие по пищеводу, расположенному непосредственно позади трахеи, не встречают препятствия со стороны стенки трахеи. Какие структуры стенки трахеи ответственны за это?: {

~слизистая оболочка
~подслизистая основа
~собственная пластинка слизистой оболочки
=волокнуто-хрящевая оболочка
~адвентициальная оболочка
}

Газообмен в легких осуществляется: {

~в трахее
~в бронхах малого калибра
=в ацинусах
~в терминальных бронхиолах
~в бронхах среднего калибра
}

Терминальные бронхиолы выстланы: {

~многорядным реснитчатым эпителием
~переходным эпителием
~однослойным плоским эпителием
=однослойным кубическим реснитчатым эпителием
~двухрядным реснитчатым эпителием
}

Стенка малого бронха выстлана: {

=двухрядным реснитчатым эпителием
~однослойным кубическим реснитчатым эпителием
~многорядным реснитчатым эпителием
~однослойным плоским эпителием
~многослойным плоским неороговевающим эпителием
}

В препарате виден бронх, в стенке которого различают слизистую оболочку и в ней – собственную и мышечную пластинки слизистой оболочки; подслизистую основу с железами, расположенными группами, фибро-хрящевую оболочку в виде гиалиновых пластин и адвентициальную оболочку. Назовите этот бронх: {

~малый

~главный

=средний

~терминальный

~респираторный

}

Эпителиоциты 1-го типа выстилают стенку: {

~бронхов малого калибра

~терминальных бронхиол

~респираторных бронхиол

~бронхов среднего калибра

=альвеол

}