

Клетками эпидермиса кожи являются: {

~%33.33333%адреноциты

~%33.33333%тиреоциты

=%50%кератиноциты

~%33.33333%плазмоциты

=%50%меланоциты

}

Клетки базального слоя эпидермиса имеют особенности: {

~%33.33333%форма кубическая

=%50%цилиндрическая

~%33.33333%в цитоплазме агранулярная эндоплазматическая сеть

=%50%в цитоплазме гранулярная эндоплазматическая сеть

~%33.33333%мало рибосом

}

Клетки шиповатого слоя эпидермиса имеют особенности: {

=%50%в цитоплазме много тонофибрилл

~%33.33333%в цитоплазме пластинчатые тельца

~%33.33333%наличие щелевых контактов

=%50%наличие десмосом

~%33.33333%на поверхности микроворсинки

}

Клетки зернистого слоя эпидермиса кожи имеют особенности: {

=%50%ромбовидная форма

~%33.33333%в цитоплазме зерна элеидина

~%33.33333%в цитоплазме много тонофибрилл

=%50%в цитоплазме зерна кератогиалина

~%33.33333%хорошо развита агранулярная эндоплазматическая сеть

}

Клетки блестящего слоя имеют особенности: {

~%33.33333%органеллы хорошо очерчены

=%50%органеллы хорошо не контурируются

~%33.33333%в цитоплазме белок керотогиалин

~%33.33333%в цитоплазме белок кератин

=%50%в цитоплазме белок элеидин

}

Клетки Лагерганса эпидермиса кожи выполняют функцию: {

- ~секреторную
 - ~рецепторную
 - =фагоцитарную
 - ~эндокринную
 - ~экскреторную
- }

Клетки Меркеля эпидермиса кожи выполняют функцию: {

- ~секреторную
 - =рецепторную
 - ~фагоцитарную
 - ~эндокринную
 - ~экскреторную
- }

Меланоциты кожи располагаются: {

- ~среди клеток шиповатого слоя
 - ~среди клеток зернистого слоя
 - ~тела клеток в шиповатом слое, а отростки в зернистом слое
 - ~тела клеток в шиповатом слое, а отростки в базальном слое
 - =тела клеток в базальном слое, а отростки в шиповатом
- }

Эпидермис тонкой кожи имеет особенности: {

- ~%33.33333%зернистый слой выраженный
 - =%50%зернистый слой имеет единичные клетки, содержащие кератогиалин
 - ~%33.33333%блестящий слой выраженный
 - ~%33.33333%блестящий слой слабо выраженный
 - =%50%нет блестящего слоя
- }

В составе сосочкового слоя дермы кожи имеются: {

- ~%33.33333%плотная неоформленная ткань
- =%50%РСТ
- ~%33.33333%ретикуляторная ткань
- =%50%фибробласты

~%33.33333%ретикулоциты
}

В составе сетчатого слоя кожи имеются: {
=%50%плотная неоформленная соединительная ткань
~%33.33333%РСТ
~%33.33333%ретикуляторная ткань
~%33.33333%густая сеть ретикулиновых волокон
=%50%густая сеть эластических волокон
}

Для сальных желез характерно: {
~%33.33333%секреция апокриновая
~%33.33333%мерокриновая
=%50%в концевых отделах имеются малодифференцированные базальные клетки.
~%33.33333%имеются миоэпителиальные клетки
=%50%имеются клетки на разных стадиях жировых дегенераций
}

Для потовых желез характерно: {
~%33.33333%секреторные клетки концевых отделов плоские
~%33.33333%полигональной формы
=%50%цилиндрические
=%50%имеются миоэпителиальные клетки
~%33.33333%нет миоэпителиальных клеток
}

Сальные железы кожи выполняют функцию: {
~защитная
~выделительная
~экскреторная
=жировая смазка для кожи
~участие в терморегуляции
}

Корковое вещество волоса состоит из: {
~полигональных клеток с зёрнами пигмента
=плоских роговых чешуй с зёрнами пигмента

~аморфного вещества
~клеток росткового слоя эпидермиса
~отмирающих меланоцитов
}

Эпидермис представлен всеми дифферонами клеток, кроме: {
~кератиноцитов
~меланоцитов
~внутриэпидермальных макрофагов
=внутриэпидермальных фибробластов
~осязательных клеток Меркеля
}

Рост волоса происходит за счёт деления клеток: {
~мозгового вещества
~коркового вещества
~волосяного сосочка
=волосяной луковицы
~волосяного фолликула
}

Основной тканью сетчатого слоя дермы кожи является: {
~рыхлая соединительная
~плотная оформленная
=плотная неоформленная
~гладкая мышечная
~поперечнополосатая мышечная
}

Размножение клеток волосяной луковицы (матрицы) приводит к образованию всех следующих компонентов волоса, кроме: {
~внутреннего эпителиального влагалища
=наружного эпителиального влагалища
~мозгового вещества
~коркового вещества
~кутикулы волоса
}

Кератолинины синтезируются клетками слоёв эпидермиса: {

- ~базального
- ~шиповатого
- ~блестящего
- =зернистого
- ~рогового
- }

Рост ногтевой пластинки происходит за счёт деления клеток: {

- ~её корня
- ~её тела
- =ногтевой матрицы
- ~эпидермиса ногтевых валиков
- ~надногтевой пластинки
- }

Центром пролиферативной единицы эпидермиса считается: {

- ~кератиноцит базального слоя в интерфазе
- ~кератиноцит базального слоя в митозе
- ~пигментная клетка
- =внутриэпидермальный макрофаг
- ~клетка Меркеля
- }