

Источниками развития тканевых элементов семенника являются: {

~%33.33333%эктодерма

~%33.33333%энтодерма

=%50%мезенхима

~%33.33333%сомиты

=%50%спланхнотомы

}

В составе семенника имеются: {

~%33.33333%проксимальные каналы

=%50%извитые каналы

~%33.33333%густая сеть эластических волокон

~%33.33333%прослойки из ретикулярной ткани

=%50%прослойки из РСТ

}

В составе извитых канальцев семенника имеются:

=%50%клетки Сертоли

~%33.33333%клетки Лейдига

=%50%сперматоциты

~%33.33333%эндокриноциты

~%33.33333%сероциты

}

В межканальцевых промежутках долек семенника имеются: {

~%33.33333%прослойки ретикулярной ткани

=%50%прослойки РСТ

~%33.33333%поддерживающие клетки

~%33.33333%сперматоциты

=%50%интерстициальные клетки

}

Поддерживающие клетки семенников имеют особенности строения: {

~%33.33333%в цитоплазме хорошо развитая гранулярная

эндоплазматическая сеть

=%50%в цитоплазме хорошо развитая агранулярная эндоплазматическая сеть

~%33.33333%в цитоплазме много гранул пигмента

=%50%трофических включений много

~%33.33333%пластинчатых телец много
}

Поддерживающие клетки извитых канальцев семенников выполняют функцию синтеза: {

~липопротеидов
=андроген связывающего белка
~тестостерона
~фолликулина
~простогландинов
}

Интерстициальные клетки семенника выполняют функцию синтеза: {

~прогестерона
~липопротеидов
~андроген связывающего белка
=тестостерона
~фолликулина
}

Роль гематотестикулярного барьера семенника выполняют: {

~интерстициальные клетки
~эндотелиоциты
=поддерживающие клетки
~сперматогонии
~сперматоциты
}

Гематотестикулярный барьера семенника выполняет функции: {

~%33.33333%тормозит сперматогенез
~%33.33333%ускоряет выработку тестостерона в извитых канальцах
=%50%способствует созданию высокой концентрации тестостерона в извитых канальцах.
~%33.33333%способствует созданию низкой концентрации тестостерона в извитых канальцах
=%50%изолирует дифференцирующиеся половые клетки от токсических веществ.
}

Клетками - мишенями ФСГ гипофиза в семеннике являются: {
~сперматогонии
~сперматоциты
~сперматиды
~интерстициальные клетки
=клетки Сертоли
}

ФСГ гипофиза в семенниках способствует: {
~повышению секреторной активности интерстициальных клеток.
~понижению секреторной активности интерстициальных клеток.
~делению сперматогониев
=образованию андрогено-связывающего белка в клетке Сертоли
~образованию ингибина в клетке Сертоли
}

Для семявыносящего протока характерно: {
~%33.33333%эпителий однорядный
=%50%двухрядный
~%33.33333%переходный
~%33.33333%подслизистая оболочка хорошо выражена
=%50%нет подслизистой оболочки
}

Для канальцев придатка характерно: {
~%33.33333%однорядный
~%33.33333%многорядный реснитчатый
=%50%двухрядный
~%33.33333%кубический
=%50%цилиндрический
}

В фазу размножения сперматогенеза происходит: {
~редукционное деление сперматоцитов
~редукционное деление сперматогоний
=митотическое деление сперматогоний
~редупликация ДНК в сперматоцитах
~митотическое деление сперматоцитов
}

В фазу роста сперматогенеза происходит: {
=профаза первого мейотического деления
~формирование сперматозоидов
~митотическое деление сперматогоний
~редукционное деление сперматоцитов
~эквационное деление сперматоцитов
}

В фазу созревания сперматогенеза происходит: {
~формирование сперматозоидов
~митотическое деление сперматогоний
~редупликация ДНК в сперматоцитах
=мейотическое деление сперматоцитов
~мейотическое деление сперматогоний
}

В фазу формирования сперматогенеза происходит: {
~конъюгация хромосом в сперматоцитах
~кроссинговер
~образование тетрад
~образование диад
=трансформация сперматид
}

Образование мужских половых клеток происходит в: {
~прямых канальцах семенника
~канальцах сети семенника
=извитых канальцах семенника
~выносящих канальцах семенника
~протоке придатка
}

В состав эпителиального сперматогенного пласта входят все перечисленные клетки, кроме: {
~сперматогоний
~сперматид
~суспендоцитов
=гландулоцитов

~сперматоцитов
}

Первичные половые клетки впервые обнаруживаются в: {

~половом валике
=энтодерме желточного мешка
~стенке первичной кишки
~сомитной ножке
~всех перечисленных образованиях
}

Интерстициальную ткань семенника составляют все компоненты, кроме: {

~рыхлой соединительной ткани
~сосудов
~нервов
~гландулоцитов
=суспендоцитов
}

Гаплоидный набор хромосом в процессе сперматогенеза образуется в
стадии: {

~роста
~размножения
=первого деления созревания
~формирования
~второго созревания
}

При просмотре гистопрепарата извитого семенного канальца видны
делящиеся сперматогонии и сперматоциты и не выявлены сперматиды.

Определите стадии сперматогенеза: {

~размножения
~роста
=размножения и роста
~созревания и формирования
~формирования
}

В извитом семенном канальце яичка при микроскопическом исследовании выявлено преобладание сперматид и зрелых спермиев над другими клеточными формами. Назовите стадии сперматогенеза. {

- ~роста и размножения
- =созревания и формирования
- ~только роста
- ~только формирования
- ~только созревания
- }

Конъюгация хромосом и кроссинговер происходят: {

- ~в стадии размножения
- ~в стадии формирования
- =в профазе первого деления созревания
- ~в стадии второго деления созревания
- ~всё неверно
- }

На гистологическом препарате яичка с придатком видны четыре типа канальцев: извитые семенные канальцы, канальцы сети семенника, выносящие канальцы и канал придатка. Назовите признаки дифференциальной диагностики выносящих канальцев. {

- =неровный просвет, чередование высоких и низких клеток
- ~двурядный эпителий, ровный просвет
- ~однослойный кубический эпителий
- ~несколько слоёв клеток, часть клеток делится
- ~однослойный цилиндрический эпителий
- }

Сустентоциты располагаются: {

- ~в прямых канальцах семенника
- =в извитых семенных канальцах
- ~в интерстиции семенника
- ~в канальцах сети семенника
- ~в выносящих канальцах семенника
- }

Капсула мужской половой железы (яичка) состоит из: {

- ~ретикулярной ткани

~жировой ткани
~рыхлой соединительной ткани
=плотной соединительной ткани
~всех перечисленных тканей
}

Предстательная железа представляет собой: {
=совокупность многочисленных отдельных слизистых желёз
~единую белковую железу
~совокупность отдельных белковых желёз
~единую слизистую железу
~эндокринную железу
}

Поддерживающие клетки (суспендоциты) соединяются между собой
~щелевидными соединениями
~пальцевидными соединениями
~десмосомами
=плотными контактами
~простыми соединениями
}

Окончательное созревание сперматозоидов происходит: {
~в извитых семенных канальцах
=в протоке придатка
~в канальцах сети семенника
~в выносящих канальцах семенника
~в прямых канальцах семенника
}

Гормонообразующими клетками интерстициальной ткани яичек являются: {
~клетки сосудов
~клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани
~суспендоциты
~миоидальные клетки
=гландулоциты
}

В состав дольки яичка входят все нижеперечисленные структуры, кроме: {

~рыхлой волокнистой соединительной ткани
=ретикулярной ткани
~гландулоцитов
~извитых семенных канальцев
~прямых канальцев семенника
}

Перед исследователем один из органов мужской половой сферы. В гистопрепарате видно много пучков гладких миоцитов вокруг концевых отделов и выводных протоков. Назовите этот орган. {

~семенник
~сеть семенника
=предстательная железа
~выносящие канальцы
~канал придатка
}