

В составе коркового вещества яичника ребенка имеются: {

~%33.33333%лимфоидные фолликулы

=%50%первичные фолликулы

~%33.33333%тельца Гассаля

~%33.33333%растущие фолликулы

=%50%РСТ

}

В составе коркового вещества яичника половозрелой женщины имеются: {

~%33.33333%лимфоидные фолликулы

=%50%первичные фолликулы

~%33.33333%тельца Гассаля

=%50%растущие фолликулы

~%33.33333%плотная соединительная ткань

}

Стадия размножения овогенеза совершается: {

=в период эмбрионального развития

~в постэмбриональном периоде до I года

~до 10 лет

~до 14 лет

~после полового созревания

}

При превращении первичного фолликула в растущий происходит: {

=%50%превращения овогония в овоцит первого порядка

~%33.33333%овоцита первого порядка в овоцит второго порядка

~%33.33333%образования яйценосного бугорка

=%50%образование блестящей оболочки

~%33.33333%формирование мышечной оболочки

}

Стадия малого роста овогенеза совершается: {

~%33.33333%в период эмбрионального развития

=%50%до периода полового созревания

~%33.33333%к моменту полового созревания

=%50%в яичнике

~%33.33333%в яйцеводе

}

Стадия созревания овогенеза совершается в: {

~зрелом фолликула яичника

~растущем фолликуле

~зрелом фолликуле яичника

=яйцеводе

~полости матки

}

Стадия большого роста овогенеза совершается: {

~%33.33333%в период эмбрионального развития

~%33.33333%до периода полового созревания

=%50%в половозрелом возрасте

=%50%в яичнике

~%33.33333%в яйцеводах

}

Лютеинизирующий гормон гипофиза в яичнике оказывает действия: {

~%33.33333%тормозит рост фолликулов в яичнике

=%50%способствует образованию желтого тела

~%33.33333%способствует росту фолликулов

~%33.33333%способствует превращению прогестерона в тестостерон

=%50%способствует образованию тестостерона в интерстициальных клетках

}

Прогестерон секретируется под влиянием: {

~эстрогена

~ФСГ гипофиза

~релаксина

~лактотропного гормона

=лютеинизирующего гормона

}

Релаксин образуют в: {

~зернистых клетках фолликулов

~интерстициальных клетках фолликулов

~атретичных фолликулах

~белом теле

=желтом теле беременности
}

Релаксин оказывает действия: {
~%33.33333%тормозит рост фолликулов
~%33.33333%стимулирует рост фолликулов
~%33.33333%стимулирует восстановление слизистой оболочки матки
=%50%расширяет половые пути
=%50%смягчает лонное сочленение
}

В процессе развития желтое тело происходит периоды: {
~%33.33333%роста
~%33.33333%созревания
=%50%пролиферации и васкуляризации
=%50%расцвета
~%33.33333%формирования
}

В составе миометрии имеются: {
~%33.33333%эпителий
~%33.33333%железы
=%50%слои из гладкой мышечной ткани
~%33.33333%прослойки плотной соединительной ткани
=%50%РСТ
}

На миометрий оказывают влияния: {
~%33.33333%тестостерон
=%50%прогестерон
=%50%окситоцин
~%33.33333%ингибин
~%33.33333%релаксин
}

Для молочной железы характерно: {
=%50%железа сложная альвеолярная
~%33.33333%сложная трубчатая
~%33.33333%сложная альвеолярно-трубчатая

=%50%тип секреции апокриновый
~%33.33333%мерокриновый
}

В составе концевых отделов молочной железы имеются клетки: {
~%33.33333%панкреоциты
=%50%лактоциты
~%33.33333%эндотелиоциты
=%50%миоэпителиоциты
~%33.33333%бокаловидные клетки
}

Белое тело яичника продуцирует: {
~продукция эстрогена
~прогестерона
~тестостерона
~ингибина
=не функционирует
}

В интерстициальных клетках фолликул яичника образуется: {
=тестостерон
~прогестерон
~эстроген
~релаксин
~ингибин
}

На эндометрий оказывают влияние:
=%50%эстроген
=%50%прогестерон
~%33.33333%тестостерон
~%33.33333%ингибин
~%33.33333%релаксин
}

После овуляции на месте фолликула образуется: {
~белое тело
=желтое тело

- ~атретическое тело
- ~зрелый фолликул
- ~растущий фолликул

}

При циклических изменениях матки наиболее выраженной морфологической перестройке подвергается: {

- ~миометрий
- ~базальный слой эндометрия
- =функциональный слой эндометрия
- ~периметрий
- ~вся стенка органа

}

Массовая атрезия фолликулов яичника, сопровождающаяся эстрогенизацией организма, происходит в период: {

- ~эмбриональный
- ~препубертатный
- ~беременности
- =климактерический
- ~старческий

}

В яичнике плода отсутствуют: {

- ~промордиальные фолликулы
- =желтые тела
- ~атрезирующие фолликулы
- ~кровеносные сосуды
- ~первичные фолликулы

}

Зрелые фолликулы в яичнике впервые появляются в периоде: {

- ~эмбриональном
- ~климактерическом
- ~старческом
- ~репродуктивном
- =полового созревания

}

Внутрифолликулярную жидкость в яичнике секретируют: {

~овогония

~овоцит 1 порядка

~овоцит II порядка

=фолликулярные клетки

~интерстициальные клетки

}

В корковом веществе яичника есть всё, кроме: {

~примордиальных фолликулов

=сосудов, нервов, эпителиальных тяжей

~первичных фолликулов

~третичных фолликулов

~атретических тел

}

Образование блестящей оболочки характеризует: {

~примордиальный фолликул

=первичный фолликул

~вторичный фолликул

~третичный фолликул

~жёлтое тело

}

Фолликулярная жидкость содержит:

~прогестерон

~гонадотропин

=эстрогены

~анδροгены

~гонадокринин

}

В развитии жёлтого тела отсутствует стадия: {

~пролиферации и васкуляризации

~железистого метаморфоза

=созревания

~расцвета

~инволюции

}

На наступление овуляции оказывает влияние гормон: {

=лютеинизирующий

~прогестерон

~фолликулостимулирующий

~эстрогены

~пролактин

}

Овуляция – это: {

~развитие жёлтого тела

=разрыв фолликула

~образование атретического тела

~образование редуцированного тельца

~образование третичного фолликула

}

Прогестерон оказывает влияние на: {

~овуляцию

~развитие жёлтого тела

~развитие атретического тела

=слизистую оболочку матки

~рост фолликулов

}

Процесс регенерации маточного эпителия в постменструальную фазу осуществляется под действием гормона: {

~прогестерона

~фоллитропина

=эстрогенов

~пролактина

~окситоцина

}

Регуляция деятельности лактирующей молочной железы осуществляется гормоном: {

~фоллитропином

=пролактином

~соматотропином

~кортикотропином

~окситоцином

