

Амниотический пузырек у человека образуется из: {

~энтодермы

~мезодермы

=эктодермы

~трофобласта

~симпластотрофобласта

}

Мезодерма у человека образуется из материала: {

~цитотрофобласта

~внезародышевой эктодермы

=зародышевой эктодермы

~внезародышевой энтодермы

~зародышевой энтодермы

}

Стадия ранней гаструляции у человека совершается на: {

~третий день

~пятый день

=второй неделе

~третьей неделе

~пятой неделе эмбрионального развития

}

Стадия поздней гаструляции у человека совершается на: {

~третий день

~пятый день

~второй неделе

=третьей неделе

~пятой неделе

}

Производным аллантоиса у человека является: {

~детская часть плаценты

~материнская часть плаценты

~хорион

~амнион

=пупочный канатик

}

Производным хориона у человека является: {

- =детская часть плаценты
 - ~материнская часть плаценты
 - ~амниотический мешок
 - ~желточный мешок
 - ~пупочный канатик
- }

В начале 4-й неделе эмбрионального развития у человека происходит образование: {

- ~амниотического пузырька
 - ~желточного пузырька
 - ~хориона
 - =обособление тела зародыша от внезародышевых органов
 - ~дифференцировка трофобласта
- }

Зародыш человека окружает: {

- ~симпластотрофобласт хориона
 - ~цитотрофобласт хориона
 - =амнион
 - ~желточный мешок
 - ~внезародышевая энтодерма желточного мешка
- }

Амнион у человека выполняет функцию: {

- ~трофическую
 - ~фагоцитарную
 - ~образования первых половых клеток
 - ~кроветворную
 - =создание водной среды вокруг зародыша
- }

Желточный мешок у человека выполняет функции: {

- ~33.33333%трофическую
- ~33.33333%фагоцитарную
- ~33.33333%защитную
- =50%образования первых половых клеток

=%50%кровоотворную
}

В состав плодной части плаценты входят: {
~лакуны
~соединительные септы
~часть хориона без ворсинок
=часть хориона с ворсинками
~часть амниона без ворсинок
}

В состав ворсинок хориона у человека входят: {
~%33.33333%плотная соединительная ткань
=%50%РСТ
~%33.33333%слой гладкомышечных клеток
~%33.33333%эластическая мембрана
=%50%симпластотрофобласт
}

В плаценте вырабатываются гормоны: {
~%33.33333%ингибин
~%33.33333%адренокортикотропин
=%50%эстроген
=%50%прогестерон
~%33.33333%тестостерон
}

Хориальный гонадотропин плаценты: {
~способствует сохранению фолликулов
~тормозит рост новых фолликулов
~тормозит выработку ФСГ
~тормозит выработку ЛГ
=способствует сохранению желтого тела
}

Производным энтодермы является эпителий: {
~%33.33333%ротовой полости
~%33.33333%передней доли гипофиза
=%50%желез желудка

=%50%печени
~%33.33333%серозной оболочки тонкой кишки
}

Производным эктодермы является эпителий: {
=%50%ротовой полости
=%50%щитовидной железы
~%33.33333%желез желудка
~%33.33333%дуоденальных желез 12-перстной кишки
~%33.33333%крипт толстой кишки
}

Производным дерматом мезодермы является: {
~эпителий кожи
~эпителий канальцев почек
~эпителий серозных покровов
~РСТ стенки пищевода
=соединительная ткань кожи
}

Производным миотом мезодермы является: {
~эпителий кожи
~эпителий канальцев почек
~эпителий серозных покровов
=мышцы языка
~РСТ стенки пищевода
}

Производным склеротом мезодермы является: {
~%33.33333%эпителиальная ткань
~%33.33333%РСТ
~%33.33333%плотная соединительная ткань
=%50%хрящевая ткань
=%50%костная ткань
}

Особенностью химического состава студенистой ткани пупочного канатика является наличие в составе ткани большого количества: {
~сурфактанта

~гликокаликса
=гиалуроновой кислоты
~хондроитинсерной кислоты
~гликопротеинов
}

Имплантация у человека совершается на: {

~5-е сутки
=7-е сутки
~9-е сутки
~11-е сутки
~14-е сутки
}

Дробление зародыша человека: {

~полное равномерное
~полное неравномерное
~частичное
=полное асинхронное неравномерное
~частичное асинхронное
}

Источником развития гладкой мышечной ткани является: {

~сомит
=мезенхима спланхнотома
~нефротом
~кожная эктодерма
~кишечная энтодерма
}

Оплодотворение яйцеклетки у человека происходит в: {

~брюшной полости
~полости матки
=ампулярной части яйцевода
~истмической части матки
~области шейки матки
}

При имплантации зародыша человека трофобласт вступает в контакт с: {

~эпителием матки
~соединительной тканью слизистой оболочки матки
~маточными железами
~стенкой кровеносных сосудов
=материнской кровью
}

В течение первых 12 ч. развития зародыша происходит: {
~имплантация
~дробление
=оплодотворение
~1-я фаза гастрюляции
~2-я фаза гастрюляции
}

В течение 1-5-х суток развития зародыша происходит: {
~имплантация
=дробление
~оплодотворение
~1-я фаза гастрюляции
~2-я фаза гастрюляции
}

В течение 6-7-х суток развития зародыша происходит: {
=имплантация
~дробление
~оплодотворение
~1-я фаза гастрюляции
~2-я фаза гастрюляции
}

Какой тип яйцеклетки характерен для человека? {
~алецитальная
~олиголецитальная
~мезолецитальная
~первично изолецитальная
=вторично изолецитальная
}

