

Источниками развития однослойного цилиндрического каемчатого эпителия кишечника является: {

~эктодерма

~нейроэктодерма

~наружный листок спланхнотома

=энтодерма

~внутренний листок спланхнотома

}

Однослойный многорядный цилиндрический мерцательный эпителий имеет: {

~%33.33333%желудок

~%33.33333%кишечник

~%33.33333%матка

~%50%трахея

~%50%бронхи

}

Для клеток блестящего слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия характерно: {

~%33.33333%форма кубическая

~%33.33333%клеточные границы хорошо очерчены

~%50%клеточные границы слабо очерчены

~%50%наличие белка элеидина

~%33.33333%кератогеалина

}

Для желез с апокриновой секрецией характерно: {

~секреторные клетки разрушаются наполовину

=разрушается апикальная часть клеток

~секреторные клетки разрушаются полностью

~секреторные клетки не разрушаются

~разрушается базальная часть клеток

}

Переходный эпителий имеется в: {

~%50%мочеточнике

~%33.33333%языке

~%33.33333%пищевوده

~%50%мочевом пузыре
~%33.33333%яйцеводах
}

Камбиальными клетками в многорядном эпителии трахеи являются: {
~базально-зернистые
~щеточные
~мерцательные
~бокаловидные
=короткие вставочные
}

Однослойный плоский эпителий имеется в: {
~%33.33333%трахее
~%50%селезенке
~%50%легких
~%33.33333%тимусе
~%33.33333%пищевод
}

Мезотелий имеет особенности: {
~%33.33333%низкая чувствительность к раздражителям
~%50%высокая чувствительность
~%33.33333%отсутствие чувствительности
~%33.33333%низкая всасывательная способность
~%50%высокая всасывательная способность
}

В состав базальной мембраны входят: {
~%33.33333%гликокаликс
~%33.33333%слой эластических волокон
~%50%слой ретикулярных волокон
~%50%базальная пластинка
~%33.33333%микрофиламенты
}

Для однослойного цилиндрического каемчатого эпителия характерно наличие: {
~ресничек

- ~базальной исчерченности
- ~пластинчатых телец
- ~тонофибрилл
- =микроворсинок

}

Однослойный однорядный цилиндрический реснитчатый эпителий имеет: {

- ~%33.33333%желудок
- ~%33.33333%кишечник
- ~%50%яйцеводы
- ~%50%матка
- ~%33.33333%трахея

}

Однослойный цилиндрический железистый эпителий желудка выполняет функции: {

- ~%33.33333%всасывательную
- ~%50%защитную
- ~%33.33333%экскреторную
- ~%50%секреторную
- ~%33.33333%транспортную

}

В составе многорядного цилиндрического реснитчатого эпителия трахеи имеются клетки: {

- ~%33.33333%плоские реснитчатые
- ~%33.33333%зернистые
- ~%33.33333%цилиндрические каемчатые
- ~%50%вставочные
- ~%50%бокаловидные

}

Базальная мембрана выполняет функции: {

- ~%33.33333%сократительную
- ~%50%разграничительную
- ~%33.33333%секреторную
- ~%50%избирательная диффузия веществ
- ~%33.33333%экскреторную

}

Источником развития многослойного плоского ороговевающего эпителия является: {

~нейроэктодерма

=эктодерма

~мезенхима

~висцеральный листок мезодермы

~париетальный листок мезодермы

}

Для клеток шиповатого слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия характерно: {

~%33.33333%цилиндрическая форма

~%33.33333%наличие микроворсинок

~%50%наличие отростков

~%33.33333%наличие ресничек

~%50%наличие десмосом

}

Между клетками шиповатого слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия кожи имеется: {

~простой контакт

~плотный контакт

=контакт с участием десмосом

~щелевой контакт

~контакт по типу замка

}

Для клеток зернистого слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия характерно: {

~%33.33333%форма кубическая

~%50%ромбовидная

~%33.33333%наличие зерен элеидина

~%33.33333%кератина

~%50%кератогиалина

}

Специальными органеллами эпителиальных клеток являются: {

- ~%33.33333%нейрофибриллы
- ~%50%тонофибриллы
- ~%33.33333%миофибриллы
- ~%50%микроворсинки
- ~%33.33333%микросомы

}

Клетки базального слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия выполняют функцию: {

- ~защитную
- ~выделительную
- ~секреторную
- ~фильтрационную
- =регенерационную

}

Многослойный плоский неороговевающий эпителий имеется в: {

- ~%50%роговице глаза
- ~%33.33333%почках
- ~%50%пищевод
- ~%33.33333%желудке
- ~%33.33333%трахее

}

В многослойном плоском неороговевающем эпителии имеются слои: {

- ~%50%базальный
- ~%33.33333%кубических клеток
- ~%33.33333%зернистый
- ~%33.33333%блестящий
- ~%50%шиповатых клеток

}

Контакты с участием десмосом имеет: {

- ~однослойный плоский
- ~однослойный цилиндрический каемчатый
- ~многорядный цилиндрический реснитчатый
- ~многослойный плоский неороговевающий
- =многослойный плоский ороговевающий

}

В переходном эпителии мочеточника имеются слои: {

~%50%базальный

~%33.33333%шиповатых клеток

~%33.33333%блестящий

~%50%покровный

~%33.33333%плоских клеток

}

Базальный слой переходного эпителия выполняет функцию: {

~сократительную

~защитную

~выделительную

~секреторную

=регенерационную

}

Для желез с мерокриновой секрецией характерно: {

~разрушается базальная часть клеток

~секреторные клетки разрушаются полностью

~секретные клетки разрушаются на половину

=секретные клетки не разрушаются

~разрушается апикальная часть клеток

}

Под эпителием располагаются: {

~мышечная ткань

~плотная неоформленная соединительная ткань

~плотная оформленная соединительная ткань

=рыхлая соединительная ткань

~жировая ткань

}

Для желез с голокриновой секрецией характерно: {

~секреторные клетки не разрушаются

=секреторные клетки разрушаются полностью

~разрушается только апикальная часть клеток

~разрушается базальная часть клеток

~секреторные клетки разрушаются только на половину
}

По мерокриновому типу секретируют: {
~%50%печень
~%50%поджелудочная железа
~%33.33333%сальные железы
~%33.33333%молочные железы
~%33.33333%потовые железы подмышечных впадин
}

По голокриновому типу секретирует: {
~печень
~поджелудочная железа
~потовые железы
=сальные железы
~молочные железы
}

Для простых неразветвленных желез характерно: {
=один выводной проток и один концевой отдел
~два выводных протока
~выводной проток ветвится
~несколько концевых отделов с одним выводным протоком
~несколько выводных протоков с одним концевым отделом
}

Полярность клеток эпителия определяется: {
~наличием межклеточных контактов на латеральной мембране
~наличием базальной мембраны
~высокой способностью к регенерации
=пограничным положением ткани
~способностью к секреции
}

Эпителии имеют все признаки, кроме: {
~пограничного положения
~базальной мембраны
~способности формировать пласт

=низкой способности к обновлению
~полярности эпителиоцитов
}

Реснитчатые клетки есть в составе ряда эпителия органов, кроме: {
~бронхов
~выносящих канальцев яичка
~яйцеводов
=канальцев почки
~собственно носовой полости
}

В клетках блестящего слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия происходит: {
~синтез гликозамингликанов
=формирование элаидина
~пролиферация
~накопление меланина
~формирование кератогиалина
}

Не сплошные плотные контакты между эпителиальными клетками имеет: {
~пищевод
~желудок
=кишечник
~трахея
~бронхи
}

Отличительным признаком переходного эпителия при сравнении с другими многослойными эпителиями является: {
~большая толщина
~способность трансформироваться в однослойный
=наличие в поверхностном слое крупных клеток с округлыми ядрами
~большое число делящихся клеток в базальном слое
~наличие в поверхностном слое плоских клеток с палочковидным ядром
}

Эпителиальная ткань выполняет все функции, кроме: {

- ~защитной
- ~секреторной
- ~эксекреторной
- =трофической
- ~барьерной

}

Для эпителиальной ткани характерно все, кроме: {

- ~наличия базальной мембраны
- ~полярной дифференцировки
- =наличия кровеносных сосудов
- ~незначительного количества межклеточного вещества
- ~хорошей регенерации

}

В слоях эпидермиса имеются все клетки, кроме: {

- ~кератиноцитов
- ~меланоцитов
- ~макрофагов
- =бокаловидных
- ~лимфоцитов

}

Тонкофибриллы появляются в клетках слоев эпителия: {

- ~базального
- =шиповатого
- ~зернистого
- ~блестящего
- ~рогового

}

Клетки Лангерганса в многослойном плоском эпителии являются {

- =иммунокомпетентными
- ~чувствительными
- ~эндокринными
- ~пигментными
- ~стволовыми

}

Стволовыми клетками в многорядном эпителии являются: {

~реснитчатые

~эндокринные

=базальные

~бокаловидные

~плоские

}

Выводные протоки есть у всех желез, кроме: {

~слюнных

~желез дыхательной системы

=гипофиза

~желез желудка

~потовых

}

Представлен однослойный кубический эпителий дистальных канальцев почки. К какому типу относится данный вид эпителия? {

~эпидермальный

~энтеродермальный

=целонефродермальный

~эпендимоглиальный

~ангиодермальный

}