

Для коллагеновых волокон характерно: {
=50%малая растяжимость
~33.33333%высокая растяжимость
~33.33333%перевариваются в щелочной среде
=50%перевариваются в кислой среде
~33.33333%перевариваются в нейтральной среде
}

Производными нервных гребней являются: {
~лаброциты
=меланоциты
~адипоциты
~фибробласты
~плазмоциты
}

Рыхлая соединительная ткань располагается в: {
=50%строме желудка
~33.33333%строме красного костного мозга
~33.33333%строме селезенки
~33.33333%строме тимуса
=50%слизистой оболочке полостных органов
}

В составе рыхлой соединительной ткани имеются: {
~33.33333%пневмоциты
=33.33333%перициты
~33.33333%альвеолоциты
=33.33333%фибробласты
=33.33333%макрофаги
}

Для перицитов рыхлой соединительной ткани характерно: {
~33.33333%форма цилиндрическая
=50%веретенообразная
33.33333%цитоплазма оксифильная
=50%цитоплазма базофильная
~33.33333%цитоплазма не окрашивается
}

Перициты РСТ выполняют функцию: {

~фагоцитоза

~трофическую

~выделительную

~всасывательную

=участия в регенерации клеток

}

Компоненты РСТ развиваются из: {

~эктодерма

~мезодерма

~энтодерма

=мезенхима

~сомиты

}

Для фибробластов характерно: {

~%33.33333%форма кубическая

=%33.33333%форма веретенообразная отросчатая

~%33.33333%цитоплазма оксифильная

=%33.33333%базофильная

=%33.33333%цитоплазма имеет две зоны

}

Фибробласты выполняют функции: {

~%33.33333%фагоцитоза

~%33.33333%трофическую

~%33.33333%секреции альбумина

=%50%секреции тропоколлагена

=%50%секреции гликозамингликанов

}

Для плазматических клеток характерно: {

~%33.33333%ядро располагается в центре клетки

=%50%эксцентрично

~%33.33333%цитоплазма слабо базофильная

=%50%сильно базофильная

~%33.33333%слабо оксифильная

}

Для тучных клеток характерно: {

~%33.33333%в цитоплазме нет гранул
~%33.33333%мало специфических гранул
=%33.33333%много специфических гранул
=%33.33333%в гранулах много гистамина
=%33.33333%в гранулах много гепарина
}

Тучные клетки выполняют функцию: {

~фагоцитоза
=участия в аллергических реакциях
~трофическую
~участия в регенерации клеток
~рецепторную
}

Плазматические клетки выполняют функцию: {

~фагоцитоза
~трофическую
~синтеза липопротеидов
~синтеза альбуминов
=синтеза антител
}

В гранулах тучных клеток содержатся: {

~%33.33333%интермедин
~%33.33333%гликокалекс
=%50%гистамин
~%33.33333%сурфактант
=%50%гепарин
}

Гистамин, который выделяется при дегрануляции тучных клеток способствует: {

~%33.33333%повышению артериального давления
=%50%понижению артериального давления
=%50%повышению проницаемости капилляров и венул

~%33.33333%понижению их проницаемости
~%33.33333%торможению их сократительной активности
}

Для макрофагов РСТ характерно: {
~%33.33333%цитоплазма оксифильная
~%33.33333%цитоплазма слабо оксифильная
=%50%много вакуолей
~%33.33333%в цитоплазме мало лизосом
=%50%много лизосом
}

Волокнистая соединительная ткань имеет разновидности: {
~%33.33333%хрящевая ткань
~%33.33333%костная ткань
=%50%рыхлая соединительная ткань
=%50%плотная неоформленная ткань
~%33.33333%пигментная ткань
}

Эластических волокон много в: {
=%50%легких
~%33.33333%щитовидной железе
~%33.33333%сухожилиях
=%50%вбрынной связке
~%33.33333%печени
}

Ретикулярных волокон много в: {
~%33.33333%сухожилиях
=%50%синусоидных капиллярах
=%50%красном костном мозге
~%33.33333%семенниках
~%33.33333%яичниках
}

Основное аморфное вещество рыхлой соединительной ткани имеет особенности: {
~наличие хондроитинсерной кислоты

=много гиалуроновой кислоты
~наличие молочной кислоты
~наличие ренина
~наличие эрипсина
}

Проницаемость основного аморфного вещества рыхлой соединительной ткани снижает: {

~пепсин
~гистамин
=гепарин
~гиалуронидаза
~дипептидаза
}

Проницаемость основного аморфного вещества рыхлой соединительной ткани повышают: {

~%33.33333%пепсин
=%50%гистамин
~%33.33333%гепарин
=%50%гиалуронидаза
~%33.33333%дипептидаза
}

Плотная волокнистая неоформленная соединительной ткани имеется в: {

~сосочковом слое кожи
=сетчатом слое кожи
~собственной пластинке
~подслизистой оболочке
~сухожилиях
}

Для плотной волокнистой оформленной соединительной ткани характерно: {

~%33.33333%относительно мало волокон
=%50%мощные пучки волокон
=%50%волокна идут в одном направлении.
~%33.33333%волокна идут в разных направлениях
~%33.33333%относительно много клеток
}

Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань имеется в: {
~%33.33333%сосочковом слое кожи
=%50%сухожилиях
~%33.33333%собственной пластинке слизистой оболочки
=%50%связках
~%33.33333%трабекулах селезенки
}

В составе сухожилия имеются: {
~%33.33333%пучки эластических волокон
=%50%коллагеновых волокон
~%33.33333%ретикулярных волокон
~%33.33333%тучные клетки
=%50%фиibroциты
}

Эндотений это: {
~прослойки РСТ между пучками первого порядка.
=второго порядка
~третьего порядка
~оболочка сухожилия
~прослойки плотной соединительной ткани
}

Перитений это: {
~прослойки РСТ между пучками первого порядка
~второго порядка
=третьего порядка
~оболочка сухожилия
~прослойки плотной соединительной ткани
}

Бурая жировая ткань имеет особенности: {
~%33.33333%мало сосудов
~%33.33333%густая сеть ретикулиновых волокон
~%33.33333%крупная капля жира в цитоплазме
=%50%в цитоплазме много митохондрий
=%50%много мелких капелек жира

}

Соединительные ткани развиваются из: {

~энтодермы

~спланхнотомы

=мезенхимы

~эктодермы

~сегментных ножек

}

Для рыхлой соединительной ткани характерно: {

~%33.33333%наличие связи с внешней средой

=%50%отсутствие связи с внешней средой

=%50%межклеточного вещества много

~%33.33333%волокон много

~%33.33333%волокна располагаются упорядоченно

}

Из моноцитов крови образуются: {

~плазмоциты

~адипоциты

~фибробласты

=макрофаги

~лаброциты

}

Студенистая соединительная ткань входит в состав: {

=пуповины

~хориона

~амниона

~желточного пузырька

~аллантоиса

}

Транспортно-трофическая функция соединительной ткани обеспечивается: {

~коллагеновыми волокнами

~адипоцитами

~эластическими волокнами

~плазмócитами

=аморфным компонентом межклеточного вещества
}

В развитии аллергических реакций ведущую роль играют: {

~адипоциты

=тучные клетки

~меланоциты

~фиброциты

~макрофаги

}

Соединительные ткани выполняют все функции, кроме: {

=внешнего обмена

~защитной

~трофической

~пластической

~опорной

}

В теплопродукции у новорожденных активно участвует ткань: {

~белая жировая

~ретикулярная

~пигментная

~слизистая

=бурая жировая

}

Из лимфоцитов крови образуются: {

~фибробласты

~лаброциты

~макрофаги

=плазмоциты

~адипоциты

}

Внутри базальной мембраны располагаются клетки: {

~макрофаги

~лаброциты

=перициты

~плазмоциты
~адипоциты
}

В развитии основного вещества соединительной ткани участвуют клетки: {

~адипоциты
=фибробласты
~меланоциты
~макрофаги
~плазмоциты
}

Адипоциты образуются из: {

=адвентициальных клеток
~плазмоцитов
~лаброцитов
~меланоцитов
~фиброцитов
}

Меланоциты (пигментоциты) образуются из: {

~мезенхимы
=нервных гребней
~эпителия
~сплахнотомы
~энтодермы
}

Межклеточное вещество образуется за счет секреции всех клеток, кроме: {

~фибробластов
~макрофагов
=перицитов
~плазмоцитов
~тучных клеток
}

Прочность соединительной ткани обусловлена наличием: {

~эластических волокон
~основного вещества

~ретикулярных волокон
=коллагеновых волокон
~ретикулярных клеток
}

Соединительная ткань выполняет все функции, кроме: {
=сократительной
~защитной
~трофической
~морфогенетической
~опорной
}

Соединительная ткань, выполняющая роль депо воды в организме: {
~пигментная
=белая жировая
~бурая жировая
~слизистая
~ретикулярная
}

Соединительная ткань, содержащая наибольшее количество меланоцитов: {
~ретикулярная
~слизистая
~жировая
=пигментная
~мезенхима
}

Соединительная ткань эмбрионального периода: {
=слизистая
~пигментная
~мезенхима
~ретикулярная
~жировая
}

Вид соединительной ткани, имеющей сетевидное строение: {
~пигментная

~слизистая
~белая жировая
~бурая жировая
=ретикулярная
}

Соединительная ткань, входящая в состав сухожилий, связок, апоневрозов и т.д.: {

~рыхлая волокнистая
=плотная оформленная
~плотная неоформленная
~ретикулярная
~мезенхима
}

Известно, что коллагеновые волокна (фибриллы) представляют собой поперечно исчерченные структуры. Каков период повторяемости темных и светлых участков? {

~30-40 нм
~40-50 нм
~55-60 нм
=64-67 нм
}

Укажите, где встречается слизистая ткань в норме у человека? {

=в пупочном канатике у эмбриона
~в фиброзных мембранах
~в полостях носа
~в суставных сумках
}

Каким свойством обладают коллагеновые волокна? {

~большой растяжимостью
~эластичностью
=малой растяжимостью
~устойчивостью к слабым кислотам и щелочам
}

Светлый “дворик” в плазматических клетках – это: {

=место скопления центриолей и аппарат Гольджи

~место скопления лизосом

~место скопления митохондрий

~место скопления рибосом

}