

Сколько ядер содержится в цисте кишечной амебы {

- ~2
 - ~4
 - ~6
 - =8
 - ~10
- }

Органеллами движения у саркодовых являются {

- ~мионемы
 - =псевдоподии
 - ~жгутики
 - ~реснички
 - ~миофибриллы
- }

В каких органах паразитирует мелкая вегетативная форма дизентерийной амебы {

- ~в желудке
 - =в просвете толстой кишки
 - ~в желчном пузыре
 - ~в тонком отделе кишечника
 - ~в легких
- }

Какое заболевание вызывает представитель саркодовых {

- ~энтеробиоз
 - ~лямблиоз
 - =амебиаз
 - ~лейшманиоз
 - ~балантидиаз
- }

Как диагностировать амёбную дизентерию {

- ~исследованием крови
 - ~исследованием дуоденального содержимого
 - ~отделяемых кожных язв
 - =фекалии
 - ~рвотная масса
- }

Последовательное развитие дизентерийной амебы с момента заражения {

- ~заражается большой вегетативной формой и переходит в цисту
 - ~проглатывается малая вегетативная форма - переходит в цисту
 - =проглатывается циста - малая форма - большая форма и обратно
 - ~проглатывается большая форма - малая форма - циста и обратно
 - ~проглатывается малая форма - переходит в большую - затем циста и обратно
- }

Что является бесспорным доказательством принадлежности большой вегетативной формы к дизентерийной амебе {

- ~большой размер
- ~активное движение

- ~множество ядер
- =наличие эритроцитов в цитоплазме
- ~постоянно меняющаяся форма тела

}

Каким путем проникает в организм человека возбудитель африканского трипаносомоза {

- =трансмиссивно
- ~активным внедрением через кожу
- ~попадает вместе с пищей
- ~воздушно-капельным путем
- ~через воду

}

Какой материал используется для диагностики трихомоноза {

- ~мокрота
- ~дуоденальное содержимое
- ~пунктат из печени
- =отделяемое из уретры и влагалища
- ~отделяемое из язвы

}

Каким путем проникает в организм человека возбудитель лямблиоза {

- =пищевым
- ~трансмиссионным
- ~активным внедрением через кожу
- ~воздушно-капельным

}

Какой материал используют для диагностики кожного лейшманиоза {

- ~фекалии
- ~мокрота
- =отделяемое из кожных язв
- ~дуоденальное содержимое
- ~рвотная масса

}

Какие жгутиковые вызывают у человека заболевания {

- =лейшмания
- ~амеба протей
- ~балантидий
- ~амеба ниглерия

}

Какой материал используется для диагностики африканской сонной болезни {

- ~слюна
- ~мокрота
- ~фекалии
- =пунктат лимфатических узлов

}

Назовите специальные органоиды, которые утрачены у споровиков, в связи с паразитизмом {

=органойды движения
~органойды зрения
~органойды дыхания
~мышцы
}

Какая стадия малярийного плазмодия инвазионна для комара{

=гаметоциты
~гаметы
~оокинета
~спорозоит
~шизонт
}

Как заражается человек малярией{

=через укусы насекомого
~проникает через кожные покровы
~проникает через расчески
~воздушно-капельным путем
~через пищевые продукты
}

Стадия развития возбудителя малярии в организме человека {

=гаметоцит
~оокинета
~гаметы
~спорозоид
}

Как называется половое и бесполое развитие возбудителя малярии и у кого оно происходит{

~гаметогония у комара
=спорогония у комара
~спорогония у человека
~схизогония у комара
}

В каких органах и тканях хозяина происходит схизогония{

~мышцы
~кожа
=печень
~головной мозг
}

Какие из этих заболеваний являются трансмиссивными{

~токсоплазмоз
=трехдневная малярия
~балантидиаз
~лямблиоз
}

Какие из простейших относятся к споровикам{

- ~лямблия
 - ~ротовая амеба
 - ~балантидий
 - =плазмодий
- }

Половые формы малярийного плазмодия, образующиеся в организме человека{

- =гаметоциты
 - ~гомонты
 - ~спороциста
 - ~ооцит
 - ~шизонт
- }

В каких органах человека развивается возбудитель малярии р. Plasmodium{

- ~в подкожной клетчатке, образует язвы
 - =сначала в клетках печени, затем в эритроцитах крови
 - ~в кишечнике, прикрепляются к микроворсинкам слизистой оболочки
 - ~сначала в лимфатической системе, затем в нервных клетках
- }

Что значит "ликвидация малярии как массового заболевания"{

- =ликвидация заболевания в соотношении 10:10 тыс.
 - ~ликвидация заболевания в соотношении 10:100 тыс.
 - ~ликвидация заболевания в соотношении 100:10 тыс.
 - ~ликвидация заболевания в соотношении 1000:10 тыс.
 - ~ликвидация заболевания в соотношении 100:100 тыс.
- }

Когда была поставлена задача ликвидации малярии, как массового заболевания и когда она была достигнута{

- ~поставлена задача в 1950 г. и достигнута в 1960 г.
 - =поставлена задача в 1949 г. и достигнута в 1951 г.
 - ~поставлена задача в 1931 г. и достигнута в 1940 г.
 - ~поставлена задача в 1925 г. и достигнута в 1945 г.
 - ~поставлена задача в 1940 г. и достигнута в 1950 г.
- }

Когда достигнута окончательная ликвидация малярии в России (Дагестане){

- ~1950 г.
 - ~1956 г.
 - ~1958 г.
 - =1959-1960 гг.
- }

Какой материал используется для диагностики балантидиаза{

- =фекалии
- ~дуоденальное содержимое
- ~моча
- ~кровь

~спинномозговая жидкость
}

Какие органоиды движения у инфузорий{

~жгутики
=реснички
~псевдоподии
~ундулирующая мембрана
~цитоплазматические выросты - ворсинки
}

Какая стадия балантидия инвазионна для человека{

=цисты
~вегетативная молодая
~вегетативная взрослая форма
~циста и молодая форма
~циста и взрослая форма
}

Где в организме локализуется балантидий{

~печень
~селезенка
=толстая кишка
~кровь
~спинномозговая жидкость
}

Как питательное вещество поступает в тело инфузории{

~путем фагоцитоза
~осмотически
=анимальным способом
~захватыванием ложноножкой
~при помощи жгутиков
}

Какие органоиды передвижения у представителей класса Саркодовые{

~жгутики;
=псевдоподии;
~реснички;
~микроворсинки;
}

Сколько ядер у представителей класса Инфузории{

~1;
=2;
~3;
~4;
}

У представителя, какого класса типа Простейшие имеется «клеточный рот» - цитостом{

~Жгутиковые;

~Саркодовые;
=Инфузории;
~Споровики;
}

У представителя, какого класса типа Простейшие имеется «клеточная глотка» - цитофаринкс{

~Жгутиковые;
~Саркодовые;
=Инфузории;
~Споровики;
}

У представителя, какого класса типа Простейшие отсутствуют органоиды движения{

~Жгутиковые;
~Саркодовые;
~Инфузории;
=Споровики;
}

Какая простейшая обитает в половых органах человека{

~лямблия;
=трихоманада;
~малярийные плазмодии;
~балантидий;
}

Представитель жгутиковых, у которого имеется четыре пары жгутиков{

=Лямблия
~Лейшмания
~Трипаносома
~Трихомонада
~Вольвокс
}

Если при дуоденальном зондировании обнаружены простейшие размером 10 – 15 мкм грушевидной формы, задний конец заострен, во время движения поворачиваются вокруг продольной оси тела, как бы сбоку на бок, то это{

~Лейшмании
~Трихомонады
~Трипаномы
=Лямблии
~Амебы
}

Как называются болезни, вызываемые простейшими{

~цестодозами;
~нематодозами;
~гельминтозами;
=протозойными;
}

Периодичность приступов лихорадки при паразитировании *Pl. vivax*

- {
- ~72 часа
- ~12 часов
- ~60 часов
- =48 часов
- ~56 часов
- }

Путь проникновения в организм человека возбудителя амебиаза (выберите один правильный ответ){

- ~Воздушно-капельный
- ~Трансмиссивный (при укусе москитом)
- =Алиментарный (пищевой)
- ~Половой
- ~Трансплацентарный
- }

К саркодовым - паразитам человека относятся{

- ~Trypanosoma brucei
- =Entamoeba histolytica
- ~Toxoplasma gondii
- ~Leishmania tropica
- }

Возбудителем амебиаза, облигатным паразитом человека, является{

- ~Entamoeba coli
- ~Entamoeba gingivalis
- =Entamoeba histolytica
- ~Entamoeba suis.
- }

Entamoeba histolytica имеет следующие жизненные формы{

- ~Циста, спорозонт, гамонты
- =Циста четырехядерная, вегетативная (мелкая и крупная) и тканевая формы
- ~Циста четырехядерная и тканевая форма
- ~Одноядерную циста, вегетативная (мелкая)и тканевая формы
- }

Инвазионной стадией для человека при амебной дизентерии является{

- ~Мелкая вегетативная форма
- ~Крупная вегетативная форма
- =Циста
- ~Тканевая форма
- }

Личинки каких видов комаров располагаются на поверхности воды в горизонтальном положении{

- ~Aedes
- ~Culex
- =Anopheles

~Coquillettidia
}

Распространению амебиаза способствуют следующие механические переносчики{

~Комары
~Слепни
~Москиты
=Тараканы
}

Инвазионная жизненная форма Entamoeba histolytica попадает в организм человека{

~При укусе москита
=С загрязненной водой и пищей
~При снятии шкур с убитых животных
~Трансфузионно (при переливании крови)
}

Entamoeba histolytica паразитирует у человека в{

~Ротовой полости
=Кишечнике
~Крови
~Мышцах
}

Лабораторная диагностика амебиаза осуществляется с помощью обнаружения{

~Цист в моче
=Цист и вегетативных форм в фекалиях
~Вегетативных форм в дуоденальном содержимом
~Тканевой формы паразита в кожных язвах
}

Меры личной профилактики при амебиазе следующие{

=Соблюдение личной гигиены при употреблении пищи
~Предохранение от укусов кровососущих насекомых
~Соблюдение стерильности медицинского инструментария
~Соблюдение гигиены при половых контактах.
}

Симптомы амебиаза{

~Нарушение дыхания и работы сердца
~Снижение аппетита и нарушение работы сердца
=Боли в животе, частый стул с примесью крови
~Боли в подреберье и нарушение дыхания
}

Патогенное действие дизентерийной амебы{

~Образование кровоточащих язв в стенке желудка и абсцессы печени
~Образование кровоточащих язв в стенке тонкого кишечника и поражение мышц сердца
=Образование кровоточащих язв в стенке толстого кишечника и обезвоживание
~Образование кровоточащих язв в стенке тонкого и толстого кишечника
}

Возбудителем кожного лейшманиоза является{

- ~Leishmania donovani
- =Leishmania tropica
- ~Leishmania brasiliensis
- ~Leishmania infantum
- }

Leishmania tropica в организме человека локализуется в клетках{

- ~Печени
- ~Лимфатических узлов
- =Кожи
- ~Стенки кишечника
- }

Возбудителем африканского трипаносомоза (сонной болезни) является{

- ~Trypanosoma cruzi
- =Trypanosoma brucei rhodesiense
- ~Toxoplasma gondii
- ~Leishmania brasiliensis
- }

Профилактика африканского трипаносомоза{

- ~Борьба с москитами
- =Борьба с мухами цеце
- ~Уничтожение бродячих собак
- ~Уничтожение грызунов
- }

Возбудителем урогенитального трихомониаза является{

- ~Trichomonas elongata
- ~Trichomonas hominis
- =Trichomonas vaginalis
- ~Trypanosoma cruzi
- }

К морфологическим особенностям трихомонад относится наличие{

- =4-5 Жгутиков, аксостилия, ундулирующей мембраны
- ~1 жгутика, 2-х ядер
- ~Двух ядер, ресничек, ундулирующей мембраны
- ~Ундулирующей мембраны и одного ядра
- }

Заражение при урогенитальном трихомонозе происходит{

- ~Через загрязненную пищу
- ~Через укус комара
- =Половым путем
- ~При питье воды
- }

Диагноз урогенитального трихомониаза ставится на основе микроскопирования{

- ~Фекалий
- =Нативных мазков из выделений влагалища, шейки матки
- ~Мазка из десневых карманов зубов

~Крови
}

Возбудителем лямблиоза является{
~Leishmania donovani
=Lamblia intestinalis
~Trichomonas vaginalis
~Trichomonas hominis
}

Паразитологический диагноз лямблиоза устанавливается путем микроскопирования мазков{
~Крови и фекалий
=Дуоденального содержимого и фекалий
~Крови и спинномозговой жидкости
~пунктат мышц
}

К профилактическим мероприятиям лямблиоза относится{
=Строгое соблюдение личной гигиены
~Предохранение от укусов москитами
~Термическая обработка рыбы и мяса
~Предохранение от укусов комарами
}

Для представителей класса Сосальщиков характерным является наличие{
=кожно-мускульного мешка
~полости тела
~дыхательной системы
~кровеносной системы
}

Для представителей класса Сосальщиков характерным является наличие{
~%50%кожно-мускульного мешка
~%-33.33333%полости тела
~%50%билатеральная симметрия
~%-33.33333%дыхательной системы
~%-33.33333%кровеносной системы
}

Сколько присосок у представителей класса Сосальщиков{
~1
=2
~3
~4
~6
}

Укажите, кто из перечисленных трематод паразитирует в желчных протоках печени{
~%50%фасциола
~%-33.33333%шистозома гематобиум
~%50%описторхис

~%-33.33333%парагонимус
~%-33.33333%шистозома мансони
}

Укажите, какие из перечисленных стадий в цикле развития фасциолы являются ивазионными для человека{

~мирацидий
~редия
=адолескарий
~церкарий
~метацеркарий
}

Укажите, каковы пути проникновения возбудителя дикроцелиоза в организм человека{

~при питье сырой воды
~при употреблении в пищу невымытых овощей, зелени
~при употреблении в пищу плохо переваренной и прожаренной рыбы
=при случайном проглатывании муравьев, проникших в продукты питания
~при употреблении в пищу плохо проваренных раков, крабов
}

Сколько стадий в цикле развития печеночного сосальщика{

~3
~5
=7
~9
~8
}

Сколько стадий в цикле развития ланцетовидного сосальщика{

~2
~4
~6
=7
~10
}

Какие из перечисленных представителей относятся к классу Ленточные черви{

~%-33.33333%печеночный сосальщик
~%50%бычий цепень
~%50%лентец широкий
~%-33.33333%сибирский сосальщик
~%-33.33333%аскарида человеческая
}

Укажите, какие из перечисленных признаков характерны для цестод{

~%-33.33333%листовидное тело
~%-33.33333%ланцетовидное тело
~%-33.33333%наличие ротовой и брюшной присосок
~%50%лентовидное тело
~%50%наличие сколекса

}

Укажите, какая финна характерна для свиного цепня{

~плероцеркоид

~ценур

=цистицерк

~цистицеркоид

~эхинококк

}

Какая из перечисленных локализаций характерна для бычьего цепня{

~толстый кишечник

~желчные протоки

~мочевой пузырь

=тонкий кишечник

~12-перстная кишка

}

В чем состоит отличие гермафродитного членика свиного и бычьего цепней{

~в количестве семенников

~в количестве желточников

=в количестве долей яичников

~в количестве ветвей матки

~в форме члеников

}

Назовите окончательного хозяина вооруженного цепня{

~собака

~свинья

~кошка

=человек

~крыса

}

Какая личиночная стадия бычьего цепня является инвазионной для промежуточного хозяина{

~яйцо

=онкосфера

~финна

~церкарий

~проглоттида

}

Назовите заболевание, которое вызывает личинка свиного цепня{

~тениаринхоз

~парагонимоз

=цистицеркоз

~тениоз

~альвеококкоз

}

Какой гельминт и у кого вызывает заболевание тениаринхоз{

~Taenia solium, человек окончательный хозяин
=Taeniarhynchus saginatus, человек окончательный хозяин
~Ascaris lumbricoides, человек единственный хозяин
~Opisthorchis felinus, человек окончательный хозяин
~Enterobius vermicularis, человек единственный хозяин
}

Какие из названных размеров характерны для половозрелой формы эхинококка{
~10м
=2-4мм
~4-6см
~2м
~2м
}

Укажите, какое количество члеников характерно для карликового цепня{
~3-4
~до1000
~несколько сот тысяч
=200 и больше
~100
}

Какие из перечисленных личиночных стадий характерны для эхинококка{
~спороциста
=онкосфера
~цистицерк
~мирацидий
~метацеркарий
}

Какая локализация чаще характерна для эхинококка в теле человека{
~%-33.33333%толстый кишечник
~%-33.333330%тонкий кишечник
~%-33.33333%12-перстная кишка
~%50%печень
~%50%легкие
}

Укажите меры профилактики при альвеококкозе{
=соблюдение правил личной гигиены
~мытьё овощей перед употреблением
~термическая обработка мяса
~не ходить босиком по земле
~не употреблять мясо свиней
}

Каким путем человек заражается альвеококкозом{
~%-33.33333%употребляя в пищу печень крупного рогатого скота
~%50%при общении с собакой
~%50%при снятии шкурок с диких животных
~%-33.33333%трансмиссивно

~%-33.33333%употребляя мясо свиней
}

Что такое аутоинвазия при гименолепидозе{

~заражение через кожу
~заражение с пищей
=заражение без выхода яиц из кишечника во внешнюю среду
~заражение при случайном проглатывании муравьев
~больной человек повторно заражается
}

Для представителей класса Собственно круглые черви присущи{

~%50%кожно-мускульный мешок
~%50%первичная полость тела
~%-33.33333%дыхательная система
~%-33.33333%кровеносная система
~%-33.33333%радиальная симметрия
}

Какое значение имеет полостная жидкость нематод{

~%50%гидроскелет
~%-33.33333%сократительная функция
~%-33.33333%пищеварительная функция
~%-33.33333%защитная функция
~%50%создание тургора
}

Каким путем человек заражается аскаридозом{

~%50%через грязные руки
~%-33.33333%половым путем
~%-33.33333%через плохо прожаренное мясо
~%50%через немытые овощи и фрукты
~%-33.33333%через кожу
}

Назовите органы, через которые мигрируют личинки аскариды{

~%-33.33333%мозг
~%-33.33333%поджелудочная железа
~%50%печень
~%-33.33333%селезенка
~%50%легкие
}

Где откладывает яйца аскарида{

=в кишечнике
~на коже
~на нательном белье
~в почве
~в легких
}

Что такое феномен миграции аскарид{

- ~проникновение в организм хозяина взрослой аскариды
- ~переход из кишечника в кровь взрослой аскариды
- =передвижение личинки через определенные органы и системы хозяина
- ~выход из организма во внешнюю среду аскарид и их личинок
- ~спаривание аскарид и совместное передвижение их по органам и системам организма человека

}

Через какое время яйцо острицы становится инвазионным{

- =4-6 ч.
- ~1-2 дня
- ~2-3 нед.
- ~месяц
- ~год

}

Где откладывает яйца острица{

- ~в почве
- =на коже промежности
- ~в постели
- ~в воде
- ~в кишечнике

}

Через какое время при благоприятных условиях яйцо аскариды становится инвазионным{

- ~1 час
- ~6 часов
- =17-20 суток
- ~30 суток
- ~60 суток

}

Назовите отличие самцов Круглых червей от самок{

- ~%50%меньшие размеры тела
- ~%-33.33333%большие размеры тела
- ~%-33.33333%передний конец тела загнут на брюшную сторону
- ~%50%задний конец тела загнут на брюшную сторону
- ~%-33.33333%степень окраски тела

}

Каким путем человек заражается трихинеллезом{

- ~через грязные руки
- =через мясо
- ~через рыбу
- ~через овощи и фрукты
- ~через кожу

}

Перечислите меры личной профилактики при анкилостомозе{

- ~не пить сырую воду
- ~не употреблять плохо прожаренное мясо

- ~мыть руки
- =не ходить босиком
- ~не гладить собак

}

Какой гельминт имеет в своем жизненном цикле свободноживущее поколение{

- ~власоглав
- ~анкилостома
- ~трихинелла
- =кишечная угрица
- ~ришта

}

Что происходит с личинками трихинеллы, попавшими в пищеварительный тракт человека с зараженным мясом{

- =превращаются в половозрелые формы
- ~проникает в кровь
- ~выносятся с фекалиями
- ~мигрируют в печень
- ~погибают

}

Каким образом человек заражается анкилостомозом{

- ~через сырую воду
- ~через грязные руки
- =через кожу
- ~через плохо прожаренное мясо
- ~при контакте с больным человеком

}

Укажите, каким из перечисленных лабораторных методов можно диагностировать описторхоз{

- ~%-33.33333%анализом мочи
- ~%50%копроанализом
- ~%-33.33333%анализом мокроты
- ~%-33.33333%анализом слюны
- ~%50%анализом дуоденального содержимого

}

Укажите, кто из названных нематод питается кровью{

- ~%50%власоглав
- ~%-33.33333%острица
- ~%-33.33333%ришта
- ~%50%некатор
- ~%-33.33333%кошачий сосальщик

}

Укажите, где локализуется ришта в организме человека{

- ~в толстом кишечнике
- ~в сердце
- =в подкожной клетчатке
- ~в мышцах

~в желчном пузыре

}

Укажите, как чаще заражается человек кишечной угрицей{

~с водой

~с немытыми овощами и фруктами

=при ходьбе босиком

~с мясом

~при поглаживании собак

}

В каких органах человека откладывает яйца кошачий сосальщик{

~в бронхах

~в кишечнике

=в желчных протоках

~в мочевом пузыре

~в перианальных складках

}

В каких органах человека откладывают яйца шистозомы{

~бронхах

~кишечнике

=кровеносных сосудах

~желчных протоках

~легких

}

Назовите гельминты, яйца которых можно обнаружить в фекалиях человека{

~%50%аскарида

~%-33.33333%острица

~%50%шистозомы

~%-33.33333%трихинелла

~%-33.33333%эхинококк

}

Назовите гельминты, яйца которых имеют крышечку для выхода личинки наружу{

~тенииды

=фасциола

~аскарида

~острица

~карликовый цепень

}

Каким образом яйца шистозомы попадают в полость мочевого пузыря{

~%50%прокалывает стенку кровеносного сосуда с помощью шипа

~%50%растворяет с помощью активных ферментов стенку сосудов мочевого пузыря

~%-33.33333%мигрирует по кровеносному руслу

~%-33.33333%проходит по мочеточнику

~%-33.33333%через легочную ткань

}

В каких органах и тканях человека откладывает яйца F. hepatica{

=в желчных протоках

~в кишечнике
~на коже
~в бронхах
~в венах
}

Какие виды гельминтов живородящи{

~%-33.33333%печеночный сосальщик
~%-33.33333%острица
~%50%ришта
~%50%трихинелла
~%-33.33333%карликовый цепень
}

В чем сущность метода флотации{

~фекалии разводят раствором хлорида натрия
~фекалии разводят раствором азотно-кислотного натрия
=яйца некоторых гельминтов концентрируются в поверхностной пленке
~яйца концентрируются в осадке
~яйца центрифугируются
}

Контактно-передаваемые гельминты{

~%-33.33333%аскарида
~%-33.33333%бычий цепень
~%50%карликовый цепень
~%-33.33333%легочный сосальщик
~%50%острица
}

Гельминтозы, которые связаны с употреблением недостаточно термически обработанного мяса{

~%-33,33333%трихоцефалез
~%-33,33333%гименолепидоз
%50%трихинеллез
~%-33,33333%альвеококкоз
%50%тениоз
}

Человек является промежуточным и окончательным хозяином для{

~аскариды
~лентеца широкого
~угрицы кишечной
=трихинеллы
~эхинококка
}

По особенностям строения яйца можно поставить диагноз{

~%-33.33333%трихинеллеза
~%-33.33333%дракункулеза
~%50%энтеробиоза
~%50%шистосомоза
~%-33.33333%тениоза
}

В жизненном цикле смена хозяев происходит у{

~%33,33333% альвеококка
~%-50% власоглава
~%33,33333% легочного сосальщика
~%-50% острицы
~%33,33333% ришты
}

Гельминтозы человека, связанные с употреблением рыбы{

~%-33.33333% парагонимоз
~%50% дифиллоботриоз
~%50% описторхоз
~%-33.33333% эхинококкоз
~%-33.33333% дракункулез
}

Окончательным хозяином человек (только) является для{

~%-33.33333% эхинококка
~%-33.33333% альвеококка
~%50% бычьего цепня
~%-33.33333% карликового цепня
~%50% кошачьего сосальщика
}

Систематическое положение *TRICHINELLA SPIRALIS*{

~%-33.33333% тип Protozoa
~%50% тип Nematelminthes
~%50% класс Nematoda
~%-33.33333% класс Cestoidea
~%-33.33333% класс Trematodes
}

Систематическое положение *Opisthorchis felineus*{

~%-33.33333% тип Protozoa
~%-33.33333% тип Nematelminthes
~%50% тип Plathelminthes
~%-33.33333% класс Cestoda
~%50% класс Trematoda
}

Раздельнополые гельминты{

~%-33.33333% кошачий сосальщик
~%-33.33333% печеночный сосальщик
~%50% кровяной сосальщик
~%50% ришта
~%-33.33333% свиной цепень
}

Условия созревания яиц аскариды{

~%-33.33333% вода
~%50% почва
~%-33.33333% промежуточные хозяева

~%-33.33333%свет
~%50%температура воздуха 20-25⁰C
}

Адолескарий – личиночная стадия у{

~ Schistosoma haematobium
~ Opisthorchis felinus
~ Paragonimus westermani
~ Schistosoma mansoni
=Fasciola hepatica
}

Яйцо имеет шипик у{

~%50%Schistosoma Mansoni
~%-33.33333%Opisthorchis felinus
~%-33.33333%Dicrocoelium lanceatum
~%-33.33333%Paragonimus westermani
~%50%Schistosoma haematobium
}

Стадия развития сосальщика, внедряющаяся в тело моллюска{

~адолескарий
=мирацидий
~редия
~церкарий
~спороциста
}

Способ инвазии человека кошачьим сосальщиком{

=алиментарный
~перкутанный
~воздушно-капельный
~несоблюдение правил личной гигиены
~трансмиссивный
}

Трансмиссивный нематодоз{

=филяриоз
~аскаридоз
~энтеробиоз
~трихоцефалез
~некатороз
}

Продолжительность жизни половозрелой острицы{

=1 месяц
~6 месяцев
~1 год
~5 лет
~20 лет
}

Полупрозрачное, бесцветное, ассиметричное яйцо характерно для{

~аскариды
~власоглава
~некатора
~трихинеллы
=острицы
}

Алиментарно в организм человека могут попасть инвазионные стадии{

~%-33.33333%Fasciola hepatica
~%50%Opisthorchis felinus
~%50%Paragonimus westermani
~%-33.33333%Schistosoma japonicum
~%-33.33333%Schistosoma mansoni
}

Дополнительный хозяин отсутствует у{

~%-33.33333%кошачьего сосальщика
~%50%кровяного сосальщика
~%-33.33333%легочного сосальщика
~%50%печеночного сосальщика
~%-33.33333%лентеца широкого
}

В природном очаге эхинококкоза окончательным хозяином является{

~белка
=волк
~овца
~человек
~лось
}

Способ инвазии человека легочным сосальщиком{

=алиментарный
~аутореинвазия
~воздушно – капельный
~несоблюдение правил личной гигиены
~трансмиссивный
}

Пищеварительная система трематод{

~%33.33333%анальное отверстие отсутствует
~%-50%имеет анальное отверстие
~%33.33333%имеет передний и средний отделы кишки
~%-50%имеет передний, средний и задний отделы кишки
~%33.33333%отсутствует задний отдел кишки
}

Промежуточный и дополнительный хозяин легочного сосальщика{

~грызуны, человек, моллюски
~крупный рогатый скот, раки, раки, крабы
=моллюски, раки, крабы

~моллюски, хищные рыбы
~плотоядные животные, человек
}

Окончательные хозяева кошачьего сосальщика:

~%-33.33333%крупный рогатый скот
~%-33.33333%моллюски, рыбы
~%50%плотоядные дикие животные
~%-33.33333%рыбы, раки
~%50%собака, человек
}

Способ инвазии человека ланцетовидным сосальщиком{

=случайное проглатывание муравьев
~активное внедрение церкарий через кожу
~аутореинвазия
~через воду или овощи, помытые некипячёной водой
}

Стадии развития трематод в печени моллюска{

~%-33.33333%адолескарий
~%50%спороциста
~%-33.33333%мирацидий
~%-33.33333%метацеркарий
~%50%редия
}

Локализация японского шистосомоза в организме человека{

~желчные протоки печени, желчный пузырь
~вены мочеполовых органов
~бронхи, легкие
=вены кишечника и брыжейки
~протоки поджелудочной железы
}

При диагностике парагонимоза яйца обнаруживаются{

~в моче (яйца без крышечки, с шипом)
~в фекалиях (яйца без крышечки, с шипом)
=в мокроте и фекалиях (яйца овальные с крышечкой)
~в фекалиях (яйца овальные с крышечкой)
~в дуоденальном содержимом
}

Профилактика фасциолёза{

~%-33.33333%термическая обработка говядины
~%50%обеззараживание воды
~%-33.33333%термическая обработка раков и крабов
~%50%избегать купания в очагах инвазии
~%-33.33333%термическая обработка рыбы
}

Условия для развития яиц сосальщиков{

~кислород, влажность, почва
=кислород, вода, оптимальная температура
~кислород, оптимальная температура, почва
~нет правильного ответа
~оптимальная температура, влажность
}

Природно – очаговое заболевание{
~%-33.33333%фасциоз
~%-33.33333%тениаринхоз
~%50%описторхоз
~%50%урогенитальный шистосомоз
~%-33.33333%гименолепидоз
}

Финна невооружённого цепня{
~плероцеркоид
~ценур
~эхинококк
~цистицеркоид
=цистицерк
}

Инвазионная стадия лентеца широкого для человека{
~цистицерк
~эхинококк
~цистицеркоид
=плероцеркоид
~яйцо с онкосферой
}

Способ инвазии человека тениозом{
~алиментарный: недостаточно прожаренная рыба
~алиментарный: недоваренное говяжье мясо
=алиментарный: недоваренное свиное мясо
~несоблюдение правил личной гигиены
~активное внедрение паразита
}

Инвазионная стадия эхинококка для человека{
~плероцеркоид
~цистицеркоид
=яйцо с онкосферой
~финна - эхинококк
~свободноживущая личинка
}

Дополнительный хозяин лентеца широкого{
~грызуны
~крупный рогатый скот
~лисица, песец, волк
=рыбы

~человек, плотоядные животные
}

Промежуточным хозяином невооружённого цепня являются: {

~грызуны, человек
~свинья, человек
~рыбы, моллюски
=крупный рогатый скот
~собака, волк
}

Матка в зрелом членике имеет от 17-35 боковых ветвей у: {

~альвеококка
=бычьего цепня
~карликового цепня
~лентеца широко
~свиного цепня
}

Гельминт, вызывающий цистицеркоз мозга у человека: {

~эхинококк
~бычий цепень
~лентец широкий
~карликовый цепень
=свиной цепень
}

Инвазионная стадия трихинеллы для человека: {

~инвазионное яйцо
=инкапсулированная личинка
`микрофилярия
~рабдитовидная личинка
~филяриевидная личинка
}

Какие особенности имеет поперечно-полосатая мускулатура: {

~%-33.33333%сокращается медленнее, чем гладкая
~%50%сокращается быстрее, чем гладкая
~%50%сила сокращения больше
~%-33.33333%сила сокращения меньше
~%-33.33333%обеспечивает медленное движение
}

Сколько всего конечностей у хелицероносных:{

=6 пар
~2 пары
~4 пары
~3 пары
~16 пар
}

Какое медицинское значение имеют клещи: {

~%-33.33333% являются переносчиками цестодозов
~%50%переносчики вирусной и спирохетной инфекции
~%-33.33333%являются переносчиками аскаридоза
~%50%являются возбудителями заболеваний
~%-33.33333%являются промежуточными и окончательными хозяевами
}

Какие заболевания называются трансмиссивными: {

~вызывающиеся гельминтами
~передающиеся через промежуточного хозяина
~передающиеся через окончательного хозяина
=передающиеся через переносчика
~передающиеся воздушно-капельным способом
}

Какие заболевания называются природно-очаговыми: {

~очаги инфекции, переносимые от человека к человеку
~очаги инфекции, переносимые от человека к животным
~очаги заболеваний, существующие в природных условиях независимо от человека и животных
=независимые от человека природные очаги заболеваний, поддерживаемых резервуарным хозяином и воспринимающим возбудителя болезни хозяином
~очаги, поддерживаемые в природных условиях благодаря наличию переносчика
}

Какие заболевания называются облигатно-трансмиссивными: {

=передающиеся только через переносчика
~передающиеся как через переносчика, так и другими путями
~переносчик не принимает участия
~передающиеся через воду и грязные руки
~вызывающиеся представителем из членистоногих
}

Дыхание у членистоногих: {

~%-33.33333%кожное
~%50%жаберное
~%50%легочное
~%-33.33333%тканевое
~%-33.33333%кожно-жаберное
}

Место обитания поселкового клеща: {

~%-33.33333%тайга
~%-33.33333%степь
~%50%глинобитные дома
~%-33.33333%водоемы
~%50%норы птиц
}

Органы выделения поселкового клеща: {

~протонефридии
~почки

~метанефридии
~нефридии
=мальпигиевы сосуды
}

Особенности природно-очаговых заболеваний: {

=наличие резервуарного хозяина переносчика, возбудителя и воспринимającego хозяина
~наличие возбудителя, главного и промежуточного хозяев
~наличие возбудителя, переносчика, первого промежуточного хозяина
~возбудитель-человек-хищные
~возбудитель - окончательный хозяин - человек
}

Переносчиком, какого облигатного трансмиссивного заболевания является таежный клещ: {

~клещевого возвратного тифа
~клещевого сыпного тифа
~туляремия,
~чесотка
=энцефалит весенне-летний
}

Переносчиком, какого облигатного трансмиссивного заболевания является клещ дермоцентр: {

~%-33.33333%клещевого возвратного тифа
~%50%клещевого сыпного тифа
~%50%туляремия
~%-33.33333%чесотка
~%-33.33333%лейшманиоз
}

Переносчиком, какого облигатного трансмиссивного заболевания является собачий клещ: {

~клещевого возвратного тифа
~клещевого сыпного тифа
~туляремия, лептоспирозы
~чесотка
=энцефалит весенне-летний
}

Возбудителем какого облигатного трансмиссивного заболевания является Ascaris siro: {

~клещевого возвратного тифа
~клещевого сыпного тифа
~туляремия, лептоспирозы
=чесотка
~энцефалит весенне-летний
}

У каких членистоногих наблюдается трансовариальная и трансфазная передача и что это такое: {

~у тараканов, передача через имаго

- ~у скорпиона, передача через яйца-личинки
- ~у пауков, передача через яйцо-личинки-имаго
- ~у чесоточного зудня, передача - личинка - имаго
- =у клещей, передача через яйцо - потомству, по фазам развития

}

Чем питаются и как передается заболевание клещами: {

- ~%-33.33333%содержимым кишечника и вызывает заболевание кишечника
- ~%-33.33333%тканями организма и повреждение их вызывает заболевание
- ~%-33.33333%кровью и вызывают малокровие
- ~%50%кровью и передаются возбудители заболевания при укусе
- ~%50%тканями и межклеточной жидкостью, повреждая ткани, проделывают ходы, вызывают заболевания

}

Какие отделы тела имеют насекомые: {

- ~головогрудь и брюшко
- =голова, грудь и брюшко
- ~головогрудь и переднебрюшье, заднебрюшье
- ~нерасчленённое
- ~голова, грудобрюшко

}

Площицы паразитируют: {

- = На волосах лобка, в бровях, усах, бороде, на волосах в подмышечных впадинах
- ~В швах одежды
- ~В волосистой части головы
- ~Под ногтями
- ~Под кожей

}

В кровяное русло человека возбудитель сыпного тифа попадает через:{

- ~Слюну комара
- =Повреждения кожи при попадании гемолимфы или фекалий вшей на месте укуса
- ~Слюну вшей при укусе
- ~Через грязные руки
- ~Через воду

}

Самки клопа постельного откладывают яйца: {

- ~На теле человека
- =В щелях, под обоями, в мебели, в книгах и т.д.
- ~В почве
- ~На одежде человека
- ~На волосистой части головы

}