

Скелетная ткань эластическая хрящевая локализуется в: {

- ~межпозвоночных дисках
 - ~местах прикрепления сухожилий к костям
 - ~хрящевых частях ребер
 - ~трубчатых костях
 - =ушной раковине
- }

Скелетная ткань волокнистая хрящевая локализуется в: {

- =%50%межпозвоночных дисках
 - =%50%местах прикрепления сухожилий к костям
 - ~%33.33333%хрящевых частях ребер
 - ~%33.33333%трубчатых костях
 - ~%33.33333%ушной раковине
- }

При условии недостатка витамина С наступают изменения в костной ткани: {

- ~повышается деятельность остеокластов
 - ~снижается кальцификация, что приводит к размягчению костей
 - =подавляется образование коллагеновых волокон
 - ~наблюдается резорбция кости
 - ~возрастает кальцификация
- }

При условии дефицита витамина Д наступают изменения в костной ткани: {

- ~повышается деятельность остеокластов
 - =снижается кальцификация, что приводит к размягчению костей
 - ~подавляется образование коллагеновых волокон
 - ~наблюдается резорбция кости
 - ~возрастает кальцификация
- }

При условии избытка паратиринна наступают изменения в костной ткани: {

- =%50%повышается деятельность остеокластов
 - ~%33.33333%снижается кальцификация, что приводит к размягчению костей
 - ~%33.33333%подавляется образование коллагеновых волокон
 - =%50%наблюдается резорбция кости
 - ~%33.33333%возрастает кальцификация
- }

При условии избытка тирокальцитонина наступают изменения в костной ткани: {

- ~повышается деятельность остеокластов
 - ~снижается кальцификация, что приводит к размягчению костей
 - ~подавляется образование коллагеновых волокон
 - ~наблюдается резорбция кости
 - =возрастает кальцификация
- }

Клетки остеобласты, их ультраструктурные признаки: {

- =хорошо развита гранулярная ЭПС
 - ~в цитоплазме много вакуолей и лизосом
 - ~много десмосом
 - ~имеют реснички
 - ~органеллы слабо развиты
- }

Клетки остеокласты их ультраструктурные признаки: {

- ~хорошо развита гранулярная ЭПС
 - =в цитоплазме много вакуолей и лизосом
 - ~много десмосом
 - ~имеют реснички
 - ~органеллы развиты слабо
- }

Клетки скелетных тканей хондробласты их локализация: {

- ~красный костный мозг
 - =надхрящница
 - ~костные лакуны
 - ~периваскулярные пространства каналов остеонов
 - ~изогенные группы
- }

Клетки скелетных тканей хондроциты их локализация: {

- ~красный костный мозг
- ~надхрящница
- ~костные лакуны
- ~периваскулярные пространства каналов остеонов

=изогенные группы

}

Клетки скелетных тканей остециты их функциональные особенности: {

=поддерживают гомеостаз костной ткани

~разрушают обызвествленный хрящ и кость

~обеспечивают интерстициальный рост хряща

~обеспечивают аппозиционный рост хряща

~образуют коллагеновые волокна

}

Клетки скелетных тканей остеобласты их функциональные особенности: {

~поддерживают гомеостаз костной ткани

~разрушают обызвествленный хрящ и кость

~обеспечивают интерстициальный рост хряща

~обеспечивают аппозиционный рост хряща

=образуют коллагеновые волокна

}

Клетки скелетных тканей остеокласты их функциональные особенности: {

~поддерживают гомеостаз костной ткани

=разрушают обызвествленный хрящ и кость

~обеспечивают интерстициальный рост хряща

~обеспечивают аппозиционный рост хряща

~образуют коллагеновые волокна

}

Клетки скелетных тканей хондробласты их функциональные особенности: {

~%33.33333%поддерживают гомеостаз костной ткани

~%33.33333%разрушают обызвествленный хрящ и кость

~%33.33333%обеспечивают интерстициальный рост хряща

=%50%обеспечивают аппозиционный рост хряща

=%50%образуют коллагеновые волокна

}

Клетки скелетных тканей хондроциты их функциональные особенности: {

~поддерживают гомеостаз костной ткани

~разрушают обызвествленный хрящ и кость

=обеспечивают интерстициальный рост хряща

- ~обеспечивают аппозиционный рост хряща
- ~образуют коллагеновые волокна

}

Надхрящница имеет слои: {

- ~%33.33333%надсосудистый
- ~%33.33333%сосудистый
- =%50%волокнистый
- ~%33.33333%остеогенный
- =%50%хондрогенный

}

Волокнистый слой надхрящницы по строению: {

- ~РСТ
- =плотная соединительная ткань
- ~ретикулярная ткань
- ~лимфоидная ткань
- ~миелоидная ткань

}

Для хондробластов характерно: {

- ~%33.33333%цитоплазма оксифильна
- =%50%базофильная цитоплазма
- =%50%хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть
- ~%33.33333%слабо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть
- ~%33.33333%хорошо развитая агранулярная эндоплазматическая сеть

}

Для зоны зрелого хряща характерно: {

- ~%33.33333%клетки располагаются в одиночку
- =%50%группами располагаются клетки
- =%50%в межклеточном веществе много коллагеновых волокон
- ~%33.33333%эластических волокон много в межклеточном веществе
- ~%33.33333%в межклеточном веществе много гиалуроновой кислоты

}

Для эластического хряща характерно: {

- ~%33.33333%клетки располагаются в одиночку
- =%50%клетки в виде столбиков

~%33.33333%в межклеточном веществе много коллагеновых волокон
=%50%эластических волокон много
~%33.33333%мало эластических волокон
}

Для костной ткани характерно: {
~%33.33333%рыхло расположенные волокна
=%50%межклеточное вещество плотное
~%33.33333%межклеточное вещество полужидкое
~%33.33333%в межклеточном веществе много белков
=%50%много солей
}

Для остеоцитов характерно: {
~%33.33333%форма округлая
=%50%отростчатая
=%50%цитоплазма базофильная
~%33.33333%оксифильная
~%33.33333%в цитоплазме много лизосом
}

Для остеокластов характерно: {
~%33.33333%форма кубическая
~%33.33333%клетки имеют одно ядро
=%50%много ядер
=%50%в цитоплазме много лизосом
~%33.33333%мало лизосом
}

Остеокласты выполняют функцию: {
~защитную
~секреторную
~продукции компонентов межклеточного вещества
=разрушения компонентов межклеточного вещества
~всасывательную
}

Остеоциты выполняют функцию: {
~защитную

- ~опорную
- ~выделительную
- =поддержания межклеточного вещества
- ~разрушения межклеточного вещества
- }

Остеобласты выполняют функцию: {

- ~защитную
- ~опорную
- ~разграничительную
- =образования компонентов межклеточного вещества
- ~разрушения компонентов межклеточного вещества
- }

В межклеточном веществе костной ткани имеются волокна: {

- =коллагеновые
- ~эластические
- ~ретикулярные
- ~смесь коллагеновых и эластических
- ~смесь коллагеновых и ретикулярных
- }

Неорганическая часть межклеточного вещества костной ткани содержит: {

- ~%33.33333%гликоген
- ~%33.33333%жиры
- ~%33.33333%углеводы
- =%50%гидроксиапатит
- =%50%ионы бикарбонатные
- }

Для пластинок костной ткани характерно: {

- =%50%мощные пучки коллагеновых волокон
- ~%33.33333%эластических волокон
- ~%33.33333%ретикулярных волокон
- =%50%пучки идут строго в одном направлении
- ~%33.33333%в разных направлениях
- }

Гиалиновый хрящ в организме взрослого человека можно встретить: {

- ~в ушной раковине

~в надгортаннике
=в незамкнутых кольцах фиброзно-хрящевой оболочки трахеи
~в межпозвоночных дисках
~на кончике носа
}

Питание хрящевой ткани осуществляется за счет: {

~сосудов в матриксе хряща
=сосудов волокнистого слоя надхрящницы
~хондрогенного слоя надхрящницы
~изогенных групп хондроцитов
~наличия лакун с канальцами
}

Развитие хрящевой ткани происходит из: {

=мезенхимы
~ретикулярной ткани
~островков окостенения
~плотной оформленной соединительной ткани
~надхрящницы
}

Эластический хрящ в организме человека располагается: {

=в ушной раковине
~в трахее и бронхах
~в межпозвоночных дисках
~в суставных поверхностях
~в хрящевых частях ребер
}

Волокнистый хрящ у человека встречается: {

~в трахее и бронхах
~в ушной раковине
~в надгортаннике
=в межпозвоночных дисках
~в хрящевых частях бедер
}

Остеоциты (костные клетки) образуются из: {

=остеобластов
~остеокластов
~фиброцитов
~лаброцитов
~адипоцитов
}

Компактное вещество трубчатой кости состоит из всех структур, кроме :{

~наружного слоя общих пластинок
~внутреннего слоя общих пластинок
~остеонов
~вставочных костных пластинок
=костно-мозговой полости
}

Рост сформированных трубчатых костей в ширину происходит за счет: {

~эпифизов
~диафиза
=периоста
~эндоста
~эпифизарных пластинок
}

Между остеонами располагаются :{

=вставочные костные пластинки
~пучки оссеиновых волокон
~остеоциты
~эндост
~прободающие каналы
}

Прямой остеогенез начинается с: {

~образования оссеомукоида
~образования костных балок
~развития периоста
=образования остеогенного островка
~ образования костных пластин.
}

Структурно-функциональная единица компактного вещества кости: {

=остеон

~костная пластинка

~коллагеновое волокно

~остеобласт

~остеоцит

}

Грубоволокнистую костную ткань у взрослого человека можно встретить: {

~в эпифизах трубчатых костей

=на месте черепных швов

~в межпозвоночных дисках

~на суставных поверхностях

~в диафизах трубчатых костей

}

Структурно-функциональная единица пластинчатой костной ткани: {

~остеон

~коллагеновое волокно

~остеоцит

~остеобласт

=костная пластинка

}

Классификация хрящевых тканей основана на: {

~особенностях строения клеток

~количестве клеток

~источниках развития

=особенностях организации межклеточного вещества

~локализации в организме

}

Рост костей в длину обеспечивается: {

~периостом

~эндостом

=эпифизарной пластинкой

~эпифизом

~диафизом

}