

В составе скелетных мышц имеются: {

~%33.33333%пучки гладкомышечных клеток

=%50%поперечно-полосатые мышечные волокна

~%33.33333%плотная неоформленная соединительная ткань

=%50%рыхлая соединительная ткань

~%33.33333%жировая ткань

}

В составе сарколеммы поперечнополосатого мышечного волокна имеются: {

~%33.33333%слой гладкомышечных клеток

~%33.33333%слой эпителиальных клеток

=%50%базальная мембрана

~%33.33333%пограничная мембрана

=%50%плазмолемма

}

Поперечную исчерченность миофибрилл обуславливает: {

~вставочные пластинки

~поперечно-ориентированные митохондрии

~складки сарколеммы

=диски А и И

~складки базальной мембраны

}

В составе миофибрилл различают протофибриллы: {

~%33.33333%гладкие

~%33.33333%шероховатые

=%50%тонкие

~%33.33333%промежуточные

=%50%толстые

}

Толстые протофибриллы в составе миофибрилл располагаются в: {

=дисках А

~дисках И

~полосках Z

~промежутках между дисками А и И

~промежутках между полосками Z и дисками А

}

Тонкие протофибриллы в составе миофибрилл располагаются в: {
~%33.33333%дисках А
=%50%дисках И
~%33.33333%полосках Z
=%50%зонах перекрытия
~%33.33333%зонах И
}

Z-полоски миофибрилл располагаются: {
~В зоне И
~на периферии дисков А
~между дисками А и И
~в средней части дисков А
=в средней части дисков И
}

Зоны-Н миофибрилл образуют: {
=только толстые протофибриллы
~только тонкие протофибриллы
~толстые и тонкие протофибриллы
~части толстых и тонких протофибрилл
~тонкие протофибриллы и полосы Z
}

В периферических участках дисков А располагаются: {
~только толстые протофибриллы
~только тонкие протофибриллы
=толстые и тонкие протофибриллы
~промежуточные
~тонкие и промежуточные
}

Концы тонких протофибрилл прикреплены: {
~%33.33333%к толстым протофибриллам
~%33.33333%к зоне Н
=%50%к полоске Z
=%50%располагаются в промежутках между толстыми
~%33.33333%располагаются в промежутках между зонами Н

}

Источником регенерации поперечно-полосатых мышечных волокон являются: {

~перициты

=клетки сателлиты

~стволовые клетки

~вставочные клетки

~клетки базального слоя

}

Клетки-сателлиты поперечно-полосатых мышечных волокон располагаются: {

=между плазмолеммой и базальной мембраной

~между базальной мембраной и слоем волокон

~между плазмолеммой и слоем волокон

~между двумя листками базальной мембраны

~между двумя листками плазмолеммы

}

Атипичные сердечные мышечные клетки имеют особенности: {

~%33.33333%много миофибрилл

=%50%мало миофибрилл

=%50%много гранул гликогена

~%33.33333%мало гранул гликогена

~%33.33333%мало митохондрий

}

Гладкая мышечная ткань отличается от поперечнополосатой скелетной мышечной ткани по всем признакам, кроме: {

~происхождения

~иннервации

~наличия нексусов

~наличия прилепительных и плотных телец

=наличия сократительных миофиламентов

}

Сердечная мышечная ткань проявляет сходство со скелетной мышечной тканью по всем признакам, кроме: {

- ~наличие прослоек РСТ между пучками
- ~обильной васкуляризации
- ~поперечнополосатой исчерченности
- =клеточного строения
- ~оксифилии саркоплазмы

}

Саркомером называют участок миофибрилла между: {

- ~мезофрагмами
- ~Н-полосками
- =Z-полосками
- ~И-дисками
- ~А-дисками

}

Скелетная мышечная ткань развивается из: {

- ~висцерального листка мезодермы
- =миотомов сомитов
- ~мезенхимы
- ~нейроглии
- ~эктодермы

}

Гладкая мышечная ткань внутренних органов развиваются из: {

- ~висцерального листка мезодермы
- ~миотомов сомитов
- =мезенхимы
- ~нейроглии
- ~эктодермы

}

Сердечная мышечная ткань развивается из: {

- =висцерального листка мезодермы
- ~миотомов сомитов
- ~мезенхимы
- ~нейроглии
- ~эктодермы

}

Миоэпителиальные клетки некоторых желез развиваются из: {
~висцерального листка мезодермы
~миотомов сомитов
~мезенхимы
~нейроглии
=эктодермы
}

Гладкие мышечные клетки радужки развиваются из: {
~висцерального листка мезодермы
~миотомов сомитов
~мезенхимы
=нейроэктодермы
~эктодермы
}

Движения изменение размера зрачка осуществляется: {
~гладкими миоцитами мезенхимного происхождения
~миоэпителиальными клетками
=гладкими миоцитами нейрального происхождения
~поперечнополосатыми мышечными клетками
~поперечнополосатыми мышечными волокнами
}

Движения сокращения сердца осуществляется: {
~гладкими миоцитами мезенхимного происхождения
~миоэпителиальными клетками
~гладкими миоцитами нейрального происхождения
=поперечнополосатыми мышечными клетками
~поперечнополосатыми мышечными волокнами
}

Движения слюноотделение осуществляется: {
~гладкими миоцитами мезенхимного происхождения
=миоэпителиальными клетками
~гладкими миоцитами нейрального происхождения
~поперечнополосатыми мышечными клетками
~поперечнополосатыми мышечными волокнами
}

Движения сокращения матки осуществляется: {
=гладкими миоцитами мезенхимного происхождения
~миоэпителиальными клетками
~гладкими миоцитами нейрального происхождения
~поперечнополосатыми мышечными клетками
~поперечнополосатыми мышечными волокнами
}

Движения перистальтика кишечника осуществляются: {
=гладкими миоцитами мезенхимного происхождения
~миоэпителиальными клетками
~поперечнополосатыми мышечными клетками
~поперечнополосатыми мышечными волокнами
~гладкими миоцитами эктодермального происхождения
}

Движения изменение просвета сосудов осуществляются: {
=гладкими миоцитами мезенхимного происхождения
~миоэпителиальными клетками
~поперечнополосатыми мышечными клетками
~поперечнополосатыми мышечными волокнами
~гладкими миоцитами эктодермального происхождения
}

Движения изменение просвета бронхов осуществляются: {
=гладкими миоцитами мезенхимного происхождения
~миоэпителиальными клетками
~поперечнополосатыми мышечными клетками
~поперечнополосатыми мышечными волокнами
~гладкими миоцитами эктодермального происхождения
}

Движения тела осуществляются: {
~гладкими миоцитами мезенхимного происхождения
~миоэпителиальными клетками
~гладкими миоцитами эктодермального происхождения
~поперечнополосатыми мышечными клетками
=поперечнополосатыми мышечными волокнами

}

Движения лактации осуществляются: {

~гладкими миоцитами мезенхимного происхождения

=миоэпителиальными клетками

~гладкими миоцитами эктодермального происхождения

~поперечнополосатыми мышечными клетками

~поперечнополосатыми мышечными волокнам

}

Клетки исчерченные миоциты локализуются в: {

~скелетной мышечной ткани

=сердечной мышечной ткани

~мышечной ткани внутренних органов

~эктодермальных железах

~мышцах радужной оболочки глаза

}

Клетки миоциты нейрального происхождения локализуются в: {

~скелетной мышечной ткани

~сердечной мышечной ткани

~мышечной ткани внутренних органов

~эктодермальных железах

=мышцах радужной оболочки глаза

}

Клетки миоэпителиальные локализуются в: {

~скелетной мышечной ткани

~сердечной мышечной ткани

~мышечной ткани внутренних органов

=эктодермальных железах

~мышцах радужной оболочки глаза

}

Клетки мышечное волокно локализуются в: {

~скелетной мышечной ткани

=сердечной мышечной ткани

~мышечной ткани внутренних органов

~эктодермальных железах

~мышцах радужной оболочки глаза
}

Основным морфофункциональным свойством гладкой мышечной ткани является: {

~разнообразие клеточных форм
~хорошо развитое межклеточное вещество
=способность к длительному (тоническому) сокращению
~наличие клеток-сателлитов
~способность осуществлять обменные реакции и поддерживать гомеостаз
}

Сердечная мышечная ткань проявляет сходство со скелетной мышечной тканью по всем признакам, кроме: {

~наличия соединительнотканых прослоек между пучками
~обильной васкуляризации
~поперечнополосатой исчерченности
=клеточного строения
~оксифилии саркоплазмы
}

Для поперечнополосатой скелетной мышечной ткани характерны все признаки, кроме: {

=клеточного строения
~происхождения из клеток миотомов
~наличия специальных органелл – миофибрилл
~наличия в миосимпласте значительного количества ядер
~наличия клеток саттелитов
}

Между мышечными волокнами находятся прослойки: {

~плотной волокнистой соединительной ткани
~жировой ткани
~ретикулярной ткани
=рыхлой волокнистой соединительной ткани
~плотной неоформленной соединительной ткани
}

Миоэпителиальные клетки участвуют: {

- ~в регенерации мышечной ткани
- =в выделении секрета из секреторных отделов железа
- ~в формировании миофибрилл
- ~в деполяризации плазматической мембраны
- ~в депонировании ионов кальция

}

В состав миофибрилл не входят: {

- ~активные миофиламенты
- ~миозиновые миофиламенты
- ~Z-линии
- =вставочные диски
- ~M-линии

}

Основным структурным элементом скелетной мышечной ткани является: {

- =мышечное волокно
- ~миофибрилла
- ~гладкий миоцит
- ~миосателлитоцит
- ~саркомер

}

Сарколемма мышечного волокна образована: {

- =базальной мембраной, ретикулярными и коллагеновыми волокнами, плазмолеммой
- ~миосателлитоцитами и плазмолеммой
- ~миофибриллами
- ~вставочными дисками
- ~телофрагмами

}

Прослойки рыхлой соединительной ткани между отдельными мышечными волокнами называются: {

- ~эпимизий
- ~перимизий
- =эндомизий
- ~эндотоний
- ~эндоневрий

}

В состав саркомера входят :{

~вставочные диски

~триады

=один А диск и две половины I диска

~две актиновые и одна миозиновая нить

~телофрагма

}

Миофибриллы построены из: {

=упорядоченно расположенных нитей актина и миозина

~Т-трубочек

~вставочных дисков

~телофрагм

~терминальных цистерн гладкой ЭПС

}

Клетки в средней оболочке сосуда, имеющие веретеновидную форму с расположенным в центре ядром, называются: {

~кардиомиоциты

~миосателлитоциты

=гладкие миоциты

~миоэпителиальные клетки

~миосимпласт

}

Клетка звездчатой формы с отростками, охватывающими концевой отдел железы, называется: {

~миосателлитоцит

~мокротительный сердечный миоцит

~миосимпласт

=миоэпителиальная клетка

~гладкий миоцит

}

Волокна, имеющие мало миофибрилл, много саркоплазмы и миоглобина, с высокой активностью окислительных ферментов, называются: {

=красные мышечные волокна скелетной мышечной ткани

- ~белые мышечные волокна скелетной мышечной ткани
- ~промежуточные мышечные волокна скелетной мышечной ткани
- ~гладкие миоциты
- ~кардиомиоциты

}

В состав стенки желудка, кишки, мочевого пузыря входит: {

- ~поперечнополосатая скелетная мышечная ткань
- ~поперечнополосатая сердечная мышечная ткань
- =гладкая мышечная ткань
- ~миосателлитоциты
- ~миоэпителиальные клетки

}

При повреждении скелетной мышечной ткани ее регенерация будет осуществляться за счет деяния: {

- ~гладких миоцитов
- ~миобластов
- ~миоэпителиальных клеток
- =миосателлитоцитов
- ~мышечных трубочек

}

Для кардиомиоцита верно все, кроме: {

- ~цилиндрической формы клетки с разветвленными концами
- ~наличие одного или двух центрально расположенных ядер
- ~наличие мифоибрилл и в них толстых и тонких нитей
- ~наличие вставочных дисков
- =наличие многочисленных ядер

}

В процессе сокращения мышечного волокна происходит все, кроме: {

- ~деполяризации мембраны мышечного волокна
- ~связывания Са тропонином С
- ~разблокирования миозинсвязывающих участков актиновой нити, с последующим прикреплением к ней головок миозина
- ~скольжения тонких нитей, вызывающих смещение Z-линий, с последующим сокращением саркомера
- =регенерации мышечного волокна

