

Аксон нейрона это: {

~длинный отросток нейрона

~короткий отросток нейрона

~когда отросток, по которому нервные импульсы идут в ЦНС

=когда нервные импульсы идут от тела нейрона

~когда нервные импульсы идут к телу нейрона

}

Дендрит нейрона это: {

~длинный отросток нейрона

~короткий отросток нейрона

~когда отросток, по которому нервные импульсы идут в ЦНС

~когда нервные импульсы идут от тела нейрона

=когда нервные импульсы идут к телу нейрона

}

В стенке центрального спинномозгового канала имеется: {

=эпендимная глия

~астроцитная глия

~олигодендроглия

~мультипотенциальная глия

~микроглия

}

В составе серого вещества головного мозга имеются: {

~%33.33333%эпендимная глия

=%50%плазматические астроциты

~%33.33333%волокнистые астроциты

~%33.33333%олигодендроглия

=%50%мультипотенциальная глия

}

В составе белого вещества головного мозга имеются: {

~%33.33333%эпендимная глия

~%33.33333%плазматические астроциты

=%50%волокнистые астроциты

~%33.33333%олигодендроглия

=%50%мультипотенциальная глия

}

Тело и отростки нейронов окружают: {

~эпендимная глия

~плазматические астроциты

~волокнистые астроциты

=олигодендроциты

~микроглия

}

Эпендимные клетки имеют: {

~%33.33333%на апикальной части: микроворсинки

=%50%реснички

=%50%один отросток

~%33.33333%два отростка

~%33.33333%много отростков

}

У плазматических астроцитов отростки: {

~длинные, толстые, сильно ветвящиеся

~длинные, толстые, неветвящиеся

~длинные, тонкие, слабо ветвящиеся

~короткие, толстые, слабо ветвящиеся

=короткие, толстые, сильно ветвящиеся

}

У волокнистых астроцитов отростки: {

~длинные, толстые, сильно ветвящиеся

=длинные, тонкие, слабо ветвящиеся

~короткие, толстые, слабо ветвящиеся

~короткие, толстые, сильно ветвящиеся

~длинные, толстые, неветвящиеся

}

Эпендимоциты выполняют функции: {

~%33.33333%всасывательную

~%33.33333%опорную

=%50%синтеза компонентов спинномозговой жидкости

~%33.33333%трофическую

=%50%участия в циркуляции спинномозговой жидкости
}

Астроциты выполняют функции: {
~%33.33333%всасывательную
=%50%опорную
%33.33333%синтеза компонентов спинномозговой жидкости
=%50%разграничительную
%33.33333%участия в циркуляции спинномозговой жидкости
}

Олигодендроциты выполняют функции: {
~%33.33333%всасывательную
=%50%опорную
=%50%трофическую
~%33.33333%синтеза, компонентов спинномозговой жидкости
~%33.33333%участия в циркуляции спинномозговой жидкости
}

Клетки микроглии выполняют функцию: {
~всасывательную
~опорную
~трофическую
=фагоцитарную
~разграничительную
}

Безмиелиновые нервные волокна имеют: {
~%33.33333%один осевой цилиндр
=%50%много осевых цилиндров
~%33.33333%миелиновую оболочку
~%33.33333%слой эпителиальных клеток
=%50%шванновскую оболочку
}

Миелиновые нервные волокна имеют: {
=%50%один осевой цилиндр
~%33.33333%много осевых цилиндров
=%50%миелиновую оболочку

~%33.33333%белочную оболочку
~%33.33333%слой эпителиальных клеток
}

Признаком начавшейся специализации нервных клеток следует считать: {
=появление в цитоплазме пучков нейрофиламентов в нейротрубочек
~развитие лизосом
~развитие гранулярной эндоплазматической сети
~появление в цитоплазме комплекса Гольджи
~появление митохондрий
}

Для миелиновых нервных волокон характерны все признаки, кроме: {
~одного осевого цилиндра
=нескольких осевых цилиндров
~узловых перехватов
~нейрофиламентов
~нейротрубочек
}

Нейроглия, выстилающая нервные сплетения желудочков мозга и спинномозговой канал, представлена: {
~протоплазматическими астроцитами
=эпендимоцитами
~волокнистыми астроцитами
~олигодендроглиоцитами
~микроглиоцитами
}

В процессе регенерации и дегенерации нервных волокон основная роль принадлежит: {
~эпендимоцитам
~волокнистым астроцитам
~протоплазматическим астроцитам
=нейролеммоцитам (олигодентроцитам)
~микроглии
}

В препарате нервной ткани выявлены клетки отростчатой формы, бедные органеллами, с короткими сильноветвящимися отростками. Назовите эти клетки: {

~нейрон

=протоплазматический астроцит

~волокнистый астроцит

~микроглиоцит

}

В очаге воспаления нервной ткани обнаружены небольшие клетки, продолговатой формы с темными и тонкими короткими отростками, вытянутыми ядром. Назовите эти клетки: {

~нейролеммоциты

~протоплазматические астроциты

~фиброциты

~лейкоциты

=микроглиоциты

}

Среди гладких миоцитов видны четкообразные утолщения нервного волокна, которые содержат темные и светлые пузырьки, нейролеммоциты отсутствуют. Что это за образования нервного волокна?: {

=двигательные окончания в гладкомышечной ткани

~эндомиций

~участок смешанного нерва

~чувствительное нервное окончание

~синапс

}

Нейроны, аксоны которых образуют двигательные окончания в гладкой мышечной ткани, располагаются только: {

=в вегетативных ганглиях

~в боковых рогах спинного мозга

~в задних рогах спинного мозга

~в спинномозговых ганглиях

~в передних рогах спинного мозга

}

Специфическим признаком регенерации нервных волокон является: {

- ~пролиферация эпендимоцитов
- ~повышенная активность волокнистых астроцитов
- =повышенная активность нейролеммоцитов
- ~повышенная функция микроглии
- ~повышенная функция протоплазматических астроцитов

}

Нейроны, аксоны которых образуют двигательные окончания в поперечнополосатой мышечной ткани, располагаются: {

- =в передних рогах спинного мозга
- ~в боковых рогах спинного мозга
- ~в задних рогах спинного мозга
- ~в вегетативных ганглиях
- ~в спинномозговых ганглиях

}

Новообразование нейронов: {

- ~прекращается к моменту рождения
- =прекращается в раннем постнатальном периоде
- ~заканчивается к 38-й неделе внутриутробного развития
- ~заканчивается к 16-летнему возрасту
- ~продолжается в течении всей жизни

}

Участок тела клетки, от которого отходит аксон, называется: {

- ~аксонной коллатералью
- ~перикарионом
- ~аксональным шипиком
- ~аксолеммой
- =аксональным холмиком

}

Свойство нейрона генерировать и проводить нервные импульсы обеспечивает: {

- =плазмолемма(цитоплазматическая мембрана)
- ~лизосомы
- ~ядро
- ~аппарат Гольджи
- ~ЭПС (эндоплазматическая сеть)

}

Хромофильная субстанция (тигроид Ниссля) является электронномикроскопическим аналогом): {

~аппарат Гольджи

~гладкой эндоплазматической сети

~митохондрий

=эндоплазматической сети с рибосомами

~скопления лизосом

}

Базофильные глыбки тигроида Ниссля: {

~хорошо выявляются в аксонном холмике

~хорошо развиты в аксонных окончаниях

~никогда не локализуются в дендритах

~никогда не локализуются в перикарионе

=никогда не обнаруживаются в аксонах

}

Вирус бешенства, например, при укусах на ногах способен вызвать поражения нейронов мозга, что связано с наличием в нейронах механизмов: {

~антероградного быстрого аксонального транспорта

~антероградного медленного транспорта

=ретроградного аксонального транспорта

~дендритного медленного транспорта

~дендритного быстрого транспорта

}

Желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга выстилают: {

~астроциты

~олигодендроглиоциты

~микроглиоциты

=эпендимоциты

~эпителиоциты

}

Шванновские клетки также называют: {

=нейролеммоцитами

~матийными глиоцитами
~эпендимоцитами
~астроцитами
}

Двойная складка плазмолеммы нейролеммоцита образует: {
=перехват Ранвье
~осевой цилиндр
~синапс
~мезаксон
~щелевидный контакт
}