

Двигательное звено вегетативного рефлекса образуют нейроны: {
~спинномозговых узлов
~задних рогов
~боковых рогов
=передних рогов спинного мозга
~периферических ганглиев
}

Чувствительные нейроны нервной системы (соматической и вегетативной) располагаются в: {
~%33.33333%коре головного мозга
~%33.33333%среднем мозге
~%33.33333%продолговатом мозге
=%50%черепно-мозговых ганглиях
=%50%спинномозговых ганглиях
}

В межнейронных промежутках спинномозговых узлов имеются: {
~%33.33333%плотная волокнистая соединительная ткань
=%50%РСТ
~%33.33333%ретикулярная ткань
~%33.33333%жировая ткань
=%50%нервные волокна
}

В задних рогах спинного мозга имеются ядра: {
~%33.33333%мелкоклеточное
~%33.33333%супрооптическое
=%50%собственное
~%33.33333%паравентрикулярное
=%50%Кларка
}

Ядра боковых рогов спинного мозга относятся к: {
~центральному ядру соматической нервной системы
~периферическим ядрам соматической нервной системы
~чувствительным ядрам
~двигательным ядрам соматической нервной системы

=центральным ядрам вегетативной нервной системы
}

В белом веществе спинного мозга имеются: {
~%33.33333%тела нейронов
=%50%отростки нейронов
~%33.33333%безмиелиновые нервные волокна
=%50%миелиновые нервные волокна
~%33.33333%плазматические астроциты
}

В сером веществе спинного мозга имеются: {
=%50%тела нейронов
~%33.33333%отростки нейронов
~%33.33333%клетки-сателлиты
=%50%плазматические астроциты
~%33.33333%волокнистые астроциты
}

В молекулярном слое мозжечка имеются нейроны: {
~%33.33333%ганглионарные
=%50%корзинчатые
=%50%звездчатые
~%33.33333%клетки-зерна
~%33.33333%клетки Гольджи
}

В ганглионарном слое мозжечка имеются нейроны: {
~клетки Гольджи
~клетки Меркеля
=клетки Пуркинье
~клетки-зерна
~корзинчатые
}

В зернистом слое мозжечка имеются нейроны: {
=%50%клетки Гольджи
~%33.33333%клетки Пуркинье
=%50%клетки-зерна

~%33.33333%корзинчатые
~%33.33333%звездчатые
}

В состав моховидных волокон входят пути: {
~черепно-мозговые
~спинномозговые
~спинномозжечковые
=оливомозжечковые
~вестибуломозжечковые
}

В состав лазающих волокон мозжечка входят пути: {
~%33.33333%черепно-мозговые
~%33.33333%спинномозговые
=%50%спинномозжечковые
~%33.33333%оливомозжечковые
=%50%вестибуломозжечковые
}

Клетки Беца коры головного мозга располагаются в слое: {
~молекулярном
~наружном зернистом
~пирамидном
~внутреннем зернистом
=ганглиозном
}

Аксоны гигантских клеток Беца коры головного мозга образуют пути: {
~%33.33333%таламоспинальные
~%33.33333%спиноталамические
~%33.33333%вестибулоспинальные
=%50%пирамидные
=%50%экстрапирамидные
}

Периферические ядра парасимпатического отдела вегетативной нервной системы располагаются в ганглиях: {
~черепно-мозговых

~спинномозговых
~паравертебральных
~превертебральных
=интрамуральных
}

Клетки центральных ядер вегетативной нервной системы: {
~%33.33333%малые мультиполярные
=%50%средние мультиполярные
~%33.33333%крупные мультиполярные
~%33.33333%двигательные
=%50%ассоциативные
}

Клетки первого типа по Догелю периферических ганглиев вегетативной нервной системы: {
~%33.33333%биполярные
=%50%мультиполярные
~%33.33333%чувствительные
=%50%двигательные
~%33.33333%ассоциативные
}

Клетки второго типа по Догелю вегетативной нервной системы: {
~%33.33333%биполярные
=%50%мультиполярные
=%50%чувствительные
~%33.33333%двигательные
~%33.33333%ассоциативные
}

Начальное звено вегетативного рефлекса образуют нейроны: {
=спинномозговых узлов
~задних рогов
~боковых рогов
~передних рогов спинного мозга
~среднего мозга
}

Ассоциативное звено вегетативного рефлекса образуют нейроны: {

- ~спинномозговых узлов
 - ~задних рогов
 - ~передних рогов
 - =боковых рогов спинного мозга
 - ~периферических ганглиев
- }

Спинномозговые узлы имеют нейроны: {

- ~униполярные
 - ~биполярные
 - =псевдоуниполярные
 - ~мультиполярные
 - ~секреторные
- }

Аксоны двигательных нейронов соматического рефлекса оканчиваются в: {

- =мышцах языка
 - ~эпителий слюнных желез
 - ~мышечной оболочке желудка
 - ~эпителий желез желудка
 - ~мышечной оболочке мочеочника
- }

Аксоны двигательных нейронов вегетативного рефлекса оканчиваются в: {

- ~%33.33333%мышцах языка
 - ~%33.33333%мышечной оболочке верхней трети пищевода
 - =%50%эпителии желез пищевода
 - ~%33.33333%мышцах нижних конечностей
 - =%50%кардиомиоцитах миокарда
- }

Тела псевдоуниполярных нейронов спинномозговых узлов имеют оболочки: {

- ~%33.33333%белочную
 - =%50%соединительнотканную
 - =%50%глиальную
 - ~%33.33333%миелиновую
 - ~%33.33333%шванновскую
- }

Двигательные нейроны нервной системы (соматической и вегетативной) располагаются в: {

- ~%33.33333%спинномозговых ганглиях
- =%50%периферических ганглиях вегетативной нервной системы
- ~%33.33333%задних рогах спинного мозга
- ~%33.33333%боковых рогах спинного мозга
- =%50%передних рогах спинного мозга

}

Ассоциативные симпатические нейроны спинного мозга образуют ядра в: {

- ~передних рогах
- ~передних канатиках
- ~задних рогах
- =боковых рогах
- ~боковых канатиках

}

Двигательные нейроны спинного мозга образуют ядра в: {

- ~задних рогах
- =передних рогах
- ~передних канатиках
- ~боковых рогах
- ~боковых канатиках

}

Эфферентные пути в коре мозжечка начинаются с клеток: {

- ~пирамидных
- =грушевидных
- ~корзинчатых
- ~звездчатых
- ~клеток-зерен

}

Участок нервной системы - передние рога спинного мозга, имеют хорошо развитые: {

- ~нейросекреторные клетки
- =моторные нейроны
- ~зернистые слои

~грушевидные нейроны
~крупные пирамидные клетки
}

Участок нервной системы – гипоталамус, имеет хорошо развитые: {
=нейросекреторные клетки
~моторные нейроны
~зернистые слои
~грушевидные нейроны
~крупные пирамидные клетки
}

Какие нейроны образуют ретикулярную формацию головного мозга?: {
=мультиполярные различной величины
~ложноуниполярные
~крупные мультиполярные
~крупные пирамидные
~нейросекреторные
}

Какая из оболочек прилежит к белому веществу спинного мозга?: {
~паутинная
~твердая мозговая
=мягкая мозговая
~перитеноний
~периневрий
}

Основной составляющей частью серого вещества центральной нервной системы являются: {
~секреторные нейроны
~глиальные клетки
~миоциты
~соединительнотканые волокна
=мультиполярные нейроны
}

Тела нейронов, аксоны которых образуют синапсы с мышечными волокнами, располагаются: {

- ~в задних рогах спинного мозга
- ~в ганглиях симпатической цепочки
- ~в рыхлой волокнистой соединительной ткани
- ~в спинномозговом узле
- =в передних рогах спинного мозга

}

Часто смерть при передозировке наркотиков связана с повреждением нейронов дыхательного центра, расположенного: {

- ~в черве мозжечка
- =на дне ромбовидной ямки продолговатого мозга
- ~в корковых структурах мозжечка
- ~в ретикулярной формации ствола мозга
- ~в верхних бугорках четверохолмия среднего мозга

}

Задние корешки спинного мозга состоят из: {

- ~дендритов двигательных нейронов
- ~аксонов мотонейронов спинного мозга
- =аксонов сенсорных нейронов
- ~аксонов вставочных нейронов спинного мозга
- ~дендритов сенсорных нейронов

}

Отдельные участки коры одного полушария связаны между собой с помощью: {

- ~комиссуральных волокон
- ~проекционных волокон
- ~мозолистого тела
- =ассоциативных волокон
- ~передней и задней мозговых комиссур

}

Вегетативные ганглии сверху покрыты: {

- ~нейроглиальной оболочкой
- ~базальной мембраной
- ~миелиновой оболочкой
- =соединительнотканной капсулой
- ~корковым слоем

}

При старении в нейронах мозга накапливаются: {

~отложения извести

=гранулы липофусцина

~холестерин

~лизосомы

~гликоген

}