

Хрусталик образован: {
=эпителиальными клетками
~коллагеновыми волокнами
~эластическими волокнами
~аморфным веществом
~гладкомышечными клетками
}

Питание роговицы осуществляется: {
~из собственных кровеносных сосудов
=за счет диффузии из жидкости передней камеры глаза
~за счет диффузии из жидкости задней камеры глаза
~из лимфатических сосудов
~из слезной жидкости
}

Гладкие мышцы радужки и ресничного тела относятся к гистогенетическому типу: {
~мезенхимному
~эпидермальному
=нейральному
~целомическому
~соматическому
}

Источником развития сетчатки и зрительного нерва являются: {
~эктодерма
~энтодерма
=нервная трубка
~мезодерма
~мезенхима
}

Барабанная перепонка состоит из всех элементов, кроме: {
~многослойного плоского эпителия
~однослойного плоского эпителия
~коллагеновых и эластических волокон
~фибробластов

=хрящевых клеток
}

Улитковый канал перепончатого лабиринта выстлан эпителием: {
=однослойным плоским
~многослойным
~многорядным мерцательным
~мезотелием
~однослойным каёмчатым
}

Отток водянистой влаги из передней камеры глаза происходит в: {
~вены радужки
~вены роговицы
=венозный синус склеры
~стекловидное тело
~вены ресничного тела
}

В радужной оболочке мышцы, суживающие и расширяющие зрачок, располагаются в: {
~переднем эпителии
~наружном пограничном слое
~сосудистом слое
=внутреннем пограничном слое
~пигментном эпителии
}

Отолитова мембрана с кристаллами карбоната кальция покрывает поверхность: {
~ампулярного гребешка
~спирального органа
~сосочков языка
=рецепторного пятна
~вестибулярной мембраны
}

Афферентное нервное волокно вкусовой почки заканчивается на: {
~поддерживающих эпителиоцитах

~базальных эпителиоцитах
=сенсорных эпителиоцитах
~базальной мембране
~вкусовой ямке
}

Назовите эмбриональный источник хрусталика: {

~эндотерма
~мезодерма
=эктодерма
~мезенхима
~прехордальная пластинка
}

Склера не прозрачна, потому что: {

=содержит много воды и большое количество коллагеновых фибрилл
~содержит много кератинсульфатов
~содержит гиалуроновую кислоту
~содержит гепарин
~содержит большое количество коллагеновых волокон
}

Сенсоэпителиальные клетки вкусовых почек получают афферентную иннервацию от нервов: {

~лицевого
~языкоглоточного
~блуждающего
=всех перечисленных
~ничего из перечисленного
}

Рецепторные вкусовые клетки на своей поверхности имеют: {

~реснички
=микроворсинки
~стереоцилии
~киноцилии
~несколько стереоцилий и одну киноцилию
}

Клетки спирального ганглия являются: {

- ~мультиполярными звездчатыми
 - =биополярными
 - ~псевдоуниполярными
 - ~униполярными
 - ~мультиполярными пирамидными
- }

Источником развития вкусовых почек являются: {

- ~мезенхима
 - ~мезодерма
 - ~нервная трубка
 - ~энтодерма
 - =эктодерма
- }

Сосочки языка, не содержащие вкусовые луковицы: {

- ~грибовидные
 - =нитевидные
 - ~желобоватые
 - ~листовидные
 - ~все перечисленные
- }

Эпителий сосудистой полосы перепончатого канала улитки: {

- ~однослойный кубический
 - =многорядный
 - ~многослойный
 - ~переходный
 - ~однослойный плоский
- }

Прозрачность собственного вещества роговицы обеспечивается наличием в нем: {

- ~гликогена
- ~воды
- ~гликопротеидов
- =гликозаминогликанов (кератинсульфаты)
- ~коллагеновых волокон

}

Обонятельные рецепторные клетки регенерируют за счет клеток: {

~поддерживающих эпителиоцитов

=базальных эпителиоцитов

~миоэпителиальных клеток

~нейросекреторных клеток

~сенсоэпителиальных клеток

}

Известно, что длительное применение антибиотика стрептомицина приводит к развитию у больного тугоухости. С изменением каких структур кортиева органа это может быть связано?: {

=волосковых клеток

~поддерживающих клеток

~внутренних столбовых клеток

~наружных столбовых клеток

~все верно

}

Пациент испытывает постоянно головокружение и чувство тошноты. При исследовании установлено нарушение способности дифференцировать угловые ускорения. Назовите клетки органа равновесия, воспринимающие данный вид ускорения. {

~волосковые клетки макулы утрикулюса

~поддерживающие эпителиоциты

=волосковые клетки ампул полукружных каналов

~биополярные нейроны спирального ганглия

~все вышеперечисленное

}

Недостаток в организме витамина А приводит к нарушению у человека сумеречного зрения (куриная слепота). Назовите гистофункциональное обоснование этого явления: {

~в состав дисков палочконесущей клетки входит родопсин

~витамин А входит в состав родопсина

~недостаток витамина А снижает ресинтез родопсина

=все верно

~все неверно

}

У ребенка вследствие ожога языка наблюдалось полное отсутствие вкусовой рецепции. Через некоторое время вкусовое восприятие восстановилось.

Назовите источник этого восстановления: {

=базальные клетки

~сенсоэпителиальные клетки

~поддерживающие клетки

~бокаловидные клетки

~все вышеперечисленное

}