

Эндокринная система + костно-суставная система

Эндокринная система

Блок А (75%)_

ТЗ Форма 1'

К факторам риска по СД относится {

- ~ожирение
 - ~гипертоническая болезнь
 - ~беременность
 - ~травмы поджелудочной железы
 - =все перечисленное
- }

В патогенезе СД 2 типа играют роль все перечисленные гормональные антагонисты инсулина, кроме {

- ~гормона роста;
 - ~АКТГ;
 - =андрогенов;
 - ~глюкокортикоидов;
 - ~глюкагона.
- }

Нарушение жирового обмена при сд характеризуется всем перечисленным, кроме {

- ~гиперлипидемии;
 - ~жировой инфильтрации печени;
 - ~гиперкетонемии и кетонурии;
 - ~гиперхолестеринемии;
 - =снижения уровня билирубина.
- }

Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе в следующих клетках

- ~альфа
 - =бета
 - ~фибробластах
 - ~макрофагах
 - ~клетках ацинусов
- }

ИЗСД - это {

- =I тип;
- ~II тип;

~диабет, связанный с недостаточностью питания;
~диабет беременных;
~нарушенная толерантность к глюкозе.
}

СД часто выявляется при всех следующих эндокринных заболеваниях, кроме {
~акромегалии;
~болезни Иценко-Кушинга;
~феохромацитомы;
~ожирения;
=гипотиреоза.
}

В патогенезе СД II типа играют роль все перечисленные гормональные антагонисты инсулина, кроме {
~гормона роста;
~АКТГ;
~глюкокортикоидов;
~глюкагона.
=андрогенов;
}

Для больных СД характерны следующие жалобы, кроме {
~жажды;
~полиурии;
=кашля;
~полидипсии;
~полифагии.

}

Что отражает определение гликозилированного гемоглобина при сахарном диабете {
~.Уровень интоксикации больного
~. Уровень кетоацидоза за последние месяцы
~Осмотическое состояние организма в момент исследования
=Колебания уровня сахара в крови за последние 3 месяца
~Ничего из вышеуказанного
}

Наименее часто атеросклеротические изменения при СД выявляются в сосудах кроме {
~коронарных;
~головного мозга;

~почек;
~нижних конечностей;
=селезенки.
}

При нагрузке глюкозой 75 г. через 2 часа гликемия у здоровых лиц достигает от исходного {
~до 50%
=до 80%
~до 100%
~до 30%
~больше 100%
}

При значении гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой (75г) диагностируется сд {
~свыше 40% от исходного
~свыше 60% от исходного
=свыше 80% от исходного
~свыше 100% от исходного
~свыше 120 % от исходного
}

Выберите какие комы имеют отношение к сахарному диабету {
~гипогликемическая
~гипергликемическая
~гиперосмолярная
~гиперлактацемическая
=все перечисленное
}

Отметьте формы, входящие в современную классификацию сахарного диабета {
~инсулиннезависимый диабет
~инсулинзависимый диабет
~диабет беременных
~нарушение толерантности к глюкозе
=все перечисленное
}

Каков уровень сахара крови натощак в норме у мужчин
~4,4 - 6,1 ммоль/л
~5,0 - 8,7 ммоль/л
~12,0 - 14,5 ммоль/л
~5,1-6,6 ммоль/л

=3,88- 5,5 ммоль/л
}

Каков уровень сахара крови натощак в норме у женщин

~5,8 - 8,9 ммоль/л
~6,1 - 9,5 ммоль/л
=3,33- 5,55 ммоль/л
~4,3-5,3 ммоль/л
~7,2-8,3 ммоль/л
}

Может ли сахар в крови при диабете достигнуть уровня 25 ммоль/л {

=Да
~Нет
~Изредка
~Не знаю
~Уровень зависит от формы диабета
}

Определяет ли уровень сахара крови тяжесть сахарного диабета {

~Нет
~Не знаю
=Да
~Не всегда
=Всегда
}

Какую мочу берут для определения степени глюкозурии при сахарном диабете {

~Утреннюю
~Выделенную за день
~Ночную
~Трехчасовую
=Суточную
}

Дайте оценку по глюкозо-толерантному тесту: исходный уровень гликемии 4,5 ммоль/л, б) максимальный уровень глюкозы через час составил 8,3 ммоль/л, в) уровень глюкозы в крови через 2 часа 4,5 ммоль/л {

~Глюкозо-толерантный тест сомнительный
=Глюкозо-толерантный тест нормальный
~Глюкозо-толерантный тест положительный
~Глюкозо-толерантный тест положительный
~Глюкозо-толерантный тест положительный
}

ЗАДАЧА. ДАЙТЕ ОЦЕНКУ ПО ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНОМУ ТЕСТУ:

Исходный уровень гликемии 5,0 ммоль/л, б) через час 10,2 ммоль/л, в) через 2 часа 5,0 ммоль/л {

~Глюкозо-толерантный тест сомнительный

=Глюкозо-толерантный тест нормальный

~Глюкозо-толерантный тест положительный

~Глюкозо-толерантный тест положительный

~Глюкозо-толерантный тест положительный

}

О каком заболевании следует думать при следующих данных глюкозо-толерантного теста:

а) исходный уровень гликемии 8,5 ммоль/л,

б) через час 13,2 ммоль/л, в) через 2 часа

11,0 ММОЛЬ/Л {

=Сахарный диабет

~Почечный диабет

~несахарный диабет

~преддиабет

~синдром-Иценко Кушинга

}

Со стороны сердечно-сосудистой системы у больных с токсическим зобом отмечается все перечисленное кроме {

~постоянного сердцебиения

=брадикардии

~одышки

~мерцательной аритмии

~глухости тонов

}

Приступообразные повышения артериального давления часто могут быть обусловлены {

~постоянной мерцательной аритмией

~атриовентрикулярной блокадой сердца

~опухолью почек

~опухолью коркового слоя надпочечников

=опухолью мозгового слоя надпочечников

}

В норме в плазме крови содержится натрия

~170 - 200 ммоль/л

=135 - 145 ммоль/л

~160 - 220 ммоль/л

~160 - 180 ммоль/л
~110- 135 ммоль/л
}

В норме в плазме крови содержится калия: {
~6,0 - 7, 1 ммоль/л
~5,8 - 6,2 ммоль/л
~5,0 -4,6 ммоль/л
=3,8 - 4,6 ммоль/л
~3,2 - 3,8 ммоль/л
}

Для какого заболевания характерны: зябкость, чувство холода, огрубение
голоса, запоры, бледность кожных покровов, выпадение волос {
~Грипп
~вирусный ларинго-трахеит
~токсический зоб
=гипотиреоз
~синдром Рейно
}

О чем следует думать, если у больного имеется тремор, потливость, исхудание,
эмоциональная лабильность, тахикардия, снижение памяти {
~туберкулез
~астенизация нервной системы
~вегето-сосудистая дистония
=гипертиреоз
~малярия
}

Какое заболевание можно подозревать у больного, если у него имеется:
упорный зуд, фурункулез, альвелярная пиорея, грибковые заболевания,
выпадения зубов {
~туберкулез
~СПИД
~ВИЧ инфекция
=Преддиабет, скрытый диабет
~бруцеллез
}

Феохромоцитомы развивается в результате {
~опухоли в коре надпочечника
=опухоли в мозговом веществе надпочечников
~опухоли гипофиза
~опухоли эпифиза

~гипоплазии мозгового вещества надпочечника
}

Адиссонова болезнь развивается {
~при хронической гиперфункции надпочечников
=при хронической гипофункции надпочечников
~при острой недостаточности надпочечниковых гормонов
~при аденоме гипофиза
~при аденоме надпочечников
}

Карликовость (гипофизарный нанизм) у мужчин, если рост {
~ниже 150 см
=ниже 130 см
~ниже 170 см
~ниже 125 см
~160 см
}

О карликовости у женщин говорят если рост ниже {
~150 см
~140 см
~130 см
=120 см
~110 см
}

Гигантизм и акромегалия у мужчин {
=выше 200 см
~выше 150 см
~выше 180 см
~выше 140 см
~выше 2,2 метра
}

Гигантизм и акромегалия у женщин {
~выше 200 см
~выше 180 см
=выше 190 см
~выше 150 см
~выше, 220 см
}

ТЗ Форма 2²

Современные методы диагностики опухолей гипофиза {
~%-33.33333% Рентгеноскопия "турецкого седла"
~%50% Рентгенография "турецкого седла"
~%50% Компьютерная томография
~%-33.33333% нагрузка радиоактивным иодом
~%-33.33333% ЯМР
}

Выберите признаки, свойственные инсулинзависимому сахарному диабету {
~%-33.33333% возраст старше 30 лет
~%-33.33333% ожирение
~%-33.33333% близнецовая конкордантность 100%конко
~%50% сниженная масса тела
~%50% гаплотип HLA B-8; DR-3
}

Выберите признаки инсулиннезависимого сахарного диабета {
~%-33.33333% начало до 30 лет
~%50% наблюдается у ожирелых
~%-33.33333% наблюдается у худых
~%50% конкордантность 100%
~%-33.33333% конкордантность 50%
}

Метаболический синдром складывается из {
~%-33.33333% %50% ожирения
~%-33.33333% исхудания
~%-33.33333% гипогликемии
~%50% гипергликемии
~%50% гипертонии
}

Важнейшие признаки сахарного диабета {
~%33.33333% сухость во рту
~%-50% потребность есть мел
~%33.33333% жажда
~%-50% олигурия
~%33.33333% полиурия
}

Наиболее частые этиологические причины сахарного диабета {
~%33.33333% повреждение клеток островков Лангерганса
~%33.33333% повышение контринсулярных гормонов
~%-50% поражения печеночной паренхимы
~%33.33333% повышение уровня глюкагона

~%-50% поражения легких

}

Наиболее ценным методом для лабораторной диагностики сд является: {

~%-50% определение гликемического профиля в течение дня

~%-33.33333% исследование содержания глюкозы в ушной сере

~%-33.33333% определение фруктозамина

~%-33.33333% определение гликозилированного гемоглобина

~%-50% определение гликемии натощак

}

Глюкозурия наиболее часто встречается при следующих нижеперечисленных заболеваниях

~%-33.33333% ~%-50% почечный диабет

~%-50% беременность

~%-33.33333% заболевания почек (пиелонефрит, хр. нефрит)

~%-50% сахарный диабет

~%-33.33333% гипотиреоз.

}

Выделяется ли сахар с мочой в норме

~%-33.33333% да

~%-50% нет

~%-33.33333% в небольшом количестве

~%-33.33333% при употреблении большого количества белков

~%-50% при злоупотреблении углеводами

}

Каков уровень сахара крови натощак в норме у мужчин

больная 40 лет обратилась к врачу в связи с появлением множества

фурункулов на теле, жаловалась на сухость во рту, полиурию, полидипсию.

из истории жизни, мать больной страдала сахарным диабетом. при осмотре на коже туловища, верхних и нижних конечностях имеются фурункулы.

какой предположительный диагноз можно поставить. что необходимо для уточнения диагноза {

~%-50% Сахарный диабет

~%-33.33333% Не сахарный диабет

~%-33.33333% Гипотиреоз

~%-33.33333% Микседема

~%-50% Исследовать на сахар кровь и мочу

}

Выберите заболевания, которые наиболее часто развиваются при гиперфункции передней доли гипофиза {

~%33.33333% Сахарный диабет
~%33.33333% несахарный диабет
~%50% гигантизм
~%50% акромегалия
~%33.33333% гипотизарный нанизм
}

Какие факторы играют роль в развитии диффузно-токсического зоба {
~%33.33333% наследственная предрасположенность
~%50% нарушение иммунной системы,
увеличивая частоту аутоиммунных
заболеваний
~%50% развитие нейроциркуляторной дистонии
~%33.33333% усиление секреции ТТГ
~%33.33333% увеличение выработким Т3 и Т4
}

Какое заболевание имеется у парня 18лет: развит пропорционально, рост 125 см, индекс кетле 16, вторичные половые признаки развиты слабо, ничем не болел, голос высокий {
~%33.33333% нанизм
~%50% карликовость
~%33.33333% простое отставание в росте и массе тела
~%50% карликовость гипотизарная
~%33.33333% карликовость соматогенная
}

Заболевания, связанные с гиперпродукцией гормонов передней доли гипофиза {
~%50% карликовость
~%50% несахарный диабет
~%33.33333% синдром Иценко-кушинга
~%33.33333% акромегалия
~%33.33333% гигантизм
}

Костно-суставная система

Блок А (75%)_

ТЗ Форма 1'

Для какого заболевания суставов характерно поражение пястно-фаланговых суставов кистей и лучезапястных суставов в дебюте болезни? {
~остеоартрит

~подагра
~ реактивный артрит
~ псориатический артрит
= ревматоидный артрит
}
При каком заболевании суставов формируются тофусы? {
~ревматический артрит
=подагра
~остеоартрит
~анкилозирующий спондилит
~ревматоидный артрит
}

ТЗ Форма 2²

Рентгенографию каких суставов необходимо выполнить при подозрении на ревматоидный артрит? {
~%33.33333%коленных
~%50% лучезапястных
~%50% суставов кистей и стоп одновременно
~%33.33333% голеностопных
~%33.33333% локтевых
}
Какие параметры характеризуют обмен мочевой кислоты? {
~%50% уровень мочевой кислоты в сыворотке крови
~%33.33333% кровь на ревматоидный фактор
~%33.33333% фибриноген в сыворотке крови
~%50% суточная моча на мочевую кислоту
~%33.33333% все перечисленное
}
Для суставного синдрома характерны: {
~%33.33333% головная боль
~%50% утренняя скованность
~%50% артралгия
~%33.33333% боль в животе
~%33.33333% ограничение движений в суставах
}