

ТЗ на установления соответствия

Установите соответствие между значением лекарственной устойчивости и его определением{

= множественная лекарственная устойчивость -> одновременная устойчивость к изониазиду и рифампицину.

= широкая лекарственная устойчивость-> устойчивость к изониазиду, рифампицину, препарату фторхинолонового ряда , аминогликозиду.

= монорезистентность -> устойчивость к одному противотуберкулезному препарату

= полирезистентность -> устойчивость к двум и более препаратам, за исключением одновременной устойчивости к изониазиду и рифампицину

}

Установите соответствие между рядом и химиопрепаратами{

=первый ряд -> изониазид , рифампицин

=второй ряд-> левофлоксацин, циклосерин

=первый ряд -> этамбутол, пиразинамид

=второй ряд-> амикацин, канамицин

}

Установите соответствие между длительностью интенсивной фазы лечения в режимах {

= I режим химиотерапии -> 2-3 месяца

= II режим химиотерапии -> 5 месяцев

= III режим химиотерапии -> 2 месяца

= IV режим химиотерапии -> 8 месяцев

= V режим химиотерапии -> 8 месяцев

}

Установите соответствие между аббревиатурой носителя информации и его значением{

=H-> изониазид

=R-> рифампицин

=Z ->пиразинамид

=E-> этамбутол

}

Установите соответствие между побочными действиями

противотуберкулезных препаратов {

= изониазид-> головокружение, головные боли, парестезии, судороги

=рифампицин->гепатотоксичность

=пиразинамид->артралгии

=этамбутол-> атрофия зрительного нерва, ухудшение остроты зрения

}

ТЗ на установление правильной последовательности

Упорядочьте от 1 до 3, последовательность лечение пациента {

= стационарное лечение-> 1

= амбулаторное лечение-> 2

= хирургическое лечение->3

= санаторно-курортное лечение ->4

}

Упорядочьте от 1 до 4, последовательность популяции микобактерий туберкулеза {

=внеклеточно расположенные микобактерии с активными метаболическими процессами-> 1

=внутриклеточно расположенные микобактерии с менее выраженными метаболическими процессами-> 2

= полупассивные микобактерии туберкулеза со спорадической активностью->3

= неактивные, пассивные микобактерии туберкулеза-> 4

}

ТЗ с кратким ответом

Какой режим химиотерапии назначается при множественной лекарственной устойчивости ? {

= четвертый

}

Какой режим назначается при широкой лекарственной устойчивости ? {

= пятый

}

Какой режим назначается при устойчивости к изониазиду? {

= второй

}

Какой режим назначается при сохранении чувствительности к противотуберкулезным препаратам? {

= первый

}

Один из методов лечения, направленный на спадение легкого ,уменьшение его объема,это? {

=коллапсотерапия

}

Основной метод лечения туберкулеза, это? {

= химиотерапия

}

Какой витамин назначают в комбинации с изониазидом , для уменьшения побочных реакций ? {

= пиридоксин

}

Искусственное введение воздуха в брюшную полость для подъёма диафрагмы, ограничения её подвижности называется {

= пневмоперитонеум

}

Лечение направленное на реабилитацию с использованием положительных климатических факторов, лечебной физкультуры и других методов активного отдыха ,это? {

= санаторное

}

Искусственное введение воздуха в плевральную полость, с целью уменьшения объема легкого называется, искусственный? {

= пневмоторакс

}