

ТЗ на установление правильной последовательности

Упорядочьте от 1 до 5 последовательность симптомов при развитии туберкулеза :{

= интоксикация - >1

= ночная потливость - >2

= похудание - >3

= кашель- >4

= мокрота- >5

}

Упорядочьте от 1 до 4 последовательность клинических форм туберкулеза наиболее часто встречающиеся у детей и подростков: {

= туберкулезная интоксикация - >1

= туберкулез внутригрудных лимфатических узлов->2

= первичный туберкулезный комплекс- >3

= острый милиарный туберкулез->4

Упорядочьте от 1 до 4 последовательность клинических форм туберкулеза наиболее часто встречающиеся взрослых: {

= инфильтративный туберкулез - >1

= очаговый туберкулез->2

= диссеминированный туберкулез- >3

= фиброзно-кавернозный туберкулез->4

}

Упорядочьте от 1 до 4 последовательность стадий обратного развития первичного комплекса в рентгенологическом изображении, начиная с инфильтративной стадии: {

=инфильтративная стадия- >1

= стадия рассасывания->2

= стадия уплотнения- >3

= стадия петрификации- >4

}

Упорядочьте от 1 до 4 последовательность состава туберкулезной каверны: {

= фиброзный слой - >1

= грануляционный слой ->2

= казеозно-некротический - >3

= казеозные массы->4

}

Упорядочьте от 1 до 4 последовательность, какие разновидности имеет инфильтративная форма туберкулеза : {

= облаковидный инфильтрат - >1

= округлый инфильтрат ->2

= перициссурит - >3

= лобит ->4

}

Упорядочьте от 1 до 3 последовательность, какие разновидности имеет туберкулез внутригрудных лимфатических узлов : {

= инфильтративная - >1

= опухолевая ->2

= малая - >3

}

Упорядочьте от 1 до 4 последовательность, тяжело протекающих клинических форм туберкулеза : {

- = туберкулезный менингит - >1
- = острый милиарный туберкулез->2
- = казеозная пневмония - >3
- = фиброзно-кавернозный туберкулез->4
- }

Упорядочьте от 1 до 4 последовательность, отличий первичного туберкулеза от вторичного : {

- = первичная инфицированность - >1
- = вираж ->2
- = лимфатропность - >3
- = генерализованность ->4
- }

Упорядочьте от 1 до 5 последовательность действий врача при обращении больного с жалобами на плохое самочувствие :{

- = сбор анамнеза - >1
- = объективный осмотр - >2
- = диагностика - >3
- = лечение - >4
- = ведение медицинской документации - >5
- }

10

ТЗ на установления соответствия

Установите соответствие между лучевой симптоматикой инфильтративного туберкулеза и бактериальной пневмонией {

- = локализация процесса в верхних долях - > инфильтративный туберкулез
- = полиморфизм патологических теней - > инфильтративный туберкулез
- = локализация процесса в нижних долях - > бактериальная пневмония

= выраженная однородная инфильтрация - > бактериальная пневмония
}

Установите соответствие между симптомами перкуссии при туберкулезе
внутрирудных лимфоузлов{

= симптом де ля Кампа - > укорочение перкуторного звука над остистыми
отростками 5-6 грудных позвонков.

= симптом Филатова - > укорочение перкуторного звука парастернально на
уровне 1-2 межреберий

=симптом «чаши» Философова - > притупление в области рукоятки
грудины

}

Установите соответствие между по частоте выявлениям среди впервые
выявленных пациентов форм туберкулеза{

=15-20% - > очаговый туберкулез

= 60-70%- >инфильтративный туберкулез

=7-10% - > диссеминированный туберкулез

= 2-6 % - > туберкулема

}

Установите соответствие между морфологической структурой очагов

=очаги Абрикосова - >свежие, протекающие по типу внутридольковой
казеозной бронхопневмонии{

=очаги Симона- > реактивация старых эндогенных очагов

=очаги Ашоффа-Пуля – вокруг которых формируется фиброзная или
гиалиновая капсула

}

Установите соответствие между формами инфильтративного туберкулеза{

=округлый инфильтрат Асмана- > охват несколько долек

=облаковидный инфильтрат- >в процесс вовлекается один или несколько сегментов легких

=периссиссурит - > локализация инфильтрата по ходу междолевой щели

=лобит - >охват всей доли

}

Установите соответствие между клинической формой туберкулеза и с заболеванием, которым проводят дифференциальную диагностику{

=инфильтративный туберкулез- >бактериальная пневмония

= диссеминированный туберкулез- > саркоидоз

=кавернозный туберкулез - >абсцесс легкого

=фиброзно-кавернозный туберкулез- > бронхоэктатическая болезнь

}

Установите соответствие между клиническими формами туберкулеза и преимущественными методами в их диагностике{

= туберкулезный плеврит-> ультразвуковой метод

= абдоминальный туберкулез-> лапароскопический метод

= туберкулезный менингит-> спинномозговая пункция

= урогенитальный туберкулез-> гистеросальпингография

}

Установите соответствие между видами профилактики и методами их осуществления: {

= специфическая профилактика → вакцинация и ревакцинация БЦЖ

= химиопрофилактика – >введение противотуберкулезных препаратов лицам с повышенным риском заболевания туберкулезом

= санитарная профилактика -> комплекс мероприятий направленных на предотвращение передачи туберкулезной инфекции

= пропаганда знаний о туберкулезе → проведение лекций для информирования и просвещения населения

}

Установите соответствие между клиническими формами туберкулеза и органами поражения при этой форме {

= туберкулезный плеврит → выпот в плевральную полость

= абдоминальный туберкулез → кишечник

= туберкулезный менингит → мозговые оболочки

= урогенитальный туберкулез → половые органы

}

10

ТЗ с кратким ответом

Инкапсулированная казеозная масса туберкулезной этиологии больше 1 см это? {

= туберкулема

}

Основной метод лечения туберкулемы? {

=оперативное

}

Как называется метод графической регистрации изменений во времени

объёма вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при проведении ряда

дыхательных маневров ? {

=спирография

}

Клиническая форма туберкулеза при котором характеризуется развитием резко выраженного экссудативного воспаления с последующим некрозом

пораженного участка легкого и образованием крупных полостей называется казеозная- ? {

= пневмония

}

Клиническая форма туберкулеза при котором на рентгенограмме преобладают очаги, но не более чем на двух сегментах, это ? {

=очаговый

}

Клиническая форма туберкулеза при котором на рентгенограмме преобладают очаги более чем на двух сегментах, это? {

=диссеминированный

}

Клиническая форма туберкулеза при котором рентгенологически преобладают участки инфильтрации, это? {

=инфильтративный

}

Метод исследования и диагностики, заключающийся в выслушивании звуков (тоны, ритм, шумы, их последовательность и продолжительность), образующихся в процессе работы органов, это? {

=аускультация

}

Наиболее тяжелая клиническая форма туберкулеза , которая встречается чаще у детей, это? {

= милиарная

}

Клиническая форма туберкулеза, при котором неясная локализация называется туберкулезная ? {

= ИНТОКСИКАЦИЯ

}

10