

ДГМУ 2026

ЛОР

Зачет от Funtik 22.06.2026

---

#1

**Риноскопия это:**

осмотр уха

осмотр носа

осмотр горла

осмотр гортани

проверка вестибулярного анализатора

#2

**Осмотр средних отделов полости носа проводится?**

носовым зеркалом Киллиана

носоглоточным зеркалом

гортанным зеркалом

отоскопом

без инструментов

#3

**Хоана – это:**

задние отделы верхнего носового хода

отверстие из полости носа в носоглотку

задние отделы нижнего носового хода

задние отделы общего носового хода

#4

**Скелет наружного носа образован:**

слезной костью

лобным отростком верхней челюсти

сошником

крыльями носа

четырехугольным хрящом

#5

**Носовая перегородка в переднем отделе представлена:**

сошником

крылом носа

четырехугольным хрящом

треугольным хрящом

вертикальной пластинкой небной кости

#6

**Два боковых ската носа, соединяясь по средней линии, образуют:**

верхушку носа

спинку носа

перегородку носа

корень носа

кончик носа

#7

**Остиомеатальный комплекс – это:**

отверстие носослезного канала

костное образование в носовых ходах

комплекс косточек, образующих боковую стенку носа

место в среднем носовом ходе, куда открываются естественные отверстия передней группы околоносовых пазух

место в среднем носовом ходе, куда открываются естественные отверстия задней группы пазух

#8

**Нижний носовой ход находится между:**

нижней носовой раковиной и верхней носовой раковиной

средней и нижней носовыми раковинами

средней и верхней носовыми раковинами

средней носовой раковиной и дном полости носа

нижней носовой раковиной и дном полости носа

#9

**Нижняя носовая раковина представляет собой:**

самостоятельную кость

отросток решетчатой кости

отросток клиновидной кости

отросток верхней челюсти

часть твердого неба

#10

**В верхний носовой ход открывается:**

естественное отверстие гайморовой пазухи

естественное отверстие лобной пазухи

естественное отверстие клиновидной пазухи

слезно-носовой канал

передние клетки решетчатой пазухи

#11

**В нижний носовой ход открывается:**

естественное отверстие гайморовой пазухи

естественное отверстие лобной пазухи

слезно-носовой канал

естественное отверстие клиновидной пазухи

естественное отверстие решетчатой пазухи

#12

**Какой нерв отвечает за обонятельные ощущения?**

тройничный нерв

лицевой нерв

обонятельный нерв

глазодвигательный нерв

блуждающий нерв

#13

**Какая из пазух имеет форму пирамиды?**

лобная пазуха

все пазухи

сферическая пазуха

этмоидальная пазуха

клиновидная пазуха

#14

**Какая пазуха расположена наиболее глубоко в черепе?**

лобная пазуха

гайморовая пазуха

этмоидальная пазуха

сферическая пазуха

клиновидная пазуха

#15

**Что ограничивает вход в гайморову пазуху?**

лобная пазуха

крючковидный отросток

гайморова пазуха

решетчатая булла

верхняя носовая раковина

#16

**Какая из пазух имеет форму куба?**

лобная пазуха

гайморовая пазуха

сферическая пазуха

этмоидальная пазуха

сфеноидальная пазуха

#17

**Какие из нервных волокон проходят через обонятельный нерв?**

трахейальный нерв

лицевой нерв

обонятельные волокна

глазодвигательный нерв

блуждающий нерв

#18

**Какая из пазух имеет наибольшее количество выходов в носовую полость?**

гайморовая пазуха

этмоидальная пазуха

лобная пазуха

сферическая пазуха

клиновидная пазуха

#19

**Какая из пазух имеет форму клина?**

клиновидная пазуха

гайморовая пазуха

лобная пазуха

сферическая пазуха

этмоидальная пазуха

#20

**Какая из пазух находится непосредственно в толще лобной кости?**

лобная пазуха

гайморовая пазуха

этмоидальная пазуха

сферическая пазуха

клиновидная пазуха

#21

**В какой из пазух находится турецкое седло?**

клиновидной пазухе

гайморовой пазуе

лобной пазухе

во всех перечисленных

этмоидальной пазухе

#22

**Продырявленная пластинка решетчатой кости есть у?**

этмоидальной пазухи

гайморовой пазухи

лобной пазухи

сферическая пазуха

клиновидная пазуха

#23

**Что представляют из себя средняя и верхняя носовые раковины?**

отростки решетчатого лабиринта

отдельные кости и раковины

часть отростка клиновидной кости

выводные протоки

часть респираторной системы

#24

**Сосудосуживающие капли в нос при остром насморке назначают:**

в стадии сухого раздражения

в стадии серозно - слизистых выделений

в стадии слизисто - гнойных выделений

в стадии гнойных выделений

в стадию осложнений

#25

**При гнойном гайморите патологическое отделяемое вытекает из:**

лобной пазухи

среднего носового хода

верхнего носового хода

нижнего носового хода

общего носового хода

#26

**Озена - это:**

зловонный насморк

носовой камень

простой атрофический насморк

гематома носа

сифилитический насморк

#27

**При носовых кровотечениях нельзя:**

запрокидывать голову назад

устанавливать тампонаду носа

сдавать коагулограмму

производить осмотр носа

устанавливать заднюю тампонаду

#28

**Воспаление основной пазухи это:**

сфеноидит

гайморит

этмоиди

фронтит

дерматит

#29

**Ринолит - это:**



опухоль носа

киста носа

носовой камень

острый насморк

хронический насморк

#30

**Абсцесс носовой перегородки чаще является осложнением:**

острого ринита

фурункула носа

гематомы

вазомоторного ринита

аденоидов

#31

**Одонтогенный гайморит это:**

воспаление лобной пазухи, , причина в инфицированных зубах

воспаление клетки agger nasi

воспаление синусов носа

воспаление верхнечелюстной пазухи, причина в инфицированных зубах

осложнение ринита

воспаление небных миндалин

#32

**Как называется врожденная аномалия, при которой носовые проходы не полностью сформированы?**

атрезия носовых проходов

девиация перегородки

полипоз

синусит

ринит

#33

**Как называется хирургическое вмешательство по исправлению формы носа?**

лапароскопия

эндоскопия

ринопластика

гастропластика

артроскопия

#34

**Как называется хирургическое удаление носовых полипов?**

синусотомия

ринотомия

полипэктомия

ангиопластика

дилатация

#35

**В какой пазухе часто образуются кисты?**

лобной пазухе

гайморовой пазухе

клиновидной пазухе

этмоидальной пазухе

в пазухах не образуются

#36

**Какая из пазух наиболее подвержена травмам?**

лобная пазуха

гайморовая пазуха

этмоидальная пазуха

сферическая пазуха

клиновидная пазуха

#37

**Как называется гнойное воспаление между слоями носовой перегородки?**

синусит

абсцесс перегородки носа

ринит

полипоз

фарингит

#38

**После травмы перегородки носа могут образоваться на слизистой оболочке?**

стрии

синехии

остеома

фиброма

ринофима

#39

**Наиболее часто носовые кровотечения могут быть из зоны?**

гайморовой пазухи

перегородки носа

задних отделов полости носа

дна полости носа

из кожи наружного носа

#40

**Как называется одна из трех стадий острого ринита?**

гипертрофия

слизисто-гнойных выделений

гнойная стадия

сливкообразных выделений

некроз

#41

**Как называется хирургическая процедура по коррекции искривленной носовой перегородки?**

полипэктомия

септопластика

ринопластика

синусотомия

ангиопластика

#42

**Кто автор методики тампонады носа?**

Николай Пирогов

Йоханн Микулич

Марио Санна

Ибн Сина

Адлер Альфред

#43

**Осложнения фурункула кончика носа?**

отогенный сепсис

тромбоз пещеристого синуса

менингит

атрофия

некроз

#44

**Как называется заболевание, при котором происходит истончение слизистой оболочки носа?**

атрофический ринит

аллергический ринит

бактериальный ринит

гастрит

синусит

#45

**К развитию фурункула носа предрасполагает:**

гемофилия

лейкоз

тиреотоксикоз

сахарный диабет

невроз

#46

**Рино-конъюнктивальные симптомы возможны при?**

аллергическом рините

гипертрофия слизистой

атрофия слизистой

параличе мышц

некрозе слизистой

#47

**Как называется отсутствие обоняния?**

аносмия

гипосмия

гиперсмия

анорексия

кокасмия

#48

**Какие кисты придаточных пазух требуют удаления?**

кисты более 1см

кисты менее 1см

ложные кисты

кисты на латеральной стенке

кисты у дна пазухи

#49

**Формы искривления носовой перегородки?**

гребень, шип

остеома

гипертрофия

атрофия

некроз

#50

**Чем обусловлен зловонный запах отделяемого при озене?**

обширной деструкцией костной ткани

слущиванием эпителия

отеком слизистой оболочки

примесью фибрина в отделяемом

аллергической сенсibilизацией

#51

**Из каких отделов состоит орган слуха:**

из наружного, среднего и внутреннего уха

из наружного, среднего, внутреннего уха и проводящих путей

из наружного, среднего, внутреннего уха, проводящих путей и слуховой зоны коры головного мозга

внутреннего уха, проводящих путей и слуховых зон коры головного мозга

#52

**Наружное ухо состоит из:**

ушной раковины и слуховой трубы

наружного слухового прохода и барабанной перепонки

ушной раковины и наружного слухового прохода

слуховой трубы и ушной раковины

слуховой трубы и наружного слухового прохода

#53

**Из каких отделов состоит слуховой проход:**

костный

костно-перепончатый, хрящевой, фибринозный

костный, хрящевой, эпидермальный

перепончато-хрящевой, костный

хрящевой, фиброзный, эпителиальный

#54

**Верхняя стенка наружного слухового прохода граничит с:**

передней черепной ямкой

средней черепной ямкой

задней черепной ямкой

сосцевидным отростком

передней и средней черепной ямкой

#55

**Задняя стенка наружного слухового прохода граничит:**

с височно-нижнечелюстным суставом

со средней черепной ямкой

с сосцевидным отростком

с околоушной слюнной железой

с передней черепной ямкой

#56

**Наружный слой барабанной перепонки образован:**

эпидермисом

мерцательным эпителием

соединительной тканью

всеми вышеперечисленными тканями

надкостницей

#57

**С носоглоткой барабанная полость сообщается через:**

вход в пещеру

слуховую трубу

каменисто-чешуйчатую щель

круглое окно

овальное окно



#58

**Сколько стенок имеет барабанная полость:**

4 стенки

7 стенок

6 стенок

3 стенки

5 стенок

#59

**Овальное окно ведет:**

в вертикальный полукружный канал

в барабанную лестницу

в ампулу полукружных каналов

в лестницу преддверия

в улитковый ход

#60

**Перечислите косточки барабанной полости:**

молоточек, наковальня, стремечко

молот, пика, стремя

молоточек, стремя, щиток

молоточек, головка, стремя

молоточек, стремя, мыс

#61

**В какой отдел полости черепа открывается водопровод улитки:**

передняя черепная ямка

Сильвиев водопровод

ромбовидная ямка

задняя черепная ямка

аммониев рог

#62

**Саккулюс и утрикулюс располагаются:**

в ампулах полукружных каналов

в преддверии

в гелиотреме

на базальной мембране

в улитковом ходе

#63

**В зоне каких частот лучше всего слышит звук ухо человека:**

50 – 100 Гц

8000 – 10000 Гц

800 – 2000 Гц

10000 – 13000 Гц

10 – 50 Гц

#64

**Какой камертон используется чаще всего при исследовании слуха:**

C128

C256

C512

C1024

C2048

#65

**Нистагм – это:**

ритмичные колебания зрачков

ритмичные подергивания век

ритмичные колебания глазных яблок

ритмичные отклонения рук

ритмичные спазмы аккомодации

#66

**В скольких законах Эвальд описал физиологические процессы вестибулярного анализатора:**

3

2

5

4

1

#67

**Фурункул наружного слухового развивается:**

по всей длине слухового прохода

только в костном отделе

только в перепончато-хрящевом отделе

на границе хрящевой и костной части

на б/перепонке

#68

**Злокачественный наружный отит у пожилых лиц вызывается:**

синегнойной палочкой

палочкой Фридлендера

палочкой Лефлера

рикетсиями

вирусом гриппа

#69

**Перихондрит ушной раковины - это диффузное воспаление:**

только кожи

хряща

только надхрящницы

надхрящницы с вовлечением кожи

только надкостницы

#70

**При созревании фурункула наружного уха и усилении болевого синдрома целесообразно применить:**

гормонотерапию

вскрытие фурункула, антибиотикотерапию

противовоспалительную терапию

антигистаминную терапию

детоксикационную терапию

#71

**Особенностью патологического отделяемого при перфоративном среднем аллергическом отите является:**

тягучий характер

кровянистое

зловонный запах

обильное жидкое

комкообразное

#72

**При грибковых отитах, вызываемых плесневыми грибами наиболее эффективен:**

нистатин

леворин

амфотерицин

гриземин

нитрофунгин

#73

**Наиболее часто микроорганизмы проникают в среднее ухо через:**

слуховую трубу

наружный слуховой проход

гематогенно

из ячеек сосцевидного отростка

через черепные вены

#74

**Наиболее выраженные патологические изменения при отите наблюдаются при:**

гриппе

коклюше

скарлатине

ОРЗ

дифтерии

#75

**Боль при остром отите вызывается раздражением нерва:**

лицевого

тройничного

преддверно-улиткового

слухового

блуждающего

#76

**Клинической особенностью острого среднего отита у детей грудного возраста является:**

явления гепатолиенальных нарушений

интенсивная гиперемия натянутой части барабанной перепонки

явления кишечной диспепсии

сужение слухового прохода

парез лицевого нерва

#77

**Продолжительность течения неосложненного острого среднего отита составляет в среднем:**

3 – 4 недели

1 – 2 неделя

2 – 3 неделя

одна неделя

4 – 6 недель

#78

**При каком типе сосцевидного отростка гной из антрума легче проникает в полость черепа:**

диплоэтическом

пневматическом

склеротическом

смешанном

кохлеарном

#79

**При сквамите припухлость располагается:**

на верхушке сосцевидного отростка

в заушной области

кпереди от ушной раковины

выше ушной раковины

ближе к затылочной кости

#80

**Парезы и параличи лицевого нерва при среднем отите относят к:**

периферическим

центрального типа

смешанного типа

вегетативным

восходящим

#81

**Диагностический признак острого среднего отита:**

гиперемия барабанной перепонки

рубцовые изменения барабанной перепонки

усиление светового конуса

грануляции в просвете наружного слухового прохода

бледность барабанной перепонки

#82

**Какой клинический признак острого среднего отита держится дольше всего:**

боль

гиперемия барабанной перепонки

снижение слуха

температура

шум в ухе

#83

**Парацентез барабанной перепонки обычно делают в:**

передне-верхнем квадранте

задне-нижнем квадранте

передне-нижнем квадранте

задне-верхнем квадранте

в центре барабанной перепонки

#84

**Петрозит - это воспаление воздухоносных ячеек:**

чешуи височной кости

скулового отростка

пирамиды височной кости

сосцевидного отростка височной кости

шиловидного отростка

#85

**Назовите неблагоприятную форму хронического гнойного среднего отита:**

мезотимпанит

эпитимпанит

синусит

туботимпанит

гипотимпанит

#86

**Холестеатома - это:**

грануляционная ткань

доброкачественная опухоль

злокачественная опухоль

полип в барабанной полости



опухолевидное образование, содержащее слущеный эпидермис, микробные тела и кристаллы холестерина

#87

**При радикальной операции уха объединяют в общую полость:**

барабанную полость и наружный слуховой проход

наружный слуховой проход и анtrum

барабанную полость, анtrum и наружный слуховой проход

сосцевидный отросток и барабанную полость

сосцевидный отросток и наружный слуховой проход

#88

**Сколько типов тимпанопластики по Вульштейну существуют:**

1 тип

2 типа

3 типа

4 типа

5 типов

#89

**Симптом менингита, при котором больной не может дотронуться подбородком до грудины, называется:**

регидность мышц затылка

регидность мышц грудины

симптом Кернига

симптом Уайта

симптом Бабинского

#90

**Вид ликвора при гнойном менингите:**

бесцветный

прозрачный с розовым оттенком

мутный

прозрачный с фибриной пленкой на поверхности

белый

#91

**При отогенном менингите в ликворе повышается содержание:**

нейтрофилов

лимфоцитов

эритроцитов

тромбоцитов

астратов

#92

**Больных с отогенным менингитом срочно госпитализируют в отделение:**

инфекционное

неврологическое

оториноларингологическое

диагностическое

психиатрическое

#93

**Изменения психики в виде неадекватности поступков, необоснованной эйфории при отогенных внутричерепных осложнениях характерны для:**

абсцесса мозжечка

абсцесса лобной доли головного мозга

абсцесса височной доли головного мозга

абсцесса затылочной доли головного мозга

абсцесса теменной доли головного мозга

#94

**Адиадохокинез характерен для локализации абсцесса:**

в лобной доле мозга

в височной доле мозга

в мозжечке

в затылочной доле мозга

в теменной доле мозга

#95

**Что является главным критерием завершения послеоперационного периода после радикальной операции на ухе:**

нормализация показателей крови и мочи

улучшение слуха

эпидермизация костной раны

заживление заушного разреза

отсутствие вестибулярных нарушений

#96

**Мирингопластика показана при:**

тотальном тимпаните

перфорации в натянутой части барабанной перепонки

перфорации в расслабленной части барабанной перепонки

перфорации в натянутой части и сохранении подвижности цепи слуховых косточек

перфорации в расслабленной части и отсутствии подвижности цепи слуховых косточек

#97

**У детей отогенные внутричерепные осложнения чаще возникают:**

в период морских купаний

в весенне-летний период

осенне – зимний период

период эпидемии вирусных инфекций

период массовых прививок

#98

**При отогенном гнойном менингите наблюдаются изменения спинномозговой жидкости, кроме:**

повышение давления

изменение прозрачности

увеличение количества нейтрофилов

увеличение хлоридов

повышение содержания белка

#99

**Какой путь распространения отогенной инфекции преобладает при височной локализации абсцесса:**

контактный

гематогенный

лимфогенный

предсуществующие дегисценции

лимфо-гематогенный

#100

**При отгематоме рекомендуется:**

пункция

вскрытие

вскрытие и дренирование

пункция и давящая повязка

физиотерапия и давящая повязка

#101

**Границей между носоглоткой и ротоглоткой является:**

горизонтальная плоскость, проведенная через поверхность языка

верхний полюс небных миндалин

горизонтальная плоскость, проведенная через твердое небо

край мягкого неба

язычок мягкого неба

#102

**Устье слуховой трубы открывается на стенке носоглотки:**

верхней

задней

боковой

передней

медиальной

#103

**Количество миндалин, располагающихся в носоглотке:**

одна

две

три

четыре

пять

#104

**Сколько миндалин входят в лимфоаденоидное глоточное кольцо Вальдейера-Пирогова:**

четыре миндалины

восемь миндалин

две миндалины

шесть миндалин

семь миндалин

#105

**В лимфоаденоидное глоточное кольцо входят:**

небные и трубные миндалины

боковые валики, небные миндалины, язычная миндалина

глоточная миндалина, небные и трубные миндалины, язычная миндалина

миндалины глотки, боковые валики

глоточная и трубные миндалины

#106

**Границей между ротоглоткой и гортаноглоткой является уровень:**

корня языка и надгортанника

нижнего края мягкого неба

нижнего полюса небных миндалин

дна полости рта

верхний полюс небных миндалин

#107

**Мышца глотки, суживающая просвет глоточного отверстия слуховой трубы**

поднимающая небную занавеску

напрягающая небную занавеску

небно-язычная

небно-глоточная

мышца язычка

#108

**Временной стенкой среднего отдела глотки является:**

задняя

верхняя

боковая

передняя

медиальная

#109

**Чувствительная иннервация носоглотки осуществляется в основном за счет нерва:**

тройничного

блуждающего

зыкоглоточного

лицевого

возвратного

#110

**Чувствительная иннервация ротоглотки осуществляется в основном за счет нерва:**

тройничного

блуждающего

языкоглоточного

лицевого

возвратного

#111

**Крупная артерия, расположенная вблизи нижнего полюса небной миндалины:**

наружная сонная

внутренняя сонная

общая сонная

щитовидная

безымянная

#112

**Первые признаки инволюции небных миндалин отмечаются:**

с 15 лет

с 20 лет

с 30 лет

с 40 лет

после 50 лет

#113

**Инволюционные изменения глоточной миндалины начинаются:**

с 7 лет

с 8 лет

с 9 лет

с 13 лет

с 15 лет

#114

**Какой метод нужно использовать для осмотра гортаноглотки?**

заднюю ларингоскопию

сальпингоскопию

непрямую ларингоскопию

заднюю риноскопию

мезофарингоскопию

#115



**Характерное изменение слизистой оболочки при хроническом атрофическом фарингите:**

яркая гиперемия

сухость

отечность

инъекция сосудов

цианотичность

#116

**Паралич мягкого неба сопровождается:**

охриплостью

закрытой гнусавостью

открытой гнусавостью

затруднением носового дыхания

осиплостью

#117

**Ведущая роль в возникновении ангины принадлежит:**

зеленящему стрептококку

золотистому стафилококку

бета-гемолитическому стрептококку группы А

аденовирусам

диплококкам

#118

**Бациллу Леффлера обнаруживают при:**

озене

дифтерии

склероме

туберкулезе

сифилисе

#119

**Мазок из зева берут, чтобы исключить:**

дифтерию

сифилис

туберкулез

сальмонеллез

ВИЧ

#120

**Причиной моноцитарной ангины является:**

веретенообразная палочка

щечная спирохета

ретровирус

вирус Эпштейна-Барр

вирус Коксаки

#121

**Некротические изменения в миндалинах бывают при:**

агранулоцитозе

фарингите

гриппе

катаральной ангине

лейкозе

#122

**При паратонзиллярном абсцессе проводят:**

диагностическую пункцию

вскрытие абсцесса через fossa supratonsillaris

рассечение лакун миндалин

криотерапию

промывание лакун

#123

**Заглочный абсцесс развивается в возрасте:**

детском

юношеском

пожилом

возраст значение не имеет

зрелом

#124

**При хроническом тонзиллите застойное валикообразное утолщение краев небных дужек характеризуется как признак:**

Преображенского

Гизе

Зака

Пальчуна

Киллиана

#125

**При хроническом тонзиллите стойкая гиперемия небных дужек характеризуется как признак:**

Гизе

Зака

Преображенского

Пальчуна

Симановского

#126

**При хроническом тонзиллите застойная отечность на стыке передних и задних небных дужек характеризуется как признак:**

Преображенского

Зака

Гизе

Пальчуна

Воячека

#127

**Острый фарингит необходимо дифференцировать с:**

катаральной ангиной

лакунарной ангиной

дифтерией глотки

фарингомикозом

гранулезным фарингитом

#128

**Клинические формы хронических фарингитов:**

гиперпластические и некротические

серозные и гнойные

катаральные, атрофические, гипертрофические

простые и токсико-аллергические

простые и гнойные

#129

**Розовые гранулы на задней стенке глотки наблюдаются при:**

катаральном фарингите

субатрофическом фарингите

атрофическом фарингите

гранулезном фарингите

боковом фарингите

#130

**Из доброкачественных опухолей ротоглотки чаще встречается:**

фиброма

папиллома

ангиома

миома

невринома

#131

**Как называется ангина, при которой на фоне гиперемизированной миндалины видны бело-желтые точки:**

лакунарная

дифтерийная

сифилитическая

фолликулярная

гнойная

#132

**Для какой ангины характерны налеты у устья крипт?**

язвенно-пленчатой

фолликулярной

некротической

лакунарной

сифилитической

#133

**Воспаление глоточной миндалины носит название:**

аденоиды

аденоидные вегетации

аденоидные разращения

ретроназальная ангина

аденоидит

#134

**Признаком дифтерийной ангины является:**

грязно-серые налеты на миндалинах

фибринозный налет на миндалинах, языке

желто-серый налет на верхушке миндалин

кратерообразная язва с налетом на одной миндалине

желтовато-белые налеты на миндалинах

#135

**Повышенное содержание моноцитов периферической крови наблюдается при:**

коревой ангине

дифтерии глотки

лейкозе

инфекционном мононуклеозе

ангине Симановского-Венсана

#136

**Ангина Симановского-Венсана вызывается симбиозом:**

стрептококка и плесневых грибов

стафилококка и веретенообразной палочки

веретенообразной палочки и спирохеты полости рта

спирохеты и вульгарного протея

синегнойной палочки и веретенообразной палочки

#137

**Вскрытие паратонзиллярного абсцесса производят обычно на:**

2 – 3 день болезни

4 день

4 – 5 день

6 – 7 день

после одной недели болезни

#138

**С каким заболеванием чаще всего путают врачи фарингомикоз:**

гипертрофическим фарингитом

фолликулярной ангиной

абсцессом корня языка

кистозным тонзиллитом

дифтерией глотки

#139

**Фитотерапия настоем зверобоя не показана при следующих заболеваниях:**

фарингитах

ангинах

ларингитах

хроническом тонзиллите

фаринготонзиллитах

#140

**Укажите наиболее частую локализацию инородных тел глотки:**

надгортанник, корень языка

небные дужки, миндалины

грушевидный синус, валлекулы, миндалины

задняя стенка глотки, мягкое небо

язычок, небные дужки, боковые валики

#141

**Опухоли из какой ткани чаще встречаются в носоглотке:**

из хрящевой

из костной

из эпителиальной

из мышечной

из соединительной

#142

**Ювенильная ангиофиброма - это опухоль:**

гортани

ушной раковины

гайморовой пазухи

основания черепа

наружного слухового прохода

#143

**К какой группе опухолей относится ангиофиброма носоглотки?**

к пограничной

доброкачественной

злокачественной

переходноклеточной



низкодифференцированной

#144

**Укажите характерный признак ангины четвертой миндалины:**

односторонняя боль в горле

болезненность при движении языком

болезненность при надавливании на язык

иррадиация боли в ухо

затруднения при глотании

#145

**Снижение слуха при остром аденоидите обусловлено:**

нарушением носового дыхания

интоксикацией рецепторных и ганглиозных образований звукового анализатора

закрытием устьев слуховых труб

хронический тонзиллит

ларингит

#146

**Причина нарушения подвижности мягкого неба при дифтерии глотки:**

отек мягких тканей глотки

токсический парез мышц небной занавески

парез языкоглоточного нерва

парез возвратного нерва

наличие налетов на слизистой глотки

#147

**Некротические изменения в миндалинах бывают при:**

агранулоцитозе

фарингите  
гриппе  
катаральной ангине  
аденоидите

#148

**При язвенно-некротической ангине общее состояние больного:**

страдает незначительно  
не страдает  
страдает значительно  
отмечается тяжелое состояние  
отмечается средне – тяжелое состояние

#149

**Антибактериальным препаратом первой линии для лечения ангины, вызванной  $\beta$ -гемолитическим стрептококком группы А, является:**

ципрофлоксацин  
амоксициллин  
цефтазидим  
тетрациклин  
супрастин

#150

**Наиболее частым осложнением ангины является:**

паратонзиллярный абсцесс  
сепсис  
отек надгортанника  
подскладочный ларингит  
острый синусит

#151

**Гортань у взрослого человека располагается на уровне каких шейных позвонков:**

4-6

3-4

1-2

5-7

4

#152

**Укажите, какой хрящ формирует кадык (адамово яблоко) у мужчин:**

перстневидный

щитовидный

надгортанный

черпаловидный

клиновидный

#153

**Морганьев желудочек находится в гортани в области:**

черпало-надгортанных складок

между голосовыми и вестибулярными складками

в межчерпаловидном пространстве

в подскладочном пространстве

в области корня надгортанника

#154

**Слизистая оболочка гортани выстлана эпителием:**

однослойным плоским

многослойным плоским

однослойным цилиндрическим

многорядным цилиндрическим

многорядным мерцательным

#155

**Возвратный (нижний гортанный) нерв является ветвью:**

блуждающего нерва

нижнего шейного нерва

шейного сплетения

тройничного нерва

лицевого нерва

#156

**Ложные голосовые складки - это:**

дубликатура слизистой оболочки над истинными голосовыми складками

мышечные образования в подскладочном пространстве

продолжение истинных голосовых складок

полостные карманы

надгортанник

#157

**Основными функциями гортани являются:**

защитная, дыхательная, голосообразовательная

рефлекторная, речевая, дыхательная

выдыхательная, защитная, речеобразовательная

дыхательная, пищеводная, рефлекторная

голосообразовательная, дыхательная

#158

**Физиологическая крепитация гортани обусловлена:**

сокращением мышц гортани

движением в суставах гортани и трением ее о позвоночник

сокращением истинных голосовых складок

движением воздуха в просвете гортани

размером гортани

#159

**При ларингоскопии слизистая оболочка при отеке гортани:**

гиперемирована

бледная

розовая

синюшная

красная

#160

**В период мутации голоса рекомендуется:**

прием гормонов

голосовой покой

занятия у педагога по вокалу

занятия у логопеда

пение на другой октаве

#161

**Под истинным крупом понимают:**

дифтерию гортани

гортанную ангину

подскладочный ларингит

флегмонозный ларингит

ларинготрахеобронхит

#162

**Ложный круп – это:**

острое воспаление подголосового отдела гортани

абсцесс черпало-надгортанной складки

острое воспаление надгортанника

дифтерия гортани

острый катаральный ларингит

#163

**Приступ затрудненного дыхания у ребенка с ложным крупом обычно длится:**

несколько минут

около 30 минут

10 минут

более 0,5 часа

около часа

#164

**При гортанной ангине воспаляется:**

слизистая оболочка

соединительная рыхлая ткань

надхрящница

надхрящница и хрящ

лимфоидная ткань

#165

**Изолированный эпиглотит наблюдается при:**

гриппозной инфекции

парагриппозной инфекции  
респираторно-синцитиальной инфекции  
ОРЗ  
аденовирусной инфекции

#166

**Флегмонозный ларингит является следствием:**

острого катарального ларингита  
подслизистого ларингита  
аллергического отека гортани  
эпиглотита  
живого инородного тела

#167

**Симптомы переднего медиастинита:**

пульсирующая боль за грудиной  
боль в межлопаточной области  
боль в эпигастральной области с иррадиацией в правое плечо  
отсутствие боли при поколачивании по груди  
осиплость голоса

#168

**Дифференциальная диагностика хронического гиперпластического ларингита проводится с:**

раком гортани  
отечно полипозным ларингитом  
туберкулезом носоглотки  
подскладочным ларингитом  
гортанной ангиной

#169

**Формирование хронического ларингита у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью вызвано:**

постоянным забросом кислого желудочного содержимого на слизистую оболочку гортани

раздражением гортани острой и кислой пищей

тем, что пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью громко разговаривают, отрицательно воздействуя таким образом на голосовые связки

прием холодных напитков

язвенная болезнь желудка

#170

**Симптомокомплекс: тусклая слизистая оболочка голосовых складок, возможно наличие вязкой мокроты, гипотонии голосовых складок и несмыкания их при фонации, наблюдается при ларингите:**

гипертрофическом

полипозном

катаральном

атрофическом

гортаной ангине

#171

**В качестве метода диагностики ограниченных форм хронического ларингита используется:**

КТ гортани

спирометрия

видеоларингостробоскопия

ультразвуковое исследование гортани

MPT гортани

#172

**Чаще узелки голосовых складок образуются в:**



передней трети голосовых складок

задней трети голосовых складок

средней трети голосовых складок

в верхней трети голосовых складок

в нижней трети голосовых складок

#173

**В большинстве случаев при аллергическом стенозе гортани 2 стадии применяется:**

трахеостомия

коникотомия

интубация трахеи

медикаментозное дестенозирование

ингаляция

#174

**Операцией выбора при остром стенозе гортани вне лечебного учреждения является:**

трахеотомия

микротрахеотомия

коникотомия

трахеостомия

интубация

#175

**Вариант трахеостомии избирается хирургом в зависимости от:**

уровня стеноза гортани

расположения щитовидной железы

причины стеноза гортани

квалификации врача

неэффективности консервативного лечения

#176

**Коникотомия показана:**

в стадии декомпенсации стеноза гортани

в стадии компенсации стеноза гортани

в стадии асфиксии стеноза гортани

в стадии субкомпенсации стеноза гортани

при гортанной ангине

#177

**Показанием к экстренной трахеостомии является:**

длительная ИВЛ с назо- или оротрахеальной интубацией

стеноз гортани III степени

стеноз гортани II степени

инородное тело трахеи

хронический бронхит

#178

**При трахеостомии:**

рассекаются полукольца трахеи

рассекается перстневидный хрящ

рассекается коническая связка гортани

рассекаются полукольца трахеи, трахея подшивается к коже

рассекают гортань

#179

**Средняя трахеотомия выполняется:**

рассечением трахеи выше перешейка щитовидной железы

в области первого кольца трахеи

рассечением трахеи ниже перешейка щитовидной железы

через перешеек щитовидной железы

в области второго кольца трахеи

#180

**Тяжесть заболевания при одностороннем параличе гортани обусловлена:**

не смыканием голосовой щели

срединным положением голосовых складок, приводящим к стенозу гортани

стенозом гортани

«лающим» кашлем

отсутствием клинических проявлений

#181

**Кортикальные параличи гортани всегда:**

двухсторонние

односторонние

правосторонние

левосторонние

нет правильного ответа

#182

**Наиболее частые причины периферического паралича гортани:**

острый кандидозный ларингит

злокачественная патология щитовидной железы

склерома гортани

медицинская хирургическая травма носоглотки

сифилис гортани

#183

**Расстройство двигательной функции одной или обеих половин гортани в виде полного отсутствия произвольных движений вследствие нарушения иннервации соответствующих мышц - это:**

дисфония

афония

фоностения

истерия

паралич

#184

**Основные жалобы при одностороннем параличе гортани:**

отсутствие охриплости

стеноз

попёрхивание, боль и ощущение инородного тела на поражённой стороне

отсутствие одышки, усиливающаяся при голосовой нагрузке

повышение температуры

#185

**При попадании инородного тела между голосовыми складками голос:**

не изменится

станет резко осиплым

станет звонче и четче

будет отсутствовать полностью

незначительно изменится

#186

**Жалобы, характерные для больных с ожогами гортани:**

боли в гортани, жжение, изменение голоса

кровотечение

нарушение носового дыхания

изжога

влажный кашель

#187

**Наиболее достоверным признаком проникающего ранения гортани и трахеи является:**

приступообразный кашель

затрудненное дыхание

боль в проекции гортани и трахеи

подкожная эмфизема шеи

нарушение глотания

#188

**Дети с инородным телом гортани и трахеи:**

являются транспортабельными

не являются транспортабельными

являются транспортабельными в сопровождении родителей

являются транспортабельными в сопровождении медицинской патронажной сестры

не нуждаются в оказании помощи

#189

**Из живых инородных тел дыхательных путей чаще встречается:**

пиявка

комнатная муха

комар

оса

таракан

#190

**Основным в лечении ларингоцеле гортани является применение:**

паровых ингаляций

хирургическое удаление

отказ от курения

противовирусная терапия

антибиотикотерапия

#191

**Этиологическим фактором папилломатоза гортани является:**

вирус папилломы человека

вирус герпеса человека

бактерии

грибы

микоплазмы

#192

**При смещении опухоли гортани на ножке и ущемлении в области голосовой щели развивается:**

болевого синдром

асфиксия

кровотечение

дисфагия

дискомфорт

#193

**Предоперационная подготовка перед удалением ангиофибromы - это:**

эндоваскулярная окклюзия питающих опухоль сосудов

местная глюкокортикостероидная терапия

курс физиолечения

системная антибактериальная терапия сроком 14 дней

трахеотомия

#194

**Основной клинический признак папилломатоза гортани:**

нарушение глотания

охриплость голоса и нарушения дыхания

боль в горле при фонации

боль в горле при дыхании и фонации

одышка

#195

**«Золотой стандарт» диагностики ювенильного папилломатоза гортани:**

непрямая ларингоскопия

КТ, МРТ

радиоизотопное исследование

эндоскопия дыхательных путей, прямая микроларингоскопия

рентгенография

#196

**Воздушная киста гортани возникает чаще всего в:**

грушевидных синусах

надгортаннике

подскладочном пространстве

гортанных желудочках

в надгортаннике

#197

**В классификации рака гортани выделяют стадии:**

3

2

4

5

1

#198

**Среди злокачественных новообразований гортани лидирует:**

базальноклеточная форма рака

железистая форма рака

плоскоклеточная форма рака

лимфома

саркома

#199

**Три стадии в развитии туберкулезного процесса в верхних дыхательных путях - это:**

образование инфильтрата, формирование язвы, поражение хрящей

формирование язвы, поражение хрящей, атрофия хрящей

поражение хрящей, атрофия хрящей, хондропериходрит хрящей трахей

формирование эрозии, атрофии, язвы

ларингоспазм

#200

**Укажите части наружного носа:**

корень носа

спинка носа

верхушка носа

колумелла

ноздри



#201

**Укажите хрящи наружного носа:**

большие хрящи крыльев носа

латеральные

сесамовидные

антральные

хоанальные

#202

**Остиомеатальный комплекс образован:**

решётчатой буллой

крючковидным отростком

валлекулой

нижней носовой раковиной

твёрдым небом

#203

**В образовании перегородки носа участвуют:**

бумажная пластинка решётчатой кости

сошник

четырёхугольный хрящ

носовой отросток верхней челюсти

носовая кость

#204

**В средний носовой ход открываются выводные отверстия пазух:**

лобной

решетчатой

гайморовой

клыковидной

крестовидной

#205

**В полости носа имеются носовые раковины:**

верхняя

нижняя

средняя

медиальная

латеральная

#206

**Какие анатомические структуры полости носа образуют мукоциллиарную транспортную систему:**

мерцательный эпителий

бокаловидные клетки

слизистые железы

обонятельные клетки

звездчатые клетки

#207

**Дно верхнечелюстной пазухи граничит с корнями зубов:**

премоляры

моляры

зуб мудрости

клыки

резцы

#208

**С какими черепными ямками граничит клиновидная пазуха:**

передней

средней

задней

боковой

медиальной

#209

**Нос выполняет следующие функции:**

дыхательную

обонятельную

резонаторную

кровообразующую

глотательную

#210

**В секрете носа содержатся следующие факторы защитных механизмов:**

лизоцим

комплемент

интерферон

виферон

анаферон

#211

**Функции околоносовых пазух:**

резонаторная

защитная

облегчение веса черепа

слезопроводящая

пищеварительная

#212

**Риноскопию проводят с помощью:**

носового зеркала

эндоскопа

отоскопа

гортанного зеркала

иглы Куликовского

#213

**Рентгенологические укладки, применяемые при исследовании околоносовых пазух:**

носо-лобная проекция

носо-подбородочная проекция

аксиальная проекция

подбородочно-горизонтальная проекция

лобно-подбородочная проекция

#214

**Осложнением фурункула носа являются:**

тромбофлебит вен лица

тромбоз кавернозного синуса

диплопия

гайморит

синусит

#215

**В комплекс терапии фурункула носа входят:**

антибиотики

вскрытие абсцесса

антидепрессанты

иглотерапия

компресс

#216

**Симптомы, характерный для искривления носовой перегородки:**

затруднение носового дыхания

сухость в горле

храп

кокасмия

постоянные носовые кровотечения

#217

**Длительное отсутствие носового дыхания у детей приводит к:**

нарушению роста и развития зубных рядов

нарушению роста и развития скелета грудной клетки

частым воспалительным процессам в нижних дыхательных путях

развитию внутричерепных осложнений

нарушению роста и развития костей носа

#218

**Какие виды оперативных вмешательств выполняются при деформации перегородки носа:**

кристотомия

септопластика

резекция перегородки

ампутация

экстерпация

#219

**Какие формы деформации носовой перегородки различают:**

гребень

шип

S-образная

круговая

воронкообразная

#220

**Причинами носового кровотечения могут быть:**

гипертония

цирроз печени

юношеская ангиофиброма

вазомоторный ринит

эндокринные нарушения

#221

**Симптомы носового кровотечения средней тяжести:**

тахикардия

низкое АД

брадикардия

высокое АД

мидриаз

#222

**Для оценки объема потерянной крови при носовом кровотечении учитывают следующие данные:**

артериальное давление

содержание гемоглобина в крови

гематокрит

резус-фактор

пол

#223

**Перечислите методы, применяемые для остановки носового кровотечения из «области Киссельбаха»:**

прижигание 40% ляписом

ватный тампон с перекисью водорода

отслойка слизистой оболочки

задняя тампонада

физиотерапия

#224

**Переднюю тампонаду при носовых кровотечениях выполняют используя:**

марлевую полоску

синус-катетер «Ямик»

сигарообразный тампон

марлевые шарики

ватный тампон

#225

**Стадиями клинического течения острого насморка являются:**

стадия сухого раздражения

стадия серозных выделений

стадия слизисто-гнойных выделений

продуктивная стадия

стадия геморрагических выделений

#226

**Осложнениями острого насморка могут быть:**

синусит

острый средний отит

евстахеит

острый наружный отит

перихондрит

#227

**Различают следующие формы хронических ринитов:**

катаральный

гипертрофический

атрофический

гнойный

серозный

#228

**Полухирургические методы лечения хронического гипертрофического ринита:**

метод лазерной коагуляции раковин

метод ультразвуковой дезинтеграции

криодеструкция

конхотомия

конхэктомия

#229

**При атрофическом рините назначают:**

витаминотерапию

щелочно-масляные ингаляции

препараты железа



щелочные ингаляции

деконгистанты

#230

**Характерными признаками озоны являются:**

поражение лиц женского пола

аносмия

зловонные корки в носу

гипертрофия слизистой оболочки носа

водянистая ринорея

#231

**Формами аллергического ринита являются:**

постоянная

сезонная

вазомоторная

катаральная

ремитирующая

#232

**Аллергический насморк вызывают следующие аллергены:**

домашняя пыль

пищевые продукты

медикаменты

пластик

вода

#233

**Для триады аллергического ринита характерно:**

затруднение носового дыхания

жидкие выделения из носа

пароксизмальное чихание

нистагм

сукровичные выделения

#234

**Аллергический ринит сочетается с:**

секреторной эозинофилией

атопическим дерматитом

бронхиальной астмой

гипокальциемией

шизофренией

#235

**Базисные методы лечения аллергического ринита:**

специфическая иммунотерапия

топические кортикостероиды

иглотерапия

ультразвуковой фонофорез

сосудосуживающие капли

#236

**Перечислите симптомы, характерные для острого гайморита:**

затруднение носового дыхания

слизисто-гнойные выделения из носа

боли в области передней стенки верхнечелюстной пазухи

снижение пневматизации лобных пазух на рентгенограмме

гнойное отделяемое в верхнем носовом ходе

#237

**Носовая инфекция проникает в орбиту:**

по кровеносным сосудам

через нервные оболочки

контактным путем

по фасциям

комплементарно

#238

**Распространение воспалительного процесса из клиновидной пазухи возможно в:**

глазницу

полость черепа

глотку

гортань

средостение

#239

**Что относится к орбитальным осложнениям, наблюдаемым при воспалении околоносовых пазух:**

абсцесс века

флегмона орбиты

периостит орбиты

этмоидит

орхит

#240

**Какие из указанных симптомов характерны для риногенных орбитальных осложнений:**

реактивный отек века

экзофтальм

хемоз

амблиопия

астигматизм

#241

**Хирургическое лечение острых синуситов применяется при:**

угрозе возникновению внутриглазных осложнений

угрозе возникновению внутричерепных осложнений

при отсутствии эффекта от консервативного лечения

никогда

во всех случаях заболевания

#242

**Методы исследования при остром или хроническом синусите:**

компьютерная томография носа и придаточных пазух

эндоскопическое обследование полости носа

передняя ларингоскопия

стробоскопия

аудиометрия

#243

**Какие пути распространения инфекции при риногенном менингите встречаются:**

контактный

гематогенный

преформированный

тубогенный

калориферный

#244

**Укажите симптомы, характерные для риногенного тромбоза кавернозного синуса:**

нарушение функции отводящего нерва

нарушение функции блокового нерва

нарушение функции глазодвигательного нерва

нарушение функции лицевого нерва

нарушение функции возвратного нерва

#245

**Осложнениями синуситов могут быть:**

базальный арахноидит

тромбоз кавернозного синуса

ретробульбарный неврит

«холодный» абсцесс глотки

тремор

#246

**Назовите лечебные мероприятия, которые должны быть выполнены у больного с открытой травмой ЛОР–органов:**

первичная хирургическая обработка раны

противостолбнячная сыворотка

антибиотикотерапия

физиотерапия

отвлекающая терапия

#247

**Для диагностики инородных тел полости носа применяют:**

передняя риноскопия

задняя риноскопия

эндоскопия полости носа

риноманометрия

диафаноскопия

#248

**Укажите симптомы нахождения инородного тела полости носа:**

одностороннее нарушение носового дыхания

односторонний насморк

гиперемия кожи наружного носа

открытая гнусавость

инфильтрация кожи наружного носа

#249

**Симптомами злокачественной опухоли полости носа могут быть:**

затруднение носового дыхания

гнусавость

геморрагическое отделяемое из носа

затруднение глотания

нистагм

#250

**Из каких отделов состоит орган слуха:**

из наружного уха

из среднего уха

из внутреннего уха

из внешнего уха

из мочки

#251

**Из чего состоит наружное ухо:**

ушная раковина

наружный слуховой проход

внутренний слуховой проход

улитка

перешеек

#252

**Какие мышцы имеются в барабанной полости:**

стременная мышца

мышца, натягивающая барабанную перепонку

отводящая мышца

приводящая мышца

двубрюшная мышца

#253

**Какие косточки имеются в барабанной полости:**

молоточек

наковальня

стремечко

ладья

козелок

#254

**Укажите типы строения сосцевидного отростка:**

диплоэтический

пневматический

склеротический

склерозированный

недоразвитый

#255

**Какие части внутреннего уха относятся к вестибулярному анализатору:**

преддверие

полукружные каналы

улитка

антрум

аттик

#256

**Какие части внутреннего уха относятся к вестибулярному анализатору:**

преддверие

полукружные каналы

орган Корти

эпитимпанум

промонториум

#257

**Какие жидкости имеются во внутреннем ухе:**

перилимфа

эндолимфа

лимфома

плазма

транссудат

#258

**Какие виды рецепторов имеет вестибулярный анализатор:**

отолитовые рецепторы



ампулярные рецепторы

офтальморецепторы

тактильные рецепторы

кохлеарные рецепторы

#259

**Укажите методы продувания слуховых труб:**

метод Вальсальвы

метод Политцера

метод Тойнби

метод Мура

метод Симановского

#260

**Возникновению воспалительных заболеваний наружного уха способствуют факторы:**

узость слухового прохода

наличие в слуховом проходе волосяных фолликулов

слабо выраженная подкожно-жировая клетчатка

наличие перешейка

высота слухового прохода

#261

**При рожистом воспалении уха кожа в области поражения:**

резко гиперемирована

значительно инфильтрирована

ограничена воспалительным валом от здоровой кожи

цианотична

с белыми пятнами

#262

**При появлении флюктуации при перихондрите ушной раковины следует провести действия:**

произвести широкий разрез тканей

выскаблить ложкой область абсцесса и удалить некротизированные ткани

дренировать вскрытую полость

не вскрывать абсцесс

провести УВЧ – терапию

#263

**Какие типы тугоухости различают:**

кондуктивная

смешанная

нейросенсорная

компенсированная

латентная

#264

**Основные симптомы при отомикозе:**

зуд в слуховом проходе, общее состояние страдает мало

снижение слуха на больное ухо

бело-серое крошковидное отделяемое из уха

гектическая температурная реакция

частое головокружение

#265

**Укажите препараты с проиовгрибковым действием:**

нистатин

леворин

амфотерицин

канамицин  
офлоксацин

#266

**Пути проникновения инфекции в среднее ухо:**

тубогенный  
гематогенный  
травматический  
контактный  
трансорбитальный

#267

**Пути проникновения инфекции в среднее ухо:**

тубогенный  
гематогенный  
травматический  
контактный  
преформированный

#268

**Какие стадии острого гнойного среднего отита выделяют:**

доперфоративная  
перфоративная  
репаративная  
сухая  
абсцедирования

#269

**Укажите симптомы, характерные для доперфоративной стадии острого гнойного среднего отита:**

боль в ухе

повышение температуры

снижение слуха

ригидность затылочных мышц

пульсирующий рефлекс

#270

**Парацентез барабанной перепонки – это (выберите описания):**

рассечение барабанной перепонки

разрез барабанной перепонки

удаление барабанной перепонки

образование стойкого отверстия на барабанной перепонке

пункция барабанной перепонки

#271

**Причинами частых острых средних отитов у детей являются:**

анатомические особенности уха

наличие эмбриональной ткани в барабанной полости

слабость иммунитета

размер ушной раковины

вес ребенка

#272

**Какие формы мастоидита встречаются:**

зигоматицит

петрозит

сквамнит

периодонтит

этмоидит

#273

**Какие формы мастоидита встречаются:**

мастоидит Бецольда

мастоидит Орлеанского

мастоидит Муре

мастоидит Симановского

мастоидит Преображенского

#274

**Какие признаки присущи острому мастоидиту:**

нависание задне-верхней стенки в костном отделе слухового прохода

сглаженность заушной складки

оттопыренность ушной раковины

крошковидные выделения в слуховом проходе

экзостозы слухового прохода

#275

**Триада Градениго при петрозите включает:**

неврит тройничного нерва

парез отводящего нерва

острый средний отит с гноетечением

боль при жевании

припухлость в заушной области

#276

**Какие формы хронического гнойного среднего отита различают:**

мезотимпанит

эпитимпанит

мезоэпитимпанит

тотальный тимпанит

субтотальный тимпанит

#277

**В каких этажах барабанной полости локализуется патологический процесс при хроническом мезотимпаните:**

среднем

нижнем

верхнем

верхнем и среднем

во всех этажах

#278

**Местные осложнения при хроническом гнойном среднем отите:**

полипы

грануляции

холестеатома

менингит

сквамит

#279

**Холестеатома состоит из следующих компонентов:**

костный детрит

микробные тела

кристаллы холестерина

лизоцима

тромбоцитов

#280

**При радикальной операции уха объединяют в общую полость:**

барабанную полость

антрум

наружный слуховой проход

улитку

ушную раковину

#281

**Какие признаки присущи эптитимпаниту:**

перфорация в ненатянутой части барабанной перепонки

гнойное отделяемое с гнилостным запахом

тугоухость

стойкая центральная перфорация

боль при оттягивании ушной раковины

#282

**Для образования новой барабанной перепонки используют:**

стенку вены

фасцию височной мышцы

твёрдую мозговую оболочку

эпидермис

конъюнктиву

#283

**Пути распространения инфекции в полость черепа из среднего и внутреннего уха:**

контактный

гематогенный

преформированный

восходящий

одонтогенный

#284

**Менингеальные симптомы при отогенных внутричерепных осложнениях следствие:**

отека мозговых оболочек

раздражения мозговых оболочек

ущемления ствола мозга

обширных деструктивных изменений костных стенок барабанной полости

воспаление вещества мозга

#285

**Укажите отогенные внутричерепные осложнения:**

менингит

синус-тромбоз

абсцесс височной доли мозга

сквамит

петрозит

#286

**Какие симптомы присущи разлитому отогенному гнойному менингиту:**

интенсивная головная боль

тошнота

высокая температура

тризм жевательных мышц

симптом Гольцкнехта



#287

**При отогенном гнойном менингите фиксируются изменения спинно-мозговой жидкости:**

повышение давления

изменение прозрачности

увеличение нейтрофилов

увеличение сахара

уменьшение белка

#288

**Укажите стадии отогенного абсцесса мозга:**

начальная

латентная

явная

нулевая

завершающая

#289

**Укажите стадии отогенного абсцесса мозга:**

начальная

латентная

явная

первичная

резидуальная

#290

**Укажите виды афазии, которые встречаются при отогенном абсцессе височной доли мозга:**

амнестическая

сенсорная

моторная

иллюзорная

прецептивная

#291

**Назовите симптомы, характерные для тромбоза сигмовидного синуса:**

Гризингера

Фосса

Уайтинга

Зака

Гизе

#292

**Для адгезивного среднего отита характерно:**

втяжение барабанной перепонки

рубцы на барабанной перепонке

тотальная перфорация барабанной перепонки

серозное отделяемое в слуховом проходе

полипы в барабанной полости

#293

**Укажите два типичных отоскопических признака отосклероза:**

нормальный вид барабанной перепонки

истончение барабанной перепонки

перфорация барабанной перепонки в ненатянутой части

наличие петрификатов на барабанной перепонке

утолщение барабанной перепонки

#294

**Причинами глухоты у ребенка в период внутриутробного развития могут быть:**

инфекция

интоксикация

генетические заболевания

неправильное положение плода

предлежание плаценты

#295

**Антибиотики, обладающие ототоксическим эффектом:**

стрептомицин

гентамицин

неомицин

пенициллин

амоксиклав

#296

**По течению различают формы нейросенсорной тугоухости:**

внезапная

острая

хроническая

лонгитудная

подострая

#297

**Болезнь Меньера характеризуется классической триадой:**

приступы системного головокружения

прогрессирующим снижением слуха на одно ухо

шумом в этом же ухе

ринорея

пульсирующие боли в ухе

#298

**По механизму развития встречаются следующие формы лабиринтитов:**

тимпаногенные

менингогенные

гематогенные

лимфогенные

неврогенные

#299

**Какие методы удаления инородного тела из наружного слухового прохода применяют:**

промывание

удаление пинцетом

удаление крючком

транстимпанальное нагнетание

выдувание

#300

**Глотка состоит из следующих слоев:**

слизистый

мышечный

соединительнотканый

сосудистый

хрящевой

#301

**Какие отделы различают в глотке:**

носоглотка

ротоглотка

гортаноглотка

ретроглотка

гипоглотка

#302

**В ротоглотке есть небные дужки:**

нёбно-язычные

нёбно-глочные

язычно-глочные

глочно-язычные

нёбные

#303

**Глотка является частью трактов:**

дыхательного

пищеварительного

кроветворного

мочевового

генитального

#304

**Какие миндалины глотки являются парными:**

небная

трубная

глочная

язычная

кишечная

#305

**Какие миндалины, расположенные в носоглотке:**

глоточная

трубные

небные

язычная

гортанная

#306

**Какие миндалины расположены в ротоглотке:**

первая

вторая

третья

четвертая

пятая

#307

**Укажите углубления, локализующиеся в гортаноглотке:**

грушевидные синусы

валлекулы

гортанные желудочки

сигмовидные синусы

морганиевы желудочки

#308

**Какие крупные артериальные сосуды расположен вблизи небной миндалины:**

внутренняя сонная

наружная сонная

общая сонная артерия

щитовидная верхняя

вертебральная артерия

#309

**Какие физиологические сужения имеются в пищеводе:**

первое

второе

третье

четвертое

пятое

#310

**Стенка пищевода имеет следующие слои:**

слизистая оболочка

мышечная оболочка

соединительнотканная оболочка

жировая оболочка

фолликулярная оболочка

#311

**Физиологическими функциями глотки являются:**

дыхательная

защитная

глотательная

выделительная

ферментативная

#312

**В защитной функции глотки участвуют:**

секреторные иммуноглобулины

макрофаги

В-лимфоциты

тромбоциты

фолликулиты

#313

**Глоточные устья слуховой трубы открываются в момент:**

глотания

зевания

вдоха

выдоха

вдоха и выдоха

#314

**К методам исследования глотки относятся:**

эпифарингоскопия

мезофарингоскопия

пальцевое исследование носоглотки

сальпингоскопия

трахеобронхоскопия

#315

**Укажите какие пробы для исследования проходимости слуховых труб существуют:**

Вальсальва

Тойнби

Политцера

Пальчуна

Симановского



#316

**Для осмотра носоглотки применяют инструменты:**

шпатель

носоглоточное зеркало

гортанное зеркало

марлевую салфетку

зеркало Киллиана

#317

**Для осмотра ротоглотки применяют инструменты:**

марлевую салфетку

гортанное зеркало

носоглоточное зеркало

шпатель

зеркало Киллиана

#318

**Для острого фарингита характерно:**

нормальная или невысокая температура

гиперемия задней стенки глотки

лихорадка

снимаемые желто-белые налеты на миндалинах

бледность слизистой оболочки

#319

**Формы хронического фарингита:**

катаральная форма

гипертрофическая

атрофическая форма

неротическая форма

боковая форма

#320

**Для гипертрофического фарингита характерно:**

гипертрофия слизистой оболочки задней стенки глотки

гипертрофия слизистой оболочки боковых валиков

гипертрофия небных миндалин

истончение слизистой оболочки задней стенки глотки

сухость слизистой оболочки задней стенки глотки

#321

**Выделите характерные признаки для атрофического фарингита:**

сухость в горле

вязкая, трудно отделяемая слизь в горле

истончение слизистой глотки

желтые налеты на миндалинах

пятна Воячека

#322

**Наличие патологических ощущений со стороны горла (чувство инородного тела, першение, болезненность и др.) является показанием для обследования у:**

невропатолога

гастроэнтеролога

гинеколога

нутрициолога

иммунолога

#323

**Для лечения острого фарингита применяют:**

орошение глотки ингалиптом

щелочное полоскание глотки

полоскание глотки настоями трав

сосудосуживающие капли

кортикостероидные гормоны

#324

**Виды первичных кокковых ангин:**

катаральная

лакунарная

фолликулярная

язвенно-пленчатая

некротическая

#325

**В каких группах классификации ангин по Б.С. Преображенскому встречаются смешанные формы:**

банальные ангины

атипичные ангины

ангины при инфекционных заболеваниях

ангины при заболеваниях крови

во всех группах

#326

**Какие признаки присущи катаральной ангине:**

боль в горле при глотании

гиперемия небных миндалин

выраженная гипертермия

гнойные выделения на задней стенке глотки

охриплость голоса

#327

**Какие признаки присущи фолликулярной ангине:**

боль в горле

на поверхности миндалин видны желтовато-белые точки

выраженная интоксикация

грязно-серые налеты на небных миндалинах

охриплость голоса

#328

**Антибактериальными препаратами первой линии для лечения ангины, вызванной β-гемолитическим стрептококком группы А, являются:**

амоксциллин

амоксиклав

аугментин

тетрациклин

эреспал

#329

**Возбудителями ангины Симановского-Плаута-Венсана являются:**

спирохета

веретенообразная палочка

дрожжеподобные грибы

бледная трепонема

кокки

#330

**Ангиной могут сопровождаться следующие инфекционные заболевания:**

корь

дифтерия

скарлатина

эпидемический паротит

коклюш

#331

**Для дифтерии характерны следующие симптомы:**

налеты на миндалинах

налеты на небных дужках

налеты на языке

отсутствие налета

кратерообразные язвы

#332

**Что относится к группе ангин при заболеваниях крови:**

моноцитарная ангина

агранулоцитарная ангина

ангина при лейкозах

ангина при ВИЧ-инфекции

тромбоцитопеническая пурпура

#333

**При каких заболеваниях крови наблюдается вторичная ангина:**

агранулоцитоз

лейкоз

моноцитоз

капилляротоксикоз

тромбоз

#334

**Клиническая картина инфекционного мононуклеоза характеризуется симптомами:**

отеком, гиперемией слизистой оболочки миндалин и задней стенки глотки

грязно-серыми налетами на слизистой оболочке глотки

гепатолиенальным синдромом

анемией

кашлем

#335

**Для агранулоцитарной ангины характерны симптомы:**

некрозы и глубокие язвы на небных миндалинах и других отделах глотки

отсутствие гранулоцитов с резкой лейкопенией

увеличение гранулоцитов с уменьшением эозинофилов

жёлтые налёты на небных миндалинах

увеличение гранулоцитов с лейкоцием

#336

**Острый паратонзиллит проходит следующие стадии:**

отечная

инфильтративная

абсцедирования

катаральная

некротическая

#337

**При паратонзиллярном абсцессе применяются:**

вскрытие абсцесса

абсцесстонзиллэктомия

пункция абсцесса, полоскание горла

антибиотики, пункция

антибиотики, гипосенсибилизирующие и противоотечные препараты

#338

**Какую процедуру необходимо выполнить больному на второй день после вскрытия паратонзиллярного абсцесса:**

разведение краев разреза

промывание полости абсцесса

орошение глотки антибиотиками

повторное вскрытие абсцесса

пункция абсцесса

#339

**Какие формы хронического тонзиллита по И.Б. Солдатову различают:**

компенсированная

декомпенсированная

субкомпенсированная

токсико – аллергическая

простая

#340

**При хроническом тонзиллите встречаются местные признаки:**

Преображенского

Гизе

Зака

Волкова

Симановского

#341

**Для хронического тонзиллита характерны следующие признаки:**

гиперемия краёв дужек

инфильтрация дужек

рубцовая деформация лакун

утолщение язычка

утолщение мягкого неба

#342

**К тонзиллогенным заболеваниям относятся:**

ревматический полиартрит

миокардит

нефрит

пневмония

мочекаменная болезнь

#343

**Какие консервативные методы лечения хронического тонзиллита применяются:**

промывание лакун

физиотерапия

гальванокаустика

бальнеотерапия

ингаляции

#344

**Какие степени увеличения глоточной миндалины существуют:**

I степень

II степень



III степень

IV степень

V степень

#345

**В симптомокомплекс «аденоидное выражение лица» включают:**

сглаженность носогубных складок

готическое небо

безжизненное выражение лица

сужение глазных щелей

расширенная спинка носа

#346

**При аденоидах часто наблюдаются средние отиты вследствие нарушения:**

барьерной функции слуховой трубы

вентиляционной функции слуховой трубы

дренажной функции слуховой трубы

глотания

зевания

#347

**Для удаления инородных тел глотки используют:**

пинцет

зажим

шпатель

зонд

носовое зеркало

#348

**Причинными факторами инородных тел пищевода являются:**

поспешность в еде

действие алкоголя

суицид

кифосколиоз позвоночника

пряная пища

#349

**Какие симптомы присущи ювенильной ангиофибrome:**

рецидивирование после удаления

неудержимый рост

проникновение в соседние анатомические образования

развитие регионарных метастазов

развитие отдаленных метастазов

#350

**Выступ на передней поверхности шеи называется:**

адамово яблоко

кадык

антрум

яблоко раздора

карина

#351

**Отделы гортани:**

голосовая область

подголосовая область

преддверие

аттик

щитовидная область

#352

**Многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием покрыты следующие отделы гортани:**

морганьевы желудочки

основание надгортанника

вестибулярные складки

край надгортанника

голосовые складки

#353

**Непарные хрящи гортани:**

рожковидные

клиновидные

черпаловидные

перстневидные

щитовидные

#354

**Парные хрящи гортани:**

клиновидный

рожковидный

перстневидный

надгортанный

щитовидный

#355

**Перстневидный хрящ состоит из:**

печатки

дуги

основания

обруча

лепестка

#356

**Укажите отростки черпаловидного хряща:**

голосовой

мышечный

короткий

длинный

подголосовой

#357

**Какие хрящи по гистологическому строению встречаются в гортани:**

гиалиновые

эластичные

фиброзные

склерозные

гумозные

#358

**Суставы гортани:**

перстнечерпаловидный

перстнещитовидный

щитонадгортанный

перстнеподъязычный

крючковидный

#359

**У детей отмечаются следующие особенности гортани:**

высокое стояние гортани

не выраженность рефлексогенных зон

наличие рыхлой клетчатки

низкое стояние гортани

плотные хрящи

#360

**С гортанью граничат:**

общая сонная артерия

внутренняя яремная вена

блуждающий нерв

аорта

диафрагма

#361

**Преддверие гортани образовано:**

валекулами

надгортанником

черпалонадгортанной складкой

голосовыми складками

корень языка

#362

**Укажите месторасположение рефлексогенных зон гортани:**

гортанная поверхность надгортанника

слизистая оболочка голосовых связок

желудочки гортани

валлекулы

подголосовая полость

#363

**Внутренние мышцы гортани делятся на группы:**

суживающие голосовую щель

расширяющие голосовую щель

натягивающие голосовые складки

поддерживающие голосовую щель

поднимающие гортань

#364

**Кровоснабжение гортани осуществляется посредством:**

верхнегортанной артерии

среднегортанной артерии

нижнегортанной артерии

внутренней гортанной артерии

задней гортанной артерии

#365

**Укажите основные функции гортани:**

дыхательная

голосοобразовательная

защитная

пищепроводная

обонятельная

#366

**Защитная функция гортани проявляется в:**

движении гортани вверх под корень языка

движении надгортанника кзади, прикрывающее вход в гортань

рефлекторном кашле

движении гортани вниз от корня языка

движении гортани вперед от корня языка

#367

**Общепризнанными являются следующие теории фонации:**

миоэластическая теория Феррейна

нейрохронаксическая теория Юссона

мукоондулярная теория Перелло

резонансная теория Гельмгольца

теория функциональных систем Анохина

#368

**При фонации в головном регистре форма фонационной щели у взрослого здорового человека:**

тонкая линейная

отсутствует – плотное смыкание голосовых складок

треугольная по всей длине

овальная

в форме песочных часов

#369

**Дыхательные пути защищены от аспирации во время глотания рефлекторными механизмами:**

движением гортани вверх и наклоном её вперед

аддукцией голосовых складок

координацией выдоха

рефлексом корня языка

першением

#370

**Методы исследования гортани:**

непрямая ларингоскопия

прямая ларингоскопия

стробоскопия

импедансометрия

фарингоскопия

#371

**Укажите при помощи чего производится непрямая ларингоскопия:**

гортанное зеркало

марлевая салфетка

ларингоскоп

шпатель

стробоскоп

#372

**У детей раннего возраста гортань можно осмотреть путем:**

прямой ларингоскопии

фибрларингоскопии

ультразвукового сканирования

гипофарингоскопии гортанным зеркалом

непрямой ларингоскопии

#373

**При эндоскопическом исследовании гортани оценивают:**

цвет слизистой оболочки



форму голосовой щели во время фонации и дыхания

тонус голосовых складок

размер межчерпаловидного пространства

глубина межчерпаловидного пространства

#374

**При стробоскопии в картине неподвижного изображения выделяют следующие фазы фонации:**

открытия

закрытия

контакта

удаления

приближения

#375

**При стробоскопии в картине движения оценивают следующие показатели:**

амплитуду колебаний

частоту колебаний

наличие или отсутствие невибрирующих частей голосовых складок

фаза фонации открытия

фаза фонации закрытия

#376

**Укажите причины острого ларингита:**

перенапряжение голосовых складок

ОРЗ

переохлаждение

фарингит

отит

#377

**Укажите жалобы, характерные при остром катаральном ларингите:**

осиплость

кашель

неприятное ощущение в горле

кровохарканье

нарушение глотания

#378

**Что входит в методику лечения острого ларингита:**

вливание лекарств в гортань

ингаляции

противоотечная терапия

криовоздействие

вокализ

#379

**Аллергическому отеку гортани характерны следующие признаки:**

затрудненное дыхание

стекловидный отек

отсутствие повышения  $t_0$  тела

боли в гортани

боли за грудиной

#380

**Укажите изменения в гортани при остром подскладочном ларингите:**

гиперемия слизистой оболочки

появление валиков в подголосовой области гортани

появление грязно-серого налета на слизистой оболочке гортани

появление гнойного налета на слизистой оболочке гортани  
наличие воспалительного инфильтрата в области надгортанника

#381

**Дифтерия гортани включает следующие симптомы:**

стеноз

охриплость

высокая температура

валики в подголосовой щели

звучный голос

#382

**Укажите, какие заболевания относят к группе гнойных ларингитов:**

абсцесс гортани

флегмонозный ларингит

гортанная ангина

ложный круп

отек гортани

#383

**Формы хронического ларингита:**

атрофическая

катаральная

гипертрофическая

пленчатая

полипозная

#384

**Гиперпластический хронический ларингит бывает:**

гиперпластический ограниченный

гиперпластический диффузный

ограничено атрофический

разлитой флегмонозный

подскладочный

#385

**Какие формы хронического ограниченного гипертрофического ларингита встречаются:**

пахидермия

узелки «крикунов»

пролапс Морганиевых желудочков

фиброма гортани

надскладочный ларингит

#386

**Укажите ларингоскопические признаки присущие хроническому атрофическому ларингиту:**

истончение слизистой оболочки гортани

сухость слизистой оболочки гортани

густая слизь и корки на слизистой оболочке гортани

контактная язва на голосовой складке

стеноз

#387

**Укажите причины, приводящие к острому стенозу гортани:**

отек воспалительного происхождения

отек аллергического происхождения

опухоль гортани

хронический катаральный ларингит

стридор

#388

**Какие операции необходимо произвести при асфиксии:**

коникотомию

трахеотомию

ларинготомию

ларингоскопию

интубацию

#389

**Укажите кольца трахеи, рассекаемые при операции трахеотомия:**

2

3

4

5

1

#390

**Какие инструменты используются при неотложной трахеотомии:**

зажимы Кохера

скальпель

однозубый крючок

игла Куликовского

крючок Ланге

#391

**К причинам периферического паралича гортани относят следующие:**

патология щитовидной железы

медицинская травма

токсическое поражение

бульбарное поражение ядер

рак головного мозга

#392

**Основные жалобы при одностороннем параличе гортани:**

попёрхивание, ощущение инородного тела на поражённой стороне

охриплость различной степени тяжести

птоз

крипитация

сухой кашель

#393

**При инородных телах трахеи наблюдаются следующие симптомы:**

симптом баллотирования

приступообразный кашель

выраженный болевой синдром

наличие большого количества мокроты

развитие ателектаза легкого

#394

**Травмы гортани могут сопровождаться симптомами:**

диспноэ

дисфагией

дисфонией

дистонией

дистопией

#395

**Для папиллом гортани у взрослых характерны симптомы:**

медленно растут

чаще одиночные

чаще малигнизируют

чаще распространенные

чаще изъязвляются

#396

**Для папилломатоза гортани в детском возрасте характерны симптомы:**

хронический стеноз гортани

афония

кровоотечение

изжога

саливация

#397

**Назовите заболевания, относящиеся к предраковым заболеваниям гортани:**

фиброма голосовой складки на широком основании

гиперпластический ларингит

папилломатоз

туберкулёз

ВИЧ

#398

**Какие жалобы предъявляют больные с распространенным раком гортани:**

дисфония

затруднение дыхания

кровохаркание

нарушение обоняния

саливция

#399

**Для лечения рака гортани применяют следующие методы:**

хирургическое лечение

лучевую терапию

химиотерапию

гормонотерапию

витаминотерапию