

//Раздел 2: «Топография верхней конечности» (коды контролируемых компетенций - ИД1, ОПК5)

Переднюю границу подмышечной ямки составляет:

4

- {
- =дельтовидная мышца;
- =медиальная головка трёхглавой мышцы плеча;
- =большая грудная мышца;
- =малая грудная мышца;
- =длинная головка трёхглавой мышцы плеча;
- }

Заднюю границу подмышечной ямки составляет мышца:

- {
- =широчайшая и большая круглая;
- =малая круглая;
- =подлопаточная;
- =длинная головка трицепса;
- =подостная;
- }

Поддельтовидная клетчатка связана с подмышечной клетчаткой по ходу:

- {
- =подлопаточной артерии;
- =подмышечной артерии;
- =срединного нерва;
- =подмышечного нерва;
- =лучевого нерва;
- }

Подлопаточная клетчатка связана с подмышечной по ходу:

- {
- =подлопаточной артерии и вены;
- =подмышечной артерии;
- =лучевого нерва;
- =подмышечного нерва;
- =подключичной вены;
- }

Подмышечная клетчатка связана с клетчаткой подключичной области по ходу:

- {
- =задней артерии, огибающей плечевую кость;
- =передней артерии, огибающей плечевую кость;
- =срединного нерва;
- =подмышечной артерии;
- =лучевого нерва;

}

Поддельтовидная клетчаточное пространство содержит:

{

=подмышечный нерв;

=лучевой нерв;

=подлопаточную артерию;

=надлопаточную артерию;

=подмышечную артерию;

}

Подапоневротическая клетчатка пястья кисти заключена между:

{

=кожей и ладонным апоневрозом;

=ладонным апоневрозом и поверхностным сгибателем пальцев;

=поверхностным и глубоким сгибателями пальцев;

=глубоким сгибателем пальцев и глубокой ладонной фасцией;

=глубокой ладонной фасцией и межкостными мышцами;

}

Медиальную стенку подмышечной ямки составляют мышцы:

{

=большая и малая грудные;

=плечевая кость и клиновидная мышца;

=большая круглая, подлопаточная и широчайшая;

=передняя зубчатая;

=большая круглая;

}

Срединный нерв по отношению к плечевой артерии в средней трети плеча находится:

{

=сзади;

=спереди;

=латерально;

=медиально;

=ни один из вариантов;

}

Переломы плеча в средней трети чаще всего сопровождаются повреждением нерва:

{

=локтевого;

=лучевого;

=срединного;

=межреберно-плечевого;

=подмышечного;

}

Из латерального пучка плечевого сплетения образуется нерв:

- {
- =подмышечный;
- =кожно-мышечный;
- =лучевой;
- =локтевой;
- =медиальная порция срединного нерва;
- }

Подмышечная вена по отношению к подмышечной артерии располагается:

- {
- =сзади;
- =спереди;
- =латерально;
- =медиально;
- =сзади и латерально;
- }

Передней стенкой подмышечной впадины является:

- {
- =большая и малая грудные мышцы
- =грудная стенка с передней зубчатой мышцей
- =надостная и подостная мышцы
- =плечевая кость с клювовидно-плечевой мышцей и двуглавой мышцей плеча
- =подлопаточная, большая круглая мышцы и широчайшая мышца спины
- }

Задней стенкой подмышечной впадины является:

- {
- =большая и малая грудные мышцы
- =грудная стенка с передней зубчатой мышцей
- =надостная и подостная мышцы
- =плечевая кость с клювовидно-плечевой мышцей и двуглавой мышцей плеча
- =подлопаточная, большая круглая мышцы и широчайшая мышца спины
- }

Глубокое субпекторальное клетчаточное пространство расположено между мышцами:

- {
- =дельтовидной и большой грудной
- =малой и большой грудными
- =передней зубчатой и подлопаточной
- =большой круглой и подлопаточной
- =малой грудной и межреберными
- }

При флегмоне подмышечной впадины гнойный затек в заднем фасциальном ложе

плеча развивается по ходу:

- {
- =длинной головки трехглавой мышцы плеча
- =клювовидно-плечевой мышцы
- =лучевого нерва
- =локтевого нерва
- =срединного нерва
- }

После вправления вывиха плечевого сустава у больного обнаружены следующие симптомы: нарушение отведения плеча до горизонтального уровня, расстройство кожной чувствительности на латеральной поверхности плеча. Другие движения в плечевом суставе свободны, в том числе и пассивное отведение плеча. Такое осложнение явилось следствием травмирования:

- {
- =дельтовидной мышцы
- =лучевого нерва
- =мышечно-кожного нерва
- =подмышечного нерва
- =срединного нерва
- }

При пункции полости плечевого сустава спереди иглу вводят:

- {
- =под клювовидный отросток лопатки
- =под выпуклую часть акромиального отростка лопатки через толщу дельтовидной мышцы
- =под задний край акромиального отростка лопатки, между задним краем дельтовидной мышцы и нижним краем надостной мышцы
- =в вершину грудной мышцы
- =в вершину локтевой ямки
- }

Кожа латеральной поверхности плеча иннервируется латеральным кожным нервом плеча, отходящим от:

- {
- =латерального пучка плечевого сплетения
- =лучевого нерва
- =мышечно-кожного нерва
- =подмышечного нерва
- =локтевого нерва
- }

Кожа задней поверхности плеча иннервируется задним кожным нервом плеча, отходящим от:

- {
- =заднего пучка плечевого сплетения

- =лучевого нерва
- =мышечно-кожного нерва
- =подмышечного нерва

В заднем фасциальном ложе плеча располагается:

- {
- =двуглавая мышца плеча
- =трехглавая мышца плеча
- =ключовидно-плечевая мышца
- =круглый пронатор
- =плечевая мышца
- }

Пульсацию плечевой артерии можно определить:

- {
- =у наружного края двуглавой мышцы плеча
- =у места прикрепления к плечевой кости дельтовидной мышцы
- =у внутреннего края дельтовидной мышцы
- =на середине медиальной поверхности плеча
- =пульсация артерии не может быть пропальпирована на плече
- }

Какая постоянная артериальная ветвь отходит от подмышечной артерии в пределах грудного треугольника (trigonum pectorale)

- {
- =грудноакромиальная
- =латеральная грудная
- =подлопаточная
- =задняя, огибающая плечевую кость
- =поверхностная грудная
- }

Какие из перечисленных отходят от подмышечной артерии в пределах подгрудного треугольника (trigonum subpectorale)

- {
- =грудноакромиальная
- =подлопаточная артерия
- =латеральная грудная
- =задняя огибающая плечевую кость
- =надлопаточная
- }

Какой нерв проходит через четырехстороннее отверстие

- {
- =лучевой нерв
- =локтевой нерв

=срединный нерв
=подмышечный нерв
=медиальный кожный предплечья
}

Какая артерия проходит через четырехстороннее отверстие
{
=глубокая плеча
=задняя, огибающая плечевую кость
=передняя, огибающая плечевую кость
=огибающая лопатку
=подключичная
}

Какая артерия проходит через трехстороннее отверстие
{
=глубокая плеча
=задняя, огибающая плечевую кость
=передняя, огибающая плечевую кость
=огибающая лопатку
=глубокая артерия плеча
}

Какой нерв может быть поврежден при переломе плечевой кости в области хирургической шейки
{
=подмышечный нерв
=лучевой нерв
=локтевой нерв
=срединный нерв
=медиальный кожный предплечья.
}

Какой нерв входит в состав основного сосудисто-нервного пучка плеча в нижней его трети
{
=лучевой нерв
=локтевой нерв
=срединный нерв
=мышечно-кожный
=медиальный кожный предплечья
}

Какой нерв может быть поврежден при переломе плечевой кости в средней части диафиза
{
=мышечно - кожный нерв

=лучевой нерв
=локтевой нерв
=срединный нерв
=медиальный кожный предплечья
}

Какой нерв проходит в передней локтевой области кнутри от сухожилия двуглавой мышцы плеча
}

=локтевой нерв
=лучевой нерв
=срединный нерв
=мышечно-кожный нерв
=медиальный кожный предплечья нерв
}

Какой нерв сопровождает лучевую артерию в верхней трети предплечья
{
=латеральный кожный предплечья
=срединный
=поверхностная ветвь лучевого
=глубокая ветвь лучевого
=лучевой
}

На каком протяжении предплечья локтевая артерия и локтевой нерв располагаются вместе
{
=на всем протяжении
=в верхней трети
=в верхней половине
=в нижней половине
=не располагаются нигде
}

На каком протяжении предплечья локтевая артерия и локтевой нерв располагаются отдельно
{
=на всем протяжении
=в верхней трети
=в нижней половине
=в нижней трети
=не разделяются нигде
}

При повреждении какого нерва кисть невозможно сжать в кулак

{
=лучевого нерва
=локтевого нерва
=срединного нерва
=поверхностной ветви лучевого нерва
=глубокой ветви лучевого нерва
}

Каким нервом иннервируются межкостные мышцы кисти

{
=лучевым нервом
=срединным нервом
=локтевым нервом
=глубокой ветвью лучевого нерва
=поверхностной ветвью локтевого нерва
}

Чем обусловлено наличие запретной зоны для разрезов на кисти

{
=расположением поверхностной ладонной дуги
=расположением двигательных ветвей срединного нерва
=расположением двигательных ветвей локтевого нерва
=расположением общих пальцевых нервов
=расположением общих пальцевых сосудов
}

Какие анатомические особенности тканей пальца определяют распространение гноя вглубь при подкожном панариции

{
=толщина кожи пальца
=слабо выраженная подкожно-жировая клетчатка
=соединительно-тканые перегородки, соединяющие кожу с надкостницей
=особенности сосудисто-нервного снабжения тканей кольца
=сильно выраженная подкожно-жировая клетчатка
}

Перелом какой кости и где может осложниться повреждением ствола лучевого нерва.

{
=локтевой кости в верхней трети
=лучевой кости в верхней трети
=плечевой в средней трети
=плечевой кости в верхней трети
=плечевой кости в области хирургической шейки
}

} Заднюю группу мышц предплечья иннервируют
=срединный, лучевой и локтевой
=лучевой
=лучевой и локтевой
=срединный
=срединный, лучевой
}

Срединный нерв по отношению к плечевой артерии располагается в средней трети
{
=медиально
=над
=латерально
=под
=все правильные

} Срединный нерв по отношению к плечевой артерии располагается в нижней трети
{
=над
=под
=латерально
=медиально
=все правильные
}

Ветви какого нерва образуют "запретную" зону кисти
{
=лучевого
=локтевого
=срединного
=мышечно-кожного
=поверхностной ветви лучевого
}

Откуда начинается надлопаточная артерия
{
=нижняя щитовидная артерия
=щитошейный ствол
=реберно-шейный ствол
=грудоспинная артерия
=подлопаточная артерия
}

Паралич какой мышцы наступает при повреждении подмышечного нерва
{
=двухглавая

=большая грудная
=трапецевидная
=дельтовидная
=грудино-ключично-сосцевидная
}

Опишите патологическое положение кисти которое наблюдается при повреждении лучевого нерва
{
=выгнута вверх
=сжата в кулак
=висит
=пальцы вытянуты веерообразно
=согнуты концы первых трех фаланг
}

Какой нерв может быть поврежден при переломе хирургической шейки плеча
{
=лучевой нерв
=локтевой нерв
=кожный нерв
=подмышечный нерв
=срединный нерв
}

Какой нерв может быть поврежден при переломе лучевой кости на уровне шейки
{
=глубокой ветви лучевого нерва
=локтевой нерв
=срединный нерв
=поверхностной ветви лучевого нерва
=бедренный нерв
}

Повреждение какого нерва может обусловить нарушение разгибания предплечья и кисти
{
=мышечно-кожного нерва
=лучевого нерва
=локтевого нерва
=срединного нерва
=седалищного нерва
}

Какой нерв может быть поврежден при переломе плеча в средней его трети
{
=лучевой

- =локтевой
- =срединный
- =кожный
- =седалищный

}

Установите мышцы 2-го слоя передней области предплечья по четырем слоям:

{

- =глубокий сгибатель пальцев
- =длинная ладонная мышца
- =квадратный пронатор
- =плече-лучевая мышца
- =поверхностный сгибатель пальцев

}

В лучевой борозде передней области предплечья лучевая артерия не сопровождается поверхностной ветвью лучевого нерва в:

{

- =верхней трети
- =средней трети
- =нижней трети
- =на всем протяжении
- =нигде

}

Кожные разрезы при панарициях пальцев не должны переходить через линию межфаланговых суставов, чтобы не:

{

- =оказалась вскрытой полость сустава
- =были повреждены околоуставные связки
- =образовался кожный рубец на уровне суставной щели
- =не повредить сосуды
- =не повредить нервы

}

//Раздел 3: «Топография нижней конечности» (коды контролируемых компетенций - ИД1, ОПК5)

Пространство под паховой связкой разделяют на:

{

- =грыжевую, мышечную и сосудистую лакуны
- =мышечную и грыжевую лакуны
- =грыжевую и сосудистую лакуны
- =мышечную и сосудистую лакуны

=мышечную, сосудистую лакуны и бедренный канал

}

При пункции полости тазобедренного сустава спереди иглу вводят:

{

= в точку, находящуюся на середине линии, проведенной от верхушки большого вертела бедра к границе между внутренней и средней третями паховой связки

=над верхушкой большого вертела во фронтальной плоскости при слегка отведенной и медиально ротированной конечности

=непосредственно под паховой связкой на границе ее внутренней и средней трети

=латерально на 2 см от седалищного бугра при слегка отведенной и латерально ротированной конечности

=латерально на 2 см от седалищного бугра при слегка отведенной и латерально ротированной конечности

}

Кожа задней поверхности бедра иннервируется задним кожным нервом бедра, отходящим от:

{

=поясничного сплетения

=крестцового сплетения

=бедренного нерва

=запирательного нерва

=седалищного нерва

}

Кожа латеральной поверхности бедра иннервируется латеральным кожным нервом бедра, отходящим от:

{

=поясничного сплетения

=крестцового сплетения

=бедренного нерва

=запирательного нерва

=седалищного нерва

}

Латеральной границей бедренного треугольника является:

{

=паховая связка

=портняжная мышца

=длинная приводящая мышца

=пояснично-подвздошная мышца

=гребешковая мышца

}

В переднем фасциальном ложе бедра располагается:

{

- =большая приводящая мышца
- =двуглавая мышца бедра
- =портняжная мышца
- =полуперепончатая мышца
- =четырёхглавая мышца бедра

Мышечная лакуна ограничена спереди:

- =подвздошной костью
- =подвздошно-гребенчатой дугой
- =паховой связкой
- =бедренной веной
- =Лакунарной связкой

Мышечная лакуна ограничена сзади и латерально:

- =подвздошной костью
- =подвздошно-гребенчатой дугой
- =паховой связкой
- =бедренной веной
- =Лакунарной связкой

Мышечная лакуна ограничена медиально:

- =подвздошной костью
- =подвздошно-гребенчатой дугой
- =паховой связкой
- =бедренной веной
- =Лакунарной связкой

Сосудистая лакуна ограничена спереди:

- =гребенчатой связкой
- =лакунарной связкой
- =паховой связкой
- =подвздошно-гребенчатой дугой
- =подвздошной костью

Сосудистая лакуна ограничена сзади:

- =гребенчатой связкой
- =лакунарной связкой
- =паховой связкой

=подвздошно-гребенчатой дугой
=повздошной костью
}

Сосудистая лакуна ограничена латерально:

{
=гребенчатой связкой
=лакунарной связкой
=паховой связкой
=подвздошно-гребенчатой дугой
=повздошной костью
}

Сосудистая лакуна ограничена медиально:

{
=гребенчатой связкой
=лакунарной связкой
=паховой связкой
=подвздошно-гребенчатой дугой
=повздошной костью
}

Ущемление бедренной грыжи устраняют рассечением:

{
=верхнего рога серповидного края
=гребенчатой связки
=лакунарной связки
=нижнего рога серповидного края
=паховой связки
}

Бедренная артерия в бедренном треугольнике расположена по отношению к бедренному нерву:

{
=спереди
=снизу
=латерально
=медиально
=сзади
}

Бедренная вена в бедренном треугольнике расположена по отношению к бедренной артерии:

{
=спереди
=сзади
=латерально

=медиально
=спереди и латерально
}

//Раздел 4: «Операции на конечностях» (коды контролируемых компетенций - ИД1, ОПК5)

Кровоток на нижней конечности после закупорки или лигирования бедренной артерии в средней трети бедра восстанавливается по:

{
=латеральной артерии, огибающей бедренную кость
=наружной подвздошной артерии
=глубокой артерии бедра
=внутренней подвздошной артерии
=нисходящей коленной артерии
}

Для операции аортокоронарного шунтирования в качестве свободного сосудистого трансплантата используется:

{
=бедренная артерия
=бедренная вена
=большая подкожная вена
=глубокая артерия бедра
=запирательная артерия
}

Так называемая «Жоберова ямка» может служить для:

{
=определения положения верхнемедиальной артерии коленного сустава
=доступа к коленному суставу
=доступа к подколенной артерии с медиальной стороны
=пункции коленного сустава
=всех вышеуказанных манипуляций
}

Проекционная линия передней большеберцовой артерии - это прямая, проведенная:

{
=от внутреннего края большеберцовой кости к середине расстояния между ахилловым сухожилием и внутренней лодыжкой
=от нижней части сухожилия двуглавой мышцы бедра к головке малоберцовой кости
=от середины подколенной ямки до латеральной лодыжки
=от середины расстояния между головкой малоберцовой кости и бугристостью большеберцовой кости до середины расстояния между внутренней и наружной лодыжками
}

=от головки малоберцовой кости до медиальной лодыжки

}

Передней стенкой голено-подколенного канала является:

{

=камбаловидная мышца

=длинный сгибатель 1 пальца стопы

=задняя большеберцовая мышца

=малоберцовая кость

=икроножная мышца

}

Стопа будет находиться в состоянии максимального разгибания («пяточная стопа») при повреждении нерва:

{

=общего малоберцового

=глубокой ветви малоберцового

=запирательного

=большеберцового

=бедренного

}

Прижимать бедренную артерию при кровотечениях следует к кости:

{

=лобковой

=бедренной

=седалищной

=подвздошной

=плечевой

}

Бедренный нерв выходит из подвздошной ямки на бедро через:

{

=запирательное отверстие;

=надгрушевидное отверстие;

=подгрушевидное отверстие;

=мышечную лакуну;

=сосудистую лакуну;

}

В иннервации четырехглавой мышцы бедра принимает участие:

{

=бедренный нерв;

=седалищный нерв;

=запирательный нерв;

=половой нерв;

=нижний ягодичный нерв;
}

При выполнении сосудистого циркулярного шва по Каррелю накладывают швы-держалки:

{
=1 шов;
=2 шва;
=3 шва;
=4 шва;
=швы-держалки не накладывают;
}

Кпереди от сосудисто-нервного пучка заднего ложа верхней трети голени находится:

{
=межкостная мембрана;
=длинный сгибатель первого пальца стопы;
=длинный сгибатель пальцев стопы;
=большеберцовая кость;
=задняя большеберцовая мышца;
}

Клетчатки переднего и заднего лож голени сообщаются друг с другом по ходу: {

=большеберцового нерва;
=задней большеберцовой артерии;
=сухожилия задней большеберцовой мышцы;
=передней большеберцовой артерии;
=общего малоберцового нерва;
}

Клетчатки заднего и латерального лож голени сообщаются друг с другом по ходу:

{
=глубокой ветви малоберцового нерва;
=поверхностной ветви малоберцового нерва;
=общего малоберцового нерва;
=задней большеберцовой артерии;
=малоберцовой артерии;
}

Передне-верхнюю границу внутреннего кольца бедренного канала составляет:

{
=бедренная артерия;
=бедренная вена;
=подвздошно-гребешковая фасция;
=паховая связка;
=лакунарная связка;
}

Медиальную границу внутреннего кольца бедренного канала составляет:

- {
- =паховая связка;
- =влагалище бедренной вены;
- =надкостница лобковой кости;
- =лакунарная связка;
- =верхний рог широкой фасции бедра;
- }

Задне-нижнюю границу внутреннего кольца бедренного канала составляет:

- {
- =влагалище бедренной вены;
- =паховая связка;
- =надкостница лобковой кости;
- =верхний рог широкой фасции бедра;
- =глубокий листок широкой фасции бедра;
- }

Латеральную стенку бедренного канала составляет:

- {
- =верхний рог широкой фасции бедра;
- =нижний рог широкой фасции бедра;
- =паховая связка;
- =подвздошно-поясничная мышца;
- =влагалище бедренной вены;
- }

Задне-медиальную стенку бедренного канала составляет:

- {
- =глубокий листок широкой фасции бедра;
- =поверхностный листок широкой фасции бедра;
- =портняжная мышца;
- =короткая мышца, приводящая бедро;
- =длинная мышца, приводящая бедро;
- }

Наружное кольцо бедренного канала образовано:

- {
- =апоневрозом наружной косой мышцы живота;
- =апоневрозом поперечной мышцы живота;
- =поверхностным листком широкой фасции бедра;
- =глубоким листком широкой фасции бедра;
- =поверхностной фасцией бедра;
- }

Какой из элементов основного сосудисто-нервного пучка в подколенной ямке располагается наиболее глубоко

{

=подколенная артерия

=подколенная вена

=большеберцовый нерв

=общий малоберцовый нерв

=поверхностная ветвь общего малоберцового нерва

}

Какой из элементов основного сосудисто-нервного пучка в подколенной ямке располагается наиболее медиально

{

=подколенная артерия

=подколенная вена

=большеберцовый нерв

=общий малоберцовый нерв

=глубокая ветвь малоберцового нерва

}

Какой из элементов основного сосудисто-нервного пучка в подколенной ямке располагается наиболее латерально

{

=подколенная артерия

=подколенная вена

=большеберцовый нерв

=подкожный нерв

=бедренный нерв

}

Сколько отверстий имеет голеноподколенный канал

{

=одно

=два

=три

=пять

=четыре

}

Повреждение какого нерва наиболее вероятно при переломе малоберцовой кости в верхней ее трети

{

=большеберцового

=латерального кожного икры

=седалищного

=общего малоберцового

=бедренного

}

Какая артерия проходит в медиальном лодыжковом канале

{

=передняя большеберцовая

=задняя большеберцовая

=малоберцовая

=тыльная стопы

=малоберцовая

}

В каком фасциальномместилище стопы находится подошвенный канал

{

=латеральном

=среднем

=медиальном

=наружном

=внутреннем

}

В каком фасциальномместилище стопы проходит пяточный канал

{

=латеральном

=среднем

=медиальном

=переднем

=заднем

}

Какие образования из перечисленных
отсутствуют в подгрушевидном отверстии

{

=верхний ягодичный сосудисто-нервный пучок

=нижний ягодичный сосудисто-нервный пучок

=седалищный нерв

=задний кожный нерв бедра

=внутренние срамные сосуды и срамной нерв

}

Какие анатомические образования
выходят через надгрушевидное отверстие

{

=верхний ягодичный сосудисто-нервный пучок

=нижний ягодичный сосудисто-нервный пучок

=седалищный нерв

=задний кожный нерв бедра

=внутренние срамные сосуды и срамной нерв

}

Суставными поверхностями каких костей
образован коленный сустав

{

=малоберцовой, большеберцовой и надколенником

=большеберцовой, бедренной и надколенником

=бедренной, малоберцовой и надколенником

=бедренной и малоберцовым

=бедренной и большеберцовой

}

Где проходит малая подкожная вена голени и куда впадает.

{

=передне-медиальная поверхность

=впадает в большую подкожную вену

=впадает в бедренную вену

=задне-латеральную поверхность, впадает в подколенную вену

=передне-латеральная поверхность

}

Укажите при поражении какого нерва стопа принимает положение "пяточная стопа"

{

=срединного нерва

=большеберцового нерва

=седалищного нерва

=малоберцового нерва

=пяточного нерва

}

Глубокая флегмона ягодичной области чаще всего локализуется между:

{

=большой, средней и малой ягодичными мышцами

=кожей и поверхностной фасцией

=средней и большой ягодичными мышцами

=поверхностной и собственной фасциями

=наружными и внутренними листками собственной фасции большой ягодичной
мышцы

}

Экзартикуляция конечности - это отсечение:

{

=нежизнеспособных тканей;

=конечности на уровне сустава;

=поврежденной конечности;

=конечности на протяжении кости;
=тканей с целью максимального сохранения жизнеспособности конечности;
}

Пункция локтевого сустава у внутреннего надмыщелка плечевой кости не производится из-за опасности повреждения:

{
=лучевого нерва;
=локтевого нерва;
=плечевой артерии;
=плечевой вены;
=срединного нерва;
}

Нижняя конечность принимает патологическое положение "пяточная стопа" при повреждении:

{
=большеберцового нерва;
=общего малоберцового нерва;
=поверхностного малоберцового нерва;
=скрытого подкожного нерва;
=глубокого малоберцового нерва;
}

Нижняя конечность принимает патологическое положение "конская стопа" при повреждении:

{
=большеберцового нерва;
=общего малоберцового нерва;
=поверхностного малоберцового нерва;
=скрытого подкожного нерва;
=глубокого малоберцового нерва;
}

Подколенный сосудисто-нервный пучок включает последовательно в направлении латерально-медиальном следующие элементы:

{
=вену, артерию, нерв;
=артерию, вену, нерв;
=вену, нерв, артерию;
=нерв, вену, артерию;
=нерв, артерию, вену;
}

Хирургическое соединение костных отломков различными способами, называется:
{

=редрессация;
=остеосинтез;
=остеотомия;
=трансплантация;
=репозиция.
}

Оперативное рассечение кости называется:

{
=редрессация;
=остеосинтез;
=остеотомия;
=трансплантация кости;
=репозиция.
}

Под артротомией понимается:

{
=удаление части суставной поверхности;
=создание подвижности суставных поверхностей;
=удаление синовиальной оболочки сустава;
=создание неподвижности суставных поверхностей;
=вскрытие полости сустава:
}

При пункции полости плечевого сустава из передней позиции иглу вводят:

{
=под клювовидный отросток лопатки;
=под выпуклую часть акромиального отростка лопатки, через толщу дельтовидной мышцы;
=под передний край акромиального отростка лопатки, между задним краем дельтовидной мышцы и нижним краем надостной мышцы;
=в вершину подмышечной ямки;
=ни один из вариантов;
}

При пункции полости плечевого сустава из задней позиции иглу вводят:

{
=под клювовидный отросток;
=под выпуклую часть акромиального отростка, через толщу дельтовидной мышцы;
=под задний край акромиального отростка лопатки, между задним краем дельтовидной мышцы и нижним краем надостной мышцы;
=в вершину подмышечной ямки;
=ни один из вариантов.
}

При гнойном тендовагините и тендобурсите I пальца гнойный процесс может распространяться по всем направлениям, кроме как:

- {
- =на протяжении I пальца кисти;
- =на ладонную поверхность пястья кисти;
- =на нижнюю треть переднего ложа предплечья;
- =во влагалище локтевого разгибателя кисти;
- =в синовиальное влагалище Y пальца кисти.
- }

Пути распространения гноя из локтевой ямки происходят в:

- {
- =передне фасциально-мышечное ложе плеча;
- =заднее фасциально-мышечное ложе предплечья;
- =наружное фасциально-мышечное ложе предплечья;
- =переднее фасциально-мышечное ложе предплечья,
- =все варианты.
- }

При аутопластике сосуда наиболее подходящим трансплантатом для его замещения является:

- {
- =основная вена плеча;
- =пупочная вена;
- =тефлоновый протез;
- =большая скрытая вена бедра;
- =головная вена плеча;
- }

Диаметр протеза, используемый для замещения дефекта сосуда, должен быть:

- {
- =равен диаметру сосуда;
- =больше диаметра сосуда;
- =меньше диаметра сосуда;
- =равен длине окружности сосуда;
- =равен двум диаметрам сосуда.
- }

При наложении циркулярного обвивного шва на сосуд по Морозовой накладывают швы-держалки в количестве:

- {
- =одной;
- =двух;
- =трех;
- =четырех;
- =не накладывают;
- }

Линия Кена - это проекция:

- {
- =бедренной вены;
- =седалищного нерва;
- =срединного нерва;
- =бедренной артерии;
- =большеберцовой артерии.
- }

Под термином невролиз понимают:

- {
- =шов нерва;
- =выделение нерва из рубцовой ткани;
- =удаление невромы;
- =иссечение части нерва;
- =пересечение нервного ствола;
- }

Двигательную функцию срединного нерва при возможном его повреждении проверяют:

- {
- =противопоставлением первого пальца кисти пятому;
- =разведением и сведением пальцев кисти;
- =сгибанием пятого пальца кисти;
- =приведением первого пальца кисти;
- =отведением пятого пальца кисти.
- }

При наложении вторичного шва на сухожилие, расположенное в синовиальном влагалище, необходимо:

- {
- =сшить глубокие и поверхностные сгибатели;
- =сшить глубокие сгибатели, а поверхностные иссечь;
- =иссечь глубокие сгибатели, а поверхностные сшить;
- =сшить поверхностные сгибатели, а глубокие не сшивать;
- =сшить глубокие и поверхностные сгибатели с червеобразными мышцами.
- }

Неврому отрезка нерва иссекают:

- {
- =скальпелем;
- =ножницами;
- =лезвием бритвы;
- =ампутационным ножом;

=пила.

}

Транспозиция нерва это:

{

=высвобождение нерва из окружающей его рубцовой ткани;

=расщепление периневрия для осмотра нервных волокон;

=вылущивание рубцов между нервными волокнами;

=перемещение сшитого нерва на новое место с целью; уменьшения его натяжения

=повторное сшивание нерва.

}

Двигательную функцию локтевого нерва проверяют:

{

=противопоставлением первый палеца кисти пятому;

=разгибанием второго палеца кисти;

=супинацией предплечья;

=разведением и сведением пальцев кисти;

=отведением первого пальца кисти.

}

При сшивании нервного ствола в шов захватывают следующие ткани:

{

=периневрий;

=эпиневрй;

=осевые цилиндры аксонов;

=эпиневрй и периневрий;

=эндоневрий;

}

При пересечении нервного ствола шванновская оболочка с перехватами Ранвье погибает:

{

=в первые сутки;

=в течении первого часа после травмы;

=в течении первых шести часов от момента травмы;

=в течении нескольких минут от момента травмы;

=длительное время остается живой.

}

Наиболее типичным местом локализации тромбов при сосудистой эмболии является:

{

=протяжение плечевой артерии;

=протяжение бедренной артерии;

=протяжение внутренней подвздошной артерии;

=протяжение наружной подвздошной артерии;

=место бифуркации сосудов.

}

Проекционную линию подкрыльцовой артерии составляет прямая, проведенная:

{

=по заднему краю дельтовидной мышцы;

=по задней границе роста волос в подмышечной впадине;

=по середине ширины подмышечной впадины;

=на границе между задней и средней третью ширины подмышечной впадины;

=на границе между передней и средней третью ширины подмышечной впадины;

}

Проекционная линия плечевой артерии проходит по прямой, проведенной от:

{

=вершины подкрыльцовой впадины к внутреннему надмыщелку плечевой кости;

=вершины подкрыльцовой впадины к наружному надмыщелку плечевой кости;

=вершины подкрыльцовой впадины к середине расстояния между внутренним надмыщелком плечевой кости и сухожилием двуглавой мышцы плеча;

=акромиального отростка лопатки до наружного надмыщелка плечевой кости;

=клювовидного отростка лопатки к внутреннему надмыщелку плечевой кости.

}

Проекционная линия локтевой артерии проходит от:

{

=медиального края сухожилия двуглавой мышцы плеча к пульсовой точке на предплечье;

=середины локтевой ямки к точке, расположенной на 0,5 см кнутри от шиловидного отростка лучевой кости;

=середины локтевой ямки к наружному краю гороховидной кости;

=внутреннего надмыщелка плеча к наружному краю гороховидной кости;

=наружного надмыщелка плеча к пульсовой точке на предплечье.

}

Проекционная линия задней большеберцовой артерии-это прямая, проведенная от:

{

=середины расстояния между головкой малоберцовой кости до середины расстояния между внутренней и наружной лодыжками;

=точки, отстоящей на 1см кзади от внутреннего края большеберцовой кости, к середине расстояния между ахилловым сухожилием и внутренней лодыжкой;

=середины подколенной ямки до латеральной лодыжки;

=середины подколенной ямки до медиальной лодыжки;

=головки малоберцовой кости до медиальной лодыжки.

}

Проекционная линия глубокого малоберцового нерва проходит по прямой, проведенной от:

{
=головки малоберцовой кости до медиальной лодыжки;
=середины подколенной ямки до латеральной лодыжки;
=середины подколенной ямки до медиальной лодыжки;
=середины расстояния между головкой малоберцовой кости и бугристостью
большеберцовой кости до середины расстояния между внутренней и наружной
лодыжками;
=нижней части сухожилия двуглавой мышцы бедра к головке малоберцовой кости.
}

На каком уровне наиболее предпочтительна блокада седалищного нерва в связи с его
близким расположением к собственной фасции

{
=в центре ягодичной области
=под ягодичной складкой
=в средней трети бедра
=в нижней трети бедра
=в подгрушевидном отверстии
}

Диаметр какого шовного материала является наибольшим

{
=8/0
=4/0
=4
=2
=3/0
}

Диаметр какого шовного материала является наименьшим

{
=8/0
=4/0
=4
=8
=2
}

Какое анатомическое образование является ориентиром для выполнения передней
пункции плечевого сустава

{
=акромиальный отросток лопатки
=клювовидный отросток лопатки
=большой бугорок плечевой кости
=малый бугорок плечевой кости

=ость лопатки
{

Как называется способ обработки кости, когда надкостница по всей окружности оставляется с избытком для покрытия костного опиала

{
=апериостальный
=субпериостальный
=гильотинный
=конусный
=круговой
}

Кака называется способ обработки костной культы, когда надкостницу удаляют выше уровня распила кости

{
=апериостальный
=субпериостальный
=гильотинный
=круговой
=конусный
}

Бедренную артерию желательно перевязать

{
=выше отхождения глубокой артерии бедра
=ниже отхождения глубокой артерии бедра
=в любом месте
=под паховой связкой
=над паховой связкой
}

Пальцевое прижатие бедренной артерии производят....

{
=в середине паховой связки к передней ветви лонной кости
=в $\frac{1}{3}$ паховой связки к передней ветви лонной кости
=в $\frac{2}{3}$ паховой связки к передней ветви лонной кости
=к лобковому симфизу
=в середине паховой связки к подвздошной кости
}

//Раздел 5: «Топографическая анатомия головы» (коды контролируемых компетенций - ИД1, ОПК5)

73

подкожная жировая клетчатка лобно-теменно-затылочной области имеет особенность своего строения и распространения на своде головы.

- {
- =ограничена пределами каждой кости свода черепа
- =разделена соединительнотканными перегородками
- =распространяется по всей области
- =ограничена пределами каждой мышцы свода черепа
- =ограничена пределами каждой областью свода черепа
- }

подапоневротическая жировая клетчатка лобно-теменно-затылочной области имеет особенность своего строения и распространения на своде головы.

- {
- =ограничена пределами каждой кости свода черепа
- =разделена соединительнотканными перегородками
- =распространяется по всей области
- =ограничена пределами каждой мышцы свода черепа
- =ограничена пределами каждой областью свода черепа
- }

поднадкостничная рыхлая клетчатка лобно-теменно-затылочной области имеет особенность своего строения и распространения на своде головы.

- {
- =ограничена пределами каждой кости свода черепа
- =разделена соединительнотканными перегородками
- =распространяется по всей области
- =ограничена пределами каждой мышцы свода черепа
- =ограничена пределами каждой областью свода черепа
- }

Основная масса кровеносных сосудов лобно-теменно-затылочной области располагается в:

- {
- =коже
- =мышечно-апоневротическом слое
- =подапоневротической клетчатке
- =подкожной клетчатке
- =поднадкостничной клетчатке
- }

В больницу доставлен пострадавший с обширной скальпированной раной в теменной области. Определите клетчаточный слой, в котором произошла отслойка лоскута:

- {
- =подкожная жировая клетчатка
- =подапоневротическая жировая клетчатка
- =поднадкостничная рыхлая клетчатка
- =может в любом слое
- }

=подкостная

}

Гематома мягких тканей свода черепа занимает область, соответствующую левой теменной кости. Определите слой, в котором она располагается:

{

=подкожная жировая клетчатка

=подапоневротическая жировая клетчатка

=поднадкостничная рыхлая клетчатка

=может в любом слое

=подкостная

}

У пострадавшего обнаружена гематома мягких тканей лобно-теменно-затылочной области, распространявшаяся по всей поверхности свода черепа. Определите клетчаточный слой, в котором она находится:

{

=подкожная жировая клетчатка

=подапоневротическая жировая клетчатка

=поднадкостничная рыхлая клетчатка

=может в любом слое

=подкостная

}

Известно, что раны мягких тканей головы и лица отличаются более быстрым заживлением и редкими нагноениями по сравнению с ранами других областей тела, что обусловлено:

{

=высокими регенераторными способностями эпителия

=хорошим кровоснабжением тканей

=наличием разнообразных межвенозных анастомозов

=наличием многочисленных скоплений лимфоидной ткани

=в местной иммунной системе

}

Средняя менингеальная артерия является ветвью артерии:

{

=верхнечелюстной

=наружной сонной

=лицевой артерии

=поверхностной височной

=внутренней сонной

}

Средняя менингеальная артерия проникает в полость черепа через отверстие:

{

=круглое

- =овальное
 - =остистое
 - =шилососцевидное
 - =надгрушевидное
- }

Лицевой нерв выходит из полости черепа на его основание через:

- {
- =круглое отверстие
 - =овальное отверстие
 - =остистое отверстие
 - =сосцевидное отверстие
 - =шилососцевидное отверстие
- }

Доставлен больной с тупой травмой височной области. Через 2 часа появились и стали нарастать симптомы сдавления головного мозга. Во время операции обнаружены: {
оскольчатый перелом чешуи височной кости и крупная эпидуральная гематома.

Определите ее источник:

- {
- =верхний каменистый синус
 - =глубокая височная артерия
 - =средняя височная артерия
 - =средняя менингеальная артерия
 - =средняя мозговая артерия
- }

Жевательные мышцы иннервируются нервом:

- {
- =верхнечелюстным
 - =добавочным
 - =лицевым
 - =нижнечелюстным
 - =нижнечелюстным
- }

Важной топографической особенностью околоушной слюнной железы является расположение в ней одного из перечисленных нервов:

- {
- =верхнечелюстного
 - =лицевого
 - =нижнечелюстного
 - =тройничного
 - =ушно-височного
- }

У ребенка, больного паротитом, врач обнаружил неплотное смыкание глазной щели и опущение угла рта, что свидетельствует о вовлечении в воспалительный процесс нерва:

- {
- =верхнечелюстного
- =лицевого
- =нижнечелюстного
- =подглазничного
- =глазничного
- }

Рассечение мягких тканей при первичной хирургической обработке раны лобно-теменно-затылочной области следует производить:

- {
- =в продольном направлении
- =в поперечном направлении
- =в радиальном направлении относительно верхней точки головы
- =крестообразно
- =выбор направления не имеет значения
- }

При обследовании больного врач-невролог для определения состояния ветвей одного из черепных нервов надавливает пальцами на участки лица, соответствующие надглазничной вырезке, подглазничному и подбородочному отверстиям. Определите, состояние какого нерва проверяется таким приемом:

- {
- =блуждающего
- =глазодвигательного
- =лицевого
- =тройничного
- =блуждающего
- }

У больного после переохладения развился паралич мимических мышц половины лица, что указывает на воспаление нерва:

- {
- =верхнечелюстного
- =лицевого
- =нижнечелюстного
- =подглазничного
- =тройничного
- }

Слой, лежащий под апоневротическим шлемом лобно-теменно-затылочной области представляет собой:

{

- =кость;
- =надкостницу;
- =собственную фасцию;
- =клетчатку;
- =лобную или затылочную мышцу;

Пахионовы грануляции паутинной оболочки выполняют функцию:

- {
- =регуляции венозного оттока;
- =регуляции ликворного оттока;
- =регуляции артериального давления;
- =кровообращения твердой мозговой оболочки;
- =ни один из вариантов;
- }

Височная мышца в височной области залегает между:

- {
- =поверхностной фасцией и височным апоневрозом;
- =листами височного апоневроза;
- =подапоневротической клетчаткой и надкостницей;
- =межапоневротической клетчаткой и глубоким листком височного апоневроза;
- =височным апоневрозом и подапоневротической клетчаткой;
- }

Лицевой нерв обеспечивает иннервацию всех образований, за исключением:

- {
- =слизистой задних ячеек лабиринта
- решетчатой кости;
- =вкусовой чувствительности языка;
- =жевательных мышц;
- =мимических мышц;
- =околоушной слюнной железы;
- }

При трепанации сосцевидного отростка возможно повреждение ствола лицевого нерва при нарушении границы треугольника Шипо:

- {
- =медиальной;
- =передней;
- =задней;
- =верхней;
- =нижней;
- }

При переломе основания черепа в области средней черепной ямки симптом "очков" обусловлен повреждением:

- {
- =верхнечелюстной артерии;
- =глазничных вен;
- =глазничной артерии;
- =внутренней сонной артерии;
- =средней оболочечной артерии;

При абсцессе подкожной клетчатки волосистой части головы инфекция распространяется на твердую мозговую оболочку через:

- {
- =эмиссарные вены;
- =височные и теменные артерии;
- =лимфатические сосуды;
- =вены лицевого отдела черепа;
- =не распространяется;
- }

Укажите особенности подапоневрозного клетчаточного пространства свода черепа.

- {
- =рыхлая клетчатка ограничена в пределах фиксации надкостницы к швам костей свода черепа
- =наличие обильного кровоснабжения
- =рыхлая клетчатка ограничена в пределах апоневроза
- =малое количество сосудов и нервов
- =не имеет особенностей
- }

Какие особенности у поднадкостничного пространства свода черепа

- {
- =имеет ячеистое строение
- =содержит диплоэтические сосуды
- =рыхлая клетчатка ограничена в пределах фиксации надкостницы к швам костей свода черепа
- =рыхлая клетчатка ограничена в пределах апоневроза
- =не имеет особенностей
- }

Чем иннервируется кожа лица

- {
- =ветвями лицевого нерва

=ветвями тройничного нерва

=кожные ветви шейного сплетения

=блуждающий нерв

=симпатические нервы

}

Откуда выходит лицевой нерв из полости черепа

{

=через внутренний слуховой проход

=через наружный слуховой проход

=через шилососцевидное отверстие

=через овальное отверстие

=через круглое отверстие

}

Слои свода черепа.

{

=кожа, подк. клетчатка, апоневроз, надкостница, поднадкост-я клетчатка, кость

=кожа, подк. клетчатка, поверхностная фасция, собственная фасция

апоневроз, подапоневротическая кл-ка, надкостница, поднадкост-я клетчатка, кость

=кожа, подк. клетчатка, апоневроз, подапоневротическая кл-ка, надкостница, кость

=кожа, подк. клетчатка, поверхностная фасция, подфасциальное пространство кл-ка, надкостница, кость

=кожа, подк. клетчатка, апоневроз, подапоневротическая кл-ка, надкостница, поднадкост-я клетчатка, кость

}

Слои скальпированной раны.

{

=кожа, клетчатка, надкостница, кость

=кожа, подкожная клетчатка, апоневроз, подапоневротическая клетчатка, надкостница

=кожа, подкожная клетчатка, апоневроз, подапоневротическая клетчатка, надкостница, поднадкостничная клетчатка

=кожа, подкожная клетчатка, апоневроз

=кожа, подкожная клетчатка, апоневроз, подапоневротическая клетчатка, надкостница, поднадкостничная клетчатка, кость

}

Проекция щечной ветви лицевого нерва.

{

=от мочки уха вдоль края нижней челюсти

=от мочки уха к верхнему краю орбиты

=от мочки уха к шее

=от мочки уха к скуловой кости

=от мочки уха к области рта

}

Какие сосуды проходят в толще околоушной слюнной железы

{

=внутренняя сонная артерия

=наружная сонная артерия которая в ней делится на в/ челюстную, заднюю ушную и поверхностную височную

=наружная сонная артерия которая в ней делится на верхнечелюстную, переднюю ушную и глубокую височную

=наружная яремная вена в которую вливаются поперечная лицевая и задняя ушная вены.

=внутренняя яремная вена в которую вливаются поперечная лицевая и задняя ушная вены.

}

Указать название первой ветви тройничного.

{

=скуловой

=глазничный

=нижнечелюстной

=верхнечелюстной

=шейный

}

Как называется вторая ветвь тройничного нерва

{

=нижнечелюстной

=скуловой

=верхнечелюстной

=подглазничный

=лобный

}

Указать место выхода третьей кожной ветви тройничного нерва в области лица.

{

=надглазничное отверстие

=подбородочное отверстие

=подглазничное отверстие

=верхняя глазничная щель

=слуховой проход

}

Перечислите клетчатые пространства височной области.

{

=подкожное

=подмышечное

=межаппоневротическое

=подаппоневротическое

=все правильные

}

Какое направление имеют артерии мягких покровов свода черепа

{

=осевое

=радиальное

=смешанное

=не имеют направления

=снизу вверх

}

В какой синус кровь оттекает из глазных вен

{

=вены лабиринта

=пещеристый синус

=сигмовидный синус

=межпещеристый синус

=клиновидно-теменной синус

}

Какой синус расположен в области турецкого седла клиновидной кости

{

=пещеристый синус

=сигмовидный синус

=прямой синус

=затылочный синус

=поперечный синус

}

Какой синус твердой мозговой оболочки лежит в основании палатки мозжечка

{

=синусовый сток

=поперечный синус

=верхний каменистый синус

=клиновидно-теменной синус

=нижний сагитальный синус

}

От какой артерии отходит средняя менингеальная артерия, являющаяся основным источником кровоснабжения твердой мозговой оболочки

{

=затылочная артерия

=глубокая височная артерия

=верхнечелюстная артерия

=лицевая артерия

=внутренняя сонная артерия

}

Укажите за счет каких черепно-мозговых нервов осуществляется иннервация твердой мозговой оболочки

{

=блоковый нерв

=тройничный нерв

=язычный нерв

=отводящий нерв

=промежуточный нерв

}

Какая артерия является непосредственным продолжением внутренней сонной артерии

{

=передняя мозговая

=средняя мозговая

=задняя височная

=передняя лобная

=теменно-затылочная

}

Чем можно объяснить изменения направления тока крови по венам мягких тканей свода черепа, внутрикостным и внутричерепным венам

{

=наличием клапанного аппарата

=отсутствием клапанного аппарата

=наличием мышечных волокон в стенке вен

=большой диаметр вен

=маленький диаметр вен

}

С какой артерией анастомозирует теменная ветвь поверхностной височной артерии

{

=позвоночная

=верхнечелюстная

=задняя ушная

=затылочная

=восходящая глоточная

}

За счет каких нервов осуществляется чувствительная иннервация височной области

{

=надблоковый нерв

=глубокие височные нервы

=ушно-височный нерв

=подглазничный нерв

=ветви лицевого нерва

}

К какому анатомическому образованию прикрепляется мощное сухожилие височной мышцы

{

=к ветви верхней челюсти

=к венечному отростку нижней челюсти

=шейке нижней челюсти

=к бугру верхней челюсти

=к скуловому отростку верхней челюсти

}

Укажите какое анатомическое образование проецируется на передне-нижний квадрант наружной поверхности сосцевидного отростка.

{

=сосцевидная пещера

=лицевой канал височной кости

=задняя черепная ямка

=сигмовидный анус

=средняя черепная ямка

}

Чем ограничен треугольник Шипо спереди

{

=задний край наружного слухового прохода

=сосцевидная вырезка височной кости

=борозда затылочной артерии височной кости

=надпроходная ость височной кости

=сосцевидный гребешок височной кости

}

Чем ограничен треугольник Шипо сзади

{

=задний край наружного слухового прохода

=сосцевидная вырезка височной кости

=борозда затылочной артерии височной кости

=надпроходная ость височной кости

=сосцевидный гребешок височной кости

}

Какой нерв проходит в толще верхней стенки верхнечелюстной пазухи

{

=глазной

=носоресничный

=скулолицевой

=слезный

=подглазничный

}

Невралгия какого нерва может возникнуть при наличии воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе

{

=языкоглоточного

=глазодвигательного

=тройничного

=блокового

=лицевого

}

Укажите источник чувствительной иннервации кожи и слизистой оболочки верхней губы (нерв)

{

=подблоковый

=скулолицевой

=щечный

=лицевой

=подглазничный

}

Укажите источник чувствительной иннервации кожи и слизистой оболочки нижней губы (нерв)

{

=подблоковый

=лицевой

=щечный

=челюстно-подъязычный

=подбородочный

}

Какой нерв обеспечивает двигательную иннервацию языка

{

=подъязычный

=челюстно-подъязычный

=язычный

=верхний гортанный

=языкоглоточный

}

У переднего края какой мышцы лицевая артерия переходит с подчелюстной области на лицо

{

=щечная

=жевательная

- =круговая рта
- =опускающая угол рта
- =подбородочная

Конечный отдел какой артерии проходит в толще околоушной слюнной железы

- =наружная сонная
- =внутренняя сонная
- =оболочечная
- =верхнечелюстная
- =височная

Через какое отверстие выходит из черепа лицевой нерв

- =круглое отверстие клиновидной кости
- =овальное отверстие клиновидной кости
- =остистое отверстие клиновидной кости
- =шилососцевидное отверстие
- =рванное отверстие

Какая артерия проходит параллельно выводному протоку околоушной слюнной железы; что следует учитывать при диф-й диагностике ранений его

- =глубокая ушная
- =средняя височная
- =поперечная лица
- =жевательная
- =глазная

Тромбосинусит какого синуса твердой мозговой оболочки развивается при некоторых формах карбункула верхней губы, крыльев носа или надбровной дуги

- =прямой синус
- =пещеристый синус
- =синусовый сток
- =базиллярное сплетение
- =вены лабиринта

Сдавление бластоматозным процессом в околоушной слюнной железе какого нерва приводит к развитию пареза и паралича мимических мышц лица

- =скуловой

- =лицевой
- =ушно-височный
- =щечный
- =подглазничный

Какой нерв входит в крылонебную ямку из средней черепной ямки и распадается на свои конечные ветви

- {
- =нижнечелюстной
- =промежуточный
- =верхнечелюстной
- =блоковый
- =лицевой
- }

Место выхода в области лица второй ветви тройничного нерва.

- {
- =надглазничное отверстие
- =подглазничное отверстие
- =подбородочное отверстие
- =слуховой проход
- =резцовое отверстие
- }

Как называется третья ветвь тройничного нерва

- {
- =скуловой
- =шейный
- =нижнечелюстной
- =глазничный
- =верхнечелюстной
- }

Эпидуральное пространство полости черепа располагается между

- {
- =между стекловидной пластинкой и твёрдой мозговой оболочкой
- =между твердой мозговой и паутинной оболочкой
- =между наружной пластинкой и диплоэтическим слоем
- =между надкостницей и костью
- =между субдуральным пространством и арахноидальной оболочкой
- }

Субдуральное пространство полости черепа располагается между

- {
- =стекловидной пластинкой и твёрдой мозговой оболочкой
- =наружной пластинкой и диплоэтическим слоем

=твёрдой мозговой оболочкой и арахноидальной оболочкой
=надкостницей и костью =диплоэтическим слоем и внутренней пластинкой
}

Субарохноидальное пространство полости черепа располагается между
{
=кожей и апоневрозом
=твёрдой мозговой оболочкой и костью
=наружной и внутренней пластинкой
=арахноидальной оболочкой и мягкой мозговой оболочкой
=надкостницей и костью
}

В затылочной области головы проходят артерии :
{
=задняя ушная, затылочная, позадиушная
=затылочная, задняя ушная, височная, надглазничная
=задняя ушная, лобная, лицевая, поверхностная височная
=затылочная, задняя ушная, височная, верхнечелюстная
=задняя ушная, лобная, височная, надглазничная
}

Выводной проток околоушной железы открывается.
{
=открывается в преддверие полости рта на уровне 2 премоляра
=открывается в преддверие полости рта на уровне 1 премоляра
=на уровне альвеолярных отростков центральных резцов верхней челюсти
=на корне языка
=на уровне клыков нижней челюсти с вестибулярной стороны

} Временную остановку кровотечения из лицевой артерии можно произвести прижатием ее ствола в области..... .

{
=скуловой кости
=к нижней челюсти у заднего края жевательной мышцы
=к суставному отростку нижней челюсти
=подъязычной кости
=к нижней челюсти у переднего края жевательной мышцы
}

Какие особенности у поднадкостничного пространства свода черепа

{
=имеет ячеистое строение
=содержит диплоэтические сосуды
=рыхлая клетчатка ограничена в пределах фиксации надкостницы к швам костей свода

черепа

- =рыхлая клетчатка ограничена в пределах апоневроза
- =не имеет особенностей

Чем иннервируется кожа лица

- =ветвями лицевого нерва
- =ветвями тройничного нерва
- =кожные ветви шейного сплетения
- =блуждающий нерв
- =симпатические нервы

Проекционная линия выводного протока околоушной слюнной железы проводится:

- =по середине тела нижней челюсти
- =от основания козелка уха до угла рта
- =параллельно нижнему краю глазницы, отступя книзу на 5 мм
- =от основания козелка уха к крылу носа
- =от угла челюсти к углу рта

Проникающими называются ранения головы:

- =связанные с повреждением костей свода черепа
- =связанные с повреждением вещества мозга
- =связанные с повреждением твердой мозговой оболочки
- =связанные с повреждением мягкой мозговой оболочки
- =определяется зиянием раны

Точка пальцевого прижатия лицевой артерии находится:

- =на 1 см ниже козелка уха
- =на 0,5-1,0 см ниже середины нижнего края глазницы
- =позади угла нижней челюсти
- =на середине тела нижней челюсти у переднего края жевательной мышцы
- =на 1 см ниже середины скуловой дуги

Проток околоушной слюнной железы открывается в преддверие полости рта:

- =на уровне промежутка между 1 и 2 верхними молярами
- =на уровне промежутка между 1 и 2 нижними молярами
- =на уровне 2 верхнего премоляра

=на уровне 2 нижнего моляра
=все вышеперечисленное верно
}

Смещение отломков при переломах нижней челюсти обуславливается:

{
=направлением удара
=направлением тяги мышц
=формой нижней челюсти
=формой прикуса
=подвижностью височно-нижнечелюстного сустава
}

//Раздел 6: «Топографическая анатомия шеи» (коды контролируемых компетенций - ИД1, ОПК5)

Поверхностный листок собственной фасции шеи образует влагалище для:

{
=поднижнечелюстной слюнной железы;
=платизмы;
=грудино-щитовидной мышцы;
=общей сонной артерии;
=внутренней яремной вены;
}

Предпозвоночная фасция шеи покрывает все образования, кроме:

{
=пограничного симпатического ствола;
=длинных мышц шеи и головы;
=общей сонной артерии;
=лестничных мышц;
=плечевого сплетения;
}

Пограничный симпатический ствол в области шеи находится во влагалище фасции:

{
=собственной шейной (поверхностного листка);
=собственной шейной (глубокого листка);
=внутренностной (париетального листка);
=внутренностной (висцерального листка);
=предпозвоночной;
}

Надгрудинное межапоневротическое клетчаточное пространство шеи сообщается с:

{
=влагалищем медиального сосудисто-нервного пучка шеи;
=влагалищем латерального сосудисто-нервного пучка шеи;

- =слепым мешком грудино-ключично-сосцевидной мышцы;
- =претрахеальным клетчаточным пространством;
- =ретровисцеральной клетчаткой шеи;

Переднюю стенку слепого мешка грудино-ключично-сосцевидной мышцы составляет:

- {
- =грудино-ключично-сосцевидная мышца;
- =задняя стенка влагалища грудино-ключично-сосцевидной мышцы;
- =передняя стенка влагалища грудино-ключично-сосцевидной мышцы;
- =предпозвоночная фасция;
- =висцеральный листок внутренностной фасции;
- }

Глубокое предпозвоночное (остеофиброзное пространство шеи содержит:

- {
- =пограничный симпатический ствол;
- =блуждающий нерв;
- =внутреннюю сонную артерию;
- =пищевод;
- =нижний гортанный (возвратный) нерв;
- }

Глубокое предпозвоночное (остеофиброзное пространство шеи включает в себя: {

- =длинные мышцы шеи и головы;
- =надостную мышцу лопатки;
- =пищевод;
- =ретровисцеральную клетчатку;
- =превисцеральную клетчатку;
- }

Латеральной границей сонного треугольника шеи является:

- {
- =общая сонная артерия;
- =внутренняя яремная вена;
- =передняя яремная вена;
- =грудино-ключично-сосцевидная мышца;
- =заднее брюшко двубрюшной мышцы;
- }

Подкожная жировая клетчатка в области сонного треугольника содержит:

- {
- =платизму;
- =наружную яремную вену и ветви шейного сплетения;
- =переднюю яремную вену;
- =нисходящую ветвь подъязычного нерва;
- =лицевую вену;

}

Блуждающий нерв по отношению к общей сонной артерии в области сонного треугольника шеи находится:

{

=спереди и медиально;

=сзади и медиально;

=спереди и латерально;

=сзади и латерально;

=спереди;

}

Наружная сонная артерия в области шеи отдает все ветви, за исключением:

{

=язычной;

=лицевой;

=верхней щитовидной;

=затылочной;

=нижней щитовидной;

}

Верхней латеральной границей лопаточно- трахеального треугольника шеи является мышца:

{

=заднее брюшко двубрюшной;

=грудино-ключично-сосцевидная;

=верхнее брюшко лопаточно-подъязычной;

=нижнее брюшко лопаточно-подъязычной;

=грудино-подъязычная;

}

Нижне-латеральной границей лопаточно-трахеального треугольника шеи является мышца:

{

=грудино-щитовидная;

=грудино-подъязычная;

=лопаточно-подъязычная;

=грудино-ключично-сосцевидная;

=передняя лестничная;

}

Глубокий листок собственной фасции шеи в области лопаточно-трахеального треугольника закрывает спереди мышцу:

{

=грудино-ключично-сосцевидную;

=грудино-подъязычную;

=длинную шейную;

=длинную головную;
=переднюю лестничную;
}

Верхней границей подчелюстного треугольника шеи является:

{
=подбородочно-подъязычная мышца;
=подъязычно-язычная мышца;
=подъязычно-нижнечелюстная мышца;
=заднее брюшко двубрюшной мышцы;
=нижний край нижней челюсти;
}

Передне-медиальной границей подчелюстного треугольника шеи является:

{
=белая линия шеи;
=переднее брюшко двубрюшной мышцы;
=подбородочно-подъязычная мышца;
=подъязычно-язычная мышца;
=подъязычно-нижнечелюстная мышца;
}

В подчелюстном треугольнике шеи непосредственно кзади от платизмы находится нерв:

{
=нижнечелюстной;
=подъязычный;
=язычный;
=лицевой (шейная ветвь)
=шейного сплетения;
}

В лестнично-позвоночном треугольнике шеи непосредственно кзади от венозного угла Пирогова и общей сонной артерии располагается:

{
=блуждающий нерв;
=пограничный симпатический ствол;
=лопаточно-подъязычная мышца;
=передняя лестничная мышца;
=подключичная артерия;
}

Вершиной лестнично-позвоночного треугольника шеи является:

{
=верхний ганглий пограничного симпатического ствола;
=бифуркация общей сонной артерии;
=поперечный отросток VI шейного позвонка;

=тело IV шейного позвонка;
=остистый отросток VII шейного позвонка;
}

Медиальной границей лестнично-позвоночного треугольника шеи является:

{
=передняя лестничная мышца;
=поперечные отростки шейных позвонков;
=длинная мышца шеи;
=грудино-ключично-сосцевидная мышца;
=мышца, поднимающая лопатку;
}

Верхнюю границу шейного треугольника Пирогова составляют:

{
=заднее брюшко двубрюшной мышцы;
=переднее брюшко двубрюшной мышцы;
=шило-подъязычная мышца;
=челюстно-подъязычная мышца;
=ни один из вариантов;
}

Нижнюю границу шейного треугольника Пирогова составляют:

{
=подъязычный нерв;
=тело подъязычной кости;
=край челюстно-подъязычной мышцы;
=сухожилие двубрюшной мышцы;
=венозный угол Пирогова;
}

Нижняя щитовидная артерия является ветвью артерии:

{
=внутренней сонной;
=общей сонной;
=наружной сонной;
=аорты;
=подключичной;
}

К трахее сзади непосредственно прилежит:

{
=висцеральная межорганный клетчатка;
=пищевод;
=общая сонная артерия;
=глотка;

=непарное венозное сплетение;

}

Капсулу поднижнечелюстной слюнной железы образует фасция шеи:

{

=поверхностная;

=собственная (поверхностный листок;

=собственная (глубокий листок;

=внутренностная (париетальный листок;

=внутренностная (висцеральный листок;

}

К шейному отделу пограничного симпатического ствола прилежат спереди:

{

=длинные мышцы головы и шеи;

=предпозвоночная фасция и влагалище общей сонной артерии;

=влагалище внутренней яремной вены;

=диафрагмальный нерв;

=блуждающий нерв;

}

К шейному отделу диафрагмального нерва сзади непосредственно прилежат образования:

{

=восходящая артерия шеи;

=внутренняя яремная вена;

=передняя лестничная мышца;

=щито-шейный артериальный ствол;

=плечевое сплетение;

}

Диафрагмальный нерв располагается на:

{

=грудино-ключично-сосцевидной мышце над собственной фасцией

=передней лестничной мышце поверх предпозвоночной фасции

=передней лестничной мышце под предпозвоночной фасцией

=средней лестничной мышце поверх предпозвоночной фасции

=средней лестничной мышце под предпозвоночной фасцией

}

По каким признакам отличается наружная сонная артерия от внутренней

{

- =по диаметру
- =по форме
- =по наличию ветвей
- =по надписи
- =по толщине стенки

Перечислить слои шеи по белой линии от кожи до трахеи.

- {
- =кожа,поверх.фасция,2-фасция,листки 4-й фасции
- =кожа,подкожная клетчатка,2фасция,3 фасция,4; фасция
- =кожа,подкожная клетчатка,поверх.фасция.3 фасция.4фасция
- =кожа,поверх.фасция,2,3,4 фасции
- =кожа,подкожная клетчатка,поверх.фасция,белая линия,4-фасция
- }

Куда может распространяться гной из претрахеального пространства

- {
- =заднее средостение
- =заглоточное пространство
- =брюшную полость
- =переднее средостение
- =предпозвоночное пространство
- }

Чем иннервируются голосовые связки

- {
- =языкоглоточный нерв
- =шейная петля
- =симпатические нервы
- =возвратные нервы
- =блуждающие нервы
- }

Чем образованно шейное сплетение

- {
- =C1-C2 шейных позвонков
- =передние корешки C1-C3 шейных позвонков
- =передние корешки C1-C4 спин. мозга
- =задние корешки C1-C4 спин. мозга
- =передние,задние корешки C1-C4 спин. мозга
- }

Для чего образует футляр первая фасция шеи

- {
- =подчелюстная слюнная железа

=основного сосудисто-нервного пучка шеи

=трахеи. гортани

=трапецевидная мышца

=подкожная мышца

}

куда может распространяться гнойный процесс из наружного шейного треугольника

{

=заднее средостение

=окологлоточное пространство

=претрахеальную клетчатку

=в подмышечную область,подключичную

=предпозвоночное пространство

}

Чем осуществляется кровоснабжение щитовидной железы

{

=ветви общей сонной артерии.непарная щитовидная артерия

=ветвями наружной сонной артерии и лицевой

=2 верхние.2 нижние и иногда непарная щитовидные артерии

=ветвями внутренней сонной артерии,верхними,нижними щитовидными артериями

=2 верхние и 1 нижняя щитовидная артерии

}

Что является показанием к проведению вагосимпатической блокады по Вишневскому

{

=асфиксия

=проникающие ранения грудной полости.пневмоторакс

=ранения черепа

=переломы шейных позвонков

=профилактика анафилактического шока

}

Чем образованна капсула щитовидной железы

{

=2 фасция шеи

=висцеральный листок 4 фасции

=5 фасция шеи

=претрахеальная фасция

=париетальный листок 4 фасции

}

Чем кровоснабжается капсула щитовидной железы

{

=ветвями щитовидных артерий и лицевой артерии

=2 верхние щитовидные артерии и ветви внутренней сонной артерии

- =ветвями щитовидной артерии и гортанной
- =ветвями наружной сонной артерии и щито-шейного ствола
- =ветвями внутренней сонной артерии и щито-шейного ствола

}

Что проходит в межапоневротической надгрудной клетчатке

{

- =грудной лимфатический проток, клетчатка
- =венозный угол Пирогова
- =нижняя щитовидная артерия
- =яремная венозная дуга,
- =наружные яремные вены, клетчатка

}

Какие сосуды проходят в ложе подчелюстной железы

{

- =общая сонная артерия
- =лицевая артерия и глоточная
- =подчелюстная артерия и вена
- =лицевой нерв, лицевая артерия и вена
- =лицевая артерия и вена

}

Для остановки кровотечения сонную артерию прижимают к

- =к остистотому отростку 6 шейного позвонка
- =к поперечному отростку 6 шейного позвонка
- =к поперечному отростку 7 шейного позвонка
- =к остистому отростку 7 шейного позвонка
- =к подъязычной кости

}

Для остановки кровотечения лицевую артерию прижимают к, в области

{

- =к скуловой кости
- =к углу нижней челюсти
- =к месту прикрепления жевательной мышцы
- =к краю нижней челюсти у переднего края жевательной мышцы
- =к краю нижней челюсти у заднего края жевательной мышцы

}

Практическое значение лестнично-позвоночного треугольника шеи

{

- =операции на сонных артериях и шейном узле симпатического нерва
- =операции на щитовидной железе
- =доступ к подчелюстной железе

=операции на позвоночной артерии и звездчатом узле симпатического нерва
=операции на плечеголовном стволе и звездчатом узле симпатического нерва
}

Какая фасция образует футляр для основного сосудисто-нервного пучка шеи
}

=2 фасция

=5 фасция

=париетальный листок 4 фасции

=висцеральный листок 4 фасции

=претрахеальная

}

На уровне верхнего края какого хряща проецируется место бифуркации общей сонной артерии

{

=щитовидный

=черполовидный

=кожновидный

=перстневидный

=рожковидный

}

Для каких мышц шеи образует фасциальный футляр первая фасция шеи

{

=подкожная

=ременная

=длинная

=передняя лестничная

=двубрюшная

}

Укажите для каких мышц шеи образует фасциальный футляр третья фасция шеи

{

=все правильные

=грудино-подъязычная

=лопаточно-подъязычная

=грудино- щитовидная

=щито-подъязычная

}

По краю какой мышцы определяется наружная граница третьей фасции шеи

{

=лопаточно-подъязычная

=двубрюшная

=челюстно-подъязычная
=щитоподъязычная
=длинная
}

Ход какого нерва объясняет необходимость проведения разреза в надподъязычной области параллельно краю нижней челюсти

{
=язычный
=краевая ветвь лицевого нерва
=подъязычный
=щитоподъязычный
=поперечный шеи
}

При повреждении какого нерва на шее во время операции угол рта на здоровой стороне подтягивается кверху.

{
=язычный
=краевая ветвь лицевого нерва
=подъязычный
=щитоподъязычный
=поперечный шеи
}

Какая вена проходит в толще второй фасции шеи в пределах подчелюстного треугольника

{
=язычная
=лицевая
=подбородочная
=поперечная шеи
=яремная
}

Укажите какая артерия проходит по верхней и глубокой сторонам заднего полюса подчелюстной железы вблизи стенки глотки

{
=подбородочная
=лицевая
=язычная
=поперечная шеи
=глубокая языка
}

Укажите верхне-наружную границу Пироговского треугольника.

{

=язычный нерв
=подъязычный нерв
=передний отдел двубрюшной мышцы
=задний отдел двубрюшной мышцы
=язычная артерия
}

Укажите -медиальную границу Пироговского треугольника.

{
=челюстно-подъязычная мышца
=подъязычно-язычная м.
=подбородочно-подъязычная м.
=подъязычный нерв
=задний отдел двубрюшной мышцы
}

Укажите нижнюю границу Пироговского треугольника.

{
=передний отдел двубрюшной мышцы
=задний отдел двубрюшной мышцы
=промежуточное сухожилие двубрюшной мышцы
=челюстно-подъязычная мышца
=подбородочно-подъязычная
}

Укажите ориентиром для нахождения какого анатомического образования служит Пироговский треугольник.

{
=подъязычный нерв
=язычный нерв
=лицевая артерия
=язычная артерия
=поперечная артерия шеи
}

Укажите какое анатомическое образование выполняет дно Пироговского треугольника.

{
=подъязычно-язычная мышца
=челюстно-подъязычная
=подбородочно-подъязычная
=передний отдел двубрюшной мышцы
=задний отдел двубрюшной мышцы
}

Укажите какой нерв лежит между общей сонной артерией и внутренней яремной веной .

{
=лицевой
=язычный
=добавочный
=блуждающий
=верхний гортанный
}

Укажите первую ветвь отходящую от наружной сонной артерии на шее.

{
=верхняя гортанная
=верхняя щитовидная
=воходящая глоточная
=лицевая
=затылочная
}

Какое венозное образование лежит в межапоневротическом надгрудном клетчаточном пространстве

{
=поперечная вена шеи
=передняя яремная вена
=яремная венозная дуга
=верхняя гортанная вена
=нижняя полая вена
}

Укажите как по отношению к пищеводу проходит правый возвратный гортанный нерв.

{
=по боковой стенке пищевода
=по задней стенке пищевода
=по передней стенке пищевода
=между трахеей и пищеводом
=по передней стенке трахеи
}

Укажите чем иннервируется трахея.

{
=язычный нерв
=лицевой нерв
=блуждающий нерв
=возвратный гортанный нерв
=верхний гортанный
}

При переходе воспалительного процесса с щитовидной железы на какой нерв голос

становится осиплым

{

=возвратный гортанный

=добавочный

=языкоглоточный

=блуждающий

=симпатический ствол

}

Ветви какой щитовидной артерии у задней поверхности боковой доли щитовидной железы пересекают возвратный гортанный нерв

{

=верхняя

=нижняя

=нижшая

=средняя

=непарная

}

Какой нерв лежит на наружной поверхности передней лестничной мышцы

{

=подъязычный

=добавочный

=диафрагмальный

=верхний гортанный

=большой затылочный

}

Чем образовано основание глубокого лестнично-позвоночного треугольника шеи

{

=подключичная вена

=подключичная артерия

=купол плевры

=ключица

=купол диафрагмы

}

Какая мышца образует внутреннюю границу лестнично-позвоночного треугольника

{

=ременная шеи

=длинная шеи

=передняя лестничная

=средняя лестничная

=трапецевидная

}

Какая мышца образует наружную границу лестнично-позвоночного треугольника

{

=ременная шеи

=длинная шеи

=передняя лестничная

=средняя лестничная

=трапецевидная

}

В каком отделе подключичная вена более всего доступна для пункции и чрескожной катеризации, благодаря её прочному сращению с окружающими фасциальными образованиями

{

=над ключицей в области средней ее трети

=над ключицей в области наружной ее трети

=под первым ребром

=между первым ребром и ключицей

=под вторым ребром

}

Содержимое подчелюстного треугольника

=щитовидная железа

=общая сонная артерия

=слюнная железа, лимфатические узлы

=подключичная артерия

=пищевод

}

снизуСонный треугольник ограничен:

{

=верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы

=грудино-ключично-сосцевидной мышцей

=задним брюшком двубрюшной мышцы

=передним брюшком двубрюшной мышцы

=передним брюшком двубрюшной мышцы

}

Поднижнечелюстная железа располагается в фасциальном ложе, образованном фасцией:

{

=поверхностной

=собственной

=лопаточно-ключичной

=внутришейной

=предпозвоночной

}

При субтотальной резекции щитовидной железы должна быть оставлена часть железы, содержащая паращитовидные железы. Такой частью является:

- {
- =верхний полюс боковых долей
- =задне-внутренняя часть боковых долей
- =задне-наружная часть боковых долей
- =передне-наружная часть боковых долей
- =нижний полюс боковых долей
- }

Сзади к гортани прилежит:

- {
- =глотка
- =доля щитовидной железы
- =паращитовидные железы
- =пищевод
- =шейный отдел позвоночника
- }

Диафрагмальный нерв располагается на:

- {
- =грудино-ключично-сосцевидной мышце над собственной фасцией
- =передней лестничной мышце поверх предпозвоночной фасции
- =передней лестничной мышце под предпозвоночной фасцией
- =средней лестничной мышце поверх предпозвоночной фасции
- =средней лестничной мышце под предпозвоночной фасцией
- }

Точка вкола иглы при проведении вагосимпатической блокады находится у:

- {
- =заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы на уровне его середины
- =заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы в месте его пересечения с наружной яремной веной
- =переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы на уровне его середины
- =переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы на уровне верхнего края щитовидного хряща
- =переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы на уровне верхнего края щитовидного хряща
- }

По классификации, предложенной В.Н. Шевкуненко, на шее выделяют:

- {
- =две фасции
- =три фасции
- =четыре фасции
- =пять фасций
- =шесть фасций
- }

=лежа на правом или левом боку

}

//Раздел 7: «Топографическая анатомия груди» (коды контролируемых компетенций - ИД1, ОПК5)

Основной лимфоотток от верхнего квадранта молочной железы осуществляется в лимфатические узлы:

{

=подключичные и надключичные;

=подмышечные;

=загрудинные;

=парастернальные;

=под большую грудную мышцу;

}

Основной лимфоотток от медиального квадранта молочной железы осуществляется в лимфатические узлы:

{

=подключичные;

=надключичные;

=парастернальные;

=подмышечные;

=субпекторальной клетчатки;

}

Межреберный сосудисто - нервный пучок расположен:

{

=по верхнему краю ребра;

=на передней поверхности ребра;

=на задней поверхности ребра;

=по нижнему краю ребра;

=между ребрами;

}

Отток лимфы от грудной стенки справа осуществляется главным образом в:

{

=правый яремный ствол;

=правый лимфатический проток;

=грудной лимфатический проток;

=левый яремный лимфатический ствол;

=левый подключичный ствол;

}

Полунепарная вена как правило впадает в вену:

{

=верхнюю полую;

- =нижнюю полую;
- =внутреннюю грудную;
- =непарную;
- =левую подключичную;

}

При скоплении воздуха в плевральной полости прокол плевры производят спереди грудной клетки в межреберье:

{

- =1;
- =1-2;
- =2-3
- =5-6;
- =7-8;

}

Через аортальное отверстие диафрагмы, кроме аорты, проходят:

{

- =пищевод;
- =блуждающий нерв;
- =диафрагмальный нерв;
- =грудной лимфатический проток;
- =непарная вена;

}

Через пищеводное отверстие диафрагмы, кроме пищевода, проходят:

{

- =аорта;
- =грудной лимфатический проток;
- =симпатический ствол;
- =непарная и полунепарная вены;
- =блуждающие нервы;

}

Отверстие нижней полой вены расположено в следующей части диафрагмы:

{

- =между медиальными и средними ножками;
- =реберной;
- =грудинной;
- =между медиальными ножками;
- =сухожильной;

}

Щель Ларрея в диафрагме расположена между:

{

- =поясничной и реберной частями справа;

- =поясничной и реберной частями слева;
- =реберной и грудной частями слева;
- =реберной и грудной частями справа;
- =медиальной и средней ножками диафрагмы;

В слабых местах диафрагмы отсутствуют мышечные волокна и соприкасаются листки:

- =париетальной плевры и брюшины;
- =подбрюшинной и подплевральной клетчаток;
- =внутригрудной и внутрибрюшной фасций;
- =внутригрудной фасции и брюшины;
- =париетальной плевры и внутрибрюшной фасции;

Щель Морганьи в диафрагме расположена между:

- =поясничной и реберной частями справа;
- =поясничной и реберной частями слева;
- =реберной и грудинной частями слева;
- =реберной и грудинной частями справа;
- =медиальной и промежуточной ножками поясничной части;

Среди диафрагмальных грыж чаще всего встречаются грыжи отверстия:

- =аортального;
- =нижней полой вены;
- =реберно-поясничных треугольников;
- =пищеводного отверстия;
- =реберно-грудинных треугольников;

Плевральная полость располагается между:

- =медиастинальной плеврой и перикардом;
- =париетальным и висцеральным листками плевры;
- =париетальным листком плевры и внутригрудной фасцией;
- =внутригрудной фасцией и висцеральным листком плевры;
- =правой и левой медиастинальными плевами;

Правый бронх по сравнению с левым бронхом:

- =уже;
- =длиннее;
- =шире;

=короче;
=одинаковый по длине и диаметру;
}

Правое легкое имеет доли:

{
=одну;
=две;
=три;
=четыре;
=пять;
}

В правом легком имеются междолевые борозды в количестве:

{
=одной;
=двух;
=трех;
=четырех;
=борозды отсутствуют;
}

Левое легкое состоит из долей в количестве:

{
=одной;
=двух;
=трех;
=четырех;
=пяти;
}

Легочная артерия в воротах левого легкого по отношению к бронху располагается:

{
=спереди;
=сзади;
=сверху;
=снизу;
=слева;
}

Составными элементами корня правого и левого легких являются все образования, кроме:

{
=бронхов;
=легочных артерий;
=легочных вен;
=стволов диафрагмальных нервов;

=лимфатических узлов и сосудов;

}

Диафрагмальные нервы по отношению к корням обоих легких расположены:

{

=сзади;

=спереди;

=снизу;

=сверху;

=медиально;

}

Блуждающие нервы по отношению к корням обоих легких расположены:

{

=спереди;

=сзади;

=медиально;

=сверху;

=снизу;

}

Сзади артериального протока (боталлов) располагается:

{

=левый блуждающий нерв;

=левый диафрагмальный нерв;

=левый возвратный нерв;

=дуга аорты;

=легочный ствол;

}

Через артериальный (боталлов) проток кровь из легочной артерии попадает в:

{

=правые легочные вены;

=левые легочные вены;

=аорту;

=верхнюю полую вену;

=нижнюю полую вену;

}

К пристеночным ветвям грудной аорты относятся:

{

=бронхиальные;

=пищеводные;

=средостенные;

=межреберные;

=сердечной сумки;
}

Грудной отдел пищевода начинается на уровне грудных позвонков:

{
=Th1;
=Th2;
=Th3;
=Th4;
=Th5;
}

Пищевод имеет сужения:

{
=одно;
=два;
=три;
=четыре;
=не имеет;
}

Венозный отток от грудного отдела пищевода главным образом осуществляется в систему вены:

{
=воротной;
=верхней поллой;
=нижней поллой;
=верхней и нижней полых;
=ни один из вариантов;
}

Венозный отток от брюшного отдела пищевода главным образом осуществляется в систему вены:

{
=верхней поллой;
=нижней поллой;
=воротной;
=верхней и нижней полых;
=ни один из вариантов;
}

Под аплазией пищевода понимается:

{
=полная облитерация пищевода;
=полное или частичное отсутствие пищевода;
=частичная облитерация пищевода;
=укорочение пищевода;

=удвоение пищевода;
}

Левый блуждающий нерв расположен по отношению к стенке пищевода:

{
=слева;
=справа;
=спереди;
=сзади;
=сзади и слева;
}

Полунепарная вена является продолжением:

{
=межреберных вен;
=левой восходящей поясничной вены;
=правой восходящей поясничной вены;
=поперечных поясничных вен;
=вен пищевода;
}

На каком легком выполняется билобэктомия

{
=правое
=левое
=сторона не имеет значения
=на обоих одновременно
=не выполняется ни на каком
} .

Край какой мышцы служит нижней границей передне-верхней области груди

{
=большой грудной
=малой грудной
=передней зубчатой
=трапецевидной
=лопаточной
}

Ветвью какой артерии является внутренняя грудная артерия

{
=подмышечной
=дуги аорты
=подключичной
=общей сонной
=брюшная аорта

}

Какая фасция образует капсулу молочной железы

{

=поверхностная фасция груди

=поверхностный листок собственной фасции груди

=ключично-реберная фасция

=собственная

=широкая

}

Куда прикрепляется поддерживающая связка молочной железы

{

=к ключице

=к клювовидному отростку лопатки

=к большому бугорку головки плечевой кости

=к первому ребру

=к третьему ребру

}

Какой разрез при гнойном субареолярном мастите с анатомической точки зрения наиболее обоснован

{

=по наружной окружности околососкового кружка

=радиальный за пределами околососкового кружка

=по переходной складке под молочной железой

=по нижней переходной складке

=через толщу железы

}

Какой разрез при гнойном ретромаммарном мастите обоснован с анатомической точки зрения

{

=по наружной окружности околососкового кружка

=радиальный за пределами околососкового кружка

=по переходной складке под молочной железой

=через толщу железы

=поперечный

}

Какой разрез при гнойном интерстициальном или паренхиматозном мастите является анатомически наиболее обоснованным

{

=по наружной окружности околососкового кружка

=радиальный за пределами околососкового кружка

=поперечный над органом воспаления

=параллельно ребрам
=по кожной переходной складке
}

Какой лимфатический узел поражается раньше других при раке молочной железы
{

=узел Зоргиуса
=узел Розенмюллера-Пирогова
=узел Вирхова
=узел Роттера
=узел Магомедова
}

Какой сосуд выходит из левого желудочка
{

=легочный артериальный ствол
=дуга аорты
=восходящая аорта
=плечеголовной ствол
=левая подключичная артерия
}

Какой сосуд выходит из правого желудочка
{

=легочный артериальный ствол
=верхняя полая вена
=нижняя полая вена
=аорта
=легочные вены
}

Сколько легочных вен впадает в левое предсердие
{

=одна
=две
=три
=четыре
=пять
}

Где располагается сердце
{

=в переднем средостении
=в заднем средостении
=на границе переднего и заднего средостений
=частично в переднем и заднем средостении
=в забрюшинном пространстве

}

Где находится трехстворчатый клапан

{

=между левым предсердием и левым желудочком

=между правым предсердием и правым желудочком

=в верхней полой вене

=в аорте

=в легочном стволе

}

Куда впадает верхняя полая вена

{

=в венозную пазуху

=в левое предсердие

=в правый желудочек

=в правое предсердие

=левый желудочек

}

Куда впадает нижняя полая вена

{

=в венозную пазуху

=в левое предсердие

=в правый желудочек

=в правое предсердие

=в левый желудочек

}

Где располагается грудной отдел пищевода

{

=в переднем средостении

=в заднем средостении

=в заднем средостении слева от позвоночника

=на границе переднего и заднего средостения

=верхнем средостении

}

Где располагается митральный клапан

{

=между левым предсердием и левым желудочком

=между правым предсердием и правым желудочком

=в аорте

=в легочной артерии

=в легочных венах

}

Емкость какой из плевральных пазух является наибольшей

- {
- =реберно-диафрагмальной
- =средостенно-диафрагмальной
- =реберно-средостенной
- =верхняя реберно-средостенная
- =задняя средостенно-реберная
- }

Какой крупный сосуд огибает корень правого легкого снизу вверх и сзади

- {
- =верхняя полая вена
- =дуга аорты
- =непарная вена
- =нижняя полая вена
- =легочная артерия
- }

Какой крупный сосуд прилежит к корню левого легкого сверху

- {
- =полунепарная вена
- =дуга аорты
- =легочный ствол
- =непарная вена
- =нижняя полая вена
- }

С каким пространством шеи связано переднее средостение

- {
- =превисцеральным
- =ретровисцеральным
- =надгрудинным
- =карманами Грубера
- =заглоточное пространство
- }

Какая ветвь внутренней грудной артерии сопровождает диафрагмальный нерв

- {
- =мышечно-диафрагмальная артерия
- =верхняя надчревная артерия
- =перикардиодиафрагмальная артерия
- =прободающая
- =мышечно-межреберная
- }

Какое положение занимает правый блуждающий нерв по отношению к нижнегрудному отделу пищевода

{
=сзади от пищевода
=спереди от пищевода
=слева от пищевода
=справа от пищевода
=латерально от пищевода
}

От каких нервов отходят возвратные гортанные нервы

{
=от диафрагмальных
=от блуждающих
=от симпатического ствола
=от шейного сплетения
=от языкоглоточных
}

Какие артерии принимают участие в кровоснабжении сердца

{
=коронарные артерии
=внутренние грудные артерии
=бронхиальные и средостенные артерии
=латеральные грудные артерии
=легочные артерии
}

Поверхностное субпекторальное пространство располагается

{
=под малой грудной мышцей
=латерально от малой грудной мышцы
=медиально от малой грудной мышцы
=над большой грудной мышцей
=между большой и малой грудной мышцами
}

Глубокое субпекторальное пространство располагается

{
=над малой грудной мышцей
=латерально от малой грудной мышцы
=между большой и малой грудной мышцами
=под малой грудной мышцей
=под малой грудной мышцей и поверхностной фасцией
}

Мышечные порции какой мышцы достигают грудины

{
=наружные межреберные

=внутренние межреберные

=подреберной

=трапецевидной

=подязычно-язычной

}

Медиальная граница молочной железы.

{

=срединная линия

=грудинная

=окологрудинная линия

=сосковая линия

=средняя ключичная

}

Латеральная граница молочной железы.

{

=среднеключичная линия

=сосковая линия

=передняя подмышечная линия

=средняя подмышечная линия

=ключичная

}

Какое анатомическое образование обеспечивает подвижность молочной железы

{

=ретромаммарное клетчаточное пространство

=кожа

=грудная фасция

=внутригрудная фасция

=подкожная клетчатка

}

Место прикрепления фасции связки, поддерживающей молочную железу, нарушение целостности которой приводит к опущению молочной железы.

{

=угол грудины

=тело грудины

=клювовидный отросток

=акромиальный конец ключицы

=тело ключицы

}

Укажите основной путь лимфооттока от молочной железы.

{

=подмышечные

=подключичные

=средостение
=межреберные
=висцеральные живота
}

Какое анатомическое образование проходит в сухожильном центре диафрагмы

{
=аорта
=нижняя полая вена
=непарная вена
=блуждающий нерв
=симпатический ствол
}

Укажите самый большой плевральный синус.

{
=реберно-диафрагмальный
=реберно-медиастинальный
=диафрагмально-медиастинальный
=позвоночно-диафрагмальный
=позвоночно-медиастинальный
}

В какой бронх в 70% случаев попадают инородные тела верхних дыхательных путей

{
=правый
=левый
=средний
=верхний
=нижний
}

Какие анатомические образования образуют заднюю границу сердца

{
=правое предсердие
=левое предсердие, нижняя полая вена
=верхняя полая вена
=левый желудочек
=правое ушко
}

Какие анатомические образования включает в себя верхушка сердца

{
=правый желудочек
=левый желудочек
=правое предсердие

=межжелудочковая перегородка

=левое предсердие

}

Каким клапаном разделяется правое предсердие и правый желудочек

{

=двухстворчатым

=трехстворчатым

=полулунным

=митральным

=одностворчатым

}

В молочной железе количество радиально расположенных долек равно:

{

=10-15

=15-20

=20-25

=25-30

=25-30

}

Выпот в плевральной полости, прежде всего, начинает накапливаться в синусе:

{

=реберно-диафрагмальном

=реберно-средостенном

=средостенно-диафрагмальном

=средостенно-диафрагмальном

=средостенно-диафрагмальном

}

При выполнении диагностической плевральной пункции пунктируется:

{

=реберно-диафрагмальный синус

=реберно-средостенный синус

=средостенно-диафрагмальный синус

=средостенно-диафрагмальный синус

=средостенно-диафрагмальный синус

}

Количество сегментов в правом легком равно:

{

=8

=9

=10

=11

=12

}

Количество сегментов в левом легком чаще равно:

{

=8

=9-10

=13-14

=11

=12

}

Капсула молочной железы образована:

{

=собственной фасцией груди

=поверхностной фасцией

=ключично-грудной фасцией

=молочная железа лежит вне фасций

=молочная железа лежит вне фасций

}

Лимфатический узел Зоргиуса располагается:

{

=над ключицей позади наружного края грудино-ключично-сосцевидной мышцы

=по ходу внутренней грудной артерии

=в центре подмышечной впадины

=под наружным краем большой грудной мышцы на уровне 3-го ребра

=под краем широчайшей мышцы спины

}

Межреберный сосудисто-нервный пучок расположен:

{

=под грудной фасцией

=между межреберными мышцами

=в параплевральной клетчатке

=под поверхностной фасцией

=между разными тканями в зависимости от отделов грудной стенки

}

Внутренняя грудная артерия отходит от:

{

=подмышечной артерии

=подключичной артерии

=наружной сонной артерии

=дуги аорты

=плечеголовного ствола

}

Пункцию плевральной полости при разлитом процессе производят при положении больного:

{

=лежа на боку

=лежа на животе

=сидя с согнутым туловищем

=полусидя

=положение больного не имеет значения

}

Наиболее тяжелые нарушения наблюдаются при пневмотораксе:

{

=открытом

=закрытом

=клапанном

=спонтанном

=комбинированном

}

Шейная вагосимпатическая блокада при ранениях груди проводится с целью:

{

=уменьшения явлений гипоксии

=борьбы с плевропульмональным шоком

=профилактики пневмонии

=гипервентиляции легких

=гипервентиляции легких

}

органы заднего средостения:

{

=вилочковая железа

=пищевод

=сердце

=трахея

=перикард

}

нервы переднего средостения:

{

=блуждающие

=большие и малые внутренностные нервы

=диафрагмальные нервы

=симпатические стволы

=межрёберные

}

При крупном дефекте межпредсердной или межжелудочковой перегородок в ходе операции применяется:

{

=пластика дефекта

=сшивание дефекта

=эндоваскулярная сшивание дефекта

=комиссуротомия

=вальвулотомия

}

Вилочковая железа располагается:

{

=в верхнем отделе переднего средостения

=в нижнем отделе переднего средостения

=в верхнем отделе заднего средостения

=в нижнем отделе заднего средостения

=на границе переднего и заднего средостений

}

Сзади и слева к верхней поллой вене прилежит:

{

=трахея

=пищевод

=перикард и сердце

=вилочковая железа

=восходящая аорта

}

Вдоль правой стенки верхней поллой вены располагается:

{

=корень правого легкого

=правый блуждающий нерв

=правый диафрагмальный нерв

=грудная часть грудного протока

=правый симпатический нерв

}

Непарная вена чаще впадает:

{

=в переднюю стенку верхней поллой

=в заднюю стенку верхней поллой

=в правую стенку верхней поллой

=в левую стенку верхней поллой

=определенного места впадения нет

}

Левый возвратный гортанный нерв от левого блуждающего нерва обычно отходит:

{

=выше дуги аорты

=на уровне передней стенки дуги аорты

=у нижнего края дуги аорты

=на всех вышеперечисленных уровнях

=возвратный нерв в грудной полости от блуждающего не отходит

}

Правый возвратный гортанный нерв от правого блуждающего нерва обычно отходит:

{

=у верхнего края правой подключичной артерии

=у нижнего края правой подключичной артерии

=на уровне корня легкого

=у места отхождения плечевого ствола

=на уровне верхнего края дуги аорты

}

Корень правого легкого сверху огибает:

{

=дуга аорты

=верхняя полая вена

=правая плечеголовная вена

=непарная вена

=грудной проток

}

В заднем средостении пищевод на всем протяжении прилежит к:

{

=полунепарной вене

=левому симпатическому стволу

=грудному протоку

=аорте

=трахее

}

//Раздел 8: «Топографическая анатомия брюшной стенки» (коды контролируемых компетенций - ИД1, ОПК5)

Какой из перечисленных органов проецируется преимущественно в правой подреберной области

{

=печень

=желудок

=селезенка
=поджелудочная железа
=сигмовидная кишка
}

Какой из перечисленных органов проецируется преимущественно в пределах собственно надчревной области

{
=желудок
=поперечноободочная кишка
=тонкая кишка
=селезенка
=почка
}

Какой из перечисленных органов проецируется в правой подвздошной области {

=тощая кишка
=нисходящий отдел толстой кишки
=слепая кишка
=желудок
=сигмовидная кишка
}

Какой из перечисленных органов проецируется в левой подвздошной области

{
=восходящая ободочная кишка
=сигмовидная кишка
=конечный отдел подвздошной кишки
=аппендикс
=прямая кишка
}

Уточните положение паховой грыжи по отношению к паховой связке

{
=выше паховой связки
=ниже паховой связки
=может быть выше и ниже паховой связки
=латерально от паховой связки
=медиально от паховой складки
}

В какой области живота располагается паховый канал

{
=в надлобковой области
=в паховой области
=в области бедренного треугольника
=в эпигастральной

=в правом подреберье

}

В какой области располагается бедренный канал

{

=в паховой области

=в пределах бедренного треугольника

=в задней области бедра

=в эпигастриальной

=Гунтеровом канале

}

Чем образована передняя стенка фиброзного влагалища прямых мышц живота на 5 см ниже пупка (ниже полукружной линии)

{

=апоневрозом наружной косой мышцы живота

=всеми сухожилиями широких мышц живота

=поперечной фасцией живота =все правильно

=апоневрозом внутренней косой мышцы живота

}

Где находится полукружная линия (Дугласа) футляра прямой мышцы живота

{

=на уровне пупка

=на 4-5 см выше пупка

=на 4-5 см ниже пупка

=в правом подреберье

=в левом подреберье

}

Чем образована задняя стенка влагалища прямой мышцы живота ниже полукружной линии (Дугласа)

{

=апоневрозом поперечной мышцы живота

=апоневрозом внутренней косой и

поперечной мышц живота

=поперечной фасцией живота

=все правильно

=томсоновой пластинкой

}

Связи каких подкожных вен пупочной области при портальной гипертензии могут служить порто-кавальными анастомозами

{

=с околопупочными венами (v.v.paraumbilicalis)

=с верхними и нижними надчревными венами (v.v. epigastricae superior et inferior)

=с поверхностной надчревной веной (v.epigastrica superficialis)

=с грудонадчревными венами (v.v.thoracoepigastricae)

=все правильно

}

Какие связи подкожных вен пупочной области могут служить кава-кавальными анастомозами

{

=с поверхностными надчревными венами (v.v. epigastricae superficialis)

=с грудно-чревными, поверхностными надчревными, верхними и нижними венами (v.v. thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superior et inferiores)

=с пупочной веной (v. umbilicalis)

=с яремной веной

=с межреберными венами

}

На каком уровне белая линия живота имеет наибольшую ширину

{

=под мечевидным отростком

=на уровне пупка

=на 5 см ниже пупка

=над лобковым симфизом

=все правильно

}

На каком уровне возможно образование грыж белой линии живота

{

=выше пупка

=на 5 см. ниже пупка

=над лобковым симфизом

=в области пупка

=все правильно

}

При какой форме пахового промежутка чаще возникают паховые грыжи

{

=при высоком и широком паховом промежутке, имеющем треугольную форму

=при паховом промежутке, имеющем щелевидно-овальную форму

=форма пахового промежутка значения не имеет

=все правильно

=при квадратной форме пахового промежутка

}

Какое анатомически слабое место может служить грыжевыми воротами при прямой паховой грыже

{

=медиальная паховая ямка
=латеральная паховая ямка
=внутреннее отверстие бедренного канала
=наружное отверстие пахового канала
=все правильно
}

Какое анатомически слабое место служит грыжевыми воротами при бедренной грыже
{
=латеральная паховая ямка
=медиальная паховая ямка
=внутреннее отверстие бедренного канала
=наружное отверстие бедренного канала
=бедренный треугольник
}

Какие пары межреберных нервов иннервируют кожу живота на уровне пупка
{
=IX пара
=X пара
=XI пара
=XII пара
=XIII пара
}

Между какими мышцами живота в боковых областях располагаются нервы брюшной стенки
}
=между наружной и внутренней косыми
=между внутренней косой и поперечной
=между поперечной мышцей и внутрибрюшной фасцией
=между наружной косой и поперечной
=все правильно
}

С какой стороны необходимо обойти пупок при срединной лапаротомии
{
=слева
=справа
=сторона не имеет значения
=сверху
=снизу
}

Какое положение занимает грыжевой мешок при прямой паховой грыже по отношению к семенному канатику
{

- =располагается вне семенного канатика
- =располагается внутри семенного канатика
- =может располагаться как внутри так и снаружи семенного канатика
- =располагается внутри семенного канатика, но в мешок не опускается

Какое отношение к оболочкам семенного канатика занимает грыжевой мешок при косой паховой грыже

- =грыжевой мешок находится внутри оболочек семенного канатика
- =грыжевой мешок находится вне семенного канатика
- =грыжевой мешок может быть как внутри, так и вне оболочек семенного канатика
- =грыжевой мешок является стенкой семенного канатика
- =семенной канатик находится внутри грыжевого мешка

Какое отношение к оболочкам семенного канатика занимает грыжевой мешок при прямой паховой грыже

- =грыжевой мешок находится внутри оболочек семенного канатика
- =грыжевой мешок находится вне оболочек семенного канатика
- =грыжевой мешок может быть как внутри, так и вне оболочек семенного канатика
- =грыжевой мешок является стенкой семенного канатика
- =семенной канатик находится внутри грыжевого мешка

Какое анатомически слабое место может служить грыжевыми воротами при косой паховой грыже

- =медиальная паховая ямка
- =латеральная паховая ямка
- =внутреннее отверстие бедренного канала
- =наружное отверстие пахового канала
- =область пупка

Какое анатомически слабое место может служить грыжевыми воротами при прямой паховой грыже

- =медиальная паховая ямка
- =латеральная паховая ямка
- =внутреннее отверстие бедренного канала
- =наружное отверстие пахового канала
- =область пупка

Какое анатомическое образование следует рассечь для ликвидации ущемления любой паховой грыжи у наружного отверстия пахового канала

- {
- =апоневроз наружной косой мышцы живота
- =паховую связку
- =гребешковую связку
- =внутреннюю и поперечную мышцы живота
- =лакунарную связку
- }

Какие из нижеперечисленных слоев брюшной стенки должны быть рассечены для обнажения грыжевого мешка при паховой грыже

- {
- =кожа, подкожная клетчатка и фасция Томпсона
- =кожа, подкожная клетчатка и апоневроз наружной косой мышцы живота
- =кожа, подкожная клетчатка, наружная и внутренняя косые мышцы живота
- =кожа, брюшина
- =кожа, прямая мышца живота
- }

В чем сущность операции Бассини при бедренной грыже

- {
- =в подшивании к лонной связке внутренней косой и поперечной мышц живота
- =в подшивании паховой связки к лонной из бедренного доступа
- =в подшивании паховой связки к лонной из пахового доступа
- =в подшивании паховой связки к поперечной фасции
- =в подшивании паховой связки к широкой фасции бедра
- }

В чем сущность операции Руджи при бедренной грыже

- {
- =в подшивании к лонной связке внутренней косой и поперечной мышц живота
- =в подшивании паховой связки к лонной из бедренного доступа
- =в подшивании паховой связки к лонной из пахового доступа
- =в подшивании паховой связки к широкой фасции бедра
- =в подшивании паховой связки к поперечной фасции
- }

В чем сущность операции Парлавецчио при бедренной грыже

- {
- =в подшивании к лонной связке внутренней косой и поперечной мышц живота
- =в подшивании паховой связки к лонной из бедренного доступа
- =в подшивании паховой связки к лонной из пахового доступа
- =в подшивании паховой связки к широкой фасции бедра
- =в подшивании паховой связки к поперечной фасции
- }

Укажите направление волокон наружной косой мышцы живота.

- {
- =снизу вверх и снаружи внутрь
- =снизу вниз и снаружи кнаружи
- =сверху вниз и снаружи внутрь
- =снизу вверх и изнутри кнаружи
- =волнообразно
- }

Какие анатомические образования составляют заднюю стенку влагалища прямой мышцы живота в нижнем её отделе

- {
- =мышечная и апоневротическая части поперечной мышцы живота
- =поверхностный листок апоневроза внутренней косой мышцы живота
- =aponевроз внутренней косой мышцы живота
- =поперечная фасция
- =aponевроз внутренней косой мышцы живота
- }

Укажите какие анатомические образования формируют складку брюшины, идущую от верхушки мочевого пузыря к пупку.

- {
- =мочевой проток
- =пупочная вена
- =околопупочная вена
- =пупочная артерия
- =мочепузырная вена
- }

Укажите какие анатомические образования формируют складку брюшины, идущую от боковых поверхностей мочевого пузыря к пупку.

- {
- =мочевой проток
- =околопупочная вена
- =пупочная артерия
- =мочепузырная вена
- =пупочная вена
- }

Укажите какие анатомические образования формируют латеральную пупочную складку брюшины.

- {
- =пупочная вена
- =мочепузырная вена
- =нижняя надчревная артерия
- =мочевой проток

=пупочная атерия

}

Какими анатомическими образованиями ограничена латеральная паховая ямка

{

=срединная пупочная складка

=медиальная пупочная складка

=медиальная паховая складка

=околопузырная ямка

=латеральная пупочная складка

}

Какая артерия огибает изнутри семенной канатик (круглую связку матки)

{

=поверхностная надчревная артерия

=глубокую артерию, огибающую подвздошную кость

=нижняя надчревная артерия

=поясничные артерии

=межреберные артерии

}

Укажите анатомические образования передней стенки пахового канала .

{

=нижний край внутренней косой мышцы живота

=поперечная фасция

=апоневроз наружной косой мышцы живота

=паховая связка

=апоневроз поперечной мышцы живота

}

Укажите анатомические образования верхней стенки пахового канала у здоровых людей.

{

=поперечная фасция

=нижний край поперечной мышцы живота

=апоневроз наружной косой мышцы живота

=апоневроз поперечной мышцы живота

=паховая связка

}

Укажите анатомические образования нижней стенки пахового канала у здоровых людей.

{

=лакунарная связка

=гребенчатая связка

=нижний край внутренней косой мышцы живота

=паховая связка

=апоневроз поперечной мышцы живота

}

Укажите анатомические образования задней стенки пахового канала у здоровых людей.

{

=подпора белой линии

=прямая мышца

=поперечная фасция

=нижний край поперечной мышцы живота

=апоневроз поперечной мышцы живота

}

Укажите через какую паховую ямку на задней поверхности брюшной стенки выходит грыжевой мешок при косой паховой грыже

{

=надпузырная

=медиальная паховая

=латеральная паховая

=повздошно-гребенчатая

=бедренная

}

Укажите через какую паховую ямку на задней поверхности брюшной стенки выходит грыжевой мешок при прямой паховой грыже.

{

=надпузырную

=медиальную паховую

=латеральную паховую

=повздошно-гребенчатая

=задняя паховая

}

Мышечные волокна какой мышцы рассекает хирург вместе с влагалищной оболочкой семенного канатика, при выделении грыжевого мешка при операции грыжесечения.

{

=пирамидальная

=внутренняя косая живота

=поперечная живота

=поднимающая яичко

=апоневроз наружной косой мышцы живота

}

Наиболее важной характеристикой скользящей грыжи является:

{

=врождённая анатомическая аномалия

=грыжа возникает в результате травмы

=стенкой грыжевого мешка является полый орган

=грыжа склонна к ущемлению

=скользящую грыжу не возможно отличить от обычной до операции

}

Чем образованна срединная пупочная складка брюшины

{

=облитерированным эмбриональным мочевым протоком

=облитерированной пупочной веной

=пупочной связкой

=пупочной артерией

=круглыми связками матки

}

Чем образованы пупочно-пузырные складки брюшины

{

=облитерированными пупочными венами

=семенными канатиками

=круглыми связками матки

=облитерированными пупочными артериями

=пупочной связкой

}

Белая линия живота образуется за счет:

{

=апоневроза наружной косой мышцы живота

=апоневроза внутренней косой мышцы живота

=апоневроза поперечной мышцы живота

=сухожильных пучков 3-х пар широких мышц живота

=внутрибрюшной фасции

}

Выполняя трансректальный доступ в подчревной области, хирург вскрывает влагалище прямой мышцы живота. На уровне ниже полукружных линий передняя стенка влагалища формируется:

{

=апоневрозом наружной косой мышцы живота

=апоневрозом наружной косой, внутренней косой и поперечной мышц

=апоневрозом внутренней косой мышцы живота

=апоневрозом наружной косой мышцы живота и поперечной фасцией

=поперечной мышцей и поперечной фасцией

}

При выполнении продольной лапаротомии в боковой области живота при рассечении

слоев брюшной стенки возможно повреждение глубоких сосудов и нервов данной области. Эти анатомические структуры расположены:

- {
- =в подкожной жировой клетчатке
- =между наружной и внутренней косой мышцей
- =между внутренней косой и поперечной мышцей
- =между поперечной мышцей и поперечной фасцией
- =в предбрюшинной клетчатке
- }

Для проведения артериальной перфузии нижних конечностей производят катетеризацию нижней надчревной артерии. Этот сосуд расположен:

- {
- =в подкожной жировой клетчатке
- =впереди прямой мышцы живота
- =в толще прямой мышцы живота
- =позади прямой мышцы живота
- =позади косой мышцы живота
- }

Иннервацию пупочной области передней брюшной стенки осуществляют:

- {
- =чревное сплетение
- =VII-IX межреберные нервы
- =IX-XI межреберные нервы
- =XII межреберные нервы
- =подвздошно-подчревный нерв
- }

Образующаяся в результате развития плода срединная пузырно-пупочная складка содержит:

- {
- =облитерированную пупочную артерию
- =облитерированную пупочную вену
- =облитерированный мочевой проток
- =семявыносящий проток
- =желчевыносящий проток
- }

Латеральная пузырно-пупочная складка брюшины содержит:

- {
- =нижние надчревные артерию и вену
- =облитерированную пупочную артерию
- =облитерированную пупочную вену
- =облитерированный мочевой проток
- =семявыносящий проток
- }

Медиальная пузырно-пупочная складка брюшины содержит:

- {
- =нижние надчревные артерию и вену
- =облитерированную пупочную артерию
- =облитерированную пупочную вену
- =облитерированный мочевой проток
- =семявыносящий проток
- }

На переднюю боковую стенку живота желудок проецируется в следующих областях:

- {
- =в левой подреберной и пупочной
- =в левой подреберной и собственно надчревной
- =в левой и правой подреберной
- =в левой подреберной и левой боковой
- =в левой подреберной и правой боковой
- }

Поверхностная фасция в нижних отделах переднебоковой стенки живота:

- {
- =отсутствует
- =сливается с собственной фасцией
- =имеет один листок
- =имеет два листка
- =имеет более двух листков
- }

При обследовании больного с острым аппендицитом хирург для оценки состояния слепой кишки и червеобразного отростка с учетом их анатомической проекции пальпирует:

- {
- =правую боковую область живота
- =левую боковую область живота
- =правую паховую область
- =левую паховую область
- =лобковую область
- }

Восходящая ободочная кишка проецируется в:

- {
- =левой боковой области живота
- =правой боковой и правой подреберной областях
- =правой боковой и пупочной областях
- =правой боковой и надчревной областях
- =правой боковой области живота

}

Одним из требований к оперативным доступам является их соответствие анатомической проекции органа. При выполнении операций на нисходящей ободочной кишке с этой позиции наиболее оптимальным следует считать доступ в:

{

=пупочной области

=левой боковой области живота

=правой боковой области живота

=надчревной области

=левой паховой области

}

С учетом анатомической проекции сигмовидной кишки сигмо-стома накладывается в:

{

=пупочной области

=левой боковой области живота

=правой боковой области живота

=надчревной области

=левой паховой области

}

Паховый промежуток - это:

{

=расстояние между наружным и внутренним кольцами пахового канала

=расстояние между паховой связкой и нижними краями внутренней косой и поперечной мышц

=расстояние между паховой связкой и поперечной фасцией

=расстояние между передней и задней стенками пахового канала

=пахового промежутка не существует

}

Пространство под паховой связкой делится на:

{

=грыжевую, мышечную и сосудистую лакуны

=грыжевую и мышечную лакуны

=грыжевую и сосудистую лакуны

=мышечную и сосудистую лакуны

=мышечную, сосудистую лакуны и бедренный канал

}

При ущемленной бедренной грыже рассекают стенку глубокого бедренного кольца:

{

=переднюю

=заднюю

=наружную

=внутреннюю

=никакую

}

Передней стенкой пахового канала является:

{

=поперечная фасция

=париетальная брюшина

=апоневроз наружной косой мышцы живота

=нижние края внутренней косой и поперечной мышц

=паховая связка

}

Задняя стенка пахового канала образована:

{

=париетальной брюшиной

=паховой связкой

=поперечной фасцией

=апоневрозом наружной косой мышцы живота

=апоневрозом внутренней косой мышцы живота

}

Нижняя стенка пахового канала образована:

{

=нижними краями внутренней косой и поперечной мышц

=паховой связкой

=гребешковой фасцией

=париетальной брюшиной

=апоневрозом наружной косой мышцы живота

}

Ущемление паховых грыж чаще всего происходит в области:

{

=глубокого пахового кольца

=надпузырной ямки

=поверхностного пахового кольца

=пахового промежутка

=закономерности не выявлено

}

Поперечная фасция является стенкой пахового канала:

{

=верхней

=нижней

=задней

=передней

=латеральной

}

Паховая связка является стенкой пахового какала:

- {
- =верхней
- =нижний
- =задней
- =передней
- =наружной
- }

У больного диагностирована прямая паховая грыжа. Анатомическим путем выхода данного вида грыж является:

- {
- =латеральная паховая ямка
- =надпузырная ямка
- =медиальная паховая ямка
- =мышечная лакуна
- =сосудистая лакуна
- }

Анатомическим местом выхода косых паховых грыж является:

- {
- =латеральная паховая ямка
- =медиальная паховая ямка
- =мышечная лакуна
- =надпузырная ямка
- =сосудистая лакуна
- }

Передней стенкой бедренного канала является:

- {
- =бедренная вена
- =бедренная артерия
- =глубокий листок широкой фасции бедра
- =поверхностный листок широкой фасции бедра
- =гребешковая фасция
- }

Заднюю стенку бедренного канала составляет:

- {
- =бедренная вена
- =бедренный нерв
- =поверхностный листок широкой фасции бедра
- =гребенчатая фасция
- =паховая связка
- }

Задненижнюю стенку внутреннего бедренного кольца составляет:

- {
- =влагалище бедренной вены
- =гребенчатая связка
- =паховая связка
- =влагалище бедренной артерии
- =ни один из вариантов
- }

Медиальную стенку внутреннего бедренного кольца составляет:

- {
- =влагалище бедренной вены
- =паховая связка
- =лакунарная связка (Жимбернатова)
- =края внутренней косой и поперечной мышц живота
- =влагалище прямой мышцы живота
- }

Хирург оперирует больного с ущемленной паховой грыжей. После выделения грыжевого мешка он должен выполнить:

- {
- =анестезию ущемляющего кольца
- =пластику пахового канала
- =рассечение грыжевого мешка
- =рассечение ущемляющего кольца
- =рассечение ущемляющего кольца
- }

Грыжевой мешок при врожденной паховой грыже образован:

- {
- =влагалищным отростком брюшины
- =париетальной брюшиной
- =брыжейкой тонкой кишки
- =оболочками яичка
- =стенками мочевого пузыря
- }

Под термином «паховый промежуток» понимают:

- {
- =величину диаметра внутреннего пахового кольца
- =величину диаметра наружного пахового кольца
- =расстояние между верхней и нижней стенками пахового канала в его медиальном участке
- =область грыжевых ворот
- =расстояние между ножками наружного пахового кольца
- }

Заднюю стенку пахового канала укрепляют:

- {
- =при косой паховой грыже
- =при прямой паховой грыже
- =при врожденной паховой грыже
- =при ущемленной грыже
- =определяется желанием хирурга
- }

Разрез при операции по поводу паховой грыжи располагается:

- {
- =параллельно паховой связке на 2 см ниже нее
- =параллельно паховой связке на 2 см выше нее
- =по проекции паховой связки
- =над грыжевым мешком
- =горизонтально на границе наружной и средней трети длины паховой связки
- }

Показаниями к экстренной операции являются следующие грыжи переднебоковой брюшной стенки:

- {
- =врожденные
- =ущемленные
- =скользящие
- =неправимые
- =все перечисленные
- }

При пластике пахового канала у больного с наружной косой паховой грыжей действия хирурга направлены на укрепление стенки пахового канала:

- {
- =верхней
- =передней
- =задней
- =нижней
- =средней
- }

При пластике пахового канала у больного с прямой паховой грыжей действия хирурга направлены на укрепление стенки пахового канала:

- {
- =верхней
- =передней
- =задней
- =нижней
- =средней

}

При пластике пахового канала по Ру-Оппелю выполняют:

- {
- =рассечение апоневроза наружной косой мышцы и создание изнего дубликатуры
- =создание дубликатуры из апоневроза наружной косой мышцы без рассечения последнего
- =сужение только наружного пахового кольца
- =укрепление задней стенки канала
- =укрепление передней и задней стенок канала
- }

При операции бедренной грыжи бедренным способом сшивают:

- {
- =паховую связку с лаку парной
- =паховую связку с гребенчатой
- =внутреннюю косую и поперечную мышцы с паховой и гребенчатой связками
- =апоневроз наружной косой мышцы живота с гребенчатой фасцией
- =лакунарную связку с гребенчатой
- }

Недостаток применения бедренного способа операции бедренной грыжи заключается в возможности:

- {
- =сдавления большой подкожной вены
- =увеличения пахового промежутка при смещении вниз паховой связки
- =сдавления сосудисто-нервного пучка бедра
- =повреждения бедренных сосудов
- =повреждения бедренных сосудов
- }

«Корона смерти» - это вариант отхождения артерии:

- {
- =бедренной
- =надчревной нижней
- =надчревной верхней
- =запирательной
- =внутренней подвздошной
- }

При выполнении средне-срединной лапаротомии:

- {
- =пупок обходят справа
- =пупок обходят слева
- =пупок рассекают вдоль
- =пупок рассекают поперек

=выбор стороны не имеет значения

}

При пластике бедренного канала по Руджи сшивают:

{

=паховую связку и подвздошно-поясничную мышцу

=паховую связку и подвздошно-гребенчатую фасцию

=лакунарную связку и надкостницу лобковой кости

=лакунарную связку и влагалище бедренной вены

=паховую связку и лакунарную связку

}

Портогепатография проводится через:

{

=пупочную вену

=пупочную артерию

=печеночную вену

=большую подкожную вену

=нижнюю полую вену

}

Купол диафрагмы справа по среднеключичной линии расположен на уровне ребра:

{

=III

=IV

=V

=VI

=VII

}

Купол диафрагмы слева по среднеключичной линии расположен на уровне ребра:

{

=III

=IV

=V

=VI

=VII

}

Аортальное и пищеводное отверстия диафрагмы образованы:

{

=средними и медиальными ножками диафрагмы

=медиальными ножками диафрагмы

=медиальными и латеральными ножками диафрагмы

=средними ножками диафрагмы

=средними и латеральными ножками диафрагмы

}

Грудной лимфатический проток проходит через диафрагму вместе с:

- {
- =пищеводом
- =непарной веной
- =симпатическим стволом
- =аортой
- =блуждающими нервами
- }

Непарная и полунепарная вены проходят через диафрагму из забрюшинного пространства в средостение:

- {
- =между медиальными и средними ножками диафрагмы
- =между средними и латеральными ножками диафрагмы
- =через аортальное отверстие
- =вместе с нижней поллой веной
- =через сухожильный центр диафрагмы
- }

//Раздел 9: «Топографическая анатомия брюшной полости» (коды контролируемых компетенций - ИД1, ОПК5)

Верхний и нижний этажи брюшной полости разделяет:

- {
- =большой сальник
- =желудочно-ободочная связка
- =брыжейка поперечной ободочной кишки
- =брыжейка тонкой кишки
- =брыжейка сигмовидной кишки
- }

По своему положению двенадцатиперстная кишка относится:

- {
- =к верхнему этажу брюшной полости
- =к нижнему этажу брюшной полости
- =располагается в обоих этажах
- =вне брюшной полости
- =забрюшинном пространстве
- }

Из отделов пищеварительного тракта имеет наиболее выраженную мышечную оболочку:

- {
- =пищевод
- =желудок

=двенадцатиперстная кишка
=тощая кишка
=толстая кишка
}

границы печеночной сумки снизу:

{
=боковая стенка живота
=венечная связка печени
=передняя брюшная стенка
=поперечная ободочная кишка
=правый купол диафрагмы
}

границы печеночной сумки справа:

{
=боковая стенка живота
=венечная связка печени
=передняя брюшная стенка
=поперечная ободочная кишка
=правый купол диафрагмы
}

При обследовании больного с прободением язвы желудка перкуторно обнаружен симптом исчезновения печеночной тупости, что обусловлено накоплением воздуха в:

{
=левом поддиафрагмальном пространстве
=предпеченочной щели
=подпеченочной щели
=правом поддиафрагмальном пространстве
=в малом сальнике
}

границы преджелудочной сумки снизу:

{
=желудок
=малый сальник
=передняя брюшная стенка
=поперечная ободочная кишка
=серповидная связка печени
}

границы преджелудочной сумки справа:

{
=боковая стенка живота
=желудок
=малый сальник
}

=поперечная ободочная кишка

=серповидная связка печени

}

Серповидная связка печени разделяет:

{

=предпеченочную щель и преджелудочную сумку

=правое и левое поддиафрагмальные пространства

=подпеченочную щель и сальниковую сумку

=брюшную полость на этажи

=сальниковую сумку на малую и большую

}

К нижней поверхности печени прилежат все образования, кроме:

{

=желудка

=горизонтальной части двенадцатиперстной кишки

=печеночной кривизны поперечной ободочной кишки

=большого сальника

=верхнего полюса правой почки

}

Брюшина покрывает печень со всех сторон, кроме ее поверхности:

{

=верхней

=нижней

=передней

=задней

=все варианты ответов неверны

}

Левый боковой канал брюшной полости сообщается с:

{

=печеночной сумкой

=подпеченочным пространством

=полостью малого таза

=полостью сальниковой сумки

=левым брыжеечным синусом

}

Знание составляющих сторон треугольника Кало необходимо при выполнении: {

=холецистостомии

=холецистоеюноанастомоза

=холецистодуоденоанастомоза

=холецистэктомии

=резекции печени

}

Установите стенки сальниковой сумки верхняя:

{
=желудок
=желудочно-ободочная связка
=малый сальник
=задний листок париетальной брюшины
=хвостатая доля печени
}

Установите стенки сальниковой сумки задняя:

{
=брыжейка поперечной ободочной кишки
=желудочно-ободочная связка
=малый сальник
=задний листок париетальной брюшины
=поперечная ободочная кишка
}

Установите границы сальникового отверстия верхняя:

{
=печеночно-двенадцатиперстная связка
=печеночно-почечная связка и нижняя полая вена
=почечно-двенадцатиперстная связка и двенадцатиперстная кишка
=хвостатая доля печени
=желудок
}

Установите границы сальникового отверстия нижняя:

{
=печеночно-двенадцатиперстная связка
=печеночно-почечная связка и нижняя полая вена
=почечно-двенадцатиперстная связка и двенадцатиперстная кишка
=хвостатая доля печени
=желудок
}

Установите границы сальникового отверстия передняя:

{
=печеночно-двенадцатиперстная связка
=печеночно-почечная связка и нижняя полая вена
=почечно-двенадцатиперстная связка и двенадцатиперстная кишка
=хвостатая доля печени
=желудок
}

Установите границы сальникового отверстия задняя:

{
=печеночно-двенадцатиперстная связка
=печеночно-почечная связка и нижняя полая вена
=почечно-двенадцатиперстная связка и двенадцатиперстная кишка
=хвостатая доля печени
=желудок
}

Из четырех брюшинных образований нижнего этажа брюшной полости свободно сообщается с брюшинными сумками верхнего этажа:

{
=левая брыжеечная пазуха
=левый боковой канал
=правая брыжеечная пазуха
=правый боковой канал
=все не сообщаются
}

Из четырех брюшинных образований нижнего этажа брюшной полости не сообщается с брюшинным этажом малого таза одно:

{
=левая брыжеечная пазуха
=левый боковой канал
=правая брыжеечная пазуха
=правый боковой канал
=все не сообщаются
}

Наиболее вероятным путем распространения гнойного перитонита из правой брыжеечной пазухи является:

{
=верхний этаж брюшной полости
=левая брыжеечная пазуха
=левый боковой канал
=правый боковой канал
=брюшинный этаж малого таза
}

Латеральной границей правой брыжеечной пазухи является:

{
=корень брыжейки сигмовидной кишки
=корень брыжейки тонкой кишки
=медиальный край восходящей ободочной кишки
=правая боковая стенка живота
=латеральный край восходящей ободочной кишки
}

Наиболее вероятным путем распространения гнойного перитонита из левого бокового канала является:

- {
- =верхний этаж брюшной полости
- =левая брыжеечная пазуха
- =правая брыжеечная пазуха
- =правый боковой канал
- =брюшинный этаж малого таза
- }

У больного гнойный аппендицит осложнился формированием внутрибрюшинного поддиафрагмального абсцесса. Определите путь распространения инфекции по:

- {
- =большому сальнику
- =передней стенке восходящей ободочной кишки
- =правому боковому каналу
- =околоободочной клетчатке восходящей ободочной кишки
- =передней стенке нисходящей ободочной кишки
- }

Верхняя граница дна желудка проецируется по левой средне-ключичной линии на уровне ребра:

- {
- =IV
- =V
- =VI
- =VII
- =VII
- }

Двенадцатиперстную кишку кровоснабжают все артерии, кроме:

- {
- =правой желудочной артерии
- =правой желудочно-сальниковой артерии
- =верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии
- =нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии
- =правой почечной артерии

- } Левая желудочно-сальниковая артерия берет начало от: {
- =левой желудочной артерии
- =чревного ствола
- =правой желудочной артерии
- =селезеночной артерии
- =верхней брыжеечной артерии
- }

Правая желудочно-сальниковая артерия берет начало от:

- {
- =собственной печеночной артерии
- =общей печеночной артерии
- =селезеночной артерии
- =верхней брыжеечной артерии
- =все варианты ответов неверны
- }

В систему верхней полой вены кровь от желудка оттекает по венам:

- {
- =селезеночной
- =правой желудочно-сальниковой
- =левой желудочно-сальниковой
- =левой желудочной
- =желудочно-пищеводным
- }

В систему воротной вены кровь от желудка оттекает по венам:

- {
- =селезеночной
- =правой желудочно-сальниковой
- =левой желудочно-сальниковой
- =левой желудочной
- =все варианты ответов верны
- }

Одним из осложнений язвенной болезни желудка является желудочное кровотечение. Чаще всего к этому приводят язвы, расположенные на:

- {
- =передней стенке тела желудка
- =задней стенке тела желудка
- =малой кривизне желудка
- =большой кривизне желудка
- =задней стенке пилорической части желудка
- }

Пузырный проток во время операции холецистэктомии используется для проведения:

- {
- =гастроскопии
- =панкреатографии
- =интраоперационной холангиографии
- =дуоденоскопии
- =портогепатографии
- }

Трехрядный шов применяется при операциях на:

- {
- =желудке
- =двенадцатиперстной кишке
- =тонкой кишке
- =толстой кишке
- =всех вышеперечисленных органах
- }

Срастание слизисто-подслизистого футляра происходит:

- {
- =через 1 сутки
- =через 7-10 суток
- =через 20 дней
- =через 1 месяц
- =более 1 месяца
- }

Гастростомия - это:

- {
- =введение зонда в полость желудка
- =наложение искусственного наружного свища на желудок
- =формирование желудочно-кишечного анастомоза
- =рассечение стенки желудка для извлечения инородного тела с последующим зашиванием раны
- =удаление части желудка
- }

При наложении гастростомы по способу Топровера формируется свищ:

- {
- =губовидный
- =трубчатый
- =продольный
- =поперечный
- =циркулярный
- }

Известна гастростомия, при которой резиновая трубка вшивается в переднюю стенку желудка с образованием канала, в конце которого трубка вводится в полость желудка, а другой конец ее выводится через переднюю брюшную стенку наружу. Такой способ называется гастростомией по:

- {
- =Витцелю
- =Кадеру
- =Топроверу
- =Сапожкову
- =Пирогову

}

При выполнении гастростомии по Витцелю действия хирурга правильны за исключением:

{

=наложения трубки на желудок по его оси на середине между малой и большой кривизной

=фиксации трубки к стенке желудка 6-8 шелковыми серозно-мышечными швами

=наложения кисетного шва у верхнего края фиксирующих трубку швов, рассечения в кисете стенки желудка, введения трубки

=затягивания кисета и перитонизации его дополнительно 2-3 серозно-мышечными швами

=выведения трубки на кожу через верхний срединный лапаротомный разрез

}

У детей гастростомия может быть выполнена путем введения в полость желудка резиновой трубки перпендикулярно передней стенке и фиксации ее к стенке желудка 2-3 концентрически наложенными кисетными швами, вворачивающими стенку желудка и создающими вокруг трубки канал, выстланный серозной оболочкой желудка.

Такой способ называется гастростомией по:

{

=Витцелю

=Кадеру

=Топроверу

=Сапожкову

=Пирогову

}

При гастростомии по Витцелю после выведения в рану перед ней стенки желудка резиновая трубка накладывается на переднюю стенку желудка:

{

=ближе к малой кривизне

=ближе к большой кривизне

=в малососудистой зоне между большой и малой кривизной

=вблизи пилорического отдела

=в кардиальном отделе

}

Предупреждение затекания пищи в свободную брюшную полость при гастростомии достигается выполнением:

{

=гастропексии

=создания искусственного клапана

=перевязки правой желудочной артерии

=тампонады большого сальника

=создания мышечного жома

}

Выполняя резекцию желудка, хирург наложил желудочно-кишечный анастомоз между культей желудка и двенадцатиперстной кишкой по типу «конец в конец». Такой способ называется резекцией:

- {
- =по Бильрот I
- =по Бильрот II
- =по Гофмейстеру-Финстереру
- =по Мойнихену
- =по Федорову
- }

Тотальная ваготомия предполагает пересечение:

- {
- =ствола левого блуждающего нерва над грудобрюшной диафрагмой
- =стволов левого и правого блуждающих нервов тотчас ниже грудобрюшной диафрагмы
- =ствола левого блуждающего нерва тотчас ниже грудобрюшной диафрагмы
- =ствола левого блуждающего нерва ниже отхождения его печеночной ветви
- =ветвей левого блуждающего нерва, отходящих к телу желудка
- }

Нижний край правой доли печени у взрослых в норме:

- {
- =не выходит из-под края реберной дуги
- =выступает на 1-2 см из-под края реберной дуги
- =выступает на 3-4 см из-под края реберной дуги
- =выступает на 4-5 см из-под края реберной дуги
- =выступает до 10 см из-под края реберной дуги
- }

Верхняя граница левой доли печени перкуторно по левой парастеральной линии определяется в межреберном промежутке:

- {
- =3-м
- =4-м
- =5-м
- =6-м
- =7-м
- }

В печени выделяют:

- {
- =7 сегментов
- =8 сегментов
- =9 сегментов

=10 сегментов

=10 сегментов

}

По отношению к печеночным венам правильным является следующее утверждение печеночные вены:

{

=выходят из ворот печени и впадают в воротную вену

=выходят на задней поверхности печени и впадают в непарную вену

=выходят на задней поверхности печени и впадают в нижнюю полую вену

=выходят из ворот печени и впадают в почечную вену

=выходят на задней поверхности печени и впадают в верхнюю полую вену

}

Дно желчного пузыря проецируется на передней брюшной стенке в точке:

{

=пересечения наружного края правой прямой мышцы живота с реберной дугой

=пересечения правой среднеключичной линии с реберной дугой

=между правой и средней третями горизонтальной линии, соединяющей нижние концы X ребер

=край мечевидного отростка

=по середине горизонтальной линии, соединяющей нижние концы X ребер

}

Для временной остановки кровотечения из печени можно пережать пальцами печеночно-двенадцатиперстную связку:

{

=на 2-3 мин

=на 5-10 мин

=на 15-20 мин

=на 25-30 мин

=время пережатия определяется необходимостью полного прекращения кровотечения

}

Удаление желчного пузыря от дна обусловлено:

{

=внутрипеченочным его расположением

=брыжеечной организацией его ложа

=невозможностью выделения его протока в печеночно-двенадцатиперстной связке

=невозможностью выделения пузырной артерии из воспалительного конгломерата

=наличием камня в пузырном протоке

}

После удаления желчного пузыря его ложе обычно закрывают:

{

=пластинкой фасции

- =частью мышцы от передней брюшной стенки
- =частью большого сальника
- =остатками серозного покрова желчного пузыря
- =паренхимой печени с помощью стягивающих швов

Шов Кузнецова-Пенского используют для ушивания ран:

- {
- =кожи
- =мышц
- =апоневроза
- =кишки
- =печени
- }

Одним из ранних клинических симптомов рака головки поджелудочной железы может быть появление признаков желтухи, что обусловлено:

- {
- =развитием ранних метастазов в печени
- =метастазированием опухоли в лимфатические узлы области ворот печени
- =прорастанием опухоли в стенку двенадцатиперстной кишки в области большого дуоденального сосочка
- =сдавлением опухолью общего желчного протока
- =усилением образования жёлчи
- }

Селезенка к брюшине относится следующим образом:

- {
- =покрыта брюшиной со всех сторон за исключением ворот
- =имеет внебрюшинное поле в местах соприкосновения с диафрагмой и в области ворот
- =покрыта брюшиной с трех сторон
- =располагается внебрюшинно
- =покрыта брюшиной только спереди
- }

Иррадиацию болей в левое плечо после спленэктомии можно объяснить:

- {
- =повреждением ветвей левого диафрагмального нерва в диафрагмально-селезеночной связке
- =повреждением ветвей межреберных нервов в диафрагмально-селезеночной связке
- =повреждением соединительных ветвей межреберных нервов в диафрагмально-ободочной связке
- =повреждением ветвей реберно-плечевого нерва
- =образованием грубого послеоперационного рубца
- }

Удаление селезенки в последующем:

- {
- =не влияет на здоровье и трудоспособность
- =может быть причиной развития иммунодефицитного состояния
- =может привести к развитию послеоперационной грыжи
- =ухудшение состояния может быть только у людей пожилого возраста
- =способствует развитию спаечной болезни
- }

По отношению к позвоночнику начальный отдел корня брыжейки тощей кишки находится на уровне позвонка:

- {
- =XI грудного
- =XII грудного
- =I поясничного
- =II поясничного
- =III поясничного
- }

По отношению к позвоночнику конечный отдел корня брыжейки подвздошной кишки находится на уровне:

- {
- =III поясничного позвонка
- =IV поясничного позвонка
- =V поясничного позвонка
- =правого крестцово-подвздошного сочленения
- =верхнего края седалищной вырезки тазовой кости
- }

Кровоснабжение тощей кишки осуществляется за счет ветвей артерий:

- {
- =нижней брыжеечной
- =верхней брыжеечной
- =селезеночной
- =общей печеночной
- =левой и правой желудочно-сальниковых
- }

Кровоснабжение подвздошной кишки осуществляется за счет ветвей артерий:

- {
- =нижней брыжеечной
- =верхней брыжеечной
- =селезеночной
- =общей печеночной
- =левой и правой желудочно-сальниковых
- }

Венозный отток от подвздошной кишки осуществляется в систему вены:

- {
- =нижней поллой
- =верхней поллой
- =воротной
- =воротной и нижней поллой
- =воротной и верхней поллой
- }

Двухрядный шов, состоящий из сквозного шва через все оболочки кишечной стенки и серозно-серозного шва, называют швом:

- {
- =Альберта
- =Ламбера
- =Пирогова-Бира
- =Черни
- =Шмидена
- }

Вворачивающий серозно-серозный шов называется швом:

- {
- =Альберта
- =Ламбера
- =Пирогова-Бира
- =Черни
- =Шмидена

} Вворачивающий сквозной шов через все оболочки кишечной стенки называют швом:

- {
- =Альберта
- =Ламбера
- =Пирогова-Бира
- =Черни
- =Шмидена
- }

При наложении межкишечного анастомоза по Альберту во второй ряд швов захватывают оболочки:

- {
- =слизистую
- =слизистую оболочку и подслизистую основу
- =серозную и мышечную
- =серозную, мышечную оболочки и подслизистую основу
- =все оболочки
- }

основные источники кровоснабжения слепой кишки:

- {
- =левая ободочная артерия
- =подвздошно-слепокишечная артерия
- =правая ободочная артерия
- =сигмовидная артерия
- =средняя ободочная артерия
- }

основные источники кровоснабжения восходящей ободочной кишки:

- {
- =левая ободочная артерия
- =подвздошно-слепокишечная артерия
- =правая ободочная артерия
- =сигмовидная артерия
- =средняя ободочная артерия
- }

основные источники кровоснабжения поперечно-ободочной кишки:

- {
- =левая ободочная артерия
- =подвздошно-слепокишечная артерия
- =правая ободочная артерия
- =сигмовидная артерия
- =средняя ободочная артерия
- }

основные источники кровоснабжения нисходящей ободочной кишки:

- {
- =левая ободочная артерия
- =подвздошно-слепокишечная артерия
- =правая ободочная артерия
- =сигмовидная артерия
- =средняя ободочная артерия
- }

основные источники кровоснабжения сигмовидной кишки:

- {
- =левая ободочная артерия
- =подвздошно-слепокишечная артерия
- =правая ободочная артерия
- =сигмовидная артерия
- =средняя ободочная артерия
- }

Наиболее часто встречающимся является положение червеобразного отростка по

отношению к слепой кишке:

- {
- =переднее
- =заднее
- =медиальное
- =латеральное
- =нисходящее
- }

Клиническая картина аппендицита, подобная правосторонней почечной колике, наиболее вероятна при положении червеобразного отростка:

- {
- =ретроцекальном интраперитонеальном
- =ретроцекальном интрамуральном
- =ретроцекальном ретроперитонеальном
- =зеркальном
- =поддиафрагмальном
- }

Клиническая картина аппендицита, подобная клинике холецистита, может быть вследствие:

- {
- =распространения воспалительного процесса по правому боковому каналу к желчному пузырю
- =рефлекторных влияний при аппендиците с илеоцекальной области на область желчного пузыря
- =подпеченочного положения слепой кишки и червеобразного отростка
- =ретроцекальном интраперитонеальном
- =ретроцекальном интрамуральном
- }

При наложении кишечного шва герметичность его создает оболочка кишки:

- {
- =слизистая
- =подслизистая основа
- =мышечная
- =серозная
- =мышечная и серозная
- =мышечная и подслизистая
- }

В ходе выполнения аппендэктомии наиболее надежным и удобным признаком отыскания червеобразного отростка является:

- {
- =расположение основания отростка на заднемедиальной стенке слепой кишки
- =расположение основания отростка у дна слепой кишки
- =расположение основания отростка у места схождения трех продольных лент слепой

КИШКИ

- =продолжение передней (свободной) ленты на основание отростка
- =расположение основания отростка у дна сигмовидной кишки

Отличительными признаками слепой кишки от других отделов толстой кишки являются:

- {
- =отсутствие лент
- =отсутствие жировых привесок
- =наличие мышечных лент
- =наличие сальниковых отростков
- =отсутствие мышечных лент
- }

Вариантами положения червеобразного отростка являются:

- {
- =ретроперитонеальное
- =все правильные
- =подпеченочное
- =тазовое
- =ретроцекальное
- }

При выполнении экстренной сигмостомии по поводу острой кишечной непроходимости хирург фиксирует края париетальной брюшины к коже с целью:

- {
- =лучшего обзора в операционной ране
- =предупреждения инфицирования брюшной полости
- =предупреждения инфицирования подкожной жировой клетчатки
- =формирования отверстия стомы
- =создания неподвижного положения стомы
- }

Кровоснабжение нисходящей ободочной кишки осуществляется за счет артерии:

- {
- =левой ободочной
- =левой почечной
- =левой яичковой (яичниковой)
- =левой желудочно-сальниковой
- =селезеночной
- }

Поперечную ободочную кишку кровоснабжает артерия:

- {
- =подвздошно-ободочная
- =правая ободочная

- =левая ободочная
- =правая желудочно-сальниковая
- =средняя ободочная

Венозный отток от поперечной ободочной кишки осуществляется в систему вены:

- {
- =нижней поллой
- =воротной
- =верхней поллой
- =воротной и нижней поллой
- =воротной и верхней поллой
- }

Кровоснабжение сигмовидной кишки осуществляется из бассейна артерии:

- {
- =верхней брыжеечной
- =общей подвздошной
- =внутренней подвздошной
- =нижней брыжеечной
- =наружной подвздошной
- }

Венозный отток от сигмовидной кишки осуществляется в систему вены:

- {
- =воротной
- =нижней поллой и воротной
- =нижней поллой
- =воротной и верхней поллой
- =верхней поллой
- }

Лимфоотток от сигмовидной кишки осуществляется в лимфоузлы по ходу:

- {
- =аорты
- =нижней поллой вены
- =верхней брыжеечной вены
- =нижней брыжеечной вены
- =внутренней подвздошной вены
- }

Кровоснабжение слепой кишки осуществляется из бассейна артерии:

- {
- =верхней брыжеечной
- =нижней брыжеечной
- =наружной подвздошной
- =внутренней подвздошной

=общей печеночной
}

Венозный отток от слепой кишки осуществляется в систему вены:

{
=нижней поллой
=верхней поллой
=нижней и верхней полых
=воротной
=воротной и нижней поллой
}

Иннервацию слепой кишки осуществляют:

{
=полово-бедренный нерв
=верхнее подчревное сплетение
=нижнее подчревное сплетение
=нижнее брыжеечное сплетение
=верхнее брыжеечное сплетение
}

Венозный отток от поперечной ободочной кишки происходит в вену:

{
=правую желудочно-сальниковую;
=нижнюю брыжеечную;
=левую желудочно-сальниковую;
=верхнюю и нижнюю брыжеечную;
=верхнюю брыжеечную;
}

отток венозной крови от нисходящего отдела ободочной кишки осуществляется в систему:

{
=нижней поллой вены;
=верхней поллой вены;
=нижней поллой и воротной вен;
=воротной вены;
=воротной и верхней поллой вен;
}

Кровоснабжение слепой кишки осуществляется из бассейна артерии:

{
=верхней брыжеечной;
=нижней брыжеечной;
=наружной подвздошной;
=внутренней подвздошной;

=общей печеночной;
}

Венозный отток от слепой кишки осуществляется в систему вены:

{
=нижней поллой;
=верхней поллой;
=нижней и верхней полых;
=воротной;
=воротной и нижней поллой;
}

Кровоснабжение тощего отдела тонкой кишки осуществляется за счет ветвей артерий:

{
=нижней брыжеечной;
=верхней брыжеечной;
=селезеночной;
=общей печеночной;
=левой и правой желудочно-сальниковых;
}

Правую желудочно-сальниковую артерию содержит связка желудка:

{
=желудочно-селезеночная;
=желудочно-печеночная;
=желудочно-поджелудочная;
=желудочно-12-перстная;
=желудочно-ободочная;
}

Правая желудочная артерия берет начало от:

{
=чревного ствола;
=левой желудочной артерии;
=общей печеночной артерии;
=собственной печеночной артерии;
=селезеночной артерии;
}

Левая желудочная артерия берет начало от:

{
=общей печеночной артерии;
=чревного ствола;
=верхней брыжеечной артерии;
=селезеночной артерии;
=левой желудочно-сальниковой артерии;
}

Заднюю стенку полости сальниковой сумки составляют все образования, кроме: {
=брюшной аорты;
=нижней поллой вены;
=поясничной части диафрагмы;
=задней стенки желудка;
=поджелудочной железы;
}

Заднюю стенку правой печеночной сумки составляет:
{
=диафрагма;
=венечная связка печени;
=задне-нижняя поверхность печени;
=верхний полюс правой почки;
=ни один из вариантов;
}

Брюшина покрывает печень со всех сторон, кроме ее поверхности:
{
=верхней;
=нижней;
=передней;
=задней;
=ни один из вариантов;
}

Основными источниками кровоснабжения печени являются:
{
=поясничные артерии;
=правая перикардально-диафрагмальная артерия;
=собственная печеночная артерия и воротная вена;
=межреберные артерии;
=диафрагмальные артерии;
}

Правый боковой канал брюшной полости сообщается со всеми образованиями, кроме:
{
=печеночной сумки;
=подпеченочного пространства;
=полости малого таза;
=полости сальниковой сумки;
=правого брыжеечного синуса;
}

Левый боковой канал брюшной полости сообщается с:
{

- =печеночной сумкой;
- =подпеченочным пространством;
- =полостью малого таза;
- =полостью сальниковой сумки;
- =левым брыжеечным синусом;

}

Брюшная полость условно делится на верхний и нижний этажи посредством:

{

- =поперечной ободочной кишки;
- =линии, проведенной через большую кривизну желудка;
- =брыжейки поперечной ободочной кишки;
- =верхнего края поджелудочной железы;
- =нижнего края поджелудочной железы;

}

Медиальную стенку правой печеночной сумки составляет:

{

- =левая доля печени;
- =венечная связка печени;
- =печеночно-желудочная связка;
- =печеночно-12-перстная связка;
- =серповидная связка печени;

}

Переднюю стенку сальниковой сумки составляют:

{

- =нижняя поверхность печени;
- =передняя стенка желудка;
- =печеночно-почечная связка;
- =печеночно-желудочная связка и задняя стенка желудка;
- =поджелудочная железа;

}

Переднюю стенку преджелудочной сумки составляет:

{

- =передняя стенка желудка;
- =поперечная ободочная кишка;
- =брыжейка поперечной ободочной кишки;
- =диафрагмальная поверхность правой доли печени;
- =брюшная стенка и задне-нижняя поверхность печени;

}

Нижнюю стенку сальниковой сумки составляет:

{

- =поперечная ободочная кишка;
- =желудочно-ободочная связка;

- =брыжейка поперечной ободочной кишки;
- =поджелудочная железа;
- =ни один из вариантов;

Элементами печеночно-12-перстной связки являются все образования, кроме:

- {
- =воротной вены;
- =нижней полой вены;
- =печеночной артерии;
- =общего желчного протока;
- =жировой клетчатки;
- }

Собственная печеночная артерия по отношению к общему желчному протоку находится:

- {
- =латерально;
- =сзади;
- =спереди;
- =медиально;
- =латерально и спереди;
- }

Воротная вена по отношению к нижней полой вене находится:

- {
- =сзади и медиально;
- =сзади и латерально;
- =латерально;
- =спереди и медиально;
- =спереди и латерально;
- }

Общий желчный проток (холедох по отношению к воротной вене находится:

- {
- =сзади и медиально;
- =сзади и латерально;
- =спереди и латерально;
- =спереди и медиально;
- =медиально;
- }

Переднюю стенку сальниковой сумки образуют все связки, кроме:

- {
- =печеночно-12-перстной;
- =печеночно-желудочной;
- =печеночно-пищеводной;

=желудочно-ободочной;

=печеночно-почечной;

}

К шейке желчного пузыря прилежит:

{

=малая кривизна желудка;

=луковица 12-перстной кишки;

=поперечная ободочная кишка;

=нисходящий отдел 12-перстной кишки;

=головка поджелудочной железы;

}

Содержимым треугольника Кале в печеночно-12-перстной связке является:

{

=правая печеночная артерия;

=пузырный проток;

=пузырная артерия;

=собственная печеночная артерия;

=ни один из вариантов;

}

К селезенке спереди и медиально прилежит:

{

=реберная часть диафрагмы;

=поперечная ободочная кишка;

=нисходящая ободочная кишка;

=дно и большая кривизна желудка;

=левая доля печени;

}

К нижней горизонтальной части 12-перстной кишки прилежит:

{

=нижний полюс правой почки;

=тощая кишка;

=подвздошная кишка;

=большой сальник;

=желудочно-ободочная связка;

}

Левая желудочно-сальниковая артерия берет начало от:

{

=левой желудочной артерии;

=чревного ствола;

=правой желудочной артерии;

=селезеночной артерии;

=верхней брыжеечной артерии;

}

По отношению к позвоночнику поджелудочная железа находится на уровне позвонков:

{

=IX-XI грудных;

=X-XI грудных;

=XII грудного -II поясничного;

=II-III поясничных;

=III-IV поясничных;

}

К поджелудочной железе сзади прилежат:

{

=левый надпочечник;

=12-перстная кишка;

=хвостатая доля печени;

=нижняя полая вена и аорта;

=корень брыжейки поперечной ободочной кишки;

}

К головке поджелудочной железы латерально прилежит:

{

=пилорический отдел желудка;

=ворота правой почки;

=вертикальный отдел 12-перстной кишки;

=восходящая ободочная кишка;

=ни один из вариантов;

}

К хвостовой части поджелудочной железы прилежит латерально:

{

=поясничная часть диафрагмы;

=ворота селезенки;

=левая почка;

=аорта;

=селезеночный угол ободочной кишки;

}

К задним отделам тощей и подвздошной кишки прилежат все образования: {, кроме:

{

=почек;

=нижней полой вены;

=брюшной аорты с ветвями;

=средних отделов мочеточников;

=брыжейки поперечной ободочной кишки;

}

При выполнении холецистостомии дренажную трубку вводят в:

- {
- =дно желчного пузыря;
- =шейку желчного пузыря;
- =пузырный проток;
- =желчный пузырь через паренхиму печени;
- =ни один из вариантов;
- }

Техническим недостатком энтероэнтероанастомоза "конец в конец" при сравнении с соустьем "бок в бок" может быть:

- {
- =сложность формирования задней губы анастомоза;
- =сужение просвета анастомоза;
- =сложность формирования передней губы анастомоза;
- =низкая прочность анастомоза;
- =низкая асептичность анастомоза;
- }

При затруднениях в отыскании аппендикулярного отростка следует ориентироваться на:

- {
- =купол слепой кишки;
- =верхний край илеоцекального угла;
- =начало восходящей ободочной кишки;
- =taenia libera;
- =нижний край илеоцекального угла;
- }

Укажите самое высокое место в брюшной полости человека в вертикальном положении

- {
- =правое поддиафрагмальное пространство
- =левое поддиафрагмальное пространство
- =сальниковая сумка
- =слепой селезеночный карман
- =правый баковой канал
- }

Какая из сумок верхнего этажа брюшной полости является наиболее изолированной

- {
- =преджелудочная
- =слепой селезеночный карман
- =сальниковая сумка
- =печеночная
- =наддиафрагмальная

}

С каким углублением брюшины сообщается левый боковой канал живота

{

=с печеночной сумкой

=с сальниковой сумкой

=с преджелудочной сумкой

=с малым тазом

=не сообщается ни с одним карманом

}

Чем разделены правый и левый брыжеечные синусы

{

=брыжейкой поперечной ободочной кишки

=корнем брыжейкой тонкой кишки

=большим сальником

=малым сальником

=брыжейкой сигмовидной кишки

}

Какое анатомическое образование отделяет селезеночный карман от левого бокового канала

{

=печеночно-двенадцатиперстная связка

=Lig. suspensorium duodeni (Трейца)

=диафрагмально-селезеночно

-ободочная- связка

=паховая связка

=печеночно- двенадцатиперстная связка

}

Какая связка из перечисленных входит в состав большого сальника

{

=печеночно -желудочная

=желудочно- ободочная

=печеночно-двенадцатиперстная

=паховая связка

=никакая

}

Какие органы разделяют брюшную полость на верхний и нижний этажи

{

=большой сальник

=поперечноободочная кишка и ее брыжейка

=двенадцатиперстная кишка

=брыжейка тонкой кишки

=поджелудочная железа и селезенка

}

Что подразумевают под интраперитонеальным расположением органа

{

=орган покрыт брюшиной с трех сторон

=орган покрыт брюшиной с одной стороны

=орган покрыт брюшиной со всех сторон

=орган покрыт спереди и сзади

=орган покрыт снизу и сзади и спереди

}

Что подразумевают под мезоперитонеальным расположением органа

{

=орган покрыт брюшиной со всех сторон

=орган покрыт брюшиной с трех сторон

=орган покрыт брюшиной с одной стороны

=орган покрыт спереди и сверху

=орган покрыт вокруг

}

Уточните отношение селезенки к брюшине

{

=селезенка покрыта брюшиной со всех сторон

=селезенка покрыта брюшиной с трех сторон

=селезенка располагается экстраперитонеально

=селезенка покрыта мезоперитонеально

=селезенка покрыта спереди и сверху

}

Что подразумевают под полостью живота

{

=пространство, ограниченное внутрибрюшной фасцией

=пространство, ограниченное париетальным листком брюшины

=пространство, расположенное между париетальным и висцеральным листками брюшины

=пространство, ограниченное висцеральным листком брюшины

=пространство, расположенное позади большого сальника

}

Что подразумевают под брюшной полостью

{

=пространство, ограниченное внутрибрюшной фасцией

=пространство, ограниченное париетальным листком брюшины

=пространство, ограниченное висцеральными листками брюшины

=пространство, ограниченное передне-брюшной стенкой и позвоночником

=пространство, ограниченное передне-брюшной стенкой и поясничными мышцами

}

Что подразумевают под забрюшинным пространством

{

=пространство, расположенное между париетальным листком брюшины и
внутрибрюшной фасцией

=пространство, ограниченное внутрибрюшной фасцией

=пространство, ограниченное париетальным листком брюшины

=пространство, расположенное между париетальным и висцеральным листками
брюшины

=пространство, ограниченное висцеральным листком брюшины

}

В каком из перечисленных отделов брюшной полости могут быть обнаружены
пищевые массы при прободной язве задней стенки желудка

{

=в преджелудочковой сумке

=в левом поддиафрагмальном пространстве

=в сальниковой сумке

=в правом поддиафрагмальном пространстве

=в левой брыжеечной пазухе

}

Какую стенку желудка иннервируют (преимущественно) ветви левого блуждающего
нерва

{

=переднюю

=заднюю

=переднюю и заднюю

=малую кривизну

=большую кривизну

}

Какую стенку желудка иннервируют (преимущественно) ветви правого блуждающего
нерва

{

=переднюю

=заднюю

=обе стенки

=малую кривизну

=большую кривизну

}

Как называется положение печени, когда передний край ее опущен и значительно
выступает из под реберной дуги

{

=дорзопетальное

- =вентропетальное
 - =декстропетальное
 - =синистропетальное
 - =брюшнопетальное
- }

Какое положение по отношению к брюшине занимает печень

- {
- =мезоперитонеальное
 - =интраперитонеальное
 - =экстраперитонеальное
 - =никокого отношения не имеет
 - =покрыт местами
- }

Укажите сосуд, по которому осуществляется наибольший приток крови к печени

- {
- =правая печеночная артерия
 - =воротная вена
 - =левая печеночная артерия
 - =собственно печеночная артерия
 - =селезеночная вена
- }

В какую вену непосредственно осуществляется отток крови из печени

- {
- =в печеночную вену
 - =в ветви воротной вены
 - =частично в печеночные, частично в воротную вены
 - =в нижнюю полую вену
 - =в брыжеечную вену
- }

Где располагаются короткие желудочные артерии

- {
- =в диафрагмально-селезеночной связке
 - =в желудочно-селезеночной связке
 - =в диафрагмально-толстокишечной связке
 - =в желудочно-ободочной связке
 - =печеночно-желудочной
- }

Из каких источников кровоснабжается тощая и подвздошная кишка

- {
- =из желудочных артерий
 - =из верхней брыжеечной артерии
 - =из нижней брыжеечной артерии

=из общей печеночной артерии

=из чревного ствола

}

В каком направлении необходимо отвести сальник и поперечную ободочную кишку при ревизии нижнего этажа брюшной полости

{

=кверху

=книзу

=вправо

=влево

=все правильные

}

Какой отдел общего желчного протока наиболее доступен для ревизии

{

=pars supraduodenalis

=pars retroduodenalis

=pars pancreatica

=pars intramuralis

=все доступны

}

Каковы допустимые сроки пережатки печечно-двенадцатиперстной связки

{

=10-15 минут

=20-30 минут

=1-2 часа

=35-40 минут

=35 минут

}

Какой из способов холецистэктомии позволяет уменьшить опасность попадания камней из желчного пузыря в желчный проток во время операции

{

=от шейки

=от дна

=способ не имеет значения

=от середины

=сверху

}

Для чего необходима перитонизация ложа желчного пузыря после его удаления {

=для предотвращения истечения желчи и крови в брюшную полость

=для предотвращения развития спаек

=для профилактики образования камней

=для красоты
=для профилактики кровотечения
}

Как объяснить с анатомических позиций появление асцита при раке головки поджелудочной железы

{
=сдавлением притоков воротной вены
=сдавлением нижней поллой вены
=нарушением проходимости протока поджелудочной железы и панкреатического отдела общего желчного протока
=сдавлением печеночной артерии
=сдавлением селезеночной вены
}

Какова судьба краевых кишечных швов при неосложненном (оптимальном) заживлении раны кишечной стенки

{
=инкапсулируются и остаются на месте
=прорезываются и отходят в просвет кишки
=прорезываются и отходят в брюшную полость
=прорезываются и отходят через кожу
=все правильные
}

Какой анастомоз, из перечисленных ниже, при резекции тонкой кишки является наиболее физиологичным

{
="конец в конец"
="бок в бок"
="конец в бок"
="бок в конец"
=все правильные
}

Где находится точка Мак-Бурнея

{
=между средней и наружной третью lin. bispinalis(spinalium)
=между наружной и средней третью lin. spinoumbilicalis
=на середине lin. spinoumbilicalis
=между верхней и средней третью lin/ spinoumbilicalis
=на середине расстояния между пупком и симфизом
}

Где находится точка Ланца

{
=на середине lin. bispinalis

=на середине lin. spinoumbilicalis

=на границе средней и наружной трети lin. bispinalis

=на границе медиальной и средней трети lin. spinoumbilicalis

=на середине расстояния между пупком и симфизом

}

В каком направлении разъединяют внутреннюю косую мышцу живота при доступе к червеобразному отростку

}

=по ходу волокон

=по ходу разреза кожи и апоневроза наружной косой мышцы живота

=в поперечном направлении

=в продольном направлении

=без разницы

}

Чем образована передняя стенка сальниковой сумки

}

=печеночно-двенадцати перстной связкой

=задней стенкой желудка

=желудочно-ободочной связкой

=печеночно-желудочной связкой

=все правильные

}

Чем образована нижняя стенка сальниковой сумки

{

=печеночно-почечная связка

=брюшина и аорта

=брюшина и нижняя полая вена

=брыжейка поперечной ободочной кишки

=диафрагма

}

Повреждение какого анатомического образования может наблюдаться при сочетанных ранениях передней стенки желудка на уровне его дна

{

=нижняя доля правого легкого

=левая доля печени

=поджелудочная железа

=нижняя доля левого легкого

=селезёнка

}

Какими анатомическими образованиями ограничено сальниковое отверстие

{

=печеночно-двенадцатиперстная связка

=все правильные
=печеночно-почечная связка
=почечно-двенадцатиперстная связка
=верхняя часть двенадцатиперстной кишки
}

Укажите, место нахождения фатерова соска в двенадцатиперстной кишке.

{
=верхняя часть
=передняя стенка нисходящей части
=задняя стенка нисходящей части
=задне-медиальная стенка нисходящей части
=восходящая часть
}

Какая связка располагается в сагитальной плоскости, деля печень на правую и левую доли, а поддиафрагмальное пространство на два отдела

{
=венечная
=серповидная
=правая треугольная
=круглая
=печеночно-дуоденальная
}

В кровоснабжении каких отделов поджелудочной железы принимает участие селезеночная артерия

{
=головка
=крючковидный отросток
=тело
=хвост
=никаких
}

Какие артерии принимают участие в кровоснабжении сигмовидной ободочной кишки

{
=правая ободочная
=средняя ободочная
=сигмовидная
=верхняя брыжеечная
=левая ободочная
}

Через что сообщается с свободной брюшной полостью полость малого сальника

{
=через поддиафрагмальное пространство

=через сальниковое отверстие

=через левый боковой канал

=через поддиафрагмальное отверстие

}

Скелетотопия 12-перстной кишки

{

=L1-L4

=C7-C8

=T1 -T3

=L4-L7

=C3-C5