

К принципам реабилитации относится

{

=Раннее начало реабилитационных мероприятий

=Поэтапность

=Индивидуальный подход

=Комплексность

=Всё перечисленное

}

Средствами реабилитации является

{

=Медикаментозная терапия

=Реконструктивная хирургия

=Психотерапия

=Физиотерапия

=Всё перечисленное

}

Показаниями к реабилитации по рекомендациям ВОЗ относится

{

=Значительное снижение функциональных способностей

=Снижение способности к обучению

=Нарушение социальных отношений

=Снижение способности к обучению

=Всё перечисленное

}

К общим противопоказаниям к реабилитации относятся

{

=Острые воспалительные и инфекционные заболевания

=Декомпенсированные соматические и онкологические заболевания

=Расстройства интеллектуально-мнестической сферы

=Психические заболевания, затрудняющие участие больного в реабилитации

=Всё перечисленное

}

Реабилитация физическими методами включает все методы, кроме

{

=Кинезотерапии

=Физиотерапии

=Массажа

=ЛФК

=Эрготерапии

}

Реабилитационный потенциал не зависит от

{

=Характера заболевания

=Степени выраженности ограничений жизнедеятельности

=Компенсаторных возможностей организма

=Предполагаемого влияния внешних факторов

=Квалификации реабилитолога

}

Результат реабилитации может быть

{

=Благоприятный

=Относительно благоприятный

=Неблагоприятный

=Сомнительный

=Всё перечисленное

}

Электромагнитные физические факторы не включают

{

=УВЧ-терапию

=Франклинизацию

=СВЧ-терапию

=Магнитотерапию

=УФО-облучение

}

Факторы механической природы не включают

{

=КВЧ-терапию

=Ультразвуковую терапию

=Массаж

=Ударно-волновую терапию
=Тракционную терапию
}

Факторы световой природы не включают
{
=СВЧ-терапию
=Инфракрасное облучение
=Лазеротерапию
=Ультрафиолетовое облучение
=Видимое излучение
}

Факторы термической природы не включают
{
=Криотерапию
=Озокеритотерапию
=Парафинотерапию
=Пелоидотерапию
=Лазеротерапию
}

К общим показаниям к физиотерапии не относится
{
=Болевой синдром
=Печёночная колика
=Декомпенсация ССС
= Нейропатия
Деформация позвоночника
}

К общим противопоказаниям к физиотерапии не относится
{
=Злокачественные новообразования
=Выраженная кахексия
=Системные заболевания крови
=Эпилепсия с частыми припадками
=Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
}

Лечебным фактором гальванизации является

{

=Постоянный ток с напряжением до 80В; с силой тока до 50мА

=Переменный ток частотой 22 кГц; с силой тока 0,02мА

=Хаотично меняющийся ток от 100 до 2000Гц

=Постоянный ток с напряжением до 20В; с силой тока до 1мА

=Импульсный ток Напряжением до 50кВ; с силой до 0,01 мА

}

К физико-химическим реакциям организма на прохождение постоянного электрического тока в тканях не относится

{

=Электролиз

=Электроосмос

=Электродиффузия

=Поляризация

=Фотолиз

}

К веществам, образующимся в тканях под действием постоянного тока, Относится

{

=Гистамин

=Ацетилхолин

=Оксид азота

=Эндотелины

=Все перечисленные

}

К лечебным эффектам гальванизации не относится

{

=Противовоспалительный

=Гипокоагулирующий

=Анальгетический

=Седативный

=Метаболический

}

К показаниям к гальванизации не относятся

{

=Выраженные вегетотрофические расстройства

=Сахарный диабет

=Остеохондроз позвоночника

=Нейромиозиты

=Гипотоническая болезнь

}

Аппаратом для гальванизации является

{

=«Поток-1»

=«Биоптрон-2»

=«Тонус-1»

=«Диадинамик»

=«Амплипульс-4»

}

При гальванизации лица обычно ток не превышает

{

=20-30мА

=15-20мА

=10-15мА

=3-5мА

=2-3мА

}

Минимальная плотность тока при проведении гальванизации составляет

{

=1мА/см²

=0,01мА/см²

=2мА/см²

=3мА/см²

=0,03мА/см²

}

Период выведения лекарственного вещества из кожного депо при электрофорезе составляет

{

- =от 3ч до 15 суток
- =от 30мин до 2 ч
- =от 3суток до 5 суток
- =от 1ч до 3 ч
- =от 10ч до 10суток

}

К показаниям к электрофорезу не относится

- {
- =Ожоги
- =Себорея
- =Конъюнктивит
- =Гингивит
- =Активный туберкулёз

}

К методикам электрофореза не относится электрофорез

- {
- =Ванночковый
- =Внутритканевой
- =Внутриполостной
- =По Бургиньону
- =Внутривенный

}

Лечебным фактором диадинамотерапии является ток

- {
- =Полусинусоидальной формы 50 и 100Гц
- =Синусоидальной формы 5000Гц
- =Прямоугольной формы от 1 до 150Гц
- =Трапецевидной формы от 2000 до 3000Гц
- =Треугольной формы от 50 до 100Гц

}

Оказывая влияние на чувствительные нервные волокна, диадинамические токи вызывают их

- {
- =Гиперестезию
- =Парабиоз

=Гипостезию
=Тетанус
=Электротравму
}

Лечебным эффектом диадинамотерапии не является
{
=Анальгетический
=Сосудорасширяющий
=Трофический
=Нейромиостимулирующий
=Противовоспалительный
}

Показанием к диадинамотерапии не является
{
=Тромбофлебит
=Артрит
=Энурез
=Дискинезия желчевыводящих путей
=Атрофия мышц
}

К видам диадинамических токов не относится
{
Однополупериодный непрерывный
=Двухполярный симметричный
=Ритм синкопа
=Двухполупериодный волновой
=Короткий период
}

Наиболее легко переносится больным диадинамический ток
{
=Короткий период
=Длинный период
=Двухполупериодный симметричный
=Однополупериодный симметричный
=Длинный период

}

Лечебным фактором амплипульстерапии является

{

=Переменный ток 5000Гц, модулированный частотами от 10 до 150Гц

=Постоянный ток низкого напряжения 30-80В, с силой тока до 50мА

=Полусинусоидальный ток с частотами 50 и 100Гц

=Импульсный ток, хаотично меняющийся от 100 до 2000Гц

=Переменный ток частотой 110кГц, с силой тока 0,02мА

}

Лечебным эффектом амплипульстерапии не является

{

=Анальгетический

=Иммуностимулирующий

=Сосудорасширяющий

=Трофический

=Нейромиостимулирующий

}

К показаниям для амплипульстерапии не относятся

{

=Гипертоническая болезнь 1-2 степени

=Хронический бронхит

=Заболевания ЦНС с двигательными нарушениями

=Энурез

=Желче- и мочекаменная болезнь

}

К аппаратуре для амплипульстерапии не относится

{

=«Мустанг-Физио»

=«ИРГА+»

=«Эль-Эскулап»

=«Амплипульс-5»

=«Медолит»

}

К показаниям для электростимуляции не относятся

{
=Утомление
=Энурез
=Гиподинамия
=Атрофия мышц
=Ранние признаки контрактуры
}

Сила тока при проведении электростимуляции мышц плеча, голени и бедра
Составляет

{
=20-30мА
=10-15мА
=3-5мА
=30-40мА
=40-50мА
}

Электростимуляцию проводят при помощи воздействия током на

{
=Двигательные точки
=Биологически активные точки
=Нервы
=Мышцы
=Сосуды
}

Лечебным фактором электросонтерапии является ток

{
=Прямоугольной формы с частотой от 1-160Гц
=Трапецевидной формы от 100 -2000Гц
=Треугольной формы от 200-300Гц
=Полусинусоидальной формы 50 и 100Гц
=Синусоидальный ток 5000Гц
}

Показаниями к электросонтерапии не являются

{
=Неврозы

- =Энурез
- =Алкогольный абстинентный синдром
- =Воспалительные заболевания глаз
- =Нейроциркуляторная дистония

}

Для электросонфореза применяют

{

- =Бром
- =Барбамил
- =Седуксен
- =Никотиновую кислоту
- =Всё перечисленное

}

Лечебным фактором интерференцтерапии является

{

- =Ток, образующийся при пересечении 2-ух токов от 3000 до 5000Гц
- =Переменный ток, хаотично меняющийся по частоте от 100 до 2000Гц
- =Постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы до 50мА
- =Синусоидальный модулированный ток 5000Гц
- =Прямоугольный ток от 1 до 160 Гц с силой тока до 8мА

}

Показаниями к интерференцтерапии не являются

{

- =Рассеянный склероз
- =Хронический гастрит
- =Артериальная гипертензия 1-2 степени
- =Болезнь Рейно
- =Цистит

}

При проведении интерференцтерапии для воздействия на гладкую мускулатуру используют частоты

{

- =От 10 до 15Гц
- =От 1 до 10Гц
- =От 25 до 50Гц

- =От 50 до 100 Гц
- =От 100 до 200 Гц

}

Аппаратурой для интерференцтерапии не является

{

- =«Немектродин»
- =«Стереодинастор»
- =«АИТОП-01»
- =«Интердин»
- =«Корона»

}

Лечебным фактором флюктуоризации является

{

- =Импульсный ток с хаотично меняющейся частотой от 100 до 2000 Гц
- =Полусинусоидальный ток частотой 22 кГц
- =Переменный ток частотой 5000 Гц
- =Переменный ток, хаотично меняющийся от 1 до 100 Гц
- =Синусоидальный ток высокого напряжения и небольшой силы

}

Лечебным эффектом флюктуоризации не является

{

- =Местный анальгетический
- =Противовоспалительный
- =Трофостимулирующий
- =Стимуляция отделения секвестров
- =Гипотензивный

}

К показаниям к флюктуоризации не относится

{

- =Заболевания дёсен
- =Межпозвоночные грыжи
- =Артрит височно-нижнечелюстного сустава
- =Внутриротовой абсцесс после вскрытия
- =Варикозная болезнь

}

Осложнения миоэлектростимуляции включают

- {
- =Ожоги кожи
- =Электротравму
- =Болевой синдром
- =Контрактуру
- =Всё перечисленное
- }

Сила тока при проведении миоэлектростимуляции мышц лица и кисти составляет

- {
- =3-5 мА
- =5-15мА
- =15-20мА
- =2-3мА
- =1-2мА
- }

С каким методом имеется сходство в механизмах действия диадинамотерапии?

- {
- =Амплипульстерапия
- =Флюктуоризация
- =Интерференцтерапия
- =Ультратонотерапия
- =Дарсонвализация
- }

Лечебным фактором дарсонвализации является

- {
- =Переменный ток частотой 110 кГц, с силой до 0.02мА
- =Постоянный ток с силой до 30мА
- =Переменный ток частотой 220 кГц, с силой 2мА
- =Полусинусоидальный ток с частотой 22кГц
- =Импульсный ток частотой 3000кГц
- }

Лечебным эффектом тихого разряда при дарсонвализации является

{

- =Спазмолитический
- =Бактерицидный
- =Сосудорасширяющий
- =Венотонический
- =Всё перечисленное

}

Противопоказанием к дарсонвализации не является

{

- =Геморрой
- =Беременность
- =Инфаркт миокарда
- =Активный туберкулёз
- =Повреждение кожи в зоне воздействия

}

К аппаратуре для проведения дарсонвализации не относится аппарат

{

- =«Корона»
- =«Карат»
- =«Искра-2»
- =«Импульс-1»
- =«Тонус-1»

}

Время воздействия на одном участке при проведении дарсонвализации не

Превышает

{

- =3-5 мин
- =5-10 мин
- =10-15 мин
- =15-20 мин
- =20-30 мин

}

Лечебным фактором ультратонотерапии является

{

- =Синусоидальный ток 22кГц с силой 0,02мА
- =Полусинусоидальный ток 110кГц с силой 2мА
- =Синусоидальный ток 5000Гц с силой до 10мА
- =Импульсный ток , меняющийся от100 до 2000Гц
- =Постоянный ток с силой до 50мА

}

С каким методом имеет сходство в параметрах и механизме действия ультратонотерапия?

{

- =УВЧ-терапия
- =Дарсонвализация
- =Флюктуоризация
- =Интерференцтерапия
- =Диадинамотерапия

}

К лечебным эффектам ультратонотерапии не относится

{

- =Спазмолитический
- =Противовоспалительный
- =Местный анальгетический
- =Сосудорасширяющий
- =Гипокоагулирующий

}

Лечебным фактором УВЧ-терапии является

{

- =Постоянное электрическое поле высокого напряжения до 50кВ
- =Переменное электрическое поле частотой 10кГц
- =Электромагнитные волны 2450МГц
- =Электромагнитные волны 460МГц
- =Переменное электрическое поле 27,12МГц или 40,68МГц

}

Длина волны поля УВЧ составляет

{

- =7,37м и 11,05м
- =22,12м и 33.12м

=3,5м и 5,7м
=2,5м и 5,2м
=8,32м и 9,35м
}

К лечебным эффектам высокоинтенсивного действия УВЧ-терапии относится

{
=Вазоактивный
=Репаративно-регенеративный
=Секреторный
=Антиатерогенный
=Бактерицидный
}

К показаниям для высокоинтенсивного действия поля УВЧ не относится

{
=Острые воспалительные процессы
=Хронические воспалительные процессы
=Гипертоническая болезнь 1-2 стадии
=Отморожения
=Гломерулонефрит
}

К противопоказаниям к УВЧ-терапии не относится

{
=Гипотензия
=ИБС (стенокардия напряжения 3 ФК)
=Гнойный очаг до дренирования
=Наличие кардиостимулятора
=Каузалгии
}

Низкоинтенсивные дозы УВЧ-терапии предполагают мощность воздействия до

{
=40Вт
=30Вт
=50Вт

=60Вт
=10 Вт
}

Среднеинтенсивные дозы УВЧ-терапии предполагают диапазон мощности
{
=От 30 до 70 Вт
=От 10 до 30Вт
=От 70 до 100Вт
=От 100 до 150Вт
=От 200 до 300Вт
}

Лечебным фактором франклинизации является
{
=Постоянное электрическое поле высокого напряжения и малой силы
=Переменное электрическое поле высокой частоты и малой силы
=Электрический ток высокого напряжения и малой силы
=Постоянный ток среднего напряжения и небольшой силы
=Среднечастотный ток малой силы и высокого напряжения
}

Параметрами франклинизации являются
{
=50кВ и 1мА
=100кВ и 10мА
=5кВ и 20мА
=150кВ и 50мА
=10 кВ и 30мА
}

К лечебным эффектам франклинизации не относится
{
=Гипоалгезивный
=Седативный
=Бактерицидный
=Гипотензивный
=Противовоспалительный
}

К показаниям к фанклиннзации не относятся

{

=Неврастения

=Мигрень

=Переутомление

=Нейродермит

=Депрессия

}

К показаниям к транскеребральной магнитотерапии не относится

{

=Перинатальное поражение

=Цефалгии

=Ожирение

=Сахарный диабет

=Тиреотоксикоз

}

Параметрами для проведения транскеребральной магнитотерапии является магнитная индукция

{

=1-10мТл

=10-50мТл

=50-100мТл

=100-120мТл

=120-150мТл

}

Аппаратом для проведения транскеребральной магнитотерапии является

{

=«АМО-АТОС»

=«Тонус-1»

=«Диадинамик»

=«АФ-3-1»

=«Узор»

}

Для импульсной магнитотерапии используют магнитное поле

{
=Высокого напряжения
=Высокой интенсивности
=Высокой частоты
=Малой интенсивности
=Малой индукции
}

Лечебным эффектом импульсной магнитотерапии является

{
=Нейростимулирующий
=Миостимулирующий
=Противовоспалительный
=Анальгетический
=Всё перечисленное
}

К противопоказаниям к импульсной магнитотерапии не относится

{
=Выраженная гипотония
=Тромбофлебит
=Желчнокаменная болезнь
=Гнойные процессы
=Атрофии мышц
}

Параметрами для низкочастотной магнитотерапии являются

{
=0,125-100Гц; до 100мТл
=100-150Гц; до 10мТл
=150-250Гц; до 5мТл
=1,225-200Гц; до 50мТл
=3-30Гц; до 30мТл
}

Лечебным фактором ДМВ-терапии являются

{
=Электромагнитные волны частотой 2375МГц; 25см
=Электромагнитные волны частотой 460 МГц; 65см;

- =Высокочастотные магнитные волны частотой 3000МГц; 45см
- =Низкочастотные волны частотой 450кГц; 50см
- =Электрические поля с частотой 1000МГц; 100см

}

Глубина проникновения ДМВ в ткани составляет

- {
- =1-2см
- =2-3см
- =3-4см
- =6-8см
- =9-11см

}

При воздействии слаботепловыми дозами на область надпочечников проявляется

- {
- =Противовоспалительное действие
- =Противоаллергическое действие
- =Стимуляция метаболизма
- =Противоотёчное действие
- =Иммуномодулирующее действие

}

При воздействии ДМВ на область сердца

- {
- =Улучшение обменных процессов в миокарде
- =Восстановление сократительной способности миокарда
- =Снижение АД
- =Развитие репаративных процессов в миокарде
- =Всё перечисленное

}

К противопоказаниям к ДМВ-терапии не относятся

- {
- =Острые воспалительные заболевания
- =Беременность
- =Металлические тела в зоне воздействия
- =Нарушения ритма сердца

=Постинфарктный кардиосклероз
}

Лечебным фактором СМВ-терапии являются

{
=Электромагнитные волны частотой 460МГц; 65см
=Электромагнитные волны 2375 МГц; 12,6см
=Переменное электрическое поля 27,12МГц; 11,05м
=Постоянное электрическое поле до 50кВ; 2м
=Высокочастотные волны 3000кГц; 25см
}

Глубина проникновения СМВ в ткани составляет

{
=1-2см
=2-3см
=3-5см
=6-7см
=7-10см
}

При воздействии СМВ низкой интенсивности на эндокринные железы происходит повышение содержания в крови

{
=Адренокортикотропного гормона
=Соматотропного гормона
=Тироксина
=Инсулина
=Всего перечисленного
}

Лечебным фактором КВЧ-терапии является

{
=Электромагнитные волны частотой 30-300ГГц; 1-10мм
=Электромагнитные волны 450ГГц; 10-20мм
=Электромагнитные волны 2450МГц; 12см
=Постоянное электрическое поле высокого напряжения до 50кВ
=Переменное электрическое поле частотой 40,68МГц; 7,37м
}

Глубина проникновения КВЧ-волн в ткани составляет

{

=0,2-0.6мм

=1-2мм

=2-3см

=0,9-10мм

=3-4см

}

Интенсивность воздействия (ППЭ) КВЧ-волн не превышает

{

=1мВт/см²

=100мВт/см²

=10мВт/см²

=50мВт/см²

=30мВт/см²

}

Аппаратурой для КВЧ-терапии не является

{

=«Баяр-01»

=«Бриз»

=«АИСТ»

=«Стелла»

=«Волна»

}

Лечебным фактором инфракрасного облучения является излучение длиной волны

{

=400-3000нм

=760-4000нм

=820-1200нм

=400-760нм

=320-400нм

}

Лечебным эффектом инфракрасного излучения является

{
=Лимфодренирующий
=Репаративно-регенеративный
=Катаболический
=Сосудорасширяющий
=Всё перечисленное
}

К показаниям для инфракрасного облучения не относятся

{
=Ожоги и отморожения
=Ревматизм
=ЛОР-заболевания
=Нарушения сна
=Острые воспалительные процессы
}

Лечебным фактором неселективной хромотерапии является

{
=Лечение хромом
=Интегральное видимое излучение
=Лечение определённым цветом (синий, красный и т.д.)
=Длинноволновое ультрафиолетовое излучение
=Красное излучение
}

Лечебным эффектом центральной неселективной хромотерапии является

{
=Липолитический
=Иммуномодулирующий
=Сосудорасширяющий
=Противовоспалительный
=Психостимулирующий
}

Лечебным фактором видимого излучения является излучение с длиной волны

{
=320-400нм
=400-760нм
}

=760-4000нм

=180-280нм

=820-1200нм

}

К показаниям к неселективной хромотерапии не относятся

{

=Депрессия

=Расстройства сна

=Пролежни

=Заболевания пародонта

=Фотоэритема

}

Освещённость лица при проведении центральной неселективной хромотерапии составляет

{

=10000-20000лк

=5000-10000лк

=100-500лк

=500-1000лк

=2000-4000лк

}

Аппаратом для хромотерапии является аппарат

{

=«Лазурь»

=«Узор»

=«Биоптрон»

=«Корона»

=«Искра»

}

Лечебным фактором длинноволнового ультрафиолетового излучения является излучение с длиной волны

{

=180-280нм

=320-400нм

=400-760нм

=280-320нм
=100-200нм
}

Основным лечебным эффектом длинноволнового ультрафиолетового излучения является

{
=Репаративный
=Противовоспалительный
=Сосудорасширяющий
=Иммуностимулирующий
=Лимфодренирующий
}

ПУВА-терапия – метод сочетанного воздействия

{
=Фотосенсибилизаторов и ДУФ-излучения
=Лекарственных препаратов и лазерного излучения
=Облучение крови КУФ-излучением
=Лекарственных препаратов и СУФ-излучения
=Фотосенсибилизаторов и КУФ-излучения
}

Лечебным фактором коротковолнового ультрафиолетового излучения является излучение с длиной волны

{
=280-320нм
=180-280нм
=320-400нм
=100-180нм
=50-120нм
}

Основным лечебным эффектом КУФ-облучения является

{
=Противовоспалительный
=Бактерицидный
=Сосудорасширяющий
=Репаративный

=Лимфодренирующий
}

Показаниями для АУФОК не являются
{

=Гипокоагуляционный синдром
=Абсцесс
=Остеомиелит
=Карбункул
=Трофические язвы
}

При первых процедурах АУФОК кровь облучают из расчёта на 1 кг массы
больного

{
=2-3мл/кг
=3-4мл/кг
=0,5-0,8мл/кг
=5-6мл/кг
=0,1-0,2мл/кг
}

К особенностям лазерного излучения не относится

{
=Монохроматичность
=Когерентность
=Фотодеструкция
=Высокая направленность
=Поляризация
}

К лечебным эффектам красного лазерного излучения не относится

{
=Сосудорасширяющий
=Противовоспалительный
=Репаративный
=Антиэкссудативный
=Катаболический
}

Искать верного
ответа

Лечебным фактором красной лазеротерапии является излучение с длиной Волны

- {
- =0,8мкм
- =0,632мкм
- =1,2мкм
- =0,502мкм
- =2,02мкм
- }

Лечебным фактором инфракрасной лазеротерапии является излучение длиной волны

- {
- =0,8-1,2мкм
- =1,3-2,3мкм
- =0,1-2мкм
- =2-3мкм
- =0,3-2,1мкм
- }

При проведении процедур лазеротерапии площадь облучения не должна превышать

- {
- =100см²
- =200см²
- =300см²
- =400см²
- =500см²
- }

При проведении процедур лазеротерапии на одно поле воздействуют

- {
- =От 20с до 5мин
- =От 10с до 10мин
- =От 30с до 7мин
- =От 1мин до 20мин
- =От 2 мин до 10мин
- }

К показаниям для проведения лазеротерапии не относятся

{

=Бронхит

=ИБС

=Невралгия

=Энурез

=Гипертиреоз

}

К показаниям к массажу не относится

{

=Гипотензия

=Боль в позвоночнике

=Параличи

=Контрактуры

=Тромбофлебит

}

За 1 массажную единицу принимают время продолжительностью

{

=15 мин

=5 мин

=10мин

=15мин

=20мин

}

К основным приёмам классического массажа не относится

{

=Поглаживание

=Растирание

=Разминание

=Рубление

=Вибрация

}

Лечебным фактором ударно-волновой терапии являются

{

- =Акустические импульсы значительной амплитуды
 - =Механические колебания частиц упругой среды с частотой свыше 20кГц
 - =Воздействие на ткани сжатым воздухом
 - =Низкочастотные механические колебания
 - =Воздействие локальной вакуум-декомпрессии и вибрации
- }

К лечебным эффектам ударно-волновой терапии не относится

- {
- =Остеолизирующий
 - =Дефиброзирующий
 - =Гипоалгезивный
 - =Репаративно-регенераторный
 - =Противовоспалительный
- }

К показаниям к ударно-волновой терапии не относятся

- {
- =Разрывы мышц и сухожилий
 - =Бурситы
 - =Пяточная шпора
 - =Ложные суставы
 - =Лигаментопатии
- }

Лечебным фактором ультразвуковой терапии являются

- {
- =Механические колебания с частотой 10-200Гц
 - =Механические колебания с частотой 800-3000кГц
 - =Воздействия аппаратом со сжатым воздухом
 - =Ударные волны с давлением до 140МПа
 - =Механические воздействия с частотой 20-100кГц
- }

Площадь озвучивания у взрослых при проведении УЗТ не должна превышать

- {
- =100см²
 - =50см²
 - =150см²

=200см²

=250см²

}

Температура газовых ванн составляет

{

=20-25С

=30-35С

=35-36С

=37-40С

=25-30С

}

К свойствам аэрозолей низкой дисперсности не относится

{

=Неустойчивость и нестабильность

=Быстрое осаждение на поверхности

=Большой расход лекарственного вещества

=Уменьшение глубины проникновения из-за быстрой коагуляции

=Проникновение в глубокие отделы дыхательных путей

}

К показаниям для аэрозольтерапии не относится

{

=Острая пневмония

=Бронхиальная астма

=ХОБЛ

=Туберкулёз

=Легочное кровотечение

}

Подавляют функцию мерцательного эпителия дыхательных путей аэрозоли температурой

{

=20С

=30С

=25С

=40С

=15С

}

К показаниям к аэроионотерапии не относятся

{

=Нарушения сна

=Болевые синдромы

=Депрессии

=Раны

=Кахексия

}

Температура плавления парафина составляет

{

=40-42C

=48-52C

=55-60C

=30-36C

=40-42C

}

К лечебным эффектам парафинотерапии не относится

{

=Спазмолитический

=Репаративно-регенеративный

=Миорелаксирующий

=Катаболический

=Фибромодулирующий

}

К лечебным эффектам озокеритотерапии не относится

{

=Репаративно-регенеративный

=Катаболический

=Сосудорасширяющий

=Фибромодулирующий

=Иммуномодулирующий

}

Умеренно низкие температуры предполагают температуру в пределах

{
=От 10 до 20С
=От 20 до -30С
=От 30 до -40С
=От 0 до -50С
=От -10 до -40С
}

Применение низких температур находится в диапазоне

{
=От -30 до -180С
=От 20 до -20С
=От -50 до -100С
=От -70 до -120С
=От 10 до -150С
}

К показаниям к локальной криотерапии не относятся

{
=Раны
=Ожоги
=Мигрень
=Невралгии
=Анемия
}

Для локальной криотерапии используют

{
=Хлорэтил
=Углекислый газ
=Жидкий азот
=Воздух
=Всё перечисленное
}

Продолжительность процедур общей криотерапии (нахождение в криосауне)
не должна превышать

{
=5 мин

=2 мин

=3 мин

=7 мин

=1 мин

}

В состав минеральных вод входят компоненты

{

=Неорганические минеральные вещества

=Газы

=Органические вещества

=Микрофлора

=Всё перечисленное

}

К лечебным эффектам хлоридно-натриевых ванн не относится

{

=Иммуностимулирующий

=Гипокоагулирующий

=Мочегонный

=Катаболический

=Противовоспалительный

}

К показаниям для приёма хлоридно-натриевых ванн не относится

{

=Варикозная болезнь

=Ревматический полиартрит

=Псориаз

=Гипотиреоз

=Тромбофлебит

}

Для лечебных минеральных вод установлены критерии минерализации

{

=От 1 до 3 г/дм³

=От 10 до 15 г/дм³

=От 3 до 5 г/дм³

=От 5 до 10 г/дм³

=От 15 до 20 г/дм³
}

Питьевое лечение минеральными водами осуществляют, исходя из расчёта на
1 кг массы тела пациента

{
=5мл
=2мл
=10мл
=3мл
=7мл
}

К показаниям к пелоидотерапии не относятся

{
=Радикулит
=Остеомиелит
=ХОБЛ
=Колит
=Цирроз печени
}

Для ЛФК как метода терапии характерно всё перечисленное, кроме

{
=Активности больного в процессе лечения
=Метода специфической терапии
=Метода естественно-биологического содержания
=Метода патогенетической терапии
=Метода функциональной терапии
}

К механизмам действия физических упражнений относятся все, кроме

{
=Тонизирующего
=Трофического
=Формирования компенсаций
=Двигательного
=Нормализации функций
}

К средствам ЛФК относятся все, кроме

{

=Физических упражнений

=Естественных природных факторов

=Массажа

=Трудотерапии

=Лечебной гимнастики

}

К формам ЛФК относятся все, кроме

{

=Лечебной гимнастики

=Гигиенической гимнастики

=Дозированной ходьбы

=Оздоровительного бега

=Двигательного режима

}

Гимнастические упражнения классифицируются по всем признакам, кроме

{

=Анатомического

=Активности

=Характера мышечного сокращения

=Видовому

=Аэробному

}

Спортивно-прикладные упражнения включают все перечисленные, кроме

{

=Ходьбы

=Бега

=Плавания

=Ползания

=Игровых

}

Игры в ЛФК подразделяются на все перечисленные, кроме

{

- =Компьютерные
- =Крокет
- =Волейбол
- =Настольный теннис
- =Гребли

}

Двигательные режимы в стационаре включают все перечисленные, кроме

- {
- =Строгого постельного
- =Расширенного постельного
- =Палатного
- =Свободного
- =Лежачего

}

ЛФК является методом: {

- =естественно-биологический
- =функциональной терапии
- =неспецифической терапии
- =восстановительный
- =специфической терапии

}

Положительными сторонами ЛФК являются: {

- =универсальность
- =возможность длительного применения
- =накопление энергии
- =отсутствие отрицательного побочного действия
- =замедление процессов старения

}

Принципами применения ЛФК являются: {

- =комплексность
- =дифференцированность
- =адекватность
- =целенаправленность
- =комплексность

}

Механизмами действия физических упражнений являются: {

- =тонизирующий
 - =трофический
 - =формирование компенсаций
 - =нормализация функций
 - =специфический
- }

К средствам ЛФК относятся: {

- =физические упражнения
 - =естественные природные факторы
 - =двигательные режимы
 - =дозированная ходьба
 - =лечебная гимнастика
- }

По характеру мышечного сокращения упражнения могут быть: {

- =динамические
 - =статические
 - =на растягивание
 - =на расслабление
 - =активные
- }

Спортивно-прикладные упражнения включают: {

- =ходьбу
 - =плавание
 - =лазание
 - =греблю
 - =езду на велосипеде
- }

Игры в ЛФК классифицируются следующим образом: {

- =на месте
- =малоподвижные
- =подвижные
- =спортивные

=аэробные
}

По цели физические упражнения классифицируются на: {

=аэробные
=анаэробные
=региональные
=общеукрепляющие
=специальные
}

Статические дыхательные упражнения включают: {

=полный тип дыхания
=диафрагмальное дыхание
=грудной тип дыхания
=дыхание с сопротивлением
=общеукрепляющие
}

Двигательные режимы в амбулаторных и санаторно-курортных условиях могут быть: {

=постельный
=санаторный
=щадящий
=щадяще-тренирующий
=тренирующий
}

Виды трудовых операций (трудотерапия) может быть: {

=в облегчённом режиме
=вырабатывающая силу и выносливость мышц
=развивающая тонкую координацию пальцев
=механотерапия
=пулитотерапия
}

Противопоказаниями к механотерапии являются: {

=болевого синдром
=анкилоз

- =кокситроз
- =тромбофлебит
- =миокардит

}

Процедура лечебной гимнастики состоит из частей: {

- =подготовительной
- =усиленной
- =водной
- =основной
- =заключительной

}

Принципами тренировки являются: {

- =длительность
- =регулярность
- =постепенность
- =индивидуальность
- =всесторонность

}

Методами проведения лечебной гимнастики могут быть: {

- =индивидуальный
- =групповой
- =самостоятельный
- =гимнастический
- =интервальный

}

Скандинавская ходьба оказывает следующее влияние: {

- =улучшает осанку
- =укрепляет мышцы живота
- =снимает стресс
- =снижает нагрузку на коленные суставы
- =укрепляет мышцы корпуса

}

Для терренкура характерна ходьба: {

- =под углом от 3 до 15 градусов

- =от 500 до 5000метров
- =от 5000 до 6000м
- = под углом от20 до60градусов
- =вертикальная

}

К противопоказаниям для гидрокинезотерапии относятся: {

- =атрофии мышц
- =контрактуры
- =туберкулёз
- =остеомиелит
- =инфаркт миокарда

}

Параметрами дозировки физической нагрузки являются: {

- =длительность
- =плотность
- =интенсивность
- =объём
- =утомление

}

Физиологические кривые нагрузки могут быть: {

- =одновершинная
- =многовершинная
- =платообразная
- =тренировочная
- =хаотическая

}

Этиологическими факторами развития инфаркта миокарда являются: {

- =Атеросклероз коронарных артерий
- =Хирургическая обтурация
- =Эмболизация коронарных артерий
- =Спазм коронарных артерий
- =Гематологические заболевания

}

По анатомии поражения выделяют инфаркт миокарда: {

- =Тотальный
- =Трансмуральный
- =Интрамуральный
- =Субэндокардиальный
- =Субэпикардиальный

}

Периодами течения инфаркта миокарда являются: {

- =Острейший
- =Острый
- =Подострый
- =Рубцевания
- =Латентный

}

Интенсивность болевого синдрома при инфаркте миокарда может быть: {

- =Интенсивная
- =Нарастающая
- =Волнообразная
- =Угасающая
- =Отсутствует

}

Болевой синдром при инфаркте миокарда купируется: {

- =Нитроглицерин
- =Морфин
- =Омнопон+Атропин
- =Фентанил
- =Дроперидол

}

NB!

Характер болевого синдрома при инфаркте миокарда может быть: {

- =Давящая
- =Сжимающая
- =Жгучая
- =Стягивающая
- =Сверлящая

}

Атипичными формами инфаркта миокарда могут быть: {

=Абдоминальная

=Астматическая

=Церебральная

=Безболевая

=Почечная

}

Ранняя активизация больных инфарктом миокарда снижает развитие следующих осложнений: {

=Застойной пневмонии

=Тробоэмболий

=Запоров

=Атеросклероза

=Мышечной гипотрофии

}

Ведущими критериями выбора тренирующих нагрузок и их дозирования являются: {

=Максимально допустимые значения ЧСС

=Продолжительность пиковых нагрузок

=Бледность кожных покровов

=Характер потоотделения

=Характер двигательной активности

}

К антиишемическим методам реабилитации при инфаркте миокарда относятся: {

=Оксигенотерапия

=Усиленная наружная контрпульсация

=Нормобарическая гипокситерапия

=Аэротерапия

=Лазерное облучение крови

}

Лечебными эффектами оксигенотерапии являются: {

=Антигипоксический

=Иммуностимулирующий

=Катаболический

=Гипокоагулирующий
=Гипотензивный
}

Продолжительность оксигенотерапии и содержание кислорода в барокамере при инфаркте миокарда составляет: {
= 100%
= 45-60мин
= 50%
= 70%
= 20-30мин
}

Какие газы и в какой концентрации используют в гипоксической газовой смеси (ГГС), которая используется для нормобарической гипокситерапии у больных инфарктом миокарда? {
=Кислород 10-15\%
=Азот 85-90\%
=Углекислота 50\%
=Озон 10\%
=Аэроионы 20\%
}

Антитромботические методы лечения инфаркта миокарда включают: {
=Аэротерапия
=Гидротерапия
=Оксигенотерапия
=Низкочастотная магнитотерапия
=Лазерное облучение крови
}

При проведении низкочастотной магнитотерапии у больных инфарктом миокарда используют параметры: {
= 35мТл
=10-15мин
=100мТл
=20-30мин
=20Тл
}

Лечебными эффектами низкочастотной магнитотерапии являются: {

- =Сосудорасширяющий
 - =Противовоспалительный
 - =Гипокоагулирующий
 - =Противоотёчный
 - =Гипертензивный
- }

Для транскутанного инфракрасного лазерного облучения крови при инфаркте миокарда воздействуют на сосуды: {

- =Кубитальную вену
 - =Подключичную вену
 - =Сонную артерию
 - =Портальную вену
 - =коронарную артерию
- }

Лечебными эффектами лазерного облучения крови являются: {

- =Гипокоагулирующий
 - =Повышение кислородной ёмкости эритроцитов
 - =Сосудорасширяющий
 - =Противовоспалительный
 - =Гипотензивный
- }

Антисклеротическими методами лечения инфаркта миокарда являются: {

- =Дидинамотерапия
 - =Бальнеотерапия
 - =Коротковолновое УФО
 - =Гелиотерапия
 - =Талассотерапия
- }

Внутрисосудистыми факторами развития ишемической болезни сердца являются: {

- =Атеросклероз
- =Тромбоэмболия
- =спазм вененых артерий

=Гиподинамия
=Гипертрофия миокарда
}

Основными факторами риска развития ишемической болезни сердца являются: {

=Мужской пол
=Возраст старше 40 лет
=Курение более 5 лет
=Ожирение
=Гиподинамия
}

Основными клиническими симптомами ИБС являются: {

=Жгучая боль
=Нарушения сердечного ритма
=Одышка
=Слабость, головокружения
=Носовое кровотечение
}

Классификация ИБС: {

=Стенокардия
=Инфаркт миокарда
=Постинфарктный кардиосклероз
=сердечная недостаточность
=Внезапная смерть
}

Задачами медицинской реабилитации при ИБС являются: {

=Повышение толерантности к физической нагрузке
=Достижение адекватного кровотока
=Снижение потребности в медикаментозной терапии
=Улучшение качества жизни
=Предупреждение атрофии мышц
}

Кардиотоническими методами лечения больных ИБС являются: {

=Углекислые ванны

- = «Пароуглекислые» ванны
- = «Сухие» углекислые ванны
- =Питьевое лечение минеральными водами
- =Электростимуляция мышц

}

Параметрами (концентрация и температура) для проведения углекислых ванн являются: {

- = 0,8-1,2г/л
- = 36-37 градусов
- = 10-12г/л
- = 40 градусов
- = 5-6г/л

}

Антиишемическими методами лечения больных ИБС, являются: {

- =Оксигентерапия
- =Усиленная наружная контрпульсация
- =Электростимуляция мышц нижних конечностей
- =Ультрафиолетовое облучение
- =Парафинотерапия

}

Программа физической реабилитации больных I функционального класса ИБС включает: {

- = Лечебная гимнастика 30-40мин
- =Дозированная ходьба 110-120шаг/мин
- =ЧСС до 140 ударов в минуту
- =Лечебная гимнастика 10-15мин
- =ЧСС 110 ударов в минуту

}

Программа физической реабилитации больных II функционального класса ИБС включает: {

- = Лечебная гимнастика 30мин
- =Дозированная ходьба 110 шаг/мин
- =ЧСС до130 ударов в минуту
- = Аэробные нагрузки 40мин
- =ЧСС до100 ударов в мин

}

Программа физической реабилитации больных III функционального класса ИБС включает: {

- =Лечебная гимнастика 20мин
 - =Дозированная ходьба 80-90 шаг/мин
 - = ЧСС до 110 ударов в минуту
 - =ЧСС до 90 ударов в минуту
 - =Дозированная ходьба 60 шаг/мин
- }

Программа физической реабилитации больных IV функционального класса ИБС включает: {

- =Лечебная гимнастика 25-20 мин
 - =Дозированная ходьба 60-70 шаг/мин
 - = ЧСС до 100 ударов в минуту
 - =Элементы спортивных игр
 - =Аэробные нагрузки
- }

Клиническими признаками гипертонической болезни являются: {

- =Давящая головная боль
 - =Носовые кровотечения
 - =Кардиалгии
 - =Тяжесть в затылке
 - =Судороги в мышцах
- }

Гипертоническая болезнь первой степени характеризуется: {

- =Систолической давление 149-159мм.рт.ст.
 - =Диастолической давление 90-99мм.рт.ст.
 - =Систолическое давление 139-149мм.рт.ст.
 - =Диастолическое давление 80-90 мм.рт.ст.
 - =Систолическое давление 160-170 мм.рт.ст.
- }

Гипертоническая болезнь второй степени характеризуется: {

- =Систолическое давление 180-190мм.рт.ст.
- =Диастолическое давление 110-120мм.рт.ст.

=Диастолическое давление 90-100мм.рт.ст.
=Систолическое давление 160-179мм.рт.ст.
=Диастолическое давление 100-109мм.рт.ст.
}

Гипертоническая болезнь третьей степени характеризуется: {

=Систолическое давление 180и >мм.рт.ст.
=Диастолическое давление 110 и >мм.рт.ст.
=Систолическое давление 170 и >мм.рт.ст.
=Диастолическое давление 99 и >мм.рт.ст.
=Пульсовое давление 50мм.рт.ст.
}

Какие методы медицинской реабилитации применяют при гипертонической болезни? {

=Физиотерапия
=Кинезотерапия
=Диетотерапия
=Психотерапия
=Санаторно-курортное лечение
}

Группы физических методов лечения, применяемых при гипертонической болезни: {

=Актопротекторные
=Седативные
=Гипотензивные
=Вегетокорригирующие
=Спазмолитические
}

Лечебными эффектами аэротерапии являются: {

=Актопротекторный
=Вентиляционно-перфузионный
=Тонизирующий
=Седативный
=Противовоспалительный
}

Контрастные ванны, применяемые у больных гипертонической болезнью, назначают поочередно с температурой воды: {

= 35градусов 5мин.

=10-15градусов 5 мин.

=25градусов 10мин.

=38-42градуса 2-3мин.

=15-25градусов 1мин.

}

Седативными методами лечения гипертонической болезни являются: {

=Амплипульстерапия

=Парафинотерапия

=Лазеротерапия

=Электросонотерапия

=Лечебный массаж

}

Параметрами токов, применяемых для электросонотерапии, являются: {

=150-250Гц

= до 50мА

= до 30мА

=1-150Гц

= до 10мА

}

Гипотензивными методами лечения гипертонической болезни являются: {

=Хлоридно-натриевые ванны

=Купание в пресной тёплой воде

=Пелоидотерапия

=Гальванизация

=Аэроионотерапия

}

Лечебными эффектами транскраниальной электроанальгезии, применяемой у больных гипертонической болезнью, являются: {

=Тонизирующий

=Стимуляция гемопоеза

=Антикоагуляционный

=Анальгетический

=Сосудорасширяющий
}

Параметрами низкочастотной магнитотерапии у больных гипертонической болезнью являются: {

=Индукция 2-3Тл
=Частота 20Гц
=Индукции 150Гц
=Индукция 20-30мТл
=Частота 50Гц
}

Диетотерапия у больных гипертонической болезнью предполагает ограничение потребления: {

=Соли
=Животных жиров
=Фруктов
=Морепродуктов
=Растительных жиров
}

Лучшими формами кинезотерапии у больных гипертонической болезнью являются: {

=Дозированная ходьба
=Плавание
=Езда на велосипеде
=Статические упражнения
=Анаэробные нагрузки
}

Этиологическими факторами, вызывающими пневмонию, могут быть: {

=Пневмококки
=Стафилококки
=Вирусы
=Грибки
=Аллергические агенты
}

По клинико-морфологическим признакам пневмония классифицируется на: {

- =Паренхиматозную
 - =Интерстициальную
 - =Вирусную
 - =Двухстороннюю
 - =Вторичные
- }

Противопоказаниями к назначению физиотерапии при пневмонии являются: {

- =Сердечно-легочная недостаточность 2-3ст
 - =Буллёзная эмфизема лёгких
 - =Лихорадочное состояние
 - =Легочное кровотечение
 - =Температура тела 37 градусов
- }

Ингаляционная терапия пневмонии включают: {

- = Кортикостероиды
 - = Бронхолитики
 - =Муколитики
 - =Сурфактанты
 - =Коагулянты
- }

Репаративно-регенеративные методы лечения пневмонии включают: {

- =Вибрационный массаж
 - =Ультразвуковую терапию
 - =Пелоидотерапию
 - =Инфракрасную лазеротерапию
 - =Низкочастотную магнитотерапию
- }

Средства и формы ЛФК при пневмонии на постельном двигательном режиме в стационаре включают: {

- =Лечебная гимнастика 10-15мин
 - =Толчкообразный выдох
 - =Дозировка упражнений 2-4 раза
 - =Лечебная гимнастика 20мин
 - =Дозировка упражнений 10 раз
- }

Средства и формы ЛФК при пневмонии на палатном двигательном режиме включают: {

=УГГ 8-10мин

=ЛГ 15-20мин

=Массаж

= Дозированная ходьба по отделению

=Дозированная ходьба по ступенькам

}

Средства и формы ЛФК при пневмонии на свободном двигательном режиме включают: {

=УГГ 10-15мин

=ЛГ 20-25мин

=ЛГ 35мин

= Подвижные игры

=Дозированная ходьба по ступенькам

}

Для интермиттирующей степени тяжести бронхиальной астмы характерно: {

=Дневные приступы < 2раз в неделю

=Ночные приступы < 2 раз в месяц

=Объём форсированного выдоха > 80%

=Дневные приступы < 4 раза в неделю

=Ночные приступы < 4 раза в месяц

}

Для тяжёлой персистирующей степени тяжести бронхиальной астмы характерно: {

=Дневные приступы - в течение дня

=Ночные приступы - каждую ночь

=Объём форсированного выдоха < 60%

=Дневные приступы 3 раза в неделю

=Ночные приступы 10 раз в месяц

}

Для бронхиальной астмы характерно: {

=Бочкообразная грудная клетка

=Экспираторная одышка

- =Инспираторная одышка
- =Вынужденное положение
- =Сужение межрёберных промежутков

}

Для ингаляционной терапии у больных бронхиальной астмой применяют: {

- =Сальбутамол
- =Фенотерол
- =Будесонид
- =Гидрокортизон
- =Эуфиллин

}

Кинезотерапия у больных бронхиальной астмой включает: {

- =Звуковую гимнастику
- =Дозированную ходьбу
- =Массаж
- =Гимнастические упражнения
- =Анаэробные нагрузки

}

Экзогенными факторами развития гастрита являются: {

- =*Helicobacter pylori*
- =Глюкокортикоидные гормоны
- = Вредные привычки (алкоголизм, курение)
- =Хронический стресс
- =Аутоиммунные процессы

}

Эндогенными факторами развития гастрита являются: {

- =Паразитарные инвазии
- =Генетическая предрасположенность
- =Дуоденогастральный рефлюкс
- =Эндокринные дисфункции
- =Нарушения обмена веществ

}

Методика питьевого приёма минеральных вод при гастрите включает: {

- = 3мл/кг; 20-25 градусов

= 1 раз в день; 30-35 градусов
= 4 раза в день; 1-1,5 мес.
= 5мл/кг; 15-20 градусов
= 2 раза в день; 2 мес.
}

Вегетокорригирующими методами физиотерапии у больных гастритом являются: {

= Транскраниальная электроанальгезия
= Электросонотерапия
= Криотерапия
= Электрофорез анестетиков
= Пелоидотерапия
}

Спазмолитическими методами физиотерапии у больных гастритом являются: {

= Электрофорез новокаина
= Парафинотерапия
= Лазеротерапия
= Диадинамотерапия
= Амплипульстерапия
}

Методика ЛФК при гиперацидном гастрите включает: {

= Нагрузка субмаксимального характера
= Упражнения на брюшной пресс
= Упражнения перед едой или сразу после еды
= Нагрузка умеренного характера
= Упражнения за 2 часа до или через 2 часа после еды
}

К агрессивным факторам развития язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки относятся: {

= Выработка простагландинов
= Выработка слизи
= Соляная кислота
= Пепсин
= Желчные кислоты

}

К защитным факторам слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки относятся: {

=Выработка слизи, простагландинов

=Адекватное кровоснабжение

=Адекватная иннервация

=Обновление эпителия

=Желчные кислоты

}

К методам локального воздействия, применяемым при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, относятся: {

=Дециметровоолновая терапия

=Амплипульстерапия

=Импульсная магнитотерапия

=Пелоидотерапия

=Электросонотерапия

}

Методами общего воздействия у больных язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки являются: {

=Парафинотерапия

=Ультрафонофорез

=Электросонотерапия

=Транскраниальная электростимуляция

=Гальванический воротник по Щербаку

}

Для сахарного диабета 1 типа характерно: {

= Распространённость у 10-20%

= Болеют дети и взрослые до 40 лет

=Лечение-инсулин

=Распространённость у 80-90%

= Лишний вес в 90% случаев

}

Для сахарного диабета 2 типа характерно: {

= Болеют чаще женщины

- = Преобладает поражение крупных сосудов
 - = Медленное и незаметное начало
 - = Распространённость в 10-20% случаев
 - = Преобладает поражение мелких сосудов
- }

Энзимстимулирующими методами лечения больных сахарным диабетом являются: {

- = Аэротерапия
 - = Контрастные ванны
 - = Талассотерапия
 - = Лазеротерапия
 - = Диадинамотерапия
- }

Противопоказаниями к ЛФК при сахарном диабете являются: {

- = Гипергликемия 16,6 ммоль/л и >
 - = Наличие в моче ацетона
 - = Признаки «прекоматозного» состояния
 - = Гипергликемия 10-15 ммоль/л
 - = Наличие ожирения 2 степени
- }

Методы реабилитации при ожирении включают: {

- = Фармакотерапию
 - = Диету
 - = ЛФК
 - = Физиотерапию
 - = Психотерапию
- }

При ожирении снижают потребление: {

- = Жиров
 - = Углеводов
 - = Белков
 - = Острых приправ
 - = Фруктов
- }

Энзимстимулирующими физическими методами лечения ожирения являются: {

- =Аэротерапия
 - =Талассотерапия
 - =Контрастные ванны
 - =Диадинамотерапия
 - =Длинноволновое УФО
- }

Методами, усиливающими контрактильный термогенез у больных ожирением, являются: {

- =Электромиостимуляция
 - =Шотландский душ
 - =Суховоздушная баня
 - =Гидрокарбонатно-хлоридные питьевые воды
 - =Колоногидротерапия
- }

Методика лечебной гимнастики (ЛГ) у больных ожирением должна включать: {

- =Продолжительность ЛГ 45-60мин
 - =Продолжительность ЛГ 30-40мин
 - =Циклические упражнения
 - =Мелкие мышечные группы
 - =Механотерапия
- }

Особенности методики лечебной гимнастики при спланхноптозе включают: {

- =Продолжительность лечебной гимнастики 1,5-2 часа
 - =Исходные положения: коленно-кистевое, лёжа
 - =Исходные положения: стоя, сидя
 - =Продолжительность лечебной гимнастики 30 мин
 - =Рекомендуются прыжки, подскоки
- }

Этиологическими факторами развития сколиоза являются: {

- =Рахит
- =Травмы и опухоли позвоночника

- =Разная длина ног
- =Недостаток кальция
- =Атеросклероз

}

2 степени сколиоза соответствует: {

- =Угол отклонения от 11 до 25 градусов
- =Угол отклонения от 26 до 40 градусов
- =Регулярные боли в спине
- =Рёберный горб
- =Деформация туловища

}

Классификация сколиоза по форме искривления включает: {

- = С 4 дугами искривления
- = С 5 дугами искривления
- = С 1 дугой искривления
- = С 2 дугами искривления
- = С 3 дугами искривления

}

При сколиозе противопоказаны следующие средства и формы ЛФК: {

- =Прыжки, подскоки
- =Исходные положения сидя
- =Упражнения скручивающие туловище
- =Чистые висы
- =Самовытяжение в исходном положении лёжа

}

Специальными упражнениями при сколиозе являются: {

- =Висы
- =Подскоки
- =Симметричные
- =Ассимметричные
- =Деторсионные

}

Ношение корсетов назначается при сколиозе: {

- =1 степени

=2 степени

=3 степени

=4 степени

=5 степени

}

Корсет при сколиозе снимается при проведении: {

=Во время сна

=Во время принятия пищи

=Гигиенических процедур

=В бассейне

=Лечебных процедур

}

Плавание при сколиозе рекомендуется детям при: {

=1 степени сколиоза

=2 степени сколиоза

=3 степени сколиоза

=4 степени сколиоза

=По желанию

}

Методика гидрокинезотерапии при сколиозе включает: {

=Продолжительность 40-45 мин.

=Продолжительность 20-30 мин.

=Курс 2 мес.

=Курс 10 мес.

=Плавание в ластах

}

Диетическое питание при сколиозе должно включать: {

=Белковую пищу

=Фрукты и овощи

=Крупы

=Продукты с витаминами E, C

=Мучные изделия

}

Факторами риска развития остеоартроза являются: {

- =Травмы
 - =Наследственная предрасположенность
 - =Избыточная масса тела
 - =Возраст старше 50 лет
 - =Пониженная масса тела
- }

Методами электролечения, применяемыми при остеоартрозе, являются: {

- =Криотерапия
 - =Лазеротерапия
 - =Амплипульстерапия
 - =Интерференцтерапия
 - =Динамическая электронейростимуляция
- }

Фибромодулирующими методами лечения у больных остеоартрозом являются: {

- =Сероводородные ванны
 - =Пелоидотерапия
 - =Короткоимпульсная электроанальгезия
 - =Амплипульстерапия
 - =Диадинамотерапия
- }

Методика лечебной гимнастики у больных остеоартрозом включает: {

- =Исходные положения: лёжа, сидя
 - =Исходные положения: стоя, коленно-локтевое
 - =Продолжительность: 1 час 1 раз в день
 - =Продолжительность: По несколько минут в течение дня
 - =Максимальный объём движения
- }

Противовоспалительными методами лечения больных артритом являются: {

- =Высокоинтенсивная лазеротерапия
 - =Низкоинтенсивная лазеротерапия
 - =Низкочастотная магнитотерапия
 - =Ультразвуковая терапия
 - =Сантиметроволновая терапия
- }

Минеральные ванны, которые назначают при артрите: {

=Сероводородные

=Радоновые

=Йодобромные

=Углекислые

=Сульфидные

}

При ревматоидном артрите назначают диету, содержащую: {

=Пшеницу

=Овсянку

=Рожь

=Животные жиры

=Фрукты, овощи

}

Инсульт классифицируется на: {

=Ишемический

=Геморрагический

=Гипотонический

=Гипертонический

=Спазмолитический

}

Общемозговые симптомы при инсульте включают: {

=Тошноту и рвоту

=Головную боль

=Угнетение сознания

=Головокружение

=Кардиалгии

}

Очаговые симптомы при инсульте включают: {

=Афазию

=Дизартрию

=Гемипарез

=Анозогнозию

=Анорексию

}

Гипокоагулирующими методами лечения инсульта являются: {

=Низкочастотная магнитотерапия

=Эуфиллин-электрофорез

=Углекислые ванны

=УВЧ-терапия

=Аэротерапия

}

Для усиления биоэлектrogenеза головного мозга у больных инсультом применяют методы: {

=Лечебный массаж

=Местную дарсонвализацию

=Аэротерапия

=Кислородные ванны

=Пелоидотерапия

}

Для шейного остеохондроза характерно: {

=Головокружение

=Снижение слуха и зрения

=Храп

=Боли в сердце

=Нарушение потоотделения

}

К факторам механической природы, которые могут применяться при остеохондрозе позвоночника относятся: {

=Ультразвуковая терапия

=Ударно-волновая терапия

=Низкочастотная магнитотерапия

=Сантиметроволновая терапия

=Амплипульстерапия

}

В фазе гидратации после оперативных вмешательств назначаются следующие группы физических методов лечения: {

=Бактерицидные

- =Противовоспалительные
- =Анальгетические
- =Иммуностимулирующие
- =Фибромодулирующие

}

В фазе дегидратации после оперативных вмешательств назначаются следующие группы физических методов лечения: {

- =Фибромодулирующие
- =Репаративно-регенеративные
- =Спазмолитические
- =Миорелаксирующие
- =Тонизирующие

}

Бактерицидными методами лечения у больных после оперативных вмешательств являются: {

- =Пелоидотерапия
- =Ультрафонофорез
- =Диадинамотерапия
- =КУФ-облучение
- =Дарсонвализация

}

Противовоспалительными физическими методами у больных хирургического профиля, являются: {

- =Низкоинтенсивная лазеротерапия
- =УВЧ-терапия
- =Амплипульстерапия
- =Парафинотерапия
- =Высокоинтенсивная лазеротерапия

}

Анальгетическими физическими методами, применяемыми у больных после хирургических вмешательств, являются: {

- =Локальная криотерапия
- =Амплипульстерапия
- =Диадинамотерапия
- =Низкочастотная магнитотерапия

=Пелоидотерапия
}

Лечебный массаж по «отсасывающей» методике назначают больным: {

=На область раны
=Дистальнее раны
=Проксимальнее раны
=На паравертебральные зоны
=На симметричную конечность
}

Методика проведения процедуры гальванизации имеет последовательность. {

=Между электродами и телом помещают гидрофильную прокладку->2
=Фиксируют электроды->1
=Включают ток ->3
= Увеличивают его до необходимого значения->4
=Плавнo уменьшают ток ->5
}

2 1 3 4 5

Установите последовательность реабилитационных мероприятий. {

=Постановка нозологического диагноза.(МКБ-10)->1
=Определение функциональной недостаточности (МКФ)->2
=Постановка реабилитационного диагноза.->3
=Разработка индивидуального плана реабилитации->5
=Оценка эффективности реабилитационных мероприятий->4
}

1 2 3 4 5

Установите последовательность развития анальгетического эффекта
диадинамотерапии. {

=Стимуляция выработки вазоактивных медиаторов->1
=Увеличение числа анастомозов и коллатералей->2
=Повышение скорости кровотока в 2-3 раза->4
=Резорбция отёков->3
=Уменьшение сдавления нервных окончаний->5
}

1 2 4 3 5

Методика проведения диадинамотерапии имеет следующую
последовательность. {

=Добиваются максимального расслабления мышц в зоне воздействия->1

- =Размещают на теле прокладки и электроды->3
- =Фиксируют электроды ->2
- =Воздействуют непрерывными токами->4
- =Воздействуют модулированными токами->5
- }

1 3 2 4 5

Действие искрового разряда дарсонвализации имеет следующую последовательность. {

- =Отведение электрода от поверхности тела ->2
- =Возникновение стримеров->1
- =Поток аэроионов образует очаги микронекрозов->3
- =Выделение биологически активных веществ->4
- =Стимуляция репаративных процессов->5
- }

1 2 3 4 5

Действие сантиметровых волн высокой интенсивности имеет следующую последовательность. {

- =Повышение температуры тканей->1
- =Увеличение скорости кровотока->5
- =Усиление региональной гемо- и лимфодинамики->3
- =Ускорение рассасывания продуктов аутолиза->4
- =Ослабление воспалительной реакции->2
- }

1 5 3 4 2

Механизм действия инфракрасного излучения имеет следующую последовательность. {

- =Нагревание тканей->1
- =Возбуждение терморецепторов ->3
- =Спазм сосудов->2
- =Расширение сосудов->4
- =Увеличение кровотока->5
- }

1 3 4 5

Механизм действия центральной хромотерапии реализуется в следующей последовательности. {

- =Воздействие видимого излучения на зрительный рецептор->4
- =Поступление импульсов в зрительную кору головного мозга->2
- =Формирование зрительных образов->3
- =Изменение адаптивно-поведенческого статуса организма->1

4 2 3 1 5

=Снижение уровня депрессии->5
}

Механизм действия ПУВА-терапии имеет следующую последовательность. {

=Приём фотосенсибилизатора->1
=ДУФ-облучение->2
=Образование свободных радикалов->4
=Иммуносупрессивное действие->3
=Исчезновение бляшек->5
}

1 2 4 3 5

Механизм действия СУФ-облучения имеет следующую последовательность. {

=Фотодеструкция клеток эпидермиса->2
=Транспорт продуктов клетками Лангерганса->1
=Образование иммуноглобулинов->3
=Выделение БАВ->4
=Формирование эритемы->5
}

2 1 3 4 5

Установите правильную последовательность проведения приёмов классического массажа. {

=Поглаживание->1
=Растирание->2
=Разминание->4
=Вибрация->3
=Поглаживание->5
}

1 2 4 3 5

Установите соответствие между душами и их температурой (в градусах). {

=Холодные ->ниже 20
=Прохладные ->20-34
=Индифферентные -> 38-39
=Тёплые -> 35-37
=Горячие -> 40 и выше
}

Установите соответствие между степенью дисперсности аэрозолей и величиной частиц (мкм). {

=Высокодисперсные -> 5-25

=Среднедисперсные → 0,5-5
=Низкодисперсные → 25-100
=Мелкокапельные → 100-250
=Крупнокапельные → 250-400
}

Установите соответствие между группами лекарственных веществ, применяемых в ингаляционной терапии. {

=Муколитические средства → антибиотики, антисептики, фитонциды
=Антимикробные препараты → кислоты, щелочи, соли, сахара
=Десенсибилизирующие препараты → антигистаминные, кортикостероидные
=Бронхолитики → адреномиметики, холинолитики
=Биогенные стимуляторы → витамины, стимуляторы ЦНС, масла
}

Установите соответствие между лечебными эффектами и механизмами их реализации при проведении криотерапии. {

=Спазмолитический → снижение активности веретеновидных структур мышц
=Миорелаксирующий → торможение гамма-мотонейронной функции
=Гемостатический эффект → увеличение расхода гликогена печени
=Метаболический → сужение капилляров
=Противовоспалительный → дегидратация тканей, снижение гиперемии
}

Установите соответствие между минеральными ваннами и их лечебными эффектами. {

=Хлоридно-натриевые → сосудорасширяющий, иммуностимулирующий, гипоксигулирующий
=Йодобромные → репаративно-регенеративный, седативный, липолитический
=Углекислые → гипотензивный, кардиотонический, катаболический
=Сероводородные → фибромодулирующий, дезинтоксикационный, эпителизирующий
=Радоновые → иммунокорригирующий, противовоспалительный, Анальгетический
}

Установите соответствие между группами и видами физических упражнений. {

=Гимнастические → изотонические, изометрические

=Механотерапия → упражнения на снарядах

=Анаэробные → кратковременные, интенсивные

=Спортивно-прикладные → малой интенсивности, продолжительные

=Аэробные → плавание

}

Установите соответствие между группами дыхательных упражнений и их характеристикой. {

=Специальные → надувание шаров, мячей

=Дренажные → гнойный очаг располагается выше бифуркации трахеи

=Статические → полный, грудной, диафрагмальный типы дыхания

=Динамический → с использованием дополнительной мускулатуры в акте дыхания

=С сопротивлением → направленные на отхождение мокроты

}

Установите соответствие между скоростью ходьбы и количеством шагов в минуту. {

=Прогулочным шагом → 70

=Медленная – 50 → 40

=Средняя – 80 → 100

=Быстрая – 100 → 120

=Очень быстрая → 120-140

}

Установите соответствие между дефектами осанки и видами физических упражнений. {

=При вялой осанке → Укрепление всей мускулатуры, мышечного корсета

=При плоской осанке → Укрепляют мышцы спины, ягодиц и брюшного пресса

=При плосковогнутой спине → Укрепление мышц брюшного пресса, ягодиц, задней поверхности бедра, расслабляют мышцы передней поверхности бедра

=При круглой спине → Упражнения на нормализацию положения головы и плечевого пояса, увеличение подвижности грудной клетки

=При кругловогнутой спине → Лечебная гимнастика направлена на уравнивание чрезмерно выраженной сутулости и поясничного прогиба

}

