

//Тема 1: Общая фармакология (ИД 1 ОПК-7)

Фармакокинетика - это раздел фармакологии, изучающий {

=совокупность эффектов лекарственных средств и механизмы их действия.

=+процессы всасывания, распределения, связывания с белками, биотрансформации и выведения лекарственных веществ из организма.

=побочные эффекты лекарственных веществ на организм

=локализацию фармакологических эффектов

=механизм действия лекарственных веществ

}

Фармакодинамика - это раздел фармакологии, изучающий {

=+совокупность эффектов лекарственных средств и механизмы их действия.

=процессы всасывания, распределения, связывания с белками, биотрансформации и выведения лекарственных веществ из организма.

=побочные эффекты лекарственных веществ на организм.

=действие организма на ЛС

=выведение лекарственных средств из организма

}

Основной механизм всасывания большинства лекарственных веществ в ЖКТ

{

=Пиноцитоз.

=Фильтрация.

=+Пассивная диффузия.

=Активный транспорт.

}

Период «полужизни» (полуэлиминации) – это

{

=Время, за которое 70% вещества подвергается биотрансформации

=+Время, за которое концентрация вещества в плазме крови снижается наполовину.

=Время, за которое половина вещества выводится из организма

=Время, за которое 100% вещества подвергается биотрансформации.

=Время, за которое 70% вещества подвергается биотрансформации.

}

Биодоступность лекарства – это {

=Скорость выведения препарата из организма.

=Скорость всасывания препарата в желудочно-кишечном тракте после приема per os.

=+Процентная часть внесосудисто введенной в организм дозы лекарственного вещества, которая попадает в системный кровоток в неизменном виде

=Скорость введения препарата в организм.

}

Накопление в организме лекарственных веществ, при их повторных введениях – это {

=Функциональная кумуляция.

=+Материальная кумуляция.

=Сенсибилизация.

=Идиосинкразия.

=Тератогенность

}

Этим термином обозначают действие лекарственных веществ на эмбрион, приводящее к врожденным уродствам {

=Мутагенное действие.

=Фетотоксическое действие.
=+Тератогенное действие.
=Эмбриотоксическое действие
}

Пресистемная элиминация – это {
=+Потеря части лекарственного вещества (ЛС) при всасывании и первом прохождении через печень.
=Биотрансформация ЛС в организме.
=Распределение ЛС с мочой.
=Выведение ЛС с желчью
=Депонирование ЛС в организме
}

Для какого из препаратов биотрансформация в печени наиболее значима? {
=Гидрофильных.
=+Липофильных.
=Газообразных.
=Смешанных.
=Амфифильных
}

Рецепторы, относящиеся к классу G-белок-ассоциированных рецепторов {
=ГАМК-рецепторы.
=+Адренорецепторы.
=Инсулиновые рецепторы.
=Глюкокортикоидные рецепторы.
}

Какое из перечисленных ниже лекарственных средств является значимым индуктором микросомальных ферментов печени {
=+Фенобарбитал

=Циметидин.
=Эритромицин.
=Пропранолол.
=Каптоприл
}

Что характерно для ректального способа введения лекарственных веществ {
=всасывание происходит путем фильтрации
=всасывание происходит путем активного транспорта
=+точность дозировки выше, чем при введении через рот
=всасывание путем пиноцитоза
=точность дозировки ниже, чем при введении через рот
}

В каких дозах проявляются побочные эффекты {
=в токсических дозах
=+в терапевтических дозах
=в минимальных дозах
=в летальных дозах
=в максимальных дозах
}

Какое взаимодействие может иметь место при смешивании растворов в одном шприце {
=фармакологическое взаимодействие лекарственных веществ
=+фармакохимическое взаимодействие
=фармакокинетическое взаимодействие
=фармакодинамическое взаимодействие
=синергизм
}

Атипичные реакции на лекарственные вещества, связанные с генетическими факторами {

=толерантность

=тахифилаксия

=+идиосинкразия

=кумуляция

=тератогенность

}

Укажите основной механизм всасывания лекарственных веществ в желудочно-кишечном тракте {

=облегченная диффузия;

=+пассивная диффузия;

=активный транспорт;

=пиноцитоз;

}

Лекарственные средства, являющиеся слабыми основаниями, лучше назначать {

=натошак;

=после еды;

=+натошак, запивая слабощелочными растворами;

=после еды, запивая слабокислыми растворами.

=во время еды

}

Укажите парентеральный путь введения лекарств {

=сублингвальный;

=ректальный;

=дуоденальный;

=+субарахноидальный.

=транsbуккальный

}

Повышение активности микросомальных ферментов печени чаще всего приводит к {

- =+ускорению инактивации лекарства;
- =замедлению инактивации лекарства;
- =увеличению токсичности лекарства;
- =увеличению числа побочных эффектов.

}

При каком способе введения биодоступность препарата 100%? {

- =ректальный;
- =сублингвальный;
- =+внутривенный;
- =трансдермальный.
- =ингаляционный

}

Что характеризует такой показатель фармакокинетики как клиренс? {

- =скорость всасывания;
- =характер распределения;
- =содержание активной формы лекарства в крови;
- =+скорость элиминирования лекарства из организма.
- =депонирование ЛС

}

К какому типу относится действие лекарственных средств, восстанавливающих деятельность ЦНС при заболеваниях, сопровождающихся психическим и двигательным возбуждением? {

- =тонизирующее;
- =+седативное;
- =угнетающее;

=парализующее.

=анксиолитическое

}

Больному назначено внутримышечное введение 2% раствора папаверина гидрохлорида по 2 мл 2 раза в день. Чему равна при таком режиме введения суточная доза папаверина гидрохлорида? {

=0,02;

=0,04;

=0,06;

=+0,08;

=0,8

}

Больному при травме назначено внутримышечное введение 1% раствора морфина гидрохлорида по 1 мл 3 раза в день. Чему равна при таком режиме введения суточная доза морфина гидрохлорида? {

=+30 мг;

=10 мг;

=300 мг;

=60 мг;

=3 мг

}

Какое явление может иметь место при повторных введениях лекарств? {

=+привыкание;

=суммирование;

=потенцирование;

=синергизм.

=идиосинкразия

}

При повторном применении эфедрина через 20 мин после первого введения, уровень артериального давления повысился незначительно. Примером чего является данная ситуация? {

=идиосинкразия;

=толерантность;

=кумуляция;

=+тахифилаксия;

=привыкание

}

Какое явление может иметь место при комбинированном применении лекарств? {

=функциональная кумуляция

=привыкание

=материальная кумуляция

=+синергизм.

=тахифилаксия

}

Способность вещества стимулировать рецептор {

=+внутренняя активность

=аффинитет

=первичная фармакологическая реакция

=фармакологический эффект

=антагонизм

}

Действие, развивающееся после всасывания ЛВ в системный кровоток {

=местное

=неизбирательное

=+резорбтивное

=рефлекторное

=прямое

}

//Тема 2: Средства, влияющие на периферический отдел нервной системы

(ИД 1 ОПК-7)

Местные анестетики производные парааминобензойной кислоты {

=+Дикаин

=Лидокаин

=Тримекаин

=Бупивакаин

=Фторотан

}

Местноанестезирующие средства, относящиеся к группе замещенных амидов

{

=Новокаин

=+Лидокаин

=Анестезин

=Кокаин

=Кетамин

}

Препараты, используемые для инфильтрационной анестезии {

=Анестезин

=Кокаин

=+Новокаин

=Дикаин

=Кетамин

}

Для купирования желудочковой аритмии при остром инфаркте миокарда применяют {

=+ **Лидокаин**.

=Атропин.

=Клофелин

=Адреналин.

=Изадрин

}

Вещество, блокирующие одновременно М- и Н- холинорецепторы {

=Прозерин

=Физостигмин

=Дипироксим

=+ **Циклодол**

=Атропин

}

Антихолинэстеразное вещество необратимого действия {

=Прозерин

=Физостигмин

=+ **Армин**

=Дипироксим

=Атропин

}

Антихолинэстеразные вещества обратимого действия {

=+ **Прозерин**

=Дипироксим

=Армин

=Мезатон

=Атропин

}

Эффекты, возникающие при использовании антихолинэстеразных средств в терапевтических дозах {

=+Сужение зрачков и снижение внутриглазного давления.

=Ослабление моторики ЖКТ

=Снижение секреции бронхиальных и пищеварительных желез

=Расширение зрачков и повышение внутриглазного давления

=Тахикардия и повышение артериального давления

}

Реактиваторы холинэстеразы {

=Гигроний

=Прозерин

=+Дипироксим

=Галантамин

=Атропин

}

Эффекты, возникающие при действии М-холиноблокаторов {

=Сужение зрачка и снижение внутриглазного давления

=Повышение тонуса гладкой мускулатуры

=+Расширение зрачка и повышение внутриглазного давления

=Бронхоспазм

=Брадикардия

}

Вещества, относящиеся к группе Н–холиноблокаторов {

=Пилокарпин.

=Атропин.

=Скополамин

=+Пентамин

=Ацеклидин

}

Миорелаксанты антидеполяризующего типа действия

=Дитилин.

=+Панкурония бромид

=Метацин.

=Скополамин

=Атропин

}

Миорелаксанты деполяризующего типа действия {

=+Дитилин

=Пирилен

=Гигроний

=Тубокурарин

=Скополамин

}

Противопоказанием к применению атропина является {

=Почечная колика

=Язвенная болезнь желудка

=Острый миокардит

=+Глаукома

=Бронхоспазм

}

Данная группа веществ повышает АД, ЧСС, увеличивает АВ (атриовентрикулярную) проводимость, усиливает гликогенолиз, снижает тонус бронхов {

=М-холиноблокаторы

=Симпатолитики

=+α- и β-адреномиметики

=Ганглиоблокаторы

=α- и β-адреноблокаторы

}

Механизм действия резерпина {

=Блокирует ганглионарные синапсы адренергических нервов

=Блокирует адренорецепторы

=Усиливает выброс медиатора

=+Истощает запасы медиатора в гранулах вследствие ускорения его утечки

=Блокирует гистаминовые рецепторы

}

Терапевтически значимым фармакологическим эффектом αадреноблокаторов является {

=Повышение АД

=Расслабление сфинктеров

=Сужение зрачка.

=+Понижение АД

=Повышение тонуса бронхов

}

Какие из этих препаратов относятся к группе обволакивающих средств {

=меди сульфат

=магния сульфат

=серебра нитрат

=+слизь крахмала

=танин

}

Какой из этих препаратов эффективен при всех видах анестезии {

=анестезин

=новокаин

=+ **лидокаин**

=дикаин

=бупивакаин

}

Средство для рефлекторной стимуляции дыхания {

=+ **цититон**

=пентамин

=анаприлин

=атропина сульфат

=пилокарпин

}

Отметить антихолинэстеральное средство, проникающее через гематоэнцефалический барьер {

=прозерин

=+ **галантамин**

=пентамин

=эфедрин

=цититон

}

Какой препарат не относится к группе М – холиноблокаторов {

=+ **тубокурарин**

=метацин

=скопаламин

=платифиллин

=атропин

}

Какой эффект не связан с действием М – холиноблокаторов {

=паралич аккомодации

=тахикардия

=+брадикардия

=снижение тонуса гладких мышц внутренних органов

=бронходилатация

}

С какими целями используют скополамин {

=для лечения миастении

=+при вестибулярных расстройствах

=для повышения артериального давления

=при тахикардии

=при стенокардии

}

Отметить особенности действия платифиллина {

=превосходит атропин по способности вызывать мидриаз, тахикардию

=+уступает атропину по способности вызывать мидриаз, тахикардию

=не влияет на ЦНС

=оказывает выраженное ганглиоблокирующее действие

}

Указать механизм действия тубокурарина {

=нарушение синтеза ацетилхолина в окончаниях двигательных нервов

=стойкая деполяризация постсинаптической мембраны

=+блокирует н-холинорецепторы волокон скелетных мышц

=повышение скорости гидролиза ацетилхолина

}

Укажите бронхолитическое средство из группы М –холиноблокаторов {

=мезатон

=мукалтин

=+ **ипратропий**

=ацеклидин

=пирензепин

}

Ганглиоблокатор, показанный при гипертоническом кризе {

=+ **бензогексоний**

=парацетамол

=атропин

=пирантел

=каптоприл

}

Курареподобное средство, антагонистом, которого является прозерин {

=дитилин

=+ **тубокурарин**

=пентамин

=бензогексоний

=гигроний

}

Средство для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки из группы М-холиноблокаторов {

=атропин

=гигроний

=+ **пирензепин**

=бензогексоний

=скополамин

}

Какими свойствами обладает атропин, в отличие от всей группы Мхолиноблокаторов{

=стимулирует дыхательный центр

=оказывает седативное действие

=+вызывает самый длительный мидриаз и паралич аккомодации

=стимулирует перистальтику ЖКТ

=вызывает бронхоспазм

}

Какие из перечисленных препаратов вызывают обострение язвенной болезни{

=атропин

=бензогексоний

=+галантамин

=пентамин

=фамотидин

}

Какие эффекты М - холиномиметиков имеют фармакотерапевтическую ценность{

=расширение зрачков

=+снижение внутриглазного давления

=спазм аккомодации

=усиление секреции бронхиальных желез

=повышение артериального давления

}

Указать препарат из группы Н-холиномиметиков{

=карбахолин

=прозерин

=+цититон

=бензогексоний

=атропин

}

Отметить антихолинэстеразное средство {

=карбахолин

=ацеклидин

=+прозерин

=атропина сульфат

=каптоприл

}

Как влияют антихолинэстеразные средства на действие ацетилхолина {

=+усиливают

=укорачивают

=ослабляют

=не влияют

}

Отметить антихолинэстеразные средства необратимого действия {

=ацеклидин

=прозерин

=+армин

=карбахолин

=пилокарпин

}

Отметить средство, облегчающее нервно - мышечную передачу {

=карбахолин

=+прозерин

=цититон

=атропина сульфат

=празозин

}

При отравлении М-холиноблокаторами назначают {

=цититон

=пирантел

=+физостигмин

=атропина сульфат

=метоклопрамид

}

М-холиномиметик, используемый при атонии кишечника {

=атропина сульфат

=платифилин

=+ацеклидин

=адреналина гидрохлорид

=пилокарпин

}

Указать основной механизм действия эфедрина {

=угнетение моноаминооксидазы

=непосредственное возбуждение адренорецепторов

=+усиление освобождения норадреналина из окончаний адренергических волокон

=угнетение освобождения норадреналина из окончаний адренергических волокон

=блокада адренорецепторов

}

Указать механизм действия изадрина {

=возбуждение альфа и бета -адренорецепторов

=блокада альфа и бета - адренорецепторов

=преимущественное возбуждение бета2 -адренорецепторов

=+возбуждение бета1 и бета2 –адренорецепторов

=преимущественная блокада бета1 -адренорецепторов

}

Указать механизм действия сальбутамола: {

=возбуждение альфа и бета -адренорецепторов

=блокада альфа и бета - адренорецепторов

=преимущественное возбуждение бета1 -адренорецепторов

=+преимущественное возбуждение бета2 -адренорецепторов

=преимущественная блокада бета2 -адренорецепторов

}

Какие препараты относятся к группе альфа- адреномиметиков {

=изадрин

=+галазолин

=фенотерол

=добутамин

=пилокарпин

}

Укажите средство, блокирующие альфа – адренорецепторы {

=метопролол

=+празозин

=анаприлин

=сальбутамол

=кленбутерол

}

Укажите средство, блокирующие бета1 и бета2 –адренорецепторы {

=метопролол

=талинолол

=+пропранолол

=атенолол

=формотерол

}

Отметить адреномиметик непрямого действия {

=резерпин

=+эфедрин

=адреналин

=норадреналин

=мезатон

}

Отметить симпатолитик {

=+октадин

=адреналин

=атеналол

=лабеталол

=каптоприл

}

Отметить механизм действия резерпина {

=+уменьшение содержания норадреналина(НА) в варикозных утолщениях

=увеличение содержания НА в варикозных утолщениях

=блокирует альфа1 и бета2 -адренорецепторы

=блокирует бета1 и бета2–адренорецепторы

=блокирует H1 гистаминовые рецепторы

}

При применении какого препарата возникает тахикардия {

=норадреналин

=октадин

=+эфедрин

=анаприлин

=метопролол

}

Отметить симпатолитик, производное индола {

=октадин

=+резерпин

=орнид

=лабеталол

=сальбутамол

}

Наиболее длительное гипотензивное действие отмечается при применении {

=бензогексония

=+резерпина

=фентоламина

=анаприлина

=каптоприла

}

Какой препарат из группы адреноблокаторов можно использовать для купирования гипертонического криза при феохромоцитоме {

=+фентоламин

=резерпин

=лабеталол

=мезатон

=нифедипин

}

Укажите механизм действия празозина {

=+преимущественная блокада альфа1 -адренорецепторов

=преимущественная блокада альфа2 -адренорецепторов

=блокада альфа и бета - адренорецепторов

=блокада бета1 и бета2 –адренорецепторов

=блокада дофаминовых рецепторов

}

Основной путь введения норадреналина {

=подкожный

=внутримышечный

=+внутривенный капельный

=внутри через ЖКТ

=внутрикожный

}

Показания к применению норадреналина {

=купирование приступов бронхиальной астмы

=гипогликемическая кома

=+в качестве прессорного средства

=гипотензивное средство

=стенокардия

}

Отметить побочные эффекты октадина {

=+ортостатический коллапс

=угнетение дыхательного центра

=обстипация
=гипертензивный криз
=гипергликемия
}

//Тема 3: Средства, влияющие на центральную нервную систему (ИД 1 ОПК-

Средство для наркоза повышает чувствительность β -адренорецепторов сердца к катехоламинам {

=Закись азота.
=Пропанидид
=+Фторотан
=Оксибутират натрия
=Кетамин
}

Свойство ингаляционного анестетика, определяющее скорость индукции анестезии {

=Растворимость в жирах.
=+Растворимость в крови.
=Удельный вес.
=Агрегатное состояние (летучая жидкость или газ).
=Растворимость в воде
}

Алкалоид опия изохинолинового ряда { =+Папаверин.

=Кодеин.
=Промедол.
=Налорфин
=Морфин
}

Препарат, являющийся специфическим антагонистом морфина {
=+Налоксон.
=Диазепам.
=Флумазенил.
=Трамадол.
=Фентанил
}

Противоэпилептическое средство, применяемое при бессудорожных формах эпилепсии {
=+Натрия вальпроат.
=Клонидин.
=Леводопа.
=Морфин
=Каптоприл
}

Основные фармакологические эффекты фенитоина {
=Стимуляция ЦНС
.=+Способен купировать судороги.
=Вызывает ингибирование микросомальных ферментов печени
=Не способствует накоплению в мозге ГАМК.
}

Препарат, применяемый при эпилептическом статусе { =Вальпроат натрия.
=+Диазепам.
=Карбамазепин.
=Этосуксимид.
=Трамадол

}

Механизм антипсихотического действия нейролептиков {

=Стимуляция адренергических процессов в ЦНС.

=+ Угнетение дофаминергической передачи.

=Центральное адренергическое действие.

=Центральное дофаминомиметическое действие.

}

Средство, применяющееся для коррекции экстрапирамидных нарушений, вызываемых нейролептиками {

=Метацин.

=+ Циклодол.

=Леводопа.

=Карбидопа

=Метоклопрамид

}

Небензодиазепиновые анксиолитики {

=Диазепам.

=Анаприлин.

=Трифтазин.

=+ Буспирон.

=Феназепам

}

Препарат, используемый для отмены эффектов бензодиазепинов {

=Налтрексон.

=Диазепам.

=+ Флумазенил.

=Леводопа.

=Аминазин

}

Препарат, применяемый при эпилептическом статусе {

=Вальпроат натрия.

=+Клоназепам

=Карбамазепин.

=Этосуксимид.

=Флумазенил

}

Эффекты, характерные для действия ноотропных препаратов {

=+Повышение устойчивости к гипоксии.

=Возбуждение дыхательного и сосудодвигательного центров.

=Повышение артериального давления.

=Возбуждающее действие при наркозе.

=Антиаритмический эффект

}

Аналептик, оказывающий прямое влияние на дыхательный центр {

=+Бемегрид.

=Сиднокарб.

=Лобелин.

=Кордиамин.

=Анаприлин

}

Отметить анксиолитики, агонисты серотониновых рецепторов {

=аминазин

=диазепам

=галоперидол

=+буспирон

=феназепам
}

Для анксиолитиков, производных бензодиазепина, характерны все ниже перечисленные эффекты, кроме {

=снотворный
=+антипсихотический
=миорелаксирующий
=противосудорожный
=седативный
}

К "дневным анксиолитикам" относится {

=феназепам
=флумазенил
=+мезапам
=мидазолам
=буспирон
}

Все утверждения, касающиеся побочных эффектов анксиолитиков бензодиазепинового ряда, правильны, за исключением {

=вызывают сонливость
=снижают тонус скелетной мускулатуры
=вызывают лекарственную зависимость
=+вызывают экстрапирамидные расстройства
=усиливают действие средств для наркоза
}

Для флумазенила, специфического антагониста бензодиазепинов, характерны все ниже перечисленные свойства, кроме {

=действует 30-60 мин.

=препарат применяют для устранения остаточных эффектов действия бензодиазепинов

=применяют при остром отравлении анксиолитиками

=+эффективен при невротических состояниях

=вводят обычно внутривенно

}

Для буспирона характерны все ниже перечисленные эффекты, кроме {

=обладает выраженной анксиолитической активностью

=эффект развивается медленно (1-2 недели)

=+взаимодействует с бензодиазепиновыми рецепторами

=лишен седативного, противосудорожного, мышечно-расслабляющего действия

=биодоступность составляет 4%

}

Отметить ноотропное средство {

=аминазин

=парацетамол

=диазепам

=+пирацетам

=клоназепам

}

Укажите эффекты, характерные для пирацетама {

=+в случае нарушения мозговой деятельности улучшает память, процесс обучения

=повышает умственную и физическую работоспособность при утомлении

=устраняет чувство страха и тревоги

=повышает возбудимость дыхательного центра

=понижает артериальное давление

}

Отметить ноотропное средство - производное витамина B6{

=пирацетам

=аминалон

=+пиридитол

=парацетамол

=пантогам

}

Укажите агонист бензодиазепиновых рецепторов, наиболее широко применяемый в качестве снотворного средства{

=зопиклон

=золпидем

=+нитразепам

=буспирон

=сульпирид

}

Какое снотворное средство существенно изменяет "структуру" сна{

=нитразепам

=феназепам

=+фенобарбитал

=хлоралгидрат

=зопиклон

}

Чем объясняется снотворный эффект нитразепама{

=+усилением тормозного действия ГАМК

=активацией дофаминергических влияний

=угнетением глутаматергических влияний

=усилением тормозного действия серотонина

=блокированием адренорецепторов
}

Для диазепама характерны все нижеперечисленные свойства, за исключением {

=хорошо всасывается в кишечнике
=+обладает кратковременным снотворным эффектом
=препарат кумулирует
=при длительном применении вызывает привыкание
=применяют при эпилептическом статусе
}

Чем объясняется увеличение тормозного постсинаптического потенциала под влиянием агонистов бензодиазениновых рецепторов {

=+активацией хлорных каналов
=блокадой хлорных каналов
=активацией калиевых каналов
=блокадой натриевых каналов
=блокадой кальциевых каналов
}

Зопиклон (имован) - снотворное средство, не относящееся к бензодиазенинам, обладает всеми ниже перечисленными свойствами, кроме {
=сон наступает через 20-30 минут
=продолжительность действия 6-8 часов
=выводится почками, частично слюнными железами
=+вызывает материальную кумуляцию
=при длительном применении вызывает зависимость
}

Для зопиклона (имован) характерны все нижеперечисленные побочные эффекты, кроме {

- =нарушение аккомодации
- =+экстрапирамидные расстройства
- =металлический горький вкус
- =психические и поведенческие расстройства
- =при длительном применении вызывает зависимость

}

Укажите снотворное средство, не относящееся к бензодиазепинам, но обладающее сродством к бензодиазепиновым рецепторам {

- =нитразепам
- =+зопиклон
- =фенобарбитал
- =хлоралгидрат
- =мезапам

}

Чем обусловлены снотворный и успокаивающий эффекты барбитуратов {

- =+ГАМК - миметическим действием
- =дофаминомиметическим действием
- =блокадой дофаминовых D₂ - рецепторов
- =блокадой глутаматных рецепторов
- =блокадой серотониновых рецепторов

}

Какие из перечисленных ниже препаратов вызывают клинически значимую индукцию микросомальных ферментов печени {

- =+фенобарбитал
- =сибазон
- =морфин
- =аминазин
- =диазепам

}

Больному, страдающему бессонницей и принимающему фенobarбитал, в связи с обострением тромбофлебита был назначен неодикумарин, однако действие его оказалось малоэффективным. Почему? {

=фенobarбитал нарушает всасывание неодикумарина в кишечнике

=фенobarбитал фармацевтически несовместим с неодикумарином

=фенobarбитал вытесняет неодикумарин из комплекса с белками плазмы крови

=+фенobarбитал индуцирует синтез микросомальных ферментов печени, ускоряя метаболизм неодикумарина

}

Какой из перечисленных ниже снотворных средств, наиболее часто вызывает явление последствия {

=этаминал - натрий

=+фенobarбитал

=нитразепам

=хлоралгидрат

=зопиклон

}

Какое действие вызывают барбитураты при их повторном применении {

=+материальную кумуляцию

=идиосинкразию

=ортостатическую гипотензию

=ригидность мышц и тремор

=тахифилаксию

}

Фенobarбитал обладает всеми ниже перечисленными эффектами, кроме {

=+антипсихотическим

=седативным

=снотворным

=противосудорожным
=кумулятивным
}

Какой из аналептиков используется при легких формах отравления барбитуратами {

=кордиамин
=камфора
=+бемегрид
=этимизол
=пропранолол
}

Все ниже перечисленные средства используют для ингаляционного наркоза, кроме {

=эфир для наркоза
=фторотан
=+кетамин
=энфлуран
=изофлуран
}

Для неингаляционного наркоза используют все нижеперечисленные средства, кроме {

=пропанидид
=кетамин
=+фторотан
=тиопентал натрий
=пропофол
}

Длительная стадия возбуждения (до 10-20 мин) характерна для наркоза, вызываемого {

=фторотаном
=+эфиром для наркоза
=азота закисью
=пропанидидом
=ксеноном
}

Рефлекторное урежение дыхания и ритма сердечных сокращений, гиперсекреция бронхиальных и слюнных желез при использовании эфира предупреждается введением {

=дителина
=дроперидола
=гигрония
=+атропина
=феназепама
}

Какое прессорное средство следует ввести при снижении артериального давления на фоне фторотана {

=адреналин
=норадреналин
=эфедрин
=+мезатон
=добутамин
}

Какое наркозное средство может быть использовано при инфаркте миокарда в качестве болеутоляющего средства {

=эфир для наркоза
=+азота закись
=фторотан
=пропанидид

=кетамин

}

Какое средство для неингаляционного наркоза обладает ультракоротким действием {

=+пропанидид

=гексенал

=тиопентал натрий

=натрия оксибутират

=кетамин

}

Какое из перечисленных ниже наркозных средств дает "диссоциативную" анестезию {

=+кетамин

=фторотан

=дроперидол

=тиопентал натрий

=изофлуран

}

Указать причину кратковременности наркотического эффекта тиопентала натрия {

=быстрое выведение вещества из организма почками

=+быстрое снижение концентрации тиопентала натрия в мозговой ткани и в крови за счет депонирования вещества в жировой ткани

=дезаминирование под влиянием моноаминоксидазы

=декарбоксилирование под влиянием дофа-декарбоксилазы

=быстрое выведение вещества из организма легкими

}

Какое наркозное средство в послеоперационном периоде (особенно у взрослых) вызывает психомоторные реакции, галлюцинации {

=пропанидид
=натрия оксибутират
=тиопентал натрия
=+кетамин
=пропофол
}

Отметить агонисты опиоидных рецепторов {

=кислота ацетилсалициловая
=анальгин
=+фентанил
=пентазоцин
=бупивакаин
}

Специфическим антагонистом опиоидных анальгетиков является {

=анальгин
=+налоксон
=амидопирин
=промедол
=флумазенил
}

Укажите эффекты морфина, связанные с его угнетающим влиянием на кору головного мозга и лимбико-ретикулярный комплекс {

=сосудорасширяющее действие
=+снотворное действие
=повышение температуры тела
=антипсихотическое действие
=учащение пульса
}

Укажите эффекты морфина, связанные с его угнетающим воздействием на продолговатый мозг {

=учащение частоты дыхания

=+противокашлевой

=способность вызвать эйфорию

=снотворное

=учащение пульса

}

Каков механизм возникновения рвоты при введении морфина {

=раздражение рецепторов слизистой оболочки желудка

=прямое возбуждение нейронов рвотного центра

=раздражение вестибулярного аппарата

=+возбуждение хеморецепторов "пусковой зоны" рвотного центра

}

Какой наркотический анальгетик используется для нейролептаналгезии (входит в состав препарата таламонал) {

=морфин

=промедол

=пентазоцин

=+фентанил

=кодеин

}

Отметить анальгетик со смешанным механизмом действия (опиоидным + неопиоидным) {

=+трамадол

=фентанил

=буторфанол

=бупренорфин

=промедол
}

К нейролептикам относятся все препараты, за исключением{

=аминазина
=трифтазина
=галоперидола
=+**диазепама**
=клозапина
}

К "типичным" антипсихотическим средствам относятся все препараты, кроме{

=аминазина
=трифтазина
=хлорпротиксена
=+**клозапина**
=дроперидола
}

Основным отличием "атипичных" антипсихотических средств от

"типичных" является{

=наличие антидепрессивной активности
=+**нарушение функций экстрапирамидной системы выражено в меньшей степени**
=слабая антипсихотическая активность
=развитие лекарственной зависимости (физической)
=способность вызывать эйфорию
}

Снижение прессорной реакции на адреналин или "извращение" его эффекта на фоне аминазина объясняется{

- =блокадой вегетативных ганглиев
- =+блокадой альфа -адренорецепторов
- =блокадой бета -адренорецепторов
- =нарушением процесса депонирования норадреналина в везикулах
- =блокадой холинорецепторов

}

Больному с психомоторным возбуждением внутримышечно был введен препарат, который купировал возбуждение, но при этом резко понизил артериальное давление. Какой препарат был назначен больному{

- =дифенин
- =сибазон
- =ноотропил
- =+дроперидол
- =лидокаин

}

Отметить побочный эффект клозапина, ограничивающий его широкое использование{

- =экстрапирамидные расстройства
- =привыкание и лекарственная зависимость
- =ортостатический коллапс
- =+лейкопения и агранулоцитоз
- =рвота

}

Укажите основной механизм стимуляции моноаминергических процессов в ЦНС под влиянием трициклических антидепрессантов{

- =блокирование дофаминовых рецепторов
- =стимуляция дофаминовых рецепторов
- =блокирование серотониновых рецепторов
- =+угнетение нейронального захвата моноаминов

=стимуляция серотониновых рецепторов
}

Укажите основной механизм стимуляции моноаминергических процессов в ЦНС под влиянием ниамида {

=блокирование дофаминовых рецепторов
=стимуляция дофаминовых рецепторов
=блокирование серотониновых рецепторов
=+угнетение активности MAO
=стимуляция серотониновых рецепторов
}

К антидепрессантам, избирательно блокирующим нейрональный захват серотонина, относится {

=имизин
=амитриптилин
=+флуоксетин
=ниамид
=мапротилин
}

К антидепрессантам, избирательно блокирующим нейрональный захват норадреналина, относится {

=имизин
=+мапротилин
=ниамид
=амитриптилин
=тразодон
}

//Тема 4: Средства, влияющие на процессы обмена веществ. (ИД 1 ОПК-7)

Отметить препараты гормонов передней доли гипофиза {

=питуитрин
=окситоцин
=+соматотропин
=бромокриптин
=тестостерон
}

Отметить наиболее важные показания к применению кортикотропина {

=+снижение функциональной активности надпочечников в результате длительной терапии кортикостероидами

=микседема
=тиреотоксикоз
=диабет
=галакторея
}

Каков механизм влияния бромокриптина на дофаминергические процессы в ЦНС {

=угнетает дофаминергические процессы в ЦНС
=+стимулирует дофаминергические процессы в ЦНС
=стимулирует холинергические процессы в ЦНС
=подавляет холинергические процессы в ЦНС
=влияет на серотонинергические процессы в ЦНС
}

Отметить основные показания к применению бромокриптина {

=стимуляция лактации
=акромегалия
=гипофизарная недостаточность
=бронхиальная астма
=+бесплодие, связанное с избыточной продукцией пролактина
}

Отметить гормон задней доли гипофиза {

=кортикотропин

=инсулин

=тироксин

=кальцитонин

=+адиурекрин

}

Отметить основной эффект вазопрессина {

=+уменьшение диуреза

=увеличение диуреза

=расширение кровеносных сосудов

=ослабление перистальтики кишечника

=снижение тонуса мочевого пузыря

}

Отметить гормон - производное аминокислот {

=+тироксин

=эстрон

=прогестерон

=гидрокортизон

=инсулин

}

Как влияет кальцитонин на обмен кальция {

=повышает содержание кальция в крови

=+снижает содержание кальция в крови

=способствует декальцификации костной ткани

=уменьшает содержание кальция в костной ткани

=нормализует содержание кальция в костной ткани

}

Какие изменения обмена вызывает тироксин {

=+повышение основного обмена

=снижение потребления кислорода тканями

=усиление синтеза белков

=увеличение массы тела

=усиление синтеза гликогена

}

Отметить антитиреоидное средство, угнетающее синтез гормонов щитовидной железы {

=трийодтиронин

=калия перхлорат

=+мерказолил

=L-тироксин

=тиреоидин

}

Как влияет паратиреоидин на обмен кальция и фосфора {

=+повышает содержание кальция в крови, снижает содержание HPO_4^- в крови

=снижает содержание кальция в крови

=повышает содержание HPO_4^- в крови

=уменьшает реабсорбцию кальция в почечных канальцах

=способствует отложению кальция в костной ткани

}

Какой препарат применяют для лечения сахарного диабета {

=вазопрессин

=глюкагон

=окситоцин

=+манинил

=преднизолон

}

Отметить противодиабетическое средство, эффективное при приеме внутрь {

=глюкагон

=мерказолил

=троглитазон

=инсулин ультраленте

=+глибенкламид

}

Отметить глюкокортикоидный препарат, используемый для резорбтивного действия {

=синафлан

=+дексаметазон

=лоринден

=флуцинар

=фторокорт

}

Как влияют глюкокортикоиды на состав периферической крови {

=увеличивает содержание лимфоцитов

=увеличивает содержание эозинофилов

=увеличивает содержание нейтрофилов

=увеличивает содержание моноцитов

=+уменьшает содержание лимфоцитов и эозинофилов

}

Отметить глюкокортикоид, который используются только местно {

=гидрокортизон

=преднизолон

=дексаметазон

=+ **синафлан**

=триамцинолон

}

Какие эффекты характерны для минералокортикоидов {

=+ **повышение реабсорбции Na^+ и увеличение выделения K^+ из организма**

=увеличение диуреза

=уменьшение реабсорбции Na^+ в почечных канальцах

=снижение сократительной активности скелетных мышц

=понижение реабсорбции Na^+ и уменьшение выделения K^+ из организма

}

Отметить препарат с преимущественным **анаболическим** действием {

=синэстрол

=+ **ретаболил**

=тестостерон

=прогестерон

=эстрон

}

Отметить влияние тиамина на обменные процессы { =+ **стимулирует**

декарбоксилирование L-кетокислот

=угнетает декарбоксилирование L -кетокислот

=понижает содержание пировиноградной и молочной кислоты

=активирует синтез норадреналина

=угнетает синтез ацетилхолина

}

Каково влияние рибофлавина на обменные процессы {

=+ **принимает участие в окислительно-восстановительных процессах в составе дегидрогеназ и оксидаз**

=стимулирует декарбоксилирование L-кетокислот
=стимулирует синтез глюкокортикоидов
=повышает тонус гладких мышц ЖКТ
=понижает тонус гладких мышц ЖКТ
}

Отметить показания к применению кислоты никотиновой {

=подагра
=+**целлагра**
=анемия
=гемералопия
=ксерофтальмия
}

Какие фармакологические препараты могут вызвать при длительном применении гиповитаминоз пиридоксина {

=+противотуберкулезные средства из группы гидразидов изоникотиновой кислоты
=эргокальциферол
=метионин
=токоферол
=глюкокортикоиды
}

Какой витаминный препарат применяют при пернициозной анемии {

=рибофлавин
=фолиевая кислота
=+**цианокоболамин**
=никотиновая кислота
=токоферол
}

Какой витаминный препарат уменьшает проницаемость биологических мембран {

=ретинол

=+рутин

=токоферол

=цианокобаламин

=рибофлавин

}

Чем объясняется понижение сосудистой проницаемости при действии препаратов, содержащих кислоту аскорбиновую и биофлавоноиды {

=подавление гиалуронидазы

=торможение синтеза коллагена

=+активирование синтеза проколлагена и коллагена

=торможение синтеза глюкокортикоидов

=торможением синтеза антител

}

Какой витаминный препарат обладает антиоксидантными свойствами {

=+токоферол

=ретинол

=эргокальциферол

=пиридоксин

=филлохинон

}

При каких состояниях применяют ретинол {

=пеллагра

=спру

=+гемералопия

=цинга

=анемия

Как влияет эргокальциферол на фосфорно-кальциевый обмен {

=понижает содержание кальция и фосфатов

=ухудшает всасывание кальция в кишечнике

=препятствует отложению кальция в костях

=способствует декальцификации костей

=+повышает содержание кальция и фосфатов в крови

}

Отметить показания к применению эргокальциферола {

=анемия

=пеллагра

=атеросклероз

=+остеомалация

=спру

}

Какой витаминный препарат является антагонистом антикоагулянтов
непрямого действия {

=рибофлавин

=цианокобаламин

=+витамин К

=тиамин

=пиридоксин

}

Определить препарат из группы водорастворимых витаминов {

=ретинол

=токоферол

=эргокальциферол

=филлохинон

=+рибофлавин

}

Отметить водорастворимые витамины{

=филлохинон

=+цианокобаламин

=эргокальциферол

=ретинол

=токоферол

}

Отметить средство для лечения макроцитарной анемии{

=цианокобаламин

=рибофлавин

=аскорбиновая кислота

=+фолиевая кислота

=пиридоксин

}

Отметить средство для лечения железодефицитной анемии{

=+аскорбиновая кислота

=фолиевая кислота

=цианокобаламин

=пиридоксин

=рибофлавин

}

Отметить средство, способствующее синтезу протромбина{

=+витамин К

=тиамин

=аскорбиновая кислота

=рутин

=кверцетин

}

Отметить витаминный препарат для лечения полиневритов, пируватемии {

=рибофлавин

=эргокальциферол

=цианокобаламин

=пиридоксин

=+тиамин

}

Отметить витаминный препарат для лечения и профилактики рахита {

=филлохинон

=рибофлавин

=тиамин

=+эргокальциферол

=пиридоксин

}

Отметить витаминный препарат для лечения ксерофтальмии {

=никотиновая кислота

=рибофлавин

=+ретинол

=эргокальциферол

=аскорбиновая кислота

}

Отметить основные физиологические функции ретинола {

=участие в синтезе протромбина

=участие в синтезе аминокислот

=участие в синтезе метионина

=+участие в фоторецепции

=участие в синтезе коллагена

}

//Тема 5:Средства, влияющие на функции исполнительных органов. (ИД 1
ОПК-7)

Препарат наперстянки { =Строфантин
К.

=Коргликон

=+Дигитоксин.

=Новокаинамид

=Коргликон

}

Какие сердечные гликозиды прочно связываются с белками плазмы {

=+Дигитоксин.

=Строфантин.

=Коргликон.

=Хинидина сульфат.

=Пропранолол.

К противоаритмическим средствам 1 класса (блокаторам натриевых каналов)
относят {

=Верапамил.

=Пропранолол.

=+Прокаинамид.

=Целанид

=Дилтиазем

}

Лекарственное средство, являющееся блокатором медленных кальциевых каналов {

=Прокаинамид.

=+Дилтиазем.

=Лидокаин.

=Коргликон

=Миноксидил

}

Средство рефлекторного действия, устраняющее коронарospазм {

=Нитроглицерин.

=Нитросорбид.

=+Валидол.

=ДипиридамоЛ

=Пропранолол.

}

Препарат, который одновременно улучшает коронарный кровоток и снижает потребность миокарда в кислороде {

=Валидол.

=Дигоксин.

=+Нитроглицерин.

=Адреналин

=Пропранолол.

}

Препараты каких групп снижают артериальное давление, ограничивая работу сердца {

=Бета-адреномиметики.

=Симпатомиметики.

=+Бета - адреноблокаторы.

=Альфа- адреномиметики.

=Альфа- адреноблокаторы
}

Каптоприл {

=Блокирует β -адренорецепторы.

=+Ингибирует ангиотензинпревращающий фермент.

=Может вызывать артериальную гипертензию.

=Применяют для лечения бронхиальной астмы.

=Противопоказан при сердечной недостаточности.

}

Развитие ортостатической гипотензии возможно при введении {

=Гидрохлортиазида.

=Пропранолола.

=Верапамила.

=+Празозина

=Амиодарона.

}

Для купирования гипертонического криза применяют {

=Пропранолол.

=+Клонидин.

=Гидрохлортиазид.

=Резерпин.

=Амлодипин.

}

Диуретик, обладающий умеренным эффектом {

=Фуросемид.

=+Листья толокнянки.

=Этакриновая кислота.

=Гидрохлортиазид.

=Торасемид

}

Указать механизм диуретического действия спиронолактона {

=Способствует выведению ионов калия из организма.

=Угнетает синтез альдостерона.

=Усиливает выведение ионов хлора.

=+Конкурентно взаимодействует с альдостероновыми рецепторами почек.

=Повышает осмотическое давление в просвете почечных канальцев.

}

Указать препарат, применяемый для форсированного диуреза {

=Триамтерен.

=Спиронолактон.

=+Фуросемид.

=Гидрохлортиазид.

=Индапамид.

}

Диуретическое средство, действующее преимущественно в области
петли Генле {

=Спиронолактон.

=Маннитол.

=+Фуросемид.

=Индапамид.

=Гидрохлортиазид.

}

Какой препарат используют местно для остановки кровотечения {

=Гепарин.

=Кальция хлорид.

=+Тромбин.

=Аминокапроновая кислота.

=Варфарин

}

Механизм антиагрегантного действия клопидогрела {

=Блокирует тромбоксановые рецепторы тромбоцитов.

=Ингибирует циклооксигеназу и нарушает образование тромбоксана.

=Ингибируют микросомальные ферменты печени

=+Блокирует пуриновые рецепторы тромбоцитов и препятствует действию на них АДФ.

=Активирует выработку протромбина.

}

К прямым антикоагулянтам относят {

=Апротинин.

=Варфарин

=Урокиназу

=+Гепарин.

=Альтеплазу

}

Для остановки кровотечений применяют {

=Стрептокиназу.

=Варфарин.

=+Аминокапроновую кислоту

=Далтепарин натрия.

=Ацетилсалициловую кислоту

}

Характерно для либексина {

- =Подавляет кашлевой центр.
- =По эффективности сопоставим с кодеином.
- =Вызывает привыкание и развитие лекарственной зависимости.
- =Повышает возбудимость чувствительных окончаний.
- =+Подавляет кашлевой рефлекс, действуя периферически.

}

Что обуславливает терапевтическое действие ганглиоблокаторов при отеке легких {

- =Дегидратирующее действие.
- =Диуретическое действие.
- =Противовспенивающее действие.
- =+Понижение давления в малом круге кровообращения.
- =Успокаивающее действие.

}

Средство, обладающее анорексигенным действием {

- =Настойка полыни.
- =Инсулин.
- =+Сибутрамин
- =Алмагель.
- =Бисакодил.

}

Характерно для омепразола {

- =Блокирует выделение гастрина
- =Блокирует гистаминовые H₂-рецепторы.
- =+Ингибирует протонный насос.
- =Применяется при гипоацидном гастрите.
- =Действует 4-6 часов

}

Ранитидин уменьшает продукцию соляной кислоты в желудке, потому что

{

=Блокирует М-холинорецепторы.

=Блокирует гистаминовые рецепторы первого типа.

=+Блокирует гистаминовые рецепторы второго типа.

=Блокирует рецепторы к гастрину.

=Блокирует адренорецепторы.

}

Препарат, обладающий противорвотным действием {

=Диазепам.

=+Галоперидол.

=Кофеин.

=Пирацетам.

=Фенобарбитал.

}

Указать антагонист гепарина{

=желатин

=фибриноген

=витамин К

=+протамина сульфат

=викасол

}

Отметить вещество, уменьшающее агрегацию тромбоцитов {

=+дипиридамол

=контрикал

=амбен

=кислота аминакапроновая

=неодикумарин

}

Отметить основное свойство урокиназы{

=+повышает фибринолитическую активность крови на 4-6 часов

=при однократном введении повышает фибринолитическую активность крови на 48-72 часа

=тормозит превращение профибринолизина в фибринолизин

=оказывает прямое угнетающее действие на фибринолиз

=по длительности действия равноценна стрептолизину

}

Препарат группы антикоагулянтов - низкомолекулярных гепаринов{

=протамина сульфат

=натрия гидроцитрат

=синкумар

=фенилин

=+эноксапарин

}

Кардиотоническое действие сердечных гликозидов обеспечивается их ингибирующим влиянием на{

=+ K⁺, Na⁺- АТФ-азу

=аденилатциклазу

=изанилатциклазу

=моноаминоксидазу

=циклооксигеназу

}

Максимальной материальной кумуляцией обладает{

=целанид

=дигоксин

=строфантин

=+ ДИГИТОКСИН

=коргликон

}

Противоаритмическое действие сердечных гликозидов обусловлено {

=+ повышением тонуса блуждающего нерва и угнетением проводимости

=повышением тонуса симпатического нерва и усилением сократимости миокарда

=повышением тонуса блуждающего нерва и угнетением автоматизма синусного узла

=понижением тонуса блуждающего нерва

}

Кардиостимулирующим действием обладают следующая группа веществ {

=адреноблокаторы

=+ β -адреномиметики

=спазмолитики

=холиномиметики

= α -адреномиметики

}

Перечислите побочный эффект, возможный при приёме фенотерола у беременных {

=флебиты

=диспепсические расстройства

=+ гипергликемия у плода

=судороги

=повышение артериального давления

}

Когда следует принимать М-холиноблокаторы при язвенной болезни 12перстной кишки {

=через 30 мин после еды

=через 1-2 часа после еды

=+за 30 мин до еды

=только на ночь

=во время приёма пищи

}

Подберите характеристику препарата алмагель{

=блокатор H₂ –гистаминовых рецепторов

=H-холиноблокатор

=+антацид

=бронхолитик

=вяжущее вещество

}

Какой из препаратов, понижающих секрецию желез желудка,
является пролекарством{

=+омепразол

=фамотидин

=пирензепин

=ранитидин

=низатидин

}

Какой из препаратов не приводит к нарушению фосфатного буфера в
организме при длительном приёме{

=+фосфалюгель

=алмагель

=алмагель - А

=алюминия гидроокись

}

Укажите побочные эффекты сукралфата{

=+сухость в ротовой полости, запоры

=поносы

=возбуждение ЦНС, бессонница

=угнетение ЦНС, апатия

=метгемоглобинемия

}

К противорвотным средствам, угнетающим серотониновые 5 HT₃ - рецепторы, относится {

=атропин

=этаперазин

=+ондансетрон

=тиэтилперазин

=ципрофлоксацин

}

Антидиарейное действие имеет {

=+лоперамид

=александрійський лист

=кора крушины

=вазопрессин

=эритромицин

}

На протяжении всего кишечника действуют следующие препараты из группы слабительных средств {

=+масло касторовое

=изафенин

=таблетки ревеня

=экстракт крушины сухой

=сенаде

}

Какое гипотензивное средство действует на ренин-ангиотензиновую систему регуляции АД {

= верапамил

= + **каптоприл**

= празозин

= нитропруссид

= миноксидил

}

Какой из нижеперечисленных препаратов нельзя назначать больному с гипертонической болезнью, у которого имеется бронхиальная астма {

= диуретик

= каптоприл

= + **пропранолол**

= гипотиазид

= дибазол

}

Отметить гипотензивное средство, которое с осторожностью назначают с препаратами, угнетающими центральную нервную систему {

= октадин

= пентамин

каптоприл

= + **клофелин**

= анаприлин

}

Какой из перечисленных препаратов, применяемый для лечения гипертонической болезни, вызывает лекарственный паркинсонизм и депрессию {

= клофелин

= моксонидин

=+метилдофа

=гуанфацин

=эналаприл

}

Укажите препарат, одновременно обладающий α и β - адреноблокирующей активностью {

=анаприлин

=+лабеталол

=талинолол

=метопролол

=атенолол

}

Какой из перечисленных препаратов оказывает прямое ингибирующее действие на ренин {

=каптоприл

=+алискирен

=эналаприл

=моноприл

=лизиноприл

}

С чем связано возникновение бронхоспазма при длительном лечении ингибиторами АПФ {

=с влиянием гистамина на мускулатуру бронхиол

=с влиянием медленно реагирующей субстанции анафилаксии (МРС –А) на мускулатуру бронхиол

=+с влиянием брадикинина на мускулатуру бронхиол с

влиянием ацетилхолина на мускулатуру бронхиол

=с влиянием простагландина E2 и простаглицлина на тонус бронхиол

}

При назначении какого препарата из группы гипотензивных средств может быть осложнение – гирсутизм {

=+ **МИНОКСИДИЛ**

=фенигидин

=каптоприл

=резерпин

=анаприлин

}

Длительность действия, какого из гипотензивных средств равна 1-2 мин. {

=+ **натрия нитропруссид**

=гигроний

=нитроглицерин

=арфонад

=фентоламин

}

При введении магния сульфата внутрь наблюдается эффект {

=гипотензивный

=седативный

=противосудорожный

=+ **слабительный**

=наркотический

}

Каков механизм действия эуфиллина {

=угнетение вагусных влияний

=блокада медиаторов аллергических реакций


=+ **угнетение фосфодиэстеразы**

=активация адренорецепторов

=угнетение дыхательного центра
}

Какая из групп бронхолитических средств угнетает секрецию слизи
бронхиальными железами {
=альфа и бета- адреномиметики
=бета - адреномиметики
=+М-холиноблокаторы
=ксантины
=симпатомиметики
}

Каков механизм бронхолитического действия зилеутона {
=блокада М -холинорецепторов
=возбуждение бета2 – адренорецепторов бронхиол
=блокада аденозиновых рецепторов бронхиол
=торможение дегрануляции тучных клеток
=+подавление эффектов лейкотриенов
}



Препараты какой группы наиболее эффективны при аспириновой астме {
=+ингибиторы лейкотриеновых рецепторов
=М- холиноблокаторы
=симпатомиметики
=бета2 -адреномиметики
=альфа - и бета - адреномиметики
}

Кромолин-натрия применяется {
=+ингаляционно
=внутри (перорально)

=ректально

=внутримышечно

=внутривенно

}

Как изменяют коронарный кровоток бета –адреноблокаторы {

=улучшают

=+ухудшают

=не изменяют

=замедляют скорость кровотока

=увеличивают количество коллатералей

}

Укажите противопоказание к назначению дипиридамола {

=+атеросклероз коронарных сосудов

=спазм коронарных сосудов

=гипертоническая болезнь

=болезни печени

=болезни почек

}

Отметить противоэпилептический препарат, обладающий
противоаритмической активностью {

=+дифенин

=лидокаин

=новокаиномид

=этмозин

=этагизин

}

У больного отмечается синусовая брадикардия (пульс -45 ударов в 1 мин.). Какой из перечисленных препаратов может быть применён для лечения брадикирдии {

=анаприлин

=кордарон

=+атропина сульфат

=дигоксин

=новокаиномид

}

Амиодарон блокирует все рецепторы, кроме {

=K⁺-каналы

=Na⁺- каналы

=Ca ⁺- каналы

=альфа - и бета- адренорецепторы

=+M- холинорецепторы

}

При использовании какого противоаритмического препарата период полувыведения T_{1/2} составляет 10-50 дней {

=+амиодарона

=орнида

=изоптина

=лидокаина

=атенолола

}

Все перечисленные препараты являются блокаторами кальциевых каналов L - типа, кроме {

=+амиодарона

=верапамила

=дилтиазепама

=фенигидина
=циннаризина
}

//Тема 6: Противовоспалительные средства. Средства, влияющие на иммунные процессы (ИД 1 ОПК-7)

Указать механизм антиагрегантного действия кислоты ацетилсалициловой {
=+угнетает циклооксигеназу и препятствует образованию тромбоксана
=угнетает циклооксигеназу
=блокирует фосфодиэстеразу тромбоцитов
=стимулирует аденилатциклазу тромбоцитов
=препятствует агрегации тромбоцитов и вызывает выраженную вазоконстрикцию
}

При каких состояниях применяют противогистаминные препараты, блокирующие H1 –рецепторы {
=гиперацидный гастрит
=стенокардия
=язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
=+легкие аллергические реакции немедленного типа
=гемморагический шок
}

Для какого препарата из группы противогистаминных средств не характерен снотворный эффект {
=диазолин
=дипразин
=супрастин
=+лоратадин
=димедрол

}

Какие препараты уменьшают повреждение тканей при гиперчувствительности замедленного типа {

=противогистаминные препараты

=+нестероидные противовоспалительные средства

=стероидные противовоспалительные средства

=анальгезирующие средства

}

При вирусных инфекциях для увеличения иммунитета применяются {

=БЦЖ

=фенкарол

=+интерфероны

=диазолин

=антибиотики

}

Антигистаминный препарат, используемый для лечения гастрита и язвенной болезни желудка {

=Ибупрофен.

=+Ранитидин.

=Индометацин.

=Диазолин

=Супрастин

}

Побочный эффект ацетилсалициловой кислоты отличает этот препарат от других нестероидных противовоспалительных средств {

=Бронхоспазм.

=+Синдром Рейя.

=Раздражение слизистой оболочки желудка.

=Аллергическая реакция.

=Нефротоксичность

}

Противоаллергическое лекарственное средство, препятствующее
вхождению ионов кальция в тучные клетки {

=Димедрол.

=+Кетотифен.

=Лоратадин.

=Тавегил.

=Дезлоратадин

}

Препарат, относящийся к группе селективных ингибиторов ЦОГ {

=Индометацин.

=Диклофенак натрия.

=+Целекоксиб.

=Кризанол.

=Аспирин

}

Укажите ненаркотический анальгетик, производное парааминофенола {

=диклофенак

=бутадион

=анальгин

=+парацетамол

=аспирин

}

Наиболее токсичным препаратом из группы нестероидных
противовоспалительных средств, вызывающих неблагоприятные побочные
эффекты у значительной части больных (до 50%) является {

=пироксикам

=+индометацин

=диклофенак - натрий

=ибупрофен

=цекоксиб

}

Одним из наиболее активных противовоспалительных средств, обладающих низкой токсичностью и значительной широтой терапевтического действия является {

=напроксен

=индометацин

=+диклофенак - натрий

=пироксикам

=метамизол натрия

}

Какие побочные эффекты со стороны системы крови характерны для ненаркотических анальгетиков производных пиразолона {

=угнетает циклооксигеназу и препятствует образованию тромбоцитов

=угнетает агрегацию тромбоцитов

=тормозит синтез протромбина в печени

=+угнетение процессов кроветворения, развитие агранулоцитоза, апластической анемии

}

К стероидным противовоспалительным средствам относятся {

=ретаболил, нероболил

=+гидрокортизон, триамцинолон

=эстрон, эстрадиол

=тестостерон

=индометацин

}

//Тема 7: Противомикробные, противовирусные, противогрибковые средства.

(ИД 1 ОПК-7)

Отметить противогрибковый антибиотик {

=+амфотерицин В

=миконазол

=метронидазол

=декамин

=клотримазол

}

Что характерно для нистатина {

=обладает широким спектром действия

=назначается парентерально

=обладает высокой токсичностью

=+обладает низкой токсичностью

=используют для лечения системных микозов

}

Амфотерицин В назначают {

=внутри

=+внутривенно

=ингаляционно

=внутримышечно

=местно

}

Отметить противовирусное средство, производное пептидов, ингибитор протеаз ВИЧ {

=+саквинавир

=арбидол

=фоскарнет

=мидантан

=метисазон

}

Отметить противовирусное средство (аналог нуклеозидов), обладающее противогерпетической активностью {

=зидовудин

=мидантан

=+ацикловир

=фоскарнет

=метисазон

}

Какой из перечисленных средств действует на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) {

=+зидовудин

=оксолин

=ремантадин

=интерферон

=метисазон

}

Какое осложнение может возникнуть при применения препаратов стрептомицина {

=гемералопия

=+снижение слуха

=гемолиз

=угнетение кроветворения

=экстрапирамидные нарушения

}

Какой побочный эффект типичен для этамбутола {

=снижение слуха

=нарушение функций печени

=+нарушение зрения

=аллергические средства

=дисбактериоз

}

Какая из нижеперечисленных групп лекарственных средств не относится к антибиотикам {

=пенициллины

=тетрациклины

=макролиды

=аминогликозиды

=+сульфаниламиды

}

Назвать группу антибиотиков, механизм антимикробного действия которой связан с нарушением проницаемости цитоплазматической мембраны {

=тетрациклины

=пенициллины

=аминогликозиды

=+полимиксины

=макролиды

}

Назвать микроорганизмы, на которые не действует бензилпенициллин {

=+стафилококки, продуцирующие пенициллиназу

=стафилококки не продуцирующие пенициллиназу

=стрептококки

=менингококки

=гонококки

}

Что характерно для эритромицина и олеандомицина {

=по спектру действия соответствует бензилпенициллину

=+действует на те же микроорганизмы, что и бензилпенициллин, а так же риккетсии и хламидии

=устойчивость микроорганизмов к действию препаратов развивается медленно

=действует бактерицидно

=хорошо и полностью всасывается в ЖКТ

}

Назвать группу антибиотиков, механизм антимикробного действия которых, в основном, связан с нарушением синтеза клеточной стенки {

=аминогликозиды

=макролиды

=тетрациклины

=+цефалоспорины

=полимиксины

}

Все нижеперечисленные антибиотики относятся к группе пенициллинов, кроме {

=+метациклина

=бензилпенициллина

=ампициллина

=оксациллина

=карбенициллина

}

Назвать антибиотик, оказывающий преимущественно бактериостатическое действие {

=стрептомицин

=оксациллин

=бензилпенициллин

=гентамицин

=+эритромицин

}

Назвать антибиотик, оказывающий преимущественно бактерицидное действие {

=+цефалоридин

=эритромицин

=олеандомицин

=тетрациклин

=левомицетин

}

К группе аминогликозидов относятся все препараты, кроме {

=стрептомицина

=неомицина

=гентамицина

=канамицина

=+эритромицина

}

Укажите препарат сульфаниламидов только для местного применения {

=сульфапиридазин

=этазол

=+сульфацил - натрий

=сульфален
=уросульфан
}

Отметить механизмы антибактериального действия сульфаниламидов {

=нарушения синтеза клеточной стенки микроорганизмов
=изменения проницаемости мембраны клеток микроорганизма
=+конкурентный антагонизм с парааминобензойной кислотой в процессе синтеза фолиевой кислоты
=угнетение синтеза белка рибосомами бактериальной клетки
=нарушения синтеза РНК
}

Какой препарат относится к производным хинолона {

=нитроксалин
=фуродонин
=+кислота налидиксовая
=энтеросептол
=диоксидин
}

Какой из препаратов относится к производным 8-оксихинолина {

=фуразолидон
=кислота налидиксовая
=этамбутол
=+нитроксолин
=офлоксацин
}

Отметить противосифилитические препараты {

=+бензилпенициллин
=фуразолидон

=невиграмон

=нистатин

=амфотерицин В

}

Макролид II поколения {:

=Эритромицин.

=Доксициклин.

=+Кларитромицин.

=Тобрамицин.

=Сизомицин.

}

Отметить антисептик из группы окислителей {

=+раствор перекиси водорода

=раствор йода спиртовый

=цинка сульфат

=окись ртути

=серебра нитрат

}