

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АЦЕЛЛБИЯ® (ACELLBIA®)

Торговое наименование: Ацеллбия®

Международное непатентованное наименование: ритуксимаб

Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий

СОСТАВ

Один флакон содержит:

Действующее вещество: ритуксимаб — 100 мг/10 мл (10 мг/мл) или 500 мг/50 мл (10 мг/мл).

Вспомогательные вещества: натрия цитрата дигидрат, полисорбат 80, натрия хлорид, вода для инъекций.

ОПИСАНИЕ

Прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или светло-жёлтого цвета жидкость.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противоопухолевое средство — моноклональное антитело.

Код АТХ: L01FA01

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Ритуксимаб представляет собой химерное моноклональное антитело мыши/человека, которое специфически связывается с трансмембранным антигеном CD20. Этот антиген расположен на пре-В-лимфоцитах и зрелых В-лимфоцитах, но отсутствует на стволовых гемопоэтических клетках, про-В-клетках, нормальных плазматических клетках и здоровых клетках других тканей. Антиген экспрессируется более чем на 95% всех В-клеточных неходжкинских лимфом.

CD20 регулирует начальные этапы активации клеточного цикла и дифференцировки, а также функционирует как кальциевый канал. После связывания антитела с CD20 ритуксимаб опосредует лизис В-клеток. Возможные механизмы клеточного лизиса включают комплементзависимую цитотоксичность (КЗЦ), антителозависимую клеточную цитотоксичность (АЗКЦ) и индукцию апоптоза.

Фармакокинетика

При внутривенном введении ритуксимаб медленно выводится из организма. Средний период полувыведения после первой инфузии составляет 76,3 часа (диапазон 31,5–152,6 часа), после четвёртой инфузии — 205,8 часа (диапазон 83,9–407,0 часов).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ацеллбия® показана для лечения следующих заболеваний:

1. Неходжкинские лимфомы (НХЛ):

- Рецидивирующие или химиорезистентные В-клеточные CD20-положительные неходжкинские лимфомы низкой степени злокачественности или фолликулярные;
- Фолликулярная лимфома III–IV стадии в комбинации с химиотерапией у ранее нелеченных пациентов;
- Фолликулярная лимфома в качестве поддерживающей терапии после ответа на индукционную терапию;
- CD20-положительная диффузная В-крупноклеточная лимфома в комбинации с химиотерапией по схеме CHOP или другими схемами.

2. Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ):

- В комбинации с химиотерапией для лечения ранее нелеченных и рецидивирующих/рефрактерных форм ХЛЛ.

3. Ревматоидный артрит:

- Ревматоидный артрит среднетяжёлого и тяжёлого течения активной формы у взрослых пациентов в комбинации с метотрексатом при непереносимости или неадекватном ответе на текущие схемы терапии, включающие один или более ингибиторов фактора некроза опухоли (ФНО-α).

4. Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера) и микроскопический полиангиит:

— В комбинации с глюкокортикостероидами для лечения тяжёлых форм активного гранулематоза с полиангиитом и микроскопического полиангиита у взрослых пациентов.

5. Вульгарная пузырчатка:

— Лечение вульгарной пузырчатки среднетяжёлого и тяжёлого течения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Повышенная чувствительность к ритуксимабу, любому компоненту препарата или белкам мыши;
- Острые инфекционные заболевания;
- Выраженный первичный или вторичный иммунодефицит;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Детский возраст (эффективность и безопасность не установлены);
- Тяжёлая сердечная недостаточность (IV функциональный класс по классификации NYHA);
- Тяжёлые неконтролируемые заболевания сердечно-сосудистой системы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Ацеллбия® вводится только внутривенно капельно через отдельный катетер. Препарат нельзя вводить внутривенно струйно или болюсно.

Неходжкинские лимфомы:

Монотерапия: 375 мг/м² поверхности тела один раз в неделю в течение 4 недель.

В комбинации с химиотерапией: 375 мг/м² поверхности тела в 1-й день каждого цикла химиотерапии после введения глюкокортикостероидного компонента схемы, в течение 8 циклов.

Хронический лимфоцитарный лейкоз:

375 мг/м² в 1-й цикле, затем 500 мг/м² в каждом последующем цикле, всего 6 циклов. Ритуксимаб вводится в 1-й день каждого цикла.

Ревматоидный артрит:

1000 мг внутривенно. Через 2 недели — повторная инфузия 1000 мг. Необходимость проведения повторных курсов оценивается через 24 недели.

Скорость инфузии:

Первая инфузия: начальная скорость 50 мг/ч, при отсутствии реакций каждые 30 минут скорость увеличивается на 50 мг/ч до максимальной скорости 400 мг/ч.

Последующие инфузии: начальная скорость 100 мг/ч, увеличение каждые 30 минут на 100 мг/ч до максимальной скорости 400 мг/ч.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Инфузионные реакции (очень часто):

— Лихорадка, озноб, тошнота, крапивница, утомляемость, головная боль, бронхоспазм, ангионевротический отёк, зуд, ринит.

Инфекции (часто):

— Инфекции верхних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей, герпетические инфекции.

Со стороны системы кроветворения:

— Нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, анемия.

Со стороны сердечно-сосудистой системы:

— Артериальная гипертензия, тахикардия, аритмия.

Редкие, но серьёзные нежелательные реакции:

— Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ);

— Реактивация гепатита В;

— Тяжёлые кожные реакции (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Данные о взаимодействии ритуксимаба с другими лекарственными средствами ограничены. При

совместном применении с метотрексатом фармакокинетика обоих препаратов не изменялась. Совместное применение с цисплатином не изучалось в специальных клинических исследованиях.

Следует избегать одновременной вакцинации живыми вакцинами.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Инфузионные реакции: перед каждой инфузией рекомендуется премедикация анальгетиком/антипиретиком (например, парацетамолом) и антигистаминным препаратом. При применении по ревматологическим показаниям рекомендуется также премедикация глюкокортикостероидами.

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ): при появлении неврологической симптоматики необходима консультация невролога и соответствующие диагностические мероприятия.

Реактивация гепатита В: перед началом терапии все пациенты должны быть обследованы на наличие вируса гепатита В. При выявлении активного гепатита В терапию ритуксимабом начинать не следует.

ФОРМА ВЫПУСКА

Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл. По 10 мл (100 мг) или 50 мл (500 мг) во флаконе из бесцветного стекла.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищённом от света месте. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года 6 месяцев. Не использовать после истечения срока годности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «БИОКАД», Россия

198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А