

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЕРТИКАД® (HERTICAD®)

Торговое наименование: Гертикад®

Международное непатентованное наименование: трастузумаб

Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

СОСТАВ

Один флакон содержит:

Действующее вещество: трастузумаб — 150 мг или 440 мг.

Вспомогательные вещества: L-гистидина гидрохлорид, L-гистидин, α,α-трегалозы дигидрат, полисорбат 20.

ОПИСАНИЕ

Лиофилизированный порошок или спрессованная масса от белого до светло-жёлтого цвета.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противоопухолевое средство — моноклональное антитело.

Код АТХ: L01FD01

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Трастузумаб представляет собой рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела, которые селективно взаимодействуют с внеклеточным доменом рецептора эпидермального фактора роста человека 2 типа (HER2). Эти антитела представляют собой IgG1, состоящие из человеческих структурных участков и определяющих комплементарность участков мышиного антитела p185HER2, которые связываются с HER2.

Протоонкоген HER2 (или c-erbB2) кодирует трансмембранный рецептороподобный белок с молекулярной массой 185 кДа, который структурно подобен другим членам семейства рецепторов эпидермального фактора роста. Гиперэкспрессия HER2 обнаружена в ткани первичного рака молочной железы у 20–30% пациентов и ассоциирована с агрессивным течением опухолевого процесса и плохим прогнозом.

Трастузумаб блокирует пролиферацию опухолевых клеток человека с гиперэкспрессией HER2. Антителозависимая клеточная цитотоксичность (АЗКЦ) трастузумаба преимущественно направлена на опухолевые клетки с гиперэкспрессией HER2.

Фармакокинетика

При введении нагрузочной дозы 4 мг/кг и поддерживающей дозы 2 мг/кг еженедельно средний период полувыведения составляет 28,5 дня (диапазон 25,5–32,8 дня). Клиренс трастузумаба увеличивается при наличии метастазов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гертикад® показан для лечения следующих заболеваний:

1. Рак молочной железы (РМЖ):

а) Метастатический рак молочной железы с гиперэкспрессией HER2:

- В качестве монотерапии после одной или более схем химиотерапии по поводу метастатического рака;
- В комбинации с паклитакселом или доцетакселом у пациентов, не получавших ранее химиотерапию по поводу метастатического рака;
- В комбинации с ингибитором ароматазы у пациентов в постменопаузе с гормонрецептор-положительным метастатическим раком молочной железы, ранее не получавших трастузумаб.

б) Ранние стадии рака молочной железы с гиперэкспрессией HER2:

- В качестве адъювантной терапии после хирургического вмешательства, завершения химиотерапии (неоадъювантной или адъювантной) и лучевой терапии (если применимо);
- В комбинации с паклитакселом или доцетакселом после адъювантной химиотерапии доксорубицином

и циклофосфамидом;

- В комбинации с адъювантной химиотерапией, состоящей из доцетаксела и карбоплатина;
- В комбинации с неоадъювантной химиотерапией с последующей адъювантной монотерапией трастузумабом при местнораспространённом (включая воспалительный) раке молочной железы или опухолях более 2 см в диаметре.

2. Метастатический рак желудка:

- В комбинации с капецитабином или 5-фторурацилом и цисплатином в качестве первой линии терапии метастатической аденокарциномы желудка или гастроэзофагеального перехода с гиперэкспрессией HER2 у пациентов, не получавших ранее противоопухолевую терапию по поводу метастатического заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Повышенная чувствительность к трастузумабу или любому компоненту препарата;
- Тяжёлая одышка в состоянии покоя, обусловленная метастатическим поражением лёгких или сопутствующими заболеваниями, требующими поддерживающей кислородной терапии;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Детский возраст до 18 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Гертикад® вводится только внутривенно капельно. Препарат нельзя вводить внутривенно струйно или болюсно.

Перед началом терапии обязательно тестирование HER2-статуса опухоли.

Рак молочной железы (еженедельный режим):

Нагрузочная доза: 4 мг/кг массы тела внутривенно капельно в течение 90 минут.

Поддерживающая доза: 2 мг/кг массы тела один раз в неделю. При хорошей переносимости нагрузочной дозы введение поддерживающих доз можно проводить в течение 30 минут.

Рак молочной железы (трёхнедельный режим):

Нагрузочная доза: 8 мг/кг массы тела.

Поддерживающая доза: 6 мг/кг массы тела каждые 3 недели. Первую поддерживающую дозу вводят через 3 недели после нагрузочной дозы.

Рак желудка (трёхнедельный режим):

Нагрузочная доза: 8 мг/кг массы тела.

Поддерживающая доза: 6 мг/кг массы тела каждые 3 недели. Трастузумаб вводится в 1-й день каждого цикла, непосредственно после введения цисплатина.

Длительность терапии:

Метастатический рак: лечение до прогрессирования заболевания.

Адъювантная терапия РМЖ: общая продолжительность лечения — 1 год (не более 18 циклов при трёхнедельном режиме).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Кардиотоксичность (важнейший профиль безопасности):

- Снижение фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ);
- Застойная сердечная недостаточность (класс II–IV по NYHA);
- Кардиомиопатия.

Мониторинг функции сердца следует проводить каждые 3 месяца во время терапии и каждые 6 месяцев после её окончания в течение 24 месяцев.

Инфузионные реакции (очень часто):

- Озноб, лихорадка, тошнота, рвота, боль в области опухоли, тремор, головная боль, головокружение, одышка, гипотензия, сыпь.

Со стороны дыхательной системы:

- Кашель, одышка, носовое кровотечение, ринорея, лёгочные нарушения.

Со стороны желудочно-кишечного тракта:

— Диарея, тошнота, рвота, боль в животе, анорексия.

Общие:

— Астения, боль в грудной клетке, озноб, лихорадка, гриппоподобные симптомы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Специальных исследований лекарственного взаимодействия не проводилось. Клинически значимых взаимодействий трастузумаба с сопутствующими лекарственными препаратами в клинических исследованиях не наблюдалось.

Следует избегать совместного применения с антрациклинами, за исключением строго контролируемых клинических исследований с мониторингом функции сердца, в связи с повышенным риском кардиотоксичности.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Кардиотоксичность: перед началом терапии необходимо оценить функцию сердца, включая сбор анамнеза, физикальное обследование, ЭКГ, эхокардиографию и/или радиоизотопную вентрикулографию (MUGA). Мониторинг функции сердца следует проводить регулярно во время терапии.

При снижении ФВЛЖ ниже 50% или на 10 и более процентных пунктов от исходного уровня терапию следует приостановить. При отсутствии восстановления ФВЛЖ в течение 4–8 недель или при повторном снижении ФВЛЖ терапию следует прекратить.

HER2-тестирование: точность определения HER2-статуса критически важна. Тестирование должно проводиться в специализированных лабораториях, обеспечивающих валидацию методик.

Лёгочные осложнения: при развитии пневмонита или тяжёлого острого респираторного дистресс-синдрома терапию следует немедленно прекратить.

ФОРМА ВЫПУСКА

Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг или 440 мг. По 1 флакону из бесцветного стекла с растворителем (20 мл бактериостатической воды для инъекций с бензиловым спиртом для флакона 440 мг).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 2 до 8 °C в защищённом от света месте. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Восстановленный раствор с бактериостатическим растворителем стабилен в течение 28 дней при температуре от 2 до 8 °C.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «БИОКАД», Россия

198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А