

**Examen final de Ecuaciones Diferenciales II**  
**Viernes, 4 de noviembre de 2022**

---

1. Considérese el problema de Cauchy

$$(P) \begin{cases} x' = 2t(x-2)\log(x) \\ x(0) = e \end{cases}$$

- (a) Probar que (P) tiene una única solución maximal  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ , siendo  $I = (a, b)$ , con  $0 \in I$ . ¿Puede aplicarse el TEUG?
- (b) Probar que  $\varphi$  es simétrica par (con lo que  $a = -b$ ) y probar también que  $\varphi(t) > 2$  para todo  $t \in I$ .
- (c) Estudiar la monotonía de  $\varphi$ , y también su curvatura (concavidad y convexidad).
- (d) Probar que  $I = \mathbb{R}$ . Para ello, se propone seguir los siguientes pasos:

(d.i) Probar que, para  $t \in [0, b)$ ,

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)\log(\varphi(t))} \leq 2t$$

(d.ii) Deducir que, para  $t \in [0, b)$ ,  $\varphi(t) \leq e^{et^2}$ .

(d.iii) Concluir que  $b = \infty$  y, en consecuencia,  $I = \mathbb{R}$ .

(e) [Opcional] Probar que  $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = \infty$ . Ayuda: si  $t > 0$  y  $\delta = \frac{e-2}{e-1}$ , entonces

$$\frac{\varphi'(t)}{(\varphi(t)-1)\log(\varphi(t)-1)} \geq 2\delta t$$

- 
- (a) Sea  $D = \mathbb{R} \times (0, \infty)$  y considérese la función  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(t, x) = 2t(x-2)\log(x)$ . Como  $f \in C^1(D, \mathbb{R})$ , entonces  $f \in \mathcal{C}(D, \mathbb{R}) \cap \text{Lip}_{\text{loc}}(x, D, \mathbb{R})$ . Además,  $(0, e) \in \overset{\circ}{D}$ , luego, por el TEUL, el problema (P) tiene solución local única, que puede extenderse (de manera única por verificarse también la PUG) a una solución maximal  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ . Y como  $D$  es abierto, por el resultado sobre soluciones maximales con gráficas en abiertos, se tiene que  $I = (a, b)$ , donde  $-\infty \leq a < 0 < b \leq \infty$ .

Obsérvese que no se puede aplicar el TEUG, pues  $D$  no es una banda vertical.

- (b) Considérese la función  $\psi: (-b, -a) \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $\psi(t) = \varphi(-t)$ . Se tiene que

(i) Por la regla de la cadena,  $\psi$  es derivable (pues  $\varphi$  lo es) y, si  $t \in (-b, -a)$ ,

$$\psi'(t) = -\varphi'(-t) = -2(-t)(\varphi(-t)-2)\log(\varphi(-t)) = 2t(\psi(t)-2)\log(\psi(t))$$

(ii)  $\text{gráf}(\psi) \subset D$ .

(iii)  $\psi(0) = \varphi(0) = e$ .

Por tanto,  $\psi$  es solución de (P), y como  $\varphi$  es la única solución maximal de (P), entonces  $\varphi$  es una prolongación de  $\psi$ , luego  $(-b, -a) \subset (a, b)$  y  $\varphi|_{(-b, -a)} = \psi$ . Pero la primera contención implica  $a \leq -b$  y  $-a \leq b$ , es decir,  $a = -b$ , así que  $(-b, -a) = (a, b)$  y en consecuencia  $\varphi = \psi$ , luego  $\varphi$  es una función par.

Por otra parte, obsérvese que la función constante 2 es solución de (E)  $x' = f(t, x)$  en  $\mathbb{R}$ , pero no resuelve el problema (P). Como (E) verifica la PUG, entonces la gráfica de  $\varphi$  no puede cortar a la de la solución constante 2, o, en otras palabras,  $\varphi(t) \neq 2$  para todo  $t \in I$ . Pero  $\varphi(0) = e > 2$ , luego, por continuidad, debe ser  $\varphi(t) > 2$  para todo  $t \in I$ .

- (c) Para todo  $t \in I$  se tiene que  $\varphi(t) - 2 > 0$  y  $\log(\varphi(t)) > 0$  (pues se acaba de ver que  $\varphi(t) > 2$ ). Por tanto, si  $t \in (-b, 0)$ , entonces  $\varphi'(t) < 0$ , y si  $t \in (0, b)$ , entonces  $\varphi'(t) > 0$ , luego  $\varphi$  es estrictamente decreciente en  $(-b, 0]$  y estrictamente creciente en  $[0, b)$ .

Para estudiar la curvatura, se calcula la derivada segunda de  $\varphi$ . Si  $t \in I$ ,

$$\begin{aligned}\varphi''(t) &= 2(\varphi(t) - 2)\log(\varphi(t)) + 2t\varphi'(t)\log(\varphi(t)) + \frac{2t(\varphi(t) - 2)}{\varphi(t)}\varphi'(t) \\ &= 2(\varphi(t) - 2)\log(\varphi(t)) + 2t\varphi'(t)\left(\log(\varphi(t)) + \frac{\varphi(t) - 2}{\varphi(t)}\right) \\ &= 2(\varphi(t) - 2)\log(\varphi(t)) + 4t^2(\varphi(t) - 2)\log(\varphi(t))\left(\log(\varphi(t)) + \frac{\varphi(t) - 2}{\varphi(t)}\right) \\ &= 2(\varphi(t) - 2)\log(\varphi(t))\left(1 + 2t^2\log(\varphi(t)) + 2t^2\frac{\varphi(t) - 2}{\varphi(t)}\right)\end{aligned}$$

Por ser  $\varphi(t) > 2$  para todo  $t \in I$ , se tiene que  $\varphi''(t) > 0$  para todo  $t \in I$ , luego  $\varphi$  es estrictamente convexa.

- (d) Sea  $t \in [0, b)$ . Entonces

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)\log(\varphi(t))} = \frac{2t(\varphi(t) - 2)\log(\varphi(t))}{\varphi(t)\log(\varphi(t))} = \frac{2t\varphi(t) - 4t}{\varphi(t)} = 2t - \frac{4t}{\varphi(t)} \leq 2t,$$

donde en la última desigualdad se ha tenido en cuenta que  $t \geq 0$  y que  $\varphi(t) > 0$ . Por tanto, por la monotonía de la integral,

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{\varphi'(s)}{\varphi(s)\log(\varphi(s))} ds &\leq \int_0^t 2s ds \iff [\log(\log(\varphi(s)))]_0^t \leq [s^2]_0^t \\ &\iff \log(\log(\varphi(t))) - \log(\log(e)) \leq t^2 \\ &\iff \log(\log(\varphi(t))) \leq t^2 \\ &\iff \log(\varphi(t)) \leq e^{t^2} \\ &\iff \varphi(t) \leq e^{e^{t^2}},\end{aligned}$$

donde en algunas equivalencias se ha utilizado que la función exponencial es estrictamente creciente en  $\mathbb{R}$ . Supóngase, por reducción al absurdo, que  $b < \infty$ . Entonces, por el resultado sobre soluciones maximales con gráficas en abiertos, se tiene una de las dos circunstancias siguientes:

- (i)  $\lim_{t \rightarrow b^-} |\varphi(t)| = \lim_{t \rightarrow b^-} \varphi(t) = \infty$ .
- (ii) La gráfica de  $\varphi$  tiene algún punto límite para  $t \rightarrow b$ , y este y todos los puntos límite de la gráfica de  $\varphi$  están en  $\partial D = \mathbb{R} \times \{0\}$ .

Lo primero es imposible, pues al tomar límites cuando  $t \rightarrow b^-$  en la desigualdad que se acaba de probar, se obtiene

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \varphi(t) \leq \lim_{t \rightarrow b^-} e^{e^{t^2}} = e^{e^{b^2}} < \infty$$

En cuanto a lo segundo, si  $(t, 0)$  es un punto límite de la gráfica de  $\varphi$ , entonces existe una sucesión  $\{t_j\}_{j=1}^\infty$  tal que  $\lim_{j \rightarrow \infty} \varphi(t_j) = 0$ , pero esto es imposible porque  $\varphi(t) > 2$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ . La contradicción viene de suponer  $b < \infty$ , luego  $b = \infty$  y, por tanto,  $I = (-b, b) = \mathbb{R}$ .

- (e) En primer lugar, como  $\varphi$  es estrictamente creciente en  $[0, \infty)$ , existe  $A = \lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) \in [2, \infty]$ . Integrando en la desigualdad de ayuda, se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{\varphi'(s)}{(\varphi(s)-1)(\log(\varphi(s)-1))} ds &\geq \int_0^t 2\delta s ds \iff \left[ \log(\log(\varphi(s)-1)) \right]_0^t \geq \delta [s^2]_0^t \\ &\iff \log(\log(\varphi(t)-1)) - \log(\log(e-1)) \geq \delta t^2 \\ &\iff \frac{\log(\varphi(t)-1)}{\log(e-1)} \geq e^{\delta t^2} \\ &\iff \log(\varphi(t)-1) \geq e^{\delta t^2} \log(e-1) \\ &\iff \varphi(t)-1 \geq e^{e^{\delta t^2} \log(e-1)} \end{aligned}$$

Ahora bien, como  $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\delta t^2} = \infty$  y  $\log(e-1) > 0$  (pues  $e > 2$ ), entonces

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{e^{\delta t^2} \log(e-1)} = \infty,$$

lo que implica, por la desigualdad probada,  $\lim_{t \rightarrow \infty} (\varphi(t)-1) = \infty$ , luego  $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = \infty$ .

2.

- (a) *Considérese la ecuación diferencial autónoma*

$$(E) \quad x' = g(x),$$

siendo  $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Supóngase que  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $I$  un intervalo de  $\mathbb{R}$ , es una solución maximal no constante de (E). Sabemos entonces, por teoría, que  $\varphi$  es estrictamente monótona, luego  $\varphi(I)$  es también un intervalo de  $\mathbb{R}$ . Probar que, para cada  $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \varphi(I)$ , el problema

$$(P_{(t_0, x_0)}) \begin{cases} x' = g(x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

tiene solución maximal única, que además resulta ser una trasladada de  $\varphi$ .

- (b) *Realizar un estudio lo más exhaustivo posible de las soluciones maximales de la ecuación*

$$(E) \quad x' = e^{x^2-1} - 1,$$

y esbozar el aspecto de las gráficas de estas posibles soluciones. Probar asimismo que si  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  es la solución maximal de (E) que satisface  $\varphi(0) = e$ , entonces  $I$  no puede ser todo  $\mathbb{R}$ . Ayuda: si  $x > 1$ , entonces  $e^{x^2-1} \geq x^2$ .

- (a) En primer lugar, por ser  $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , se tiene  $g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \cap \text{Lip}_{\text{loc}}(x, \mathbb{R}, \mathbb{R})$ , así que el TEUL proporciona una solución local única del problema  $(P_{(t_0, x_0)})$  que puede ser extendida (de manera única por verificarse la PUG) a una solución maximal  $\psi: J \rightarrow \mathbb{R}$ .

Por otro lado, como  $x_0 \in \varphi(I)$ , existe  $t_1 \in I$  tal que  $x_0 = \varphi(t_1)$ . Ahora se considera la función  $\varphi_{t_0-t_1}: I + t_0 - t_1 \rightarrow \mathbb{R}$ . dada por  $\varphi_{t_0-t_1}(t) = \varphi(t - t_0 + t_1)$ . Entonces

- (i)  $\varphi_{t_0-t_1}$  es derivable en  $I + t_0 - t_1$  por serlo  $\varphi$ .
- (ii)  $\text{gráf}(\varphi_{t_0-t_1}) \subset \mathbb{R}^2$ .

- (iii)  $\varphi'_{t_0-t_1}(t) = \varphi'(t-t_0+t_1) = g(\varphi(t-t_0+t_1)) = g(\varphi_{t_0-t_1}(t))$  para todo  $t \in I + t_0 - t_1$ .  
(iv)  $\varphi_{t_0-t_1}(t_0) = \varphi(t_1) = x_0$ .

Además,  $\varphi_{t_0-t_1}$  es una solución maximal de (E) por ser la traslación de una solución maximal de (E). Ahora bien, como  $\varphi_{t_0-t_1}$  es solución de  $(P_{(t_0, x_0)})$  y  $\psi$  es la única solución maximal de dicho problema, entonces  $\psi = \varphi_{t_0-t_1}$ , concluyéndose que  $(P_{(t_0, x_0)})$  tiene solución maximal única, y resulta ser una trasladada de  $\varphi$ .

- (b) Sea  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida por  $g(x) = e^{x^2-1} - 1$ . La ecuación (E)  $x' = g(x)$  es una ecuación diferencial escalar autónoma de primer orden. Se tiene que

$$e^{x^2-1} - 1 = 0 \iff e^{x^2-1} = 1 \iff x^2 - 1 = 0 \iff x = 1, x = -1$$

Por tanto,  $\varphi_{-1} \equiv -1$  y  $\varphi_1 \equiv 1$  son las únicas soluciones constantes en  $\mathbb{R}$  de la ecuación (E). Como (E) verifica la PUG en  $\mathbb{R}$  (pues  $g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ), entonces la gráfica de cualquier solución maximal no constante no debe cortar a la gráfica de ninguna solución constante. En otras palabras, si  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  es una solución maximal de (E) y consideramos las regiones

$$D_1 = \mathbb{R} \times (-\infty, -1), \quad D_2 = \mathbb{R} \times (-1, 1) \quad \text{y} \quad D_3 = \mathbb{R} \times (1, \infty),$$

entonces  $\text{gráf}(\varphi) \subset D_i$  para algún  $i \in \{1, 2, 3\}$ . Además, por ser  $\mathbb{R}^2$  abierto, el resultado sobre soluciones maximales con gráficas en abiertos permite asegurar que  $I = (a, b)$ , y si  $t^*$  es un extremo finito de  $I$ , entonces  $\lim_{t \rightarrow t^*} |\varphi(t)| = \infty$  (la casuística de los puntos límite es imposible por tener  $\mathbb{R}^2$  frontera vacía). Se distinguen tres casos:

- (i)  $\text{gráf}(\varphi) \subset D_1$ . Entonces  $\varphi(t) < -1$ , así que  $\varphi(t)^2 - 1 > 0$ , y, en consecuencia, se verifica  $\varphi'(t) = e^{\varphi(t)^2-1} - 1 > 0$  para todo  $t \in I$ , obteniéndose que  $\varphi$  es estrictamente creciente. Por tanto, existen  $A = \lim_{t \rightarrow a^+} \varphi(t)$  y  $B = \lim_{t \rightarrow b^-} \varphi(t)$  (pudiendo ser infinitos). Si fuese  $b < \infty$ , entonces  $\lim_{t \rightarrow b^-} |\varphi(t)| = \lim_{t \rightarrow b^-} -\varphi(t) = \infty$ , luego  $B = -\infty$ , que es imposible por ser  $\varphi$  estrictamente creciente. Por tanto,  $b = \infty$ , y como no puede ser  $B = -\infty$ , entonces  $B = -1$  (si fuera  $-\infty < B < -1$ , se obtendría una nueva solución constante de (E)). En el otro extremo, en principio, pudiera ocurrir  $a > -\infty$  o  $a = -\infty$ , pero en cualquier caso,  $A = -\infty$  ( $A = -1$  no puede ser por el crecimiento de  $\varphi$ ; tampoco puede ser  $-\infty < A < -1$  porque se obtendría otra solución constante). El resumen de este caso es que, o bien

$$a > -\infty, \quad A = -\infty, \quad b = \infty \quad \text{y} \quad B = -1,$$

o bien

$$a = -\infty, \quad A = -\infty, \quad b = \infty \quad \text{y} \quad B = -1,$$

- (ii)  $\text{gráf}(\varphi) \subset D_2$ . Resulta que la gráfica de  $\varphi$  queda encerrada entre la gráfica de sendas soluciones constantes, así que ha de ser  $I = \mathbb{R}$ . Además, como  $-1 < \varphi(t) < 1$ , entonces  $\varphi(t)^2 - 1 < 0$ , y, por tanto,  $\varphi'(t) = e^{\varphi(t)^2-1} - 1 < 0$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ , así que  $\varphi$  decrece estrictamente. De esto se deduce que  $A = 1$  y que  $B = -1$ . El resumen de este caso es

$$a = -\infty, \quad A = 1, \quad b = \infty \quad \text{y} \quad B = -1,$$

- (iii)  $\text{gráf}(\varphi) \subset D_3$ . Entonces  $\varphi(t) > 1$ , así que  $\varphi(t)^2 - 1 > 0$ , y, en consecuencia, se verifica  $\varphi'(t) = e^{\varphi(t)^2-1} - 1 > 0$  para todo  $t \in I$ , obteniéndose que  $\varphi$  es estrictamente creciente. Por tanto, existen  $A = \lim_{t \rightarrow a^+} \varphi(t)$  y  $B = \lim_{t \rightarrow b^-} \varphi(t)$  (pudiendo ser infinitos). Si fuese  $a > -\infty$ , entonces  $\lim_{t \rightarrow a^+} |\varphi(t)| = \lim_{t \rightarrow a^+} \varphi(t) = \infty$ , luego  $A = \infty$ , que es imposible por ser  $\varphi$  estrictamente creciente. Por tanto,  $a = -\infty$ , y como no puede ser  $A = \infty$ , entonces  $A = 1$  (si fuera  $1 < A < \infty$ , se obtendría una nueva solución constante de (E)). En el otro extremo, en principio, pudiera ocurrir  $b < \infty$  o  $b = \infty$ , pero en cualquier caso,  $B = \infty$

( $B = 1$  no puede ser por el crecimiento de  $\varphi$ ; tampoco puede ser  $1 < B < \infty$  porque se obtendría otra solución constante). El resumen de este caso es que, o bien

$$a = -\infty, \quad A = 1, \quad b = \infty \quad \text{y} \quad B = \infty,$$

o bien

$$a = -\infty, \quad A = 1, \quad b < \infty \quad \text{y} \quad B = \infty,$$

Por otra parte, sea  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  la única solución maximal del problema

$$(P) \begin{cases} x' = e^{x^2-1} - 1 \\ x(0) = e \end{cases}$$

La existencia y unicidad de  $\varphi$  son garantizadas por el apartado (a). Considérese el problema

$$(\widetilde{P}) \begin{cases} x' = x^2 - 1 \\ x(0) = e \end{cases}$$

La ecuación  $(\widetilde{E}) \ x' = x^2 - 1$  es de Ricatti. Se busca una solución particular del tipo  $x_p(t) = A$ :

$$x' = x^2 - 1 \iff 0 = A^2 - 1 \iff A = 1, A = -1$$

Se escoge  $A = 1$ , y se realiza el cambio  $y(t) = x(t) - 1$ . Entonces  $x(t) = y(t) + 1$ , luego

$$y'(t) = x'(t) = x(t)^2 - 1 = (1 + y(t))^2 - 1 = 1 + y(t)^2 + 2y(t) - 1 = y(t)^2 + 2y(t)$$

Ahora se resuelve la ecuación  $(B) \ y' = y^2 + 2y$ , que es de Bernoulli. Obsérvese que la solución de  $(\widetilde{P})$  verifica  $x(t) > 1$  para todo  $t$ , luego  $y(t) \neq 0$  para todo  $t$ , y por tanto,

$$y' = y^2 + 2y \iff y'y^{-2} = 1 + 2y^{-1} \iff -y'y^{-2} = -1 - 2y^{-1}$$

Haciendo el cambio  $z = y^{-1}$ , se tiene  $z' = -y'y^{-2}$ , luego ahora se resuelve  $(L) \ z' = -1 - 2z$ , que es lineal. La solución general de la ecuación homogénea  $(L) \ z' = -2z$  es

$$z_h(t) = ce^{\int -2dt} = ce^{-2t}, \quad c \in \mathbb{R}$$

Se va a hallar una solución particular de  $(L)$ , recurriendo al método de variación de los parámetros. La idea es buscar una solución de la forma  $z(t) = c(t)e^{-2t}$ . Se tendría entonces

$$\begin{aligned} z'(t) = -1 - 2z(t) &\iff c'(t)e^{-2t} - 2c(t)e^{-2t} = -1 - 2c(t)e^{-2t} \iff c'(t) = -e^{2t} \\ &\iff c(t) = \int -e^{2t} dt + d = -\frac{1}{2}e^{2t} + d \end{aligned}$$

Tomando, por ejemplo,  $d = 0$ , se llega a la solución general de  $(L)$ , que es

$$z(t) = ce^{-2t} - \frac{1}{2}, \quad c \in \mathbb{R}$$

Haciendo  $z = y^{-1}$ , se obtiene

$$y(t) = \frac{1}{ce^{-2t} - \frac{1}{2}}$$

Por último, haciendo  $y = x - 1$  se llega a

$$x(t) = \frac{1}{ce^{-2t} - \frac{1}{2}} + 1$$

Como debe ser  $x(0) = e$ , hay que escoger

$$c = \frac{1}{e-1} + \frac{1}{2}$$

Total, que tenemos una solución de  $(\tilde{P})$  dada por

$$\psi(t) = \frac{1}{\left(\frac{1}{e-1} + \frac{1}{2}\right)e^{-2t} - \frac{1}{2}} + 1,$$

y está bien definida en los puntos donde no se tenga

$$\left(\frac{1}{e-1} + \frac{1}{2}\right)e^{-2t_0} - \frac{1}{2} = 0 \iff e^{2t_0} = 2\left(\frac{1}{e-1} + \frac{1}{2}\right) \iff t_0 = \frac{\log(2(\frac{1}{e-1} + \frac{1}{2}))}{2}$$

Como  $t_0 > 0$ , entonces  $\psi$  está bien definida en  $[0, t_0)$ . Como en  $D_3$  se tiene  $e^{x^2-1} - 1 \geq x^2 - 1$  y además  $\varphi(0) = \psi(0) = e$ , entonces, suponiendo que  $b \geq t_0$  (de lo contrario no habría nada que demostrar), por el teorema de comparación de soluciones de ecuaciones escalares, se tiene que  $\varphi(t) \geq \psi(t)$  para todo  $t \in [0, t_0)$ . Pero es que

$$\lim_{t \rightarrow t_0^-} \psi(t) = \infty,$$

luego

$$\lim_{t \rightarrow t_0^-} \varphi(t) = \infty$$

y esto implica que  $b = t_0$ . Se concluye que  $b \leq t_0 < \infty$ , luego  $I \neq \mathbb{R}$ .

3.

(a) Supóngase que  $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  es continua y  $\omega$ -periódica, con  $\omega \in (0, \infty)$ . Considérese el sistema

$$(H) \quad x' = A(t)x$$

(a.i) Probar que si  $\varphi$  es una solución de (H) en  $\mathbb{R}$  con  $\varphi(0) = \varphi(\omega)$ , entonces  $\varphi$  es  $\omega$ -periódica.

(a.ii) Sea  $\Phi$  una matriz fundamental de (H). Demostrar que H tiene solución  $\omega$ -periódica no trivial si y solo si  $\det(\Phi(0) - \Phi(\omega)) = 0$ . Ayuda: el determinante de una matriz  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  es cero y si solo si existe un vector  $c \in \mathbb{R}^n$  no nulo tal que  $Bc = 0$ .

(b) Considérese la ecuación (E)  $y'' + a(t)y = 0$ , con  $a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continua y  $\omega$ -periódica, y supongamos que  $\varphi_1$  y  $\varphi_2$  son soluciones de (E) tales que

$$\begin{pmatrix} \varphi_1(0) \\ \varphi_1'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} \varphi_2(0) \\ \varphi_2'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(b.i) Probar que  $W(\varphi_1, \varphi_2)(t) = 1$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ . Ayuda: calcular  $W(\varphi_1, \varphi_2)'(t)$ .

(b.ii) Probar que (E) tiene una solución  $\omega$ -periódica no trivial si y solo si  $\varphi_1(\omega) + \varphi_2'(\omega) = 2$ .

(a) Sea  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una solución de (H) verificando  $\varphi(0) = \varphi(\omega)$ . Sea  $x^0 = \varphi(0) = \varphi(\omega)$ . Como (S) es un sistema diferencial lineal de primer orden, el problema

$$(P) \begin{cases} x' = A(t)x + b(t) \\ x(0) = x^0 \end{cases}$$

tiene solución única en  $\mathbb{R}$ . Por una parte, tenemos que  $\varphi$  es solución de (P). Por otra parte, si se define  $\varphi_\omega: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  mediante  $\varphi_\omega(t) = \varphi(t + \omega)$ , se tiene que

- (i)  $\varphi_\omega$  es derivable por serlo  $\varphi$ .
- (ii)  $\text{gráf}(\varphi_\omega) \subset \mathbb{R}^2$ , evidentemente.
- (iii) Por la regla de la cadena,

$$\varphi'_\omega(t) = \varphi'(t + \omega) = A(t + \omega)\varphi(t + \omega) = A(t)\varphi(t + \omega) = A(t)\varphi_\omega(t),$$

donde se ha usado que  $A$  es  $\omega$ -periódica.

- (iv)  $\varphi_\omega(0) = \varphi(\omega) = x^0$ .

Por tanto,  $\varphi_\omega$  es también solución de (P), así que debe ser  $\varphi_\omega = \varphi$  por asuntos de unicidad, concluyéndose que  $\varphi$  es periódica de periodo  $\omega$ .

Sea  $\Phi$  una matriz fundamental de (H), y supóngase que  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  es solución  $\omega$ -periódica de (H) no trivial. Sea  $x^0 = \varphi(0)$  y considérese el problema

$$(P) \begin{cases} x' = A(t)x \\ x(0) = x^0 \end{cases}$$

Como  $\Phi$  es matriz fundamental, la única solución de (P) en  $\mathbb{R}$  viene dada por

$$\psi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)x^0,$$

y como  $\varphi$  es solución de (P), entonces

$$\varphi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)x^0$$

Pero, por el apartado (a),  $\varphi(0) = \varphi(\omega)$ , luego

$$x^0 = \Phi(\omega)\Phi^{-1}(0)x^0$$

Equivalentemente,

$$(\Phi(\omega)\Phi^{-1}(0) - \text{Id})x^0 = (\Phi(\omega) - \Phi(0))\Phi^{-1}(0)x^0 = 0,$$

Obsérvese que  $x^0 \neq 0$  (si fuese  $x^0$  se contradiría que  $\varphi$  es no trivial, ya que la función nula resolvería (P)) y  $\Phi^{-1}(0) \neq 0$  (de lo contrario sería  $\varphi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)x^0 = 0$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ , lo que también contradice que  $\varphi$  es no trivial). Por tanto,  $\text{rg}(\Phi(\omega) - \Phi(0)) < n$ , o lo que es lo mismo,  $\det(\Phi(\omega) - \Phi(0)) = \det(\Phi(0) - \Phi(\omega)) = 0$ .

Recíprocamente, supóngase que  $\det(\Phi(0) - \Phi(\omega)) = 0$ . Entonces el sistema  $(\Phi(0) - \Phi(\omega))X = 0$  tiene solución no trivial, llámese  $x^0$ . Nótese que  $\Phi(0)x^0 = \Phi(\omega)x^0$ . Sea  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^n$  la función definida por  $\varphi(t) = \Phi(t)x^0$ . Se tiene que

- (i)  $\varphi$  es solución de (E), pues  $\varphi'(t) = \Phi'(t)x^0 = A(t)\Phi(t)x^0 = A(t)\varphi(t)$  para cada  $t \in \mathbb{R}$ .
- (ii)  $\varphi$  no es la función nula, pues  $x^0 \neq 0$  y  $\Phi$  es una matriz regular.
- (iii)  $\varphi(0) = \Phi(0)x^0 = \Phi(\omega)x^0 = \varphi(\omega)$ , luego, por lo probado anteriormente,  $\varphi$  es periódica de periodo  $\omega$ .

(b) Obsérvese que

$$W(\varphi_1, \varphi_2)(0) = \det \begin{pmatrix} \varphi_1(0) & \varphi_2(0) \\ \varphi_1'(0) & \varphi_2'(0) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

Por otra parte, por la fórmula de Abel-Liouville-Jacobi, para todo  $t \in \mathbb{R}$  se tiene

$$W(\varphi_1, \varphi_2)(t) = W(\varphi_1, \varphi_2)(0)e^{-\int_0^t b(s)ds},$$

donde  $b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es el coeficiente de  $y'$  en  $(E)$ . En nuestro caso,  $b = 0$ , luego

$$W(\varphi_1, \varphi_2)(t) = W(\varphi_1, \varphi_2)(0)e^{-\int_0^t 0 ds} = W(\varphi_1, \varphi_2)(0) = 1$$

para todo  $t \in I$ .

Para el apartado segundo, considérese el sistema de primer orden asociado a la ecuación  $(E)$ :

$$(S) \begin{cases} z'_1 = z_2 \\ z'_2 = -a(t)z_1 \end{cases}$$

Como  $\varphi_1$  y  $\varphi_2$  son soluciones de la ecuación  $(E)$  en  $\mathbb{R}$ , entonces  $\widetilde{\varphi}_1 = (\varphi_1, \varphi'_1)$  y  $\widetilde{\varphi}_2 = (\varphi_2, \varphi'_2)$  son soluciones de  $(S)$  en  $\mathbb{R}$ , así que  $\Phi = \begin{pmatrix} \widetilde{\varphi}_1 & \widetilde{\varphi}_2 \end{pmatrix}$  es matriz solución de  $(S)$ . Además,

$$\det(\Phi(0)) = \det \begin{pmatrix} \varphi_1(0) & \varphi_2(0) \\ \varphi'_1(0) & \varphi'_2(0) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0,$$

luego  $\det(\Phi(t)) \neq 0$  para todo  $t \in \mathbb{R}$  y, por tanto,  $\Phi$  es matriz fundamental de  $(S)$ . Se tiene que

$$\begin{aligned} \det(\Phi(0) - \Phi(\omega)) &= \det \begin{pmatrix} \varphi_1(0) - \varphi_1(\omega) & \varphi_2(0) - \varphi_2(\omega) \\ \varphi'_1(0) - \varphi'_1(\omega) & \varphi'_2(0) - \varphi'_2(\omega) \end{pmatrix} \\ &= (\varphi_1(0) - \varphi_1(\omega))(\varphi'_2(0) - \varphi'_2(\omega)) - (\varphi_2(0) - \varphi_2(\omega))(\varphi'_1(0) - \varphi'_1(\omega)) \\ &= \varphi_1(0)\varphi'_2(0) - \varphi_1(0)\varphi'_2(\omega) - \varphi_1(\omega)\varphi'_2(0) + \varphi_1(\omega)\varphi'_2(\omega) + \\ &\quad \varphi_2(0)\varphi'_1(\omega) + \varphi_2(\omega)\varphi'_1(0) - \varphi_2(0)\varphi'_1(0) - \varphi_2(\omega)\varphi'_1(\omega) \\ &= W(\varphi_1, \varphi_2)(0) + W(\varphi_1, \varphi_2)(\omega) + \det \begin{pmatrix} \varphi_2(0) & \varphi_1(\omega) \\ \varphi'_2(0) & \varphi'_1(\omega) \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} \varphi_1(0) & \varphi_2(\omega) \\ \varphi'_1(0) & \varphi'_2(\omega) \end{pmatrix} \\ &= 2 + \det \begin{pmatrix} 0 & \varphi_1(\omega) \\ 1 & \varphi'_1(\omega) \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} 1 & \varphi_2(\omega) \\ 0 & \varphi'_2(\omega) \end{pmatrix} \\ &= 2 - \varphi_1(\omega) - \varphi'_2(\omega) \end{aligned}$$

Por el apartado (a),  $(S)$  tiene solución  $\omega$ -periódica no trivial si y solo si  $\varphi_1(\omega) + \varphi'_2(\omega) = 2$ . Para terminar el ejercicio, se va a probar que  $(S)$  tiene solución  $\omega$ -periódica no trivial si y solo si  $(E)$  tiene solución  $\omega$ -periódica no trivial.

En efecto, si  $(\varphi_1, \varphi_2)$  es solución  $\omega$ -periódica de  $(S)$ , entonces  $\varphi_1$  es solución de  $(E)$ , y como  $(\varphi_1, \varphi_2)(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t)) = (\varphi_1(t + \omega), \varphi_2(t + \omega))$  para todo  $t \in \mathbb{R}$  por la periodicidad de  $(\varphi_1, \varphi_2)$ , entonces, en particular,  $\varphi_1(t) = \varphi_1(t + \omega)$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ , luego  $\varphi_1$  es  $\omega$ -periódica.

Recíprocamente, si  $\varphi$  es solución  $\omega$ -periódica de  $(E)$ , entonces  $(\varphi, \varphi')$  es solución de  $(S)$ . Por la periodicidad de  $\varphi$  se tiene  $\varphi(t) = \varphi(t + \omega)$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ , y derivando se obtiene  $\varphi'(t) = \varphi'(t + \omega)$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ , concluyéndose que  $(\varphi(t), \varphi'(t)) = (\varphi(t + \omega), \varphi'(t + \omega))$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ , y, por tanto,  $(\varphi, \varphi')$  es  $\omega$ -periódica.