

О правилах и условиях эффективного и безопасного использования работ и услуг

1. Вылечен кариес

Рекомендации:

1. При появлении самопроизвольных болей и при завышении пломбой высоты прикуса (нарушении смыкания зубов) - немедленно обратиться к стоматологу.
2. Посещение стоматолога 1 раз в 6 месяцев с целью наблюдения, проведения профилактического осмотра и гигиенических мероприятий.
3. Электроодонтометрия и холодовой тест 1 раз в 6 мес.
4. Прицельная контрольная рентгенограмма 1 раз в 6 мес.
5. В случае рецидива кариеса или появления новых кариозных полостей – лечение кариеса и назначение комплексной реминерализующей терапии эмали.
6. Диетическая терапия: ограничение потребления пищевых продуктов и напитков с низкими значениями pH (соки, газированные напитки), уменьшение частоты потребления продуктов и напитков, содержащих легкоусвояемые углеводы и тщательное полоскание рта после их приема. Ограничение пребывания углеводов в полости рта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ЕГО ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

1. Запломбированные зубы необходимо чистить зубной щеткой с пастой так же, как естественные зубы — два раза в день. После еды следует полоскать рот для удаления остатков пищи.
2. Для чистки межзубных промежутков можно использовать зубные нити (флоссы) после обучения их применению и по рекомендации врача-стоматолога.
3. При возникновении кровоточивости при чистке зубов нельзя прекращать гигиенические процедуры. Если кровоточивость не проходит в течение 3—4 дней, необходимо обратиться к врачу.
4. Если после пломбирования и окончания действия анестезии пломба мешает смыканию зубов, то необходимо в ближайшее время обратиться к лечащему врачу.
5. При пломбах из композитных материалов не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например: чернику, чай, кофе и т. п.), в течение первых двух суток после пломбирования зуба.
6. При возникновении в зубе резкой боли необходимо как можно быстрее обратиться к лечащему стоматологу.
7. Во избежание сколов пломбы и прилегающих к пломбе твердых тканей зуба не рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (например: орехи, сухари), откусывать от больших кусков (например: от цельного яблока).
8. Раз в полгода следует посещать стоматолога для проведения профилактических осмотров и необходимых манипуляций (при пломбах из композитных материалов — для полировки пломбы, что увеличит срок её службы).

2. Вылечен пульпит

Рекомендации:

1. Исключить полную нагрузку на зуб и ограничить прием грубой пищи до момента покрытия зуба ортопедической конструкцией.
2. Изготовить искусственную коронку/вкладку/накладку с целью снижения риска фрактуры зуба и восстановления адекватных окклюзионных контактов в сроки не позднее 1 месяца.
3. При появлении самопроизвольных болей и /или болей при накусывании - незамедлительно обратиться к врачу.
4. Посещение специалиста 1 раз в 6 месяцев с целью наблюдения, проведения профилактического осмотра и гигиенических мероприятий.
5. Прицельная контрольная рентгенография 1 раз в 6 мес.

3. Вылечен периодонтит

Рекомендации:

1. Исключить полную нагрузку на зуб и ограничить прием грубой пищи до момента покрытия зуба ортопедической конструкцией.
2. Изготовить искусственную коронку/вкладку/накладку с целью снижения риска фрактуры зуба и восстановления адекватных окклюзионных контактов в сроки не позднее 1 месяца.
3. При появлении самопроизвольных болей и /или болей при накусывании - незамедлительно обратиться к врачу.
4. Посещение специалиста 1 раз в 6 месяцев с целью наблюдения, проведения профилактического осмотра и гигиенических мероприятий.
5. Прицельная контрольная рентгенография 1 раз в 6 мес.
6. Хирургическое вмешательство в _____ зубе с целью _____ или удаление зуба в случае неэффективности консервативного лечения.