

Multi Compartment Model

Neuroprothetics SS 2017


Jörg Encke

Prof. Werner Hemmert

Technical University of Munich

Fachgebiet für Bioanaloge


Informationsverarbeitung



Technische Universität München



Fachgebiet für Bioanaloge
Informationsverarbeitung



Using Kirchhoff's current law on the compartment n results in the following system of differential equations

$$0 = C_m \frac{dV_{m,n}}{dt} + I_{HH,n} + \frac{V_{i,n} + V_{i,n-1}}{R_a} + \frac{V_{i,n} - V_{i,n+1}}{R_a}$$
$$\frac{dV_{m,n}}{dt} = -\frac{1}{C_m} I_{HH,n} + \frac{1}{C_m} \frac{V_{i,n-1} - 2V_{i,n} + V_{i,n+1}}{R_a}$$

If we add a stimulation current:

$$\frac{dV_{m,n}}{dt} = \frac{1}{C_m} (-I_{HH,n} + I_{stim,n}) + \frac{1}{C_m} \frac{V_{i,n-1} - 2V_{i,n} + V_{i,n+1}}{R_a}$$

This system can also be written in matrix form:

$$\frac{d}{dt}\vec{V}_m = \frac{1}{C_m}(-\vec{I}_{HH} + \vec{I}_{stim}) + \frac{1}{C_m R_a} \mathbf{C} \vec{V}_i$$

Where $\vec{V}_m = \begin{pmatrix} V_{m,1} \\ V_{m,2} \\ \vdots \end{pmatrix}$ and $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & & & 0 \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ 0 & & & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$\vec{V}_i, \vec{I}_{HH}, \vec{I}_{stim}$ are vectors similar to \vec{V}_m

We can substitute the internal potential using the following relation:

$$\vec{V}_m = \vec{V}_i - \vec{V}_e$$

$$\frac{d}{dt} \vec{V}_m = \frac{1}{C_m} (-\vec{I}_{HH} + \vec{I}_{stim}) + \frac{1}{C_m R_a} \mathbf{C} \vec{V}_m + \frac{1}{C_m R_a} \mathbf{C} \vec{V}_e$$

For this exercise, we set: $\mathbf{C} \vec{V}_e = 0$ as we do not apply any external potentials

We use this system of differential equations using the implicit Euler method:

$$\frac{dV}{dt} = f(t)$$
$$V(t + \Delta t) = V(t) + \Delta t \cdot f(t + \Delta t)$$

$$\vec{V}_m(t + \Delta t) = \vec{V}_m(t) + \frac{\Delta t}{C_m}(-\vec{I}_{HH}(t + \Delta t) + \vec{I}_{stim}(t + \Delta t)) + \frac{\Delta t}{C_m R_a} \mathbf{C} \vec{V}_m(t + \Delta t)$$

$$\underbrace{\left(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{C_m R_a} \mathbf{C} \right)}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\vec{V}_m(t + \Delta t)}_{\vec{x}} = \underbrace{\vec{V}_m(t) + \frac{\Delta t}{C_m}(-\vec{I}_{HH}(t + \Delta t) + \vec{I}_{stim}(t + \Delta t))}_{\vec{b}}$$

The Result is a linear system of the Type:

$$\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$$

A linear system of the type $\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ can easily be solved:

Matlab: $x = A \setminus b$

Python: $x = \text{solve}(A, b)$

The solve function is provided by the Numpy package `numpy.linalg`

Questions ?