

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Расчетно-графическая работа по линейной алгебре и аналитической
геометрии:

“Аналитическая геометрия”

Работу выполнили:

Андреев Владислав Р3119

Кокорев Михаил Р3119

Петрова Анастасия Р3119

Чежин Павел Андреевич Р3119

Преподаватель:

Правдин Константин


Ментор:

Анастасия Кузьмина

Санкт-Петербург, 2022

Задание №1.

1,2) Обозначим середину стороны $B_1C_1 - N_1$, $BC - N$



3) Чтобы найти координаты в новом базисе, найдем матрицу перехода, для этого выразим векторы нового базиса через старые.

$$\vec{A_1B} = \vec{AA_1} + \vec{AB} = -\vec{AA_1} + \vec{AB}$$

$$\vec{AB} = \vec{A_1B} + \vec{AA_1}$$

$$\vec{AA_1} = \vec{A_1N_1} - \vec{A_1N}$$

$$\vec{A_1N} = \frac{1}{2}\vec{A_1B} + \frac{1}{2}\vec{A_1C}$$

$$\vec{A_1N_1} = \frac{3}{2}\vec{A_1M}$$

$$\vec{AA_1} = \frac{3}{2}\vec{A_1M} - \frac{1}{2}\vec{A_1B} - \frac{1}{2}\vec{A_1C}$$

$$\vec{AB} = \vec{A_1B} + \frac{3}{2}\vec{A_1M} - \frac{1}{2}\vec{A_1B} - \frac{1}{2}\vec{A_1C} = \frac{1}{2}\vec{A_1B} - \frac{1}{2}\vec{A_1C} + \frac{3}{2}\vec{A_1M}$$

$$\vec{A_1C} = \vec{A_1A} + \vec{AC}$$

$$\vec{AC} = \vec{A_1C} + \vec{AA_1} = \vec{A_1C} + \frac{3}{2}\vec{A_1M} - \frac{1}{2}\vec{A_1B} - \frac{1}{2}\vec{A_1C} = \frac{-1}{2}\vec{A_1B} + \frac{1}{2}\vec{A_1C} + \frac{3}{2}\vec{A_1M}$$

$$\vec{AB_1} = \vec{AB} + \vec{AA_1} = \frac{1}{2}\vec{A_1B} - \frac{1}{2}\vec{A_1C} + \frac{3}{2}\vec{A_1M} + \frac{3}{2}\vec{A_1M} - \frac{1}{2}\vec{A_1B} - \frac{1}{2}\vec{A_1C} = -\vec{A_1C} + 3\vec{A_1M}$$

Таким образом, матрица перехода:

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

Найдем обратную матрицу:

$$\det T = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * 3 + 0 + \frac{3}{2} * (-\frac{1}{2}) * (-1) - 0 - (-1) * \frac{3}{2} * \frac{1}{2} - 3 * (-\frac{1}{2}) * (-\frac{1}{2}) = 1.5$$

$$T^* = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1.5 \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -1.5 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$


$$(T^*)^T = \begin{pmatrix} 3 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -1.5 & -1.5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \frac{(T^*)^T}{\det T} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда координаты в новом базисе x'', y'', z''

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x' + y' + \frac{1}{3}z' \\ y' + \frac{1}{3}z' \\ -x' - y' \end{pmatrix}$$

4) Проверим решение построением:



Точка в старых и новых координатах совпадает.

Задание №2.

Множество 1:

1) $4x^2 - 4xy + y^2 + 12x - 6y + 9 = 0$

Решим уравнение как квадратное относительно y :


$$y^2 + y(-4x - 6) + (2x - 3)^2 = 0$$

$$D = (-4x - 6)^2 - 4(2x - 3)^2 = (2(2x - 3))^2 - 4(2x - 3)^2 = 4(2x - 3)^2 - 4(2x - 3)^2 = 0$$

$$y = \frac{4x + 6}{2} = 2x + 3$$

Таким образом, множество задает прямую на плоскости.

2) График кривой:



Множество №2:

$$1) \quad 7x^2 - 24xy - 38x + 24y + 175 = 0$$

Сделаем перенос системы координат так, чтобы коэффициенты a_{13} и a_{23} в общем виде уравнения стали равны 0, для этого должно выполняться условие:

$$\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 = -a_{13} \\ a_{12}x_0 + a_{22}y_0 = -a_{23} \\ 7x_0 - 12y_0 = 19 \\ -12x_0 = -12 \end{cases}$$

$$x_0 = 1, y_0 = -1$$

Тогда новые коэффициенты уравнения:

$$\begin{aligned} a'_{11} &= a_{11} = 7 \\ a'_{12} &= a_{12} = -12 \\ a'_{22} &= a_{22} = 0 \\ a'_{13} &= 0 \\ a'_{23} &= 0 \\ a'_{33} &= a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + 2a_{13}x_0 + 2a_{23}y_0 + a_{33} = 7 + 24 - 38 - 24 + 175 = 144 \end{aligned}$$

Новое уравнение:

$$7x'^2 - 24x'y' + 144 = 0$$

Новые координаты:

$$\begin{cases} x' = x - 1 \\ y' = y + 1 \end{cases}$$

Сделаем поворот системы координат так, чтобы коэффициент a'_{12} стал равен 0.

$$\begin{aligned} a''_{12} &= -\frac{a'_{11} - a'_{22}}{2} \sin 2\varphi + a'_{12} \cos 2\varphi \\ &= -\frac{7}{2} \sin 2\varphi - 12 \cos 2\varphi = 0 \\ 7 \operatorname{tg} 2\varphi + 24 &= 0 \\ 2\varphi &= \operatorname{arctg}\left(\frac{-24}{7}\right) \end{aligned}$$

Тогда новые коэффициенты уравнения:

$$\begin{aligned} a''_{11} &= a'_{12} \sin 2\varphi + \frac{a'_{11} - a'_{22}}{2} \cos 2\varphi + \frac{a'_{11} + a'_{22}}{2} = -12 \sin\left(\operatorname{arctg}\frac{-24}{7}\right) + \frac{7}{2} \cos\left(\operatorname{arctg}\frac{-24}{7}\right) + \frac{7}{2} = 16 \\ a''_{12} &= 0 \\ a''_{22} &= -a'_{12} \sin 2\varphi - \frac{a'_{11} - a'_{22}}{2} \cos 2\varphi - \frac{a'_{11} + a'_{22}}{2} = 12 \sin\left(\operatorname{arctg}\frac{-24}{7}\right) - \frac{7}{2} \cos\left(\operatorname{arctg}\frac{-24}{7}\right) - \frac{7}{2} = -16 \\ a''_{13} &= 0 \\ a''_{23} &= 0 \\ a''_{33} &= a'_{33} = 144 \end{aligned}$$

Новое уравнение:


$$\begin{aligned} 16x''^2 - 16y''^2 + 144 &= 0 \\ \frac{y''^2}{9} - \frac{x''^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

Полученное уравнения является каноническим уравнением гиперболы с фокусами лежащими на оси y'' .

Новые координаты:

$$\begin{cases} x'' = x' \cos \varphi + y' \sin \varphi = 0.8(x-1) - 0.6(y+1) \\ y'' = -x' \sin \varphi + y' \cos \varphi = 0.6(x-1) + 0.8(y+1) \end{cases}$$

2) График кривой:



3) $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{9} = 1$

$a = 3, b = 3$

$c^2 = a^2 + b^2 = 18$

$c = 3\sqrt{2}$

$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{3\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}$

уравнение директрисы d_1 :

$y = \frac{b}{\varepsilon} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

координаты фокус имеет координаты: $F_1(0, c)$

расстояние между фокусом и директрисой:


$p = 3\sqrt{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

уравнения веток гиперболы в полярной системе координат:

$\rho = \frac{\varepsilon p}{1 - \varepsilon \cos \varphi}, \rho = \frac{-\varepsilon p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}$

$$\rho = \frac{3}{1 - \sqrt{2} \cos \varphi}, \rho = \frac{-3}{1 + \sqrt{2} \cos \varphi}$$

4) График кривой в ДПСК и ПСК:



Графики не совпадают, так как в полярном уравнение гиперболы центр координат выбран в фокусе и фокусы расположены на оси совпадающей с осью Ox в ДПСК.


5)

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

$$\frac{\rho^2 \sin^2 \varphi}{9} - \frac{\rho^2 \cos^2 \varphi}{9} = 1$$

$$\rho = \frac{3}{\sqrt{-\cos 2\varphi}}$$

Полярное и каноническое уравнение описывают одну и ту же кривую:




Задание №3.

Даны две точки, расстояние между которыми $2c$. Найдите геометрическое место точек и его уравнение, сумма квадратов расстояний от которых до двух данных равна $2a^2$, $a > c$.

1) Обозначим две данные точки F_1, F_2 , расстояния до этих фокусов — r_1, r_2

Введем систему координат: фокусы расположим на оси Ox , начало координат поместим посередине между фокусами.



2) По условию: $r_1^2 + r_2^2 = 2a^2$

3) $r_1 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$

$$r_2 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

$$(x-c)^2 + y^2 = 4a^4 - 4a^2 \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + (x+c)^2 + y^2$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = 4a^4 - 4a^2 \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + x^2 + 2cx + c^2 + y^2$$

$$4a^2 \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 4a^4 + 4cx$$

$$a^4((x+c)^2 + y^2) = a^8 + 2a^4 cx + c^2 x^2$$


$$a^4 x^2 + 2a^4 cx + a^4 c^2 + a^4 y^2 = a^8 + 2a^4 cx + c^2 x^2$$

$$x^2(a^4 - c^2) + a^4 y^2 + a^4(c^2 - a^4) = 0$$

Поделим обе части уравнения на $a^4(a^4 - c^2)$

$$\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{a^4 - c^2} = 1$$

4) График кривой при $a = 3$, $c = 2$:



Оценочный лист:

Андреев Владислав Р3119 - 100%

Чежин Павел Андреевич Р3119 - 100%

Кокорев Михаил Р3119 - 100%

Петрова Анастасия Р3119 - 100%