

# אלגברה ב' (104168) — אביב 2020-2021

## עוד תרגילים

אלעד צורני

19 באפריל 2021

## 2 מרחבי העתקות

**תרגיל 1.** תהי  $S := \{4\}$  ויהי  $V = \mathbb{R}^S$  מרחב הפונקציות מ- $S$  ל- $\mathbb{R}$ . תהי

$$f: S \rightarrow \mathbb{R} \\ n \mapsto n^2 - 1$$

ותהי

$$m_f: \mathbb{R}^S \rightarrow \mathbb{R}^S \\ g \mapsto fg$$

מצאו בסיס של  $\mathbb{R}^S$  ומטריצה מייצגת של  $m_f$  לפי אותו בסיס.

**פתרון.** נשים לב כי  $B := (\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4)$  בסיס עבור  $\mathbb{R}^S$ , כי זאת קבוצה בלתי־תלויה לינארית וכי עבור כל  $g \in \mathbb{R}^S$  ו- $n \in [4]$  מתקיים

$$g(n) = \sum_{i \in [4]} g(i) \delta_i(n)$$

מתקיים

$$m_f(\delta_1) = f\delta_1 = f(1)\delta_1$$

ובאותו אופן  $m_f(\delta_i) = f(i)\delta_i$  לכל  $i \in [4]$ . לכן

$$[m_f]_B = \begin{pmatrix} f(1) & & & \\ & f(2) & & \\ & & f(3) & \\ & & & f(4) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 3 & & \\ & & 8 & \\ & & & 15 \end{pmatrix}.$$

**תרגיל 2.** הראו כי

$$\dim_{\mathbb{F}} \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) = \dim_{\mathbb{F}}(V) \cdot \dim_{\mathbb{F}}(W)$$

**פתרון.** יהי  $B = (v_1, \dots, v_n)$  בסיס של  $V$  ויהי  $C = (w_1, \dots, w_m)$  בסיס של  $W$ . עבור  $i \in [n], j \in [m]$  תהי

$$\rho_{i,j}: V \rightarrow W \\ \sum_{k \in [n]} \alpha_k v_k \mapsto \alpha_i w_j$$

נראה כי

$$B = (\rho_{1,1}, \dots, \rho_{1,n}, \rho_{2,1}, \dots, \rho_{2,n}, \dots, \rho_{n,1}, \dots, \rho_{n,n})$$

בסיס של  $\text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, W)$ . מספיק להראות שזאת קבוצה בלתי־תלויה לינארית, ואכן אם

$$\rho_{i,j} = \sum_{(k,\ell) \neq (i,j)} \alpha_{k,\ell} \rho_{k,\ell}$$

נקבל

$$\rho_{i,j}(v_i) = w_j$$

אבל

$$\sum_{(k,\ell) \neq (i,j)} \alpha_{k,\ell} \rho_{k,\ell}(v_i) = \sum_{\ell \neq j} \alpha_{i,\ell} w_\ell$$

וזה שונה מ־ $w_j$  כי  $(w_1, \dots, w_m)$  בלתי־תלויה.

**תרגיל 3.** תהי

$$S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\cdot \quad (x, y) \mapsto (-2y, x)$$

נגדיר

$$T: \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2) \rightarrow \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$$

$$\cdot \quad U \mapsto SU$$

יהי

$$B = (\rho_{i,j}) \quad i, j \in [2]$$

כאשר  $\rho_{i,j}$  מוגדרות כמו בסעיף הקודם לפי הבסיסים הסטנדרטיים על  $\mathbb{R}^2$ .

1. מצאו את  $[S]_E$ .

2. מצאו את  $[T]_B$ .

**פתרון.** 1.  $Se_1 = e_2$  וגם  $Se_2 = -2e_1$  לכן

$$\cdot [S]_E = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. מתקיים

$$T\rho_{1,1}e_1 = S\rho_{1,1}e_1 = Se_1 = e_2$$

$$T\rho_{1,1}e_2 = S\rho_{1,1}e_2 = S0 = 0$$

$$T\rho_{1,2}e_1 = S\rho_{1,2}e_1 = Se_2 = -2e_1$$

$$T\rho_{1,2}e_2 = S\rho_{1,2}e_2 = S0 = 0$$

$$T\rho_{2,1}e_1 = S\rho_{2,1}e_1 = S0 = 0$$

$$T\rho_{2,1}e_2 = S\rho_{2,1}e_2 = Se_1 = e_2$$

$$T\rho_{2,2}e_1 = S\rho_{2,2}e_1 = S0 = 0$$

$$T\rho_{2,2}e_2 = S\rho_{2,2}e_2 = Se_2 = -2e_1$$

לכן

$$T\rho_{1,1} = \rho_{1,2}$$

$$T\rho_{1,2} = -2\rho_{1,1}$$

$$T\rho_{2,1} = \rho_{2,2}$$

$$T\rho_{2,2} = -2\rho_{2,1}$$

ולכן

$$\cdot [T]_B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}$$

## סכומים ישרים

**הגדרה 2.1 (מכפלה של מרחבים וקטוריים).** יהי  $\mathcal{S}$  אוסף סדור (לאו דווקא סופי או בן־מנייה) של מרחבים וקטוריים מעל שדה  $\mathbb{F}$  (עם חזרות). נגדיר את המכפלה

$$\prod_{V \in \mathcal{S}} V$$

להיות המכפלה התורת־קבוצתית עם חיבור וכפל בסקלר רכיב רכיב. אם  $\mathcal{S} = (V_1, \dots, V_n)$  סופי, נכתוב לפעמים

$$V_1 \times \dots \times V_n := \prod_{V \in \mathcal{S}} V$$

אם כל איברי  $\mathcal{S}$  שווים לאותו מרחב  $V$  נכתוב לפעמים

$$V^{|\mathcal{S}|} := \prod_{V \in \mathcal{S}} V$$

**תרגיל 4.** תהי  $\mathcal{S} := \{4\}$  ויהי  $V = \mathbb{R}^S$  מרחב הפונקציות מ־ $S$  ל־ $\mathbb{R}$ . תהי

$$\begin{aligned} f: S &\rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto n^2 - 1 \end{aligned}$$

ותהי

$$\begin{aligned} m_f: \mathbb{R}^S &\rightarrow \mathbb{R}^S \\ g &\mapsto fg \end{aligned}$$

מצאו בסיס של  $\mathbb{R}^S$  ומטריצה מייצגת של  $m_f$  לפי אותו בסיס.

**פתרון.** נשים לב כי  $B := (\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4)$  בסיס עבור  $\mathbb{R}^S$ , כי זאת קבוצה בלתי־תלויה לינארית וכי עבור כל  $g \in \mathbb{R}^S$  ו־ $n \in [4]$  מתקיים

$$g(n) = \sum_{i \in [4]} g(i) \delta_i(n)$$

מתקיים

$$m_f(\delta_1) = f\delta_1 = f(1)\delta_1$$

ובאותו אופן  $m_f(\delta_i) = f(i)\delta_i$  לכל  $i \in [4]$ . לכן

$$\begin{aligned} [m_f]_B &= \begin{pmatrix} f(1) & & & \\ & f(2) & & \\ & & f(3) & \\ & & & f(4) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 3 & & \\ & & 8 & \\ & & & 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**תרגיל 5.** 1. הראו שמתקיים

$$\dim_{\mathbb{F}}(V \times W) = \dim_{\mathbb{F}} V + \dim_{\mathbb{F}} W$$

2. הראו שמתקיים

$$\dim_{\mathbb{F}} \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) = (\dim_{\mathbb{F}} V)(\dim_{\mathbb{F}} W)$$

3. הסיקו שמתקיים

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W_1 \times \dots \times W_n) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W_1) \times \dots \times \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W_n)$$

וגם

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \times \dots \times V_n, W) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W) \times \dots \times \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_n, W)$$

## פתרון.

**הגדרה 2.2 (מכפלה של העתקות).** תהי קבוצה סדורה עם חזרות, יהיו  $(V_i)_{i \in \mathcal{I}}, (W_i)_{i \in \mathcal{I}}$  מרחבים וקטוריים ויהיו  $(T_i)_{i \in \mathcal{I}}$  העתקות לינאריות כך ש-

$$T_i: V_i \rightarrow W_i$$

נגדיר את המכפלה

$$\prod_{i \in \mathcal{I}} T_i: \prod_{i \in \mathcal{I}} V_i \rightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} W_i$$

$$\cdot (v_i)_{i \in \mathcal{I}} \mapsto (T_i v_i)_{i \in \mathcal{I}}$$

אם  $\mathcal{I}$  סופית, ניקח בדרך כלל  $\mathcal{I} = [n]$  ואז נכתוב לפעמים

$$T_1 \times T_2 \times \dots \times T_n := \prod_{i \in [n]} T_i$$

**תרגיל 6.** 1. יהיו  $V_1 := \mathbb{R}^3$  עם הבסיס הסטנדרטי  $B_1 = (e_1, e_2, e_3)$  ו- $V_2 := \mathbb{R}^2$  עם הבסיס הסטנדרטי  $B_2 = (f_1, f_2)$ .

יהי  $B = (e_1, e_2, e_3, f_1, f_2)$  בסיס של  $V_1 \times V_2$ , ותהיינה

$$T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}$$

ו

$$T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$$

חשבו את  $(T_1 \times T_2)_B$ .

2. יהיו  $(V_i)_{i \in [n]}$  מרחבים וקטוריים עם בסיסים

$$B_i := (v_1^{(i)}, \dots, v_{k_i}^{(i)})$$

בהתאמה. לכל  $i \in [n]$  תהי  $T_i \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_i, V_i)$ . יהי

$$B = (v_1^{(1)}, \dots, v_{k_1}^{(1)}, \dots, v_1^{(n)}, \dots, v_{k_n}^{(n)})$$

הראו כי

$$[T_1 \times \dots \times T_n]_B$$

מטריצה אלקסונית בלוקים.  $(k_1, \dots, k_n)$

**תרגיל 7.** תהי  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  ויהיו  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$  הערכים העצמיים השונים של  $T$ . נראה בתרגיל זה כי  $T$  לכסינה אם ורק אם

$$V = \bigoplus_{i \in [k]} V_{\lambda_i}$$

1. נניח כי

$$V = \bigoplus_{i \in [k]} V_{\lambda_i}$$

הראו כי יש בסיס של  $V$  שמורכב מוקטורים עצמיים של  $T$  והסיקו כי  $T$  לכסינה.

2. נניח כי  $T$  לכסינה. הראו שניתן לכתוב

$$V = \bigoplus_{i \in [k]} V'_{\lambda_i}$$

עבור  $V'_{\lambda_i} \subseteq V_{\lambda_i}$  לכל  $i \in [k]$ .

3. הראו תחת הנחות הסעיף הקודם שמתקיים  $V'_{\lambda_i} = V_{\lambda_i}$  והסיקו כי במקרה זה

$$V = \bigoplus_{i \in [k]} V_{\lambda_i}$$

**תרגיל 8.** יהיו  $V, W$  מרחבים וקטוריים  $n$ -מימדיים מעל  $\mathbb{F}$ . תהי  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  ויהי  $\lambda \in \mathbb{F}$  עם מרחב עצמי  $V_{\lambda}$ . נקרא ל- $\dim_{\mathbb{F}} V_{\lambda}$  הריבוי הגיאומטרי של  $\lambda$  כערך עצמי של  $T$ .

1. תהי  $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(W)$  ויהי  $P \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$  איזומורפיזם עבורו  $T = P^{-1}SP$ . הראו של- $T, S$  אותם ערכים עצמיים מאותם ריבויים גיאומטריים.

2. הסיקו ש- $S$  לכסינה אם ורק אם  $T$  לכסינה.

3. נניח כי  $T$  לכסינה ותהי  $S' \in \text{End}_{\mathbb{F}}(W)$  עם אותם ערכים עצמיים וריבויים גיאומטריים כמו של  $T$ . הראו כי  $T \sim S'$ .

**תרגיל 9 (נילפוטנטיות).** העתקה לינארית  $T: V \rightarrow V$  נקראת נילפוטנטית אם קיים  $n \in \mathbb{N}_+$  עבורו  $T^n = 0$ . המינימלי המקיים זאת נקרא האינדקס של  $T$ .

1. הראו שצירוף לינארי של העתקות נילפוטנטיות הוא נילפוטנטי.

2. הראו שעבור  $T: V \rightarrow V$  נילפוטנטית מתקיים  $\det(T) = \text{tr}(T) = 0$ .

3. הראו שעבור  $T: V \rightarrow V$  נילפוטנטית הערך העצמי היחיד הוא 0. הסיקו שעבור  $T$  נילפוטנטית ולכסינה מתקיים  $T = 0$ .

4. תהי  $T$  נילפוטנטית. הראו שההעתקות  $\text{Id}_V \pm T$  הפיכות.

**רמז:** נסו לחשוב על ההופכי של  $1 \pm x$  כאשר  $x$  מספר.

5. יהי  $V$  מרחב וקטורי ממימד  $n \in \mathbb{N}_+$  ותהי  $T$  נילפוטנטית מאינדקס  $k$ . לכל  $i \in [k]$  נסמן  $n_i := \dim \ker T^i$ . הראו שמתקיים

$$0 < n_1 < n_2 < \dots < n_{k-1} < n_k = n$$

6. יהי  $V$  מרחב וקטורי ממימד  $n \in \mathbb{N}_+$  ותהי  $T: V \rightarrow V$  יהי  $B = (v_1, \dots, v_n)$  בסיס של  $V$  ותהי

$$T: V \rightarrow V$$

$$v_1 \mapsto 0$$

$$\forall i > 1: v_i \mapsto v_{i-1}$$

הראו כי  $T$  נילפוטנטית מאינדקס  $n$  וכיתבו את  $[T]_B$ .

7. נאמר כי  $A \in M_n(\mathbb{F})$  נילפוטנטית אם  $L_A$  נילפוטנטית.

תהי  $A \in M_n(\mathbb{F})$  אלכסונית בלוקים  $(m_1, \dots, m_k)$  כאשר כל בלוק  $A_i$  נילפוטנטי מאינדקס  $n_i$ . הראו ש- $A$  נילפוטנטית מאינדקס  $\max_{i \in [k]} (n_i)$ .

8. יהי  $V$  מרחב וקטורי ממימד  $n \in \mathbb{N}_+$  ותהי

$$0 < n_1 < n_2 < \dots < n_{k-1} < n_k = n$$

סדרת מספרים.

הראו שיש העתקה  $T: V \rightarrow V$  כך שמתקיים  $n_i = \dim \ker T^i$  לכל  $i \in [k]$ .

**תרגיל 10.** פולינום  $p \in \mathbb{F}[x]$  נקרא מתוקן אם המקדם המוביל שלו שווה 1. עבור פולינום כזה ממעלה  $n \in \mathbb{N}$  נכתוב

$$p(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$$

כאשר  $c_n = 1$ , ונגדיר את המטריצה המלווה של  $p$  על ידי

$$C(p) := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{F})$$

1. יהי  $p \in \mathbb{F}[x]$  ממעלה  $n \in \mathbb{N}$ . מצאו את הפולינום המינימלי של  $C(p)$ .  
 רמז: השתמשו בעובדה שהפולינום המינימלי של מטריצה  $A$  שווה ל- $\det(xI - A)$  וחשבו את הדטרמיננטה לפי השורה הראשונה.

2. הראו שהתנאים הבאים שקולים עבור  $A \in M_n(\mathbb{F})$ .

(i)  $A$  דומה ל- $C(p_A)$ .

(ii) לכל פולינום  $p \in \mathbb{F}_{n-1}[x]$  מתקיים  $p(A) \neq 0$ .

(iii) יש וקטור  $v \in \mathbb{F}^n$  ציקלי עבור  $A$  במובן שהקבוצה  $\{v, Av, \dots, A^{n-1}v\}$  היא בסיס של  $V$ .