




אלגברה ב' (01040168)

אביב 2026

רשימות תרגולים

אלן סורני

הרשימות עודכנו לאחרונה בתאריך ה-21 ביוני 2026

תוכן העניינים

2	I חלק ראשון - מרחבים שמורים
3	1 חזרה על מטריצות מייצגות
3	1.1 הגדרות ותכונות בסיסיות
4	1.2 תרגילים
7	2 הדטרמיננטה
7	2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות
7	2.2 תרגילים
9	2.3 הדטרמיננטה לפי תמורות
14	2.4 כלל קרמר
14	2.4.1 מוטיבציה
15	2.4.2 תרגילים
18	2.5 המטריצה המצורפת
18	2.5.1 מוטיבציה
19	2.5.2 תרגילים
22	2.6 הפולינום האופייני, ולכסינות
22	2.6.1 הגדרות ותכונות בסיסיות
23	2.6.2 תרגילים
30	3 משפט ז'ורדן
30	3.1 משפט קיליהמילטון
30	3.1.1 חזרה
30	3.1.2 תרגילים
35	3.2 סכומים ישירים
35	3.2.1 חזרה
35	3.2.2 תרגילים
36	3.3 הטלות
37	3.3.1 חזרה
37	3.3.2 תרגילים
38	3.4 מרחבים שמורים
41	3.5 צורת ז'ורדן
46	II מרחבי מכפלות פנימיות
47	4 מכפלות פנימיות וניצבות
47	4.1 מוטיבציה
47	4.2 מכפלות פנימיות
49	4.3 בסיסים אורתונורמליים והמרחב הניצב
54	5 אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית
54	5.1 המרחב הדואלי, ומשפט ההצגה של ריס
56	5.2 ההעתקה הצמודה

סימונים

$[n] = \{1, \dots, n\}$ -

$\sum_{i \in [n]} a_i = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ -

$M_{m \times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו- n עמודות, עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$. -

$\mathbb{F}^n = M_{n \times 1}(\mathbb{F})$ -

$M_n(\mathbb{F}) = M_{n \times n}(\mathbb{F})$ -

$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ הוא מרחב ההעתקות הלינאריות $V \rightarrow W$ כאשר V, W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$. -

$\text{End}_{\mathbb{F}}(V) = \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V)$ -

- אותיות בפורנט mathcal עבור בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ וכו'

חלק I

חלק ראשון - מרחבים שמורים

פרק 1

חזרה על מטריצות מייצגות

1.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 1.1.1 (וקטור קואורדינטות). יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V ויהי

$v \in V$. וקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס $\mathcal{B}$ הוא הוקטור $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ היחידים עבורם

$$v = \sum_{i \in [n]} \alpha_i v_i := \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

הערה 1.1.2. ההעתקה

$$\begin{aligned} \rho_{\mathcal{B}}: V &\rightarrow \mathbb{F}^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

היא איזומורפיזם לינארי.

הגדרה 1.1.3 (מטריצה מייצגת). יהיו V, W מרחבים וקטורים סוף־מימדיים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ בהתאמה, ונסמן

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$$

נסמן גם $n := \dim(V)$ ו- $m := \dim(W)$. עבור $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ נגדיר

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(v_n)]_{\mathcal{C}} \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$$

משפט 1.1.4 (כפל מטריצות). תהי $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ויהי $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_m)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^m$. אז:

(i) לכל $i \in [m]$ מתקיים כי Ae_i העמודה ה- i של A .

$$AB = \begin{pmatrix} | & & | \\ Ab_1 & \cdots & Ab_{\ell} \\ | & & | \end{pmatrix} \text{ מתקיים } B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \cdots & b_{\ell} \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{n \times \ell}(\mathbb{F}) \text{ לכל (ii)}$$

תרגיל 1.1. הראו שניתן לשחזר את ההגדרה של כפל מטריצות משתי התכונות במשפט.

הערה 1.1.5. ההעתקה

$$\begin{aligned} \eta_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}: \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) &\rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F}) \\ T &\mapsto [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

היא איזומורפיזם לינארי.

טענה 1.1.6. תהי $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V ו- $\mathcal{C}$ בסיס של W . אז

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}} = [T(v)]_{\mathcal{C}}$$

לכל $v \in V$.

סימון 1.1.7. אם $\mathcal{B}$ בסיס של מרחב וקטורי סוף-מימדי V ואם $T \in \text{End}(V)$, נסמן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} := [T]_{\mathcal{B}}$ ונקרא למטריצה זאת המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס $\mathcal{B}$.

סימון 1.1.8. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי עם בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$. נסמן $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} := [\text{Id}_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$.

סימון 1.1.9. אם $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$, נסמן

$$\begin{aligned} T_A: \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^n \\ v &\mapsto Av \end{aligned}$$

1.2 תרגילים

תרגיל 1.2. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ ויהי $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. הראו כי $[T_A]_{\mathcal{E}} = A$.

פתרון. לפי הגדרת מטריצה מייצגת, העמודה ה- i של $[T_A]_{\mathcal{E}}$ היא $T_A(e_i) = Ae_i$. לפי הגדרת כפל מטריצות, וכפי שראינו באלגברה א', זאת בדיוק העמודה ה- i של A .

תרגיל 1.3. יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינום הממשיים ממעלה לכל היותר 3, תהי

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}_3[x] &\rightarrow \mathbb{R}_3[x] \\ p(x) &\mapsto p(x+1) \end{aligned}$$

ויהי $\mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3)$ בסיס של V . כיתבו את $[T]_{\mathcal{B}}$.

פתרון. לפי הגדרת המטריצה המייצגת, עמודות $[T]_{\mathcal{B}}$ הן $[T(x^i)]_{\mathcal{B}}$ עבור $i \in \{0, 1, 2, 3\}$. מתקיים

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(x) &= x+1 = 1+x \\ T(x^2) &= (x+1)^2 = 1+2x+x^2 \\ T(x^3) &= (x+1)^3 = 1+3x+3x^2+x^3 \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} [T(1)]_{\mathcal{B}} &= e_1 \\ [T(x)]_{\mathcal{B}} &= e_1 + e_2 \\ [T(x^2)]_{\mathcal{B}} &= e_1 + 2e_2 + e_3 \\ [T(x^3)]_{\mathcal{B}} &= e_1 + 3e_2 + 3e_3 + e_4 \end{aligned}$$

ואז

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

תרגיל 1.4. יהי $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$, תהי

$$\begin{aligned} T: V &\rightarrow V \\ A &\mapsto \frac{1}{2}(A - A^t) \end{aligned}$$

ויהי

$$\mathcal{E} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2}) := \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

הבסיס הסטנדרטי של V . כיתבו את $[T]_{\mathcal{E}}$.

פתרון. כמו מקודם, נחשב את $[T(E_{i,j})]_{\mathcal{E}}$ כיוון שאלו עמודות $[T]_{\mathcal{E}}$. מתקיים

$$\begin{aligned} T(E_{1,1}) &= \frac{1}{2}(E_{1,1} - E_{1,1}) = 0 \\ T(E_{1,2}) &= \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2}E_{1,2} - \frac{1}{2}E_{2,1} \\ T(E_{2,1}) &= \frac{1}{2}(E_{2,1} - E_{1,2}) = \frac{1}{2}E_{2,1} - \frac{1}{2}E_{1,2} \\ ,T(E_{2,2}) &= \frac{1}{2}(E_{2,2} - E_{2,2}) = 0 \end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned} [T(E_{1,1})]_{\mathcal{E}} &= 0 \\ [T(E_{1,2})]_{\mathcal{E}} &= \frac{1}{2}e_2 - \frac{1}{2}e_3 \\ [T(E_{2,1})]_{\mathcal{E}} &= -\frac{1}{2}e_2 + \frac{1}{2}e_3 \\ [T(E_{2,2})]_{\mathcal{E}} &= 0 \end{aligned}$$

ואז

$$, [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

בנדרש.

תרגיל 1.5. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ונניח כי לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $Av = Bv$. אז $A = B$.

פתרון. מהנתון, מתקיים $(A - B)v = 0$ לכל $v \in \mathbb{F}^n$. בפרט העמודה ה- i של $A - B$, שהינה $(A - B)e_i$, שווה ל-0. לכן $A - B = 0$.

טענה 1.2.1. יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים סוף-מימדיים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ בהתאמה, ותהיינה

$$\begin{aligned} S &\in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V) \\ T &\in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \end{aligned}$$

אז

$$. [T \circ S]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

תרגיל 1.6. תהיינה

$$\begin{aligned} A &:= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \\ .B &:= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

מבלי לכפול מטריצות, מיצאו העתקה לינארית $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ עבורה $[T]_{\mathcal{E}} = AB$.

פתרון. יהי $\mathcal{E}$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$. לפי הטענה האחרונה, מתקיים

$$[T_A \circ T_B]_{\mathcal{E}} = [T_A]_{\mathcal{E}} [T_B]_{\mathcal{E}}$$

אך כפי שראינו מתקיים

$$\begin{aligned} [T_A]_{\mathcal{E}} &= A \\ [T_B]_{\mathcal{E}} &= B \end{aligned}$$

ולכן בסך הכל

$$[T_A \circ T_B] = AB$$

ובחר את האופרטור $T = T_A \circ T_B$ שיקיים $[T]_{\mathcal{E}} = AB$ בנדרש.
נחשב אותו מפורשות. מתקיים

$$\begin{aligned} T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} (xe_1 + ye_2) \\ &= x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} e_1 + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} e_2 \\ &= x \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ובן

$$\begin{aligned} T_B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} e_1 + y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} e_2 \\ &= x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= (T_A \circ T_B) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= T_A \left(T_B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) \\ &= T_A \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

בנדרש.

פרק 2

הדטרמיננטה

2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 2.1.1 (דטרמיננטה). תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$. נגדיר את הדטרמיננטה של A באופן הרקורסיבי הבא. תהי $A_{(i,j)}$ המטריצה המתקבלת מ- A על ידי הסרת השורה ה- i והעמודה ה- j . המספר $\det(A_{(i,j)})$ נקרא המינור ה- (i,j) של A והדטרמיננטה של A שווה

$$\det(A) = \sum_{i \in [n]} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{(i,j)})$$

עבור כל $j \in [n]$ קבוע, ושווה

$$\det(A) = \sum_{j \in [n]} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{(i,j)})$$

עבור כל $i \in [n]$ קבוע.

משפט 2.1.2. תהיינה $A, B, C \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ ונניח כי C הפיכה. מתקיימות התכונות הבאות.

$$1. \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

$$2. \det(C^{-1}) = (\det(C))^{-1}$$

משפט 2.1.3. 1. החלפת שתי שורות או עמודות במטריצה כופלת את הדטרמיננטה ב- (-1) .

2. כפל שורה או עמודה במטריצה בסקלר α כופל את הדטרמיננטה ב- α .

3. הוספת כפולה שורה או עמודה לשורה או עמודה במטריצה אינה משנה את הדטרמיננטה.

2.2 תרגילים

תרגיל 2.1. חשבו את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות.

1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

2.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$$

.3

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

.4

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

פתרון. 1. נחשב לפי השורה הראשונה.

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} &= 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} + 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= 1 \cdot (5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 2 \cdot (4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) + 3 \cdot (4 \cdot 8 - 5 \cdot 7) \\ &= 1 \cdot (-3) - 2 \cdot (-6) + 3 \cdot (-3) \\ &= -3 + 12 - 9 \\ &= 0 \end{aligned}$$

2. החלפת שורות בופלת את הדטרמיננטה ב (-1) . כיוון שניתן לקבל את המטריצה ממטריצת היחידה על ידי החלפת השורות 1, 4 והשורות 2, 3, נקבל כי הדטרמיננטה שווה לזאת של היחידה. לכן

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$$

3. הוספת כפולה של השורות הראשונה והשנייה ב (-1) לשורה השלישית לא משנה את הדטרמיננטה. לכן הדטרמיננטה של המטריצה שווה לזאת של היחידה, ולכן

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

4. הוספת כפולה של השורות הראשונה והשנייה ב (-1) לשורה השלישית לא משנה את הדטרמיננטה. לכן הדטרמיננטה של המטריצה שווה לזאת של

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כיוון שהשורה השלישית היא שורת אפסים, אם נפתח את הדטרמיננטה לפיה נקבל שהדטרמיננטה שווה 0. זה נכון באופן כללי יותר אם השורות תלויות לינארית, כי נוכל לקבל שורת אפסים מצירוף לינארי של השורות.

תרגיל 2.2. תהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ העתקה לינארית ויהי $\mathcal{B}$ בסיס של V . הראו כי ניתן להגדיר $\det(T) = \det([T]_{\mathcal{B}})$. כלומר, הראו שאם $\mathcal{C}$ בסיס נוסף של V מתקיים $\det([T]_{\mathcal{B}}) = \det([T]_{\mathcal{C}})$.

פתרון. מתקיים

$$[T]_{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}})^{-1} [T]_{\mathcal{C}} M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

ולכן

$$\det([T]_B) = \det\left((M_C^B)^{-1}\right) \det([T]_C) \det(M_C^B)$$

כיוון ש- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ לכל מטריצה A , מתקיים $\det\left((M_C^B)^{-1}\right) = \frac{1}{\det(M_C^B)}$. לכן, נקבל בסה"כ כי

$$\det([T]_B) = \det([T]_C)$$

בנדרש.

2.3 הדטרמיננטה לפי תמורות

הגדרה 2.3.1 (תמורות על n איברים). העתקה

$$\sigma: [n] \rightarrow [n]$$

נקראת תמורה על $[n]$ אם היא חד-חד-ערכית ועל. אוסף כל התמורות על $[n]$ מסומן S_n , ונסמן $\sigma\tau$ עבור ההרכבה של σ של איברים בו.

הגדרה 2.3.2 (חילוף). תמורה $\sigma \in S_n$ נקראת חילוף אם קיימים $i, j \in [n]$ שונים עבורם

$$\sigma(i) = j$$

$$\sigma(j) = i$$

$$\forall k \in [n] \setminus \{i, j\} : \sigma(k) = k$$

סימון 2.3.3. נסמן תמורה $\sigma \in S_n$ בתור $\sigma = (\sigma(1), \dots, \sigma(n))$, וחילוף τ בין איברים n, m בתור $(n; m)$.

הגדרה 2.3.4 (סימן של תמורה). ראיתן בהרצאה כי כל תמורה σ ניתן לכתובה כהרכבה של חילופים $\tau_1, \dots, \tau_m$, וכי אם היא הרכבה גם של חילופים $\tau'_1, \dots, \tau'_k$ אז $(-1)^m = (-1)^k$.

לכן, ניתן להגדיר את הסימן של תמורה σ בתור $(-1)^k$ כאשר k מספר החילופים בהצגת σ כהרכבת חילופים. נסמנו $\text{sgn}(\sigma)$.

תרגיל 2.3. חשבו את הסימן של התמורה

$$\sigma := (n, 1, 2, \dots, (n-1)) \in S_n$$

פתרון. הסימן של σ הוא (-1) בחזקת מספר החילופים בהצגת σ כהרכבת חילופים. אם נמצא חילופים $\tau_1, \dots, \tau_k$ עבורם

$$\tau_k \circ \dots \circ \tau_1 \sigma = \text{Id}_{[n]}$$

נקבל כי

$$\sigma^{-1} = \tau_k \circ \dots \circ \tau_1$$

ולכן

$$\begin{aligned} \sigma &= (\tau_k \circ \dots \circ \tau_1)^{-1} \\ &= \tau_1^{-1} \circ \dots \circ \tau_k^{-1} \\ &= \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k \end{aligned}$$

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^k$$

נבצע חילופים כאלו כאשר נדאג, משמאל לימין, שהערכים של התמורה החדשה נשלחים לעצמם. מתקיים

$$(1; n) \sigma = (1, n, 2, 3, \dots, (n-1))$$

$$(2; n) (1; n) \sigma = (1, 2, n, 3, \dots, (n-1))$$

$$\vdots$$

$$(n-1; n) \circ \dots \circ (1; n) \sigma = \text{Id}_{[n]}$$

ולכן

$$\sigma = (1; n) (2; n) \circ \dots \circ (n-1; n)$$

ואז

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-1}$$

בנדרש.

בהרצאות הקרובות, תיראו כי ניתן לחשב דטרמיננטה בעזרת תמורות באופן הבא.

טענה 2.3.5. תהי $A = (a_{i,j})_{i,j \in [n]} \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \prod_{i \in [n]} a_{i, \sigma(i)}$$

הערה 2.3.6. כל תמורה ב- S_n מתאימה לבחירה של סדר על איברי $[n]$, ולכן בסכום מתאימה לבחירה של מקדם מכל שורה, כך שמכל עמודה נבחר רק מקדם אחד. נסכום את מכפלות המקדמים מהבחירות השונות, כאשר חלק מהמכפלות האלו יסכמו בסימן שלילי, לפי סימן התמורות המתאימות להן. למשל, אם

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

נסתכל על התמורות ב- S_2 :

$$\sigma_1 := (1, 2), \sigma_2 := (2, 1)$$

ומתקיים

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn}(\sigma_1) &= \operatorname{sgn}((1, 2)) = \operatorname{sgn}(\operatorname{Id}_{[2]}) = (-1)^0 = 1 \\ \operatorname{sgn}(\sigma_2) &= \operatorname{sgn}((2, 1)) = (-1)^1 = -1 \end{aligned}$$

הדטרמיננטה, לפי ההגדרה, היא

$$\begin{aligned} \left(\operatorname{sgn}(\sigma_1) \prod_{i \in [2]} a_{i, \sigma_1(i)} \right) + \left(\operatorname{sgn}(\sigma_2) \prod_{i \in [2]} a_{i, \sigma_2(i)} \right) &= a_{1, \sigma_1(1)} a_{2, \sigma_1(2)} - a_{1, \sigma_2(1)} a_{2, \sigma_2(2)} \\ &= a_{1,1} a_{2,2} - a_{1,2} a_{2,1} \\ &= 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \\ &= -2 \end{aligned}$$

כאשר הגורם בסכום הנ"ל שמתאים לתמורה (12) הוא המכפלה של המקדם ה-1 בשורה הראשונה והמקדם ה-2 בשורה השנייה, והגורם המתאים לתמורה (21) הוא (מינוס) המכפלה של המקדם ה-2 בשורה ה-1 והמקדם ה-1 בשורה השנייה, כפול סימן התמורה שהוא -1.

תרגיל 2.4. חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה הבאה לפי תמורות.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

פתרון. נרשום את כל איברי S_3 . הם

$$\begin{aligned} \operatorname{Id}_{S_3} &= (1, 2, 3), \\ &(1, 3, 2), \\ &(2, 1, 3), \\ &(2, 3, 1), \\ &(3, 1, 2), \\ &(3, 2, 1). \end{aligned}$$

עבור כל אחד מהאיברים, נפעיל חילופים משמאל כדי להביא אותו ליחידה, ומספר החילופים יהיה החזקה של (-1) בסימן של התמורה. אם הגענו לתמורה קודמת, מספר החילופים שנתנו זהה הוא מספר החילופים שכבר מצאנו בחישוב קודם.

$$\begin{aligned} \operatorname{Id}_{S_3} = \operatorname{Id}_{S_3} &\implies \operatorname{sgn}(\operatorname{Id}_{S_3}) = 1 \\ (2; 3) \circ ((1, 3, 2)) &= ((1, 2, 3)) = \operatorname{Id}_{S_3} \implies \operatorname{sgn}((1, 3, 2)) = -1 \\ (1; 2) \circ ((2, 1, 3)) &= ((1, 2, 3)) = \operatorname{Id}_{S_3} \implies \operatorname{sgn}((2, 1, 3)) = -1 \\ (1; 2) \circ ((2, 3, 1)) &= ((1, 3, 2)) \implies \operatorname{sgn}((2, 3, 1)) = -1 \cdot \operatorname{sgn}((1, 3, 2)) = 1 \\ (1; 3) \circ ((3, 1, 2)) &= ((1, 3, 2)) \implies \operatorname{sgn}((3, 1, 2)) = (-1) \cdot \operatorname{sgn}((1, 3, 2)) = 1 \\ (1; 3) \circ ((3, 2, 1)) &= ((1, 2, 3)) = \operatorname{Id}_{S_3} \implies \operatorname{sgn}((3, 2, 1)) = -1 \end{aligned}$$

לכן נקבל

$$\begin{aligned}\det(A) &= 1 \cdot 5 \cdot 9 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 - 3 \cdot 5 \cdot 7 \\ &= 45 - 48 - 72 + 84 + 96 - 105 \\ &= 0.\end{aligned}$$

תרגיל 2.5. חשבו בעזרת תמורות את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} X & 0_{m \times k} \\ 0_{k \times m} & Y \end{pmatrix}$$

עבור $X \in M_m(\mathbb{F}), Y \in M_k(\mathbb{F})$.**פתרון.** 1. במטריצה A , הדרך היחידה לבחור מקדם מכל שורה כך שאין שני מקדמים באותה עמודה היא זאת:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \boxed{1} \\ \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן,

$$\det(A) = \operatorname{sgn}((3, 4, 1, 2)) \cdot 1^4$$

מתקיים $(3, 4, 1, 2) = (1; 3)(2; 4)$ ולכן

$$\det(A) = \operatorname{sgn}((3, 4, 1, 2)) = (-1)^2 = 1$$

2. במטריצה B אם נבחר את המקדם ה-1 בשורה הראשונה, נצטרך לבחור את המקדם ה-4 בשורה האחרונה (כי צריך להיות מקדם בעמודה ה-4, ואז את המקדם ה-3 בשורה השלישית (כי צריך להיות מקדם בעמודה ה-3), ואת המקדם ה-2 בשורה השנייה. כלומר, התמורה σ_1 היחידה עבורה $\sigma_1(1) = 1$ שנצטרך להסתכל עליה בסכום היא $\sigma_1 = \operatorname{Id}_{[4]}$ והגורם המתאים בחישוב הדטרמיננטה הוא

$$\operatorname{sgn}(\operatorname{Id}_{[4]}) \prod_{i \in [4]} b_{i,i} = 1$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 1 \\ 1 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \boxed{1} \end{pmatrix}$$

באופן דומה, אם בשורה הראשונה נבחר את המקדם ה-1, נצטרך בשורה האחרונה לבחור את המקדם ה-3 ונקבל בסוף את בחירת המקדמים הבאה, המתאימה לתמורה $\sigma_2 := (4, 1, 2, 3)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ראינו בתרגיל קודם שסימן תמורה זאת הוא $\text{sgn } \sigma_2 = (-1)^{4-1} = -1$ ולכן בסך הכל נקבל כי

$$\det(B) = 1 + (-1) = 0$$

3. נסמן $n = m + k$ לפי ההגדרה,

$$\det(C) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i \in [n]} c_{i, \sigma(i)}$$

נשים לב כי אם $\sigma(i) = j$ עבור $1 \leq i \leq m$ ועבור $m+1 \leq j \leq m+k$, המקדם $c_{i,j}$ הוא מקדם של המטריצה $0_{m \times k}$, שהוא 0. באופן דומה, $c_{i,j} = 0$ כאשר $m+1 \leq i \leq m+k$ וגם $1 \leq j \leq m$. לכן, כל תמורה שתורמת לסכום בדטרמיננטה היא הרכבה של תמורה על m האיברים הראשונים של $[n]$ שמקבעת את שאר האיברים, ותמורה של k האיברים שאחריהם שמקבעת את האיברים הראשונים.

נסמן

$$S := \{\sigma \in S_n \mid \forall i > m : \sigma(i) = i\}$$

$$S' := \{\sigma \in S_n \mid \forall i \leq m : \sigma(i) = i\}$$

ואז נקבל כי

$$\begin{aligned} \det(C) &= \sum_{\substack{\sigma_1 \in S \\ \sigma_2 \in S'}} \text{sgn}(\sigma_1 \sigma_2) \left(\prod_{i=1}^m c_{i, \sigma_1(i)} \right) \left(\prod_{i=m+1}^{m+k} c_{i, \sigma_2(i)} \right) \\ &= \sum_{\substack{\sigma_1 \in S_m \\ \sigma_2 \in S_k}} \text{sgn}(\sigma_1) \text{sgn}(\sigma_2) \left(\prod_{i=1}^m x_{i, \sigma_1(i)} \right) \left(\prod_{i=1}^k y_{i, \sigma_2(i)} \right) \\ &= \sum_{\sigma_1 \in S_m} \text{sgn}(\sigma_1) \left(\prod_{i=1}^m x_{i, \sigma_1(i)} \right) \underbrace{\sum_{\sigma_2 \in S_k} \text{sgn}(\sigma_2) \left(\prod_{i=1}^k y_{i, \sigma_2(i)} \right)}_{\det(Y)} \\ &= \det(Y) \underbrace{\sum_{\sigma_1 \in S_m} \text{sgn}(\sigma_1) \left(\prod_{i=1}^m x_{i, \sigma_1(i)} \right)}_{\det(X)} \\ &= \det(Y) \det X \\ &= \det(X) \det Y \end{aligned}$$

בנדרש.

הערה 2.3.7. שימו לב כי נובע באינדוקציה מהסעיף האחרון כי עבור מטריצה אלבסונית בלוקים, כלומר כזאת מהצורה

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & A_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A_k \end{pmatrix}$$

עבור $A_i \in M_{m_i}(\mathbb{F})$ ועבור $m_i \in \mathbb{N}_+$, מתקיים כי

$$\det(A) = \prod_{i \in [k]} \det(A_i)$$

תרגיל 2.6. הראו לפי נוסחת הדטרמיננטה לפי תמורות כי הדטרמיננטה של מטריצה משולשת עליונה היא מכפלת איברי האלכסון.

פתרון. תהי $A := (a_{i,j})_{i,j \in [n]} \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה משולשת עליונה. כלומר,

$$\forall i > j : a_{i,j} = 0$$

אם $\sigma \in S_n$ תמורה כך שיש $i_0 \in [n]$ עם $\sigma(i_0) < i_0$, נקבל כי $a_{i_0, \sigma(i_0)} = 0$ ולכן $\prod_{i \in [n]} a_{i, \sigma(i)} = 0$. לפי הגדרת הדטרמיננטה, $\det(A)$ היא סכום הגורמים $\text{sgn } \sigma \prod_{i \in [n]} a_{i, \sigma(i)}$ עבור התמורות σ עבורן $\sigma(i) \geq i$ לכל $i \in [n]$. אבל, תמורה היא חד-חד ערכית ועל, ולכן התמורה היחידה המקיימת זאת היא הזהות. לכן

$$\det(A) = \text{sgn}(\text{Id}_{[n]}) \prod_{i \in [n]} a_{i,i} = \prod_{i \in [n]} a_{i,i}$$

בנדרש.

הגדרה 2.3.8 (ערכים עצמיים ופולינום אופייני). ניזכר מאלגברה א' כי $\alpha \in \mathbb{F}$ הינו ערך עצמי של מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ אם קיים $v \in \mathbb{F}^n$ עבורו $Av = \alpha v$, וכי הערכים העצמיים של A הם שורשי הפולינום האופייני $p_A(x) = \det(xI - A)$.

הערה 2.3.9. המטריצה $xI - A$ אינה ב- $M_n(\mathbb{F})$, כיוון ש- x אינו איבר ב- $\mathbb{F}$. נחשב את הדטרמיננטה $\det(xI - A)$ באותו אופן שאנו מחשבות את הדטרמיננטה של מטריצה עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 2.3.10 (פולינום מתוקן). פולינום

$$p(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$$

נקרא מתוקן אם עבור $i \in \{0, \dots, n\}$ המקסימלי כך ש- $c_i \neq 0$, מתקיים כי $c_i = 1$. כלומר, אם המקדם של החזקה הגדולה ביותר שווה 1.

בתרגיל הבא, ניעזר בדטרמיננטות כדי להראות שכל פולינום הינו פולינום אופייני של מטריצה.

תרגיל 2.7. עבור פולינום מתוקן $p \in \mathbb{F}[x]$ נכתוב

$$p(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$$

כאשר $c_n = 1$, ונגדיר את המטריצה המלווה של p על ידי

$$C(p) := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{F})$$

יהי $p \in \mathbb{F}[x]$ ממעלה n . הראו כי הפולינום האופייני של $C(p)$ הוא p .

פתרון. מתקיים

$$p_{C(p)} = \det(I - xC(p)) = \det \begin{pmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & c_0 \\ -1 & x & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x + c_{n-1} \end{pmatrix}$$

ניעזר בכך שהטרמיננטה אינווריאנטית תחת הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת. נוסיף את השורה האחרונה כפול x לזאת שלפניה. לאחר מכן נוסיף את השורה ה- $n-1$ כפול x לזאת שלפניה ונמשיך כך עד שנקבל מטריצה

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & y \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & * \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & * \end{pmatrix}$$

כאשר

$$y = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(\dots(a_{n-2} + x(a_{n-1} + x))\dots))) = \sum_{i=0}^n c_i x^i = p$$

נחשב כעת את הדטרמיננטה של A בעזרת תמורות. נשים לב כי לכל תמורה σ שאינה מקיימת $\sigma(1) = n$, נקבל כי $\sigma(i) = i - 1$ ולכן הגורם $a_{i, \sigma(i)} = 0$ וכן $a_{1, \sigma(1)} = 0$. נקבל שהגורם המתאים לה בדטרמיננטה מתאפס, בגלל האפסים בשורות $n, \dots, 2$. לכן, אם נסמן $\sigma := (n, 1, 2, \dots, n-1)$ נקבל כי

$$\det(A) = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot (-1)^{n-1} p(x)$$

ראינו בתרגיל קודם כי $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-1}$ ולכן נקבל כי

$$\det(C(p)) = \det(A) = (-1)^{n-1} (-1)^{n-1} p(x) = p(x)$$

בנדרש.

2.4 כלל קרמר

2.4.1 מוטיבציה

כלל קרמר מציג לנו דרך, בעזרת דטרמיננטות, לפתירה של מערכת משוואות לינארית $Ax = b$. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ונסמן את העמודה ה- i של A בתור v_i .

כדי למצוא את המקדמים x_i של x ניזכר כי כפל של עמודה של A ב- x_i כופל את הדטרמיננטה ב- x_i . למשל, אם $i = 1, n = 2$,

$$\det \begin{pmatrix} | & | \\ x_1 v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} = x_1 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

אם כן, נרצה לתאר את הדטרמיננטה שבאגף שמאל באופן אחר. אבל, לפי הגדרת כפל מטריצות, מתקיים $b = x_1 v_1 + x_2 v_2$ עבור $\alpha_i \in \mathbb{F}$ ונקבל כי

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} | & | \\ x_1 v_1 + x_2 v_2 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= x_1 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} + x_2 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_2 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= x_1 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \end{aligned}$$

0

וזו בדיוק הביטוי שקיבלנו קודם ב-(2.1). נקבל בסך הכל כי


$$\det \begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} = x_1 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

ולכן

$$x_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}}$$

נקבל שוויון דומה עבור x_2 .

ראו איור 2.1 או עבור המחשה אינטרקטיבית, את המחברת ב-Google Colab.



איור 2.1: ויזואליזציה של כלל קרמר. שטח המקבילית הכחולה שווה $\det(A_1)$, וזה שווה לשטח המקבילית הירוקה, השווה $x_1 \det(A)$.

סימון 2.4.1. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ ויהי $b \in \mathbb{F}^n$. עבור $i \in [n]$, נסמן ב- A_i את המטריצה המתקבלת על ידי החלפת העמודה ה- i של A ב- b .

טענה 2.4.2 (כלל קרמר). תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ויהי $b \in \mathbb{F}^n$. למערכת המשוואות

$$Ax = b$$

קיים פתרון יחיד המתקבל על ידי

$$\forall i \in [n] : x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

2.4.2 תרגילים

תרגיל 2.8. תהי

$$T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x] \\ p(x) \mapsto p(x) + p(x+1)$$

ויהי

$$q(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{R}_2[x]$$

מיצאו $p \in \mathbb{R}_2[x]$ עבורו $T(p) = q$.

פתרון. יהי $\mathcal{E} = (x^2, x, 1)$ כיוון שההעתקה

$$\begin{aligned}\rho_{\mathcal{E}}: \mathbb{R}_2[x] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{E}}\end{aligned}$$

הינה חד־חד ערכית, מתקיים

$$T(p) = q$$

אם ורק אם

$$[T(p)]_{\mathcal{E}} = [q]_{\mathcal{E}}$$

ניזכר כי מתקיים תמיד

$$[S(v)]_{\mathcal{B}} = [S]_{\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}}$$

ולכן השוויון הנ"ל מתקיים בדיוק כאשר מתקיים השוויון

$$[T]_{\mathcal{E}} [p]_{\mathcal{E}} = [q]_{\mathcal{E}}$$

בעת,

$$[q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ובן

$$\begin{aligned}[T]_{\mathcal{E}} &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ [T(x^2)]_{\mathcal{E}} & [T(x)]_{\mathcal{E}} & [T(1)]_{\mathcal{E}} \\ | & | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ [2x^2 + 2x + 1]_{\mathcal{E}} & [2x + 1]_{\mathcal{E}} & [2]_{\mathcal{E}} \\ | & | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

נסמן

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

וגם $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ואז מתקיים $T(p) = q$ אם ורק אם $A[p]_{\mathcal{E}} = b$. לפי כלל קרמר, זה מתקיים בדיוק כאשר

$$[p]_{\mathcal{E}} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} \det(A_1) \\ \det(A_2) \\ \det(A_3) \end{pmatrix}$$

בעת

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 8$$

$$\det(A_1) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 4$$

$$\det(A_2) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} \det(A_3) &= \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 1 \det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2(2 - 1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

כאשר שתי הדטרמיננטות הראשונות הן מכפלות איברי האלכסון בדטרמיננטות של מטריצות משולשות עליונות, והדטרמיננטה של A_2 היא 0 כי יש שתי שורות שוות, ולכן השורות תלויות לינארית. נקבל בסך הכול כי

$$[p]_{\mathcal{E}} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/4 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$p(x) = \frac{1}{2} \cdot x^2 + 0 \cdot x + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4}$$

נשים לב כי אכן

$$\begin{aligned} T(p) &= p(x) + p(x+1) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4} + \frac{(x+1)^2}{2} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{x^2 + 2x + 1}{2} \\ &= x^2 + x + 1 \\ &= q(x) \end{aligned}$$

בנדרש.

תרגיל 2.9. תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה עם מקדמים שלמים ויהי $b \in \mathbb{R}^n$ וקטור עם מקדמים שלמים. קבעו האם לפתרון המשוואה $Ax = b$ יש מקדמים שלמים במקרים הבאים. הוכיחו או הפריכו את טענתכן.

$$1. \det(A) = 1$$

$$2. \det(A) = 2$$

פתרון. ראשית, ניזכר כי לפי כלל קרמר, פתרון המשוואה x מתקבל על ידי

$$\forall i \in [n] : x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

ונשים לב כי $\det(A_i) \in \mathbb{Z}$ כיוון שמקדמי A_i שלמים, והדטרמיננטה היא סכום של מכפלות של המקדמים. נעבור לדון בשני המקרים.

1. במקרה בו $\det(A) = 1$, נקבל כי $x_i = \det(A_i) \in \mathbb{Z}$ לכל $i \in [n]$, ולכן הוקטור x בעל מקדמים שלמים.

2. במקרה בו $\det(A) = 2$, אלא אם כל הדטרמיננטות $\det(A_i)$ מתחלקות ב-2, לא כל מקדמי x יהיו שלמים. נמצא דוגמה נגדית.

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$, שמקדמיה אכן שלמים, ויהי $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ שאכן מקדמיו שלמים. נשים לב שגם אכן מתקיים

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 4 - 2 = 2.$$

לפי כלל קרמר, פתרון $Ax = b$ מתקבל על ידי

$$x_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{4 - 1}{2} = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$$

$$x_2 = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{1 \cdot 1 - 1 \cdot 2}{2} = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$$

ולכן מקדמי x אינם כולם שלמים (ובעצם, אף אחד מהם אינו שלם).

יכולנו בעצם לבנות דוגמה בלי לנחש מקדמים. למשל, כדי למצוא $A = \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ עבורה מקדמי

הפתרון למערכת $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אינם שלמים, נרצה $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ שאינם שלמים עבורם $x_1 v_1 + x_2 v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

נבחר למשל $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$ ונקבל כי $\frac{1}{2}(v_1 + v_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ואז $v_1 + v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. נקבל כי אם $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ מתקיים

$$2 = \det(A) = ad - bc$$

$$2 = a + b$$

$$2 = c + d$$

ומכאן

$$b = 2 - a$$

$$d = 2 - c$$

ואז

$$\begin{aligned} 2 &= \det(A) \\ &= a(2 - c) - (2 - a)c \\ &= 2a - ac - 2c + ac \\ &= 2a - 2c \end{aligned}$$

ולכן $a - c = 1$. נבחר למשל $a = 2$, $c = 1$, ונקבל $d = 2 - 1 = 1$, $b = 2 - 2 = 0$. כלומר $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

שמקדמיה אכן שלמים, והדטרמיננטה שלה אכן שווה 2 במכפלת איברי האלכסון של מטריצה משולשת תחתונה. אכן

מתקיים $A \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ולכן זאת דוגמה נגדית לסעיף.

2.5 המטריצה המצורפת

2.5.1 מוטיבציה

ניזכר כי כלל קרמר אומר שהפתרון של המערכת $Ax = b$ עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ועבור $b \in \mathbb{F}^n$ מתקבל על ידי

$$\forall i \in [n] : x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

אם $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$, מתקיים לפי פיתוח דטרמיננטה לפי עמודה כי

$$\begin{aligned} \det(A_i) &= (-1)^{i+1} b_1 \det(A_{(1,i)}) + \dots + (-1)^{i+n} b_n \det(A_{(n,i)}) \\ &= \sum_{j \in [n]} (-1)^{i+j} b_j \det(A_{(j,i)}) \\ &= \left((-1)^{i+1} \det(A_{(1,i)}) \quad \dots \quad (-1)^{i+n} \det(A_{(n,i)}) \right) b \end{aligned}$$

לכן אם נגדיר מטריצה $\text{adj}(A) \in M_n(\mathbb{F})$ שמקיימת $(\text{adj}(A))_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A_{(j,i)})$ לכל $i, j \in [n]$, נקבל כי

$$\text{adj}(A) b = \begin{pmatrix} \det(A_1) \\ \vdots \\ \det(A_n) \end{pmatrix} = \det(A) x$$

כאשר x הפתרון היחיד של המערכת $Ax = b$. נכתוב במקום זאת $x = A^{-1}b$ ונקבל כי $\text{adj}(A)b = \det(A)A^{-1}b$. כיוון שלא נעזרנו ב- b בבניית $\text{adj}(A)$, המשוואה הזאת מתקיימת לכל $b \in \mathbb{F}^n$, ולכן $\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$. אם נרצה לכתוב זאת אחרת, נכפול ב- A מימין ונקבל $\text{adj}(A)A = \det(A)I$.

הגדרה 2.5.1. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. נגדיר $\text{adj}(A) \in M_n(\mathbb{F})$ על ידי

$$\forall i, j \in [n] : (\text{adj}(A))_{i,j} = \det(A_{(j,i)})$$

טענה 2.5.2. לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה מתקיים

$$\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$$

ובאופן שקול

$$\text{adj}(A)A = A\text{adj}(A) = \det(A)I$$

2.5.2 תרגילים

תרגיל 2.10. תהי

$$\begin{aligned} T: M_2(\mathbb{C}) &\rightarrow M_2(\mathbb{C}) \\ A &\mapsto iA + A^t \end{aligned}$$

מיצאו בעזרת המטריצה המצורפת את T^{-1} .

פתרון. יהי $\mathcal{E} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ בסיס של $V := M_2(\mathbb{C})$ ונסמן

$$A := [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 1 & 0 \\ 0 & 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$

אז לפי הטענה על המטריצה המשוכלפת מתקיים

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$$

נחשב את $\det(A)$, $\text{adj}(A)$ ונקבל מכך את A^{-1} . מתקיים

$$\begin{aligned} \det(A) &= (1+i)^2 \det \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 (i^2 - 1^2) \\ &= (1^2 + 2i + i^2)(-2) \\ &= 2i \cdot (-2) \\ &= -4i \end{aligned}$$

לכל $j \neq 1$ מתקיים $\det(A_{(1,j)}) = 0$ כי העמודה הראשונה של $A_{(1,j)}$ היא עמודת אפסים. באותו אופן $\det(A_{(i,1)}) = 0$ לכל $i \neq 1$ כי אז השורה הראשונה במטריצה היא שורת אפסים. מתקיים

$$\begin{aligned} \det(A_{1,1}) &= \det \begin{pmatrix} i & 1 & 0 \\ 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (i^2 - 1)(1+i) \\ &= -2 - 2i \end{aligned}$$

באותו אופן, $\det(A_{(4,j)}) = 0$ לכל $j \neq 4$ וגם $\det(A_{(i,4)}) = 0$ לכל $i \neq 4$ וכן

$$\begin{aligned} \det(A_{4,4}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & i & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1+i)(i^2 - 1) \\ &= -2 - 2i \end{aligned}$$

לכן

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -2-2i & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & -2-2i \end{pmatrix}$$

עבור מטריצה $X \in M_2(\mathbb{C})$.
נחשב את שאר המקדמים.

$$\begin{aligned} \det(A_{(2,2)}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 i \\ &= 2i^2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A_{(2,3)}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 \\ &= 2i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A_{(3,2)}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 \\ &= 2i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A_{(3,3)}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 i \\ &= 2i \cdot i \\ &= -2 \end{aligned}$$

לבן

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} -2-2i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2i & 0 \\ 0 & -2i & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2-2i \end{pmatrix}$$

ולכן

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{-4i} \begin{pmatrix} -2-2i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2i & 0 \\ 0 & -2i & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2-2i \end{pmatrix}$$

אז, לכל $a, b, c, d \in \mathbb{C}$

$$T^{-1} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\frac{1}{4i} \begin{pmatrix} (-2-2i)a & -2b-2ic \\ -2ib-2c & (-2-2i)d \end{pmatrix}$$

ואז נוכל לשים לב שלכל $X \in M_2(\mathbb{C})$ מתקיים

$$T^{-1}(X) = \frac{X + iX^t}{2i}$$

תרגיל 2.11. תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה עם מקדמים שלמים. הוכיחו כי למטריצה A^{-1} מקדמים שלמים אם ורק אם $\det(A) \in \{\pm 1\}$. מטריצה המקיימת זאת נקראת אונימודולרית.

פתרון. • אם למטריצה A^{-1} מקדמים שלמים, מתקיים כי $\det(A), \det(A^{-1}) \in \mathbb{Z}$, אבל אז $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ ולכן $\det(A) \in \mathbb{Z}$ הינו מספר שלם שההופכי שלו גם הוא שלם, כלומר 1 או -1.

• נניח כי $\det(A) \in \{\pm 1\}$. מתקיים

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$$

ולכן

$$A^{-1} \in \{\operatorname{adj}(A), -\operatorname{adj}(A)\}$$

אבל, מקדמי $\operatorname{adj}(A)$ הם סכומים של מכפלות של מקדמים של A , שהינם מספרים שלמים, ולכן גם מקדמי $\operatorname{adj}(A)$ שלמים, ואז גם מקדמי A^{-1} .

תרגיל 2.12. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבא.

אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית, גם $\operatorname{adj}(A)$ אלכסונית.

פתרון. נסתכל על דוגמה לצורך כיוון. אם $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, לכל אחת מבין $A_{(1,i)}$ עבור $i \neq 1$ יש עמודת אפסים בתור

העמודה הראשונה, ולכן $\operatorname{adj}(A)_{i,1} = 0$ לכל $i \neq 1$. באותו אופן, $\operatorname{adj}(A)_{1,j} = 0$ לכל $j \neq 1$, כיוון שהמקדם הוא דטרמיננטה של מטריצה שהשורה הראשונה שלה היא שורת אפסים. נעבור למקרה הכללי. אם A אלכסונית, ו- $i, j \in [n]$ שונים, מתקיים כי

$$\operatorname{adj}(A)_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A_{(i,j)})$$

אם $j > i$, העמודה ה- i של $A_{(i,j)}$ היא זאת של A בלי המקדם ה- i , (כיוון שחיסרנו מ- A רק עמודה שלאחר העמודה ה- i). אבל, $A_{k,i} = 0$ לכל $k \neq i$, כיוון ש- A אלכסונית, ולכן זאת עמודת אפסים. אחרת, $j < i$ ואז באותו אופן השורה ה- j של $A_{(i,j)}$ היא שורת אפסים. בכל מקרה, נקבל כי $\operatorname{adj}(A)_{i,j} = 0$ לכל $i, j \in [n]$ שונים, ולכן $\operatorname{adj}(A)$ אלכסונית.

2.6 הפולינום האופייני, ולכסינות

2.6.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 2.6.1 (אופרטור לכסין). אופרטור $T \in \text{End}(V)$ נקרא לכסין אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית. נתעניין באלגברה לינארית הרבה באופרטורים לכסינים. יתרון אחד של לכסינות, היא חישוב יעיל של חזקות. אם $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ מטריצה לכסינה, ו- $\mathcal{B}$ בסיס עבורו $[T]_{\mathcal{B}} = D$, נקבל כי לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$[T^m]_{\mathcal{B}} = D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)$$

ולכן מצאנו בקלות מטריצה מייצגת של T^m .

אם נכתוב $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ נשים לב מהגדרת מטריצה מייצגת שמתקיים $T(v_i) = \lambda_i v_i$.

הגדרה 2.6.2 (ערכים ווקטורים עצמיים). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נגיד כי λ הינו ערך עצמי של T אם קיים $v \in V \setminus \{0\}$ עבורו $T(v) = \lambda v$. נקרא לוקטור v כזה וקטור עצמי של T עבור הערך העצמי λ .

נרצה לכמת ערכים עצמיים באופן שיגיד לנו, במקרה של אופרטורים לכסינים, כמה פעמים כל ערך מופיע על האלכסון. נשים לב כי עבור מטריצה לכסינה $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, מספר הפעמים ש- λ מופיע על האלכסון, הוא הריבוי שלו כשורש של הפולינום

$$p_D(x) := \det(xI - D) = (x - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (x - \lambda_n)$$

לא כל פולינום יתפרק באופן כזה למכפלה של גורמים לינאריים, אבל נוכל תמיד להגדיר פולינום כזה.

הגדרה 2.6.3 (פולינום אופייני). תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. נגדיר את הפולינום האופייני של A בתור

$$p_A(x) = \det(xI - A)$$

נגדיר את הפולינום האופייני של $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ בתור $p_T(x) = p_{[T]_{\mathcal{B}}}(x)$ עבור בסיס $\mathcal{B}$ של V .

הערה 2.6.4. יתכן שבמהלך הקורס לא נציין כל הגדרה או טענה גם עבור אופרטורים וגם עבור מטריצות. הרבה מהטענות ניתן לתרגם בין אופרטורים ומטריצות באופן מיידי, וכאשר לא נציין את התרגום במפורש כדאי לנסות לחשוב עליו לבד.

הערה 2.6.5. עבור $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ מתקיים

$$p_T(x) = \det(x \text{Id}_V - T)$$

טענה 2.6.6. הערכים העצמיים של $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הם שורשי הפולינום האופייני $p_T(x)$.

הגדרה 2.6.7 (ריבוי אלגברי). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הריבוי האלגברי של λ ביחס ל- T הוא הריבוי של λ כשורש של $p_T(x)$.

נסמנו $r_a^T(\lambda)$, או כאשר האופרטור ברור מההקשר, לעתים $r_a(\lambda)$.

נוכל לחשב את מספר הפעמים שמופיע $\lambda \in \mathbb{F}$ על האלכסון של המטריצה $D := \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ באופן נוסף, בתור $\dim \ker(\lambda I - D)$, כיוון שהמטריצה $\lambda I - D$ היא מטריצה אלכסונית עם מספר אפסים על האלכסון השווה למספר הפעמים שמופיע λ על האלכסון של D .

באופן כללי, הגרעין $\ker(\lambda \text{Id}_V - T)$ הוא אוסף כל הוקטורים העצמיים עם הערך העצמי λ , יחד עם וקטור האפס.

הגדרה 2.6.8 (מרחב עצמי). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נסמן

$$V_{\lambda}^T := \ker(\lambda \text{Id}_V - T)$$

ונקרא לו המרחב העצמי של T המתאים לערך העצמי λ .

כאשר האופרטור ברור מההקשר, נסמן לעתים V_{λ} עבור מרחב זה.

הגדרה 2.6.9 (ריבוי גיאומטרי). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הריבוי הגיאומטרי של λ בערך עצמי של T הוא

$$r_g^T(\lambda) := \dim V_{\lambda}^T$$

כאשר האופרטור ברור מההקשר נסמן לעתים $r_g(\lambda)$ במקום זאת.

טענה 2.6.10. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$ אז

$$r_g^T(\lambda) \leq r_a^T(\lambda)$$

טענה 2.6.11. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. התנאים הבאים שקולים.

(א) T לכסין.

(ב) הפולינום $p_T(x)$ מתפצל כמכפלה של גורמים לינאריים, ולכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים $r_a(\lambda) = r_g(\lambda)$.

(ג) אם הערכים העצמיים השונים של T הם $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ואם $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_k$ בסיסים של $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ בהתאמה, אז

$$\mathcal{B} := \bigcup_{i \in [k]} \mathcal{B}_i$$

הוא בסיס של V .

2.6.2 תרגילים

תרגיל 2.13. הוכיחו כי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

הינה לכסינה אם ורק אם $b = 0$ או $a \neq c$.

פתרון. ניזכר ראשית שהערכים העצמיים של מטריצה משולשת עליונה איברי האלכסון, וכי הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי הוא מספר הפעמים שהוא מופיע על האלכסון. לכן הערכים העצמיים של A הם a, c כאשר אם $a = c$, זהו ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 ואחרת כל אחד מריבוי אלגברי 1.

נניח כעת כי A לכסינה וכי $a = c$, ונראה כי $b \neq 0$.

a ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. הריבוי האלגברי של ערך עצמי במטריצה לכסינה הוא מספר הפעמים שהוא מופיע על האלכסון במטריצה אלכסונית הדומה לה, ולכן A דומה ל- aI . אבל, המטריצה היחידה הדומה ל- aI היא עצמה, כיוון שלכל $P \in M_2(\mathbb{R})$ הפיכה מתקיים

$$P^{-1}aIP = aP^{-1}IP = aP^{-1}P = aI$$

לכן $A = aI$ ולכן $b = 0$.

נניח בכיוון השני כי $a \neq c$ או $b = 0$, ונוכיח כי A לכסינה.

אם $b = 0$, המטריצה A אלכסונית בעצמה, ואין מה להראות. נניח אם כן כי $a \neq c$. אז

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det \begin{pmatrix} x-a & -b \\ 0 & x-c \end{pmatrix} \\ &= (x-a)(x-c) \end{aligned}$$

מתפצל לגורמים לינאריים ובנוסף

$$1 \leq r_g(a) \leq r_a(a) = 1$$

$$1 \leq r_g(c) \leq r_a(c) = 1$$

ולכן $r_g(a) = r_a(a) = 1$ וכן $r_g(c) = r_a(c) = 1$. לכן מטענה 2.6.11 המטריצה A לכסינה.

תרגיל 2.14. נסתכל על מטריצת הסיבוב הבאה, התלויה בפרמטר $\theta \in \mathbb{R}$.

$$\rho_\theta := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

1. קיבעו עבור אילו ערכי θ המטריצה ρ_θ לכסינה. עבור הערכים שעבורם היא לכסינה, מיצאו מטריצה 2×2 הפיכה P ומטריצה אלכסונית D עבורן

$$P^{-1}\rho_\theta P = D$$

2. איך תשתנה תשובתכן לסעיף הקודם אם נסתכל על ρ_θ כעל מטריצה ב- $M_2(\mathbb{C})$?

פתרון. 1. נחשב ערכים עצמיים, שהם שורשי הפולינום האופייני.

$$p_{\rho_\theta}(x) = \det(xI - \rho_\theta)$$

$$= \det \begin{pmatrix} x - \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & x - \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

$$= (x - \cos(\theta))^2 + \sin(\theta)^2$$

$$= x^2 - 2\cos(\theta)x + \cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2$$

$$= x^2 - 2\cos(\theta)x + 1$$

שורשי הפולינום, לפי נוסחת השורשים של פולינום ריבועי, הם

$$x_{1,2} := \frac{2\cos(\theta) \pm \sqrt{(2\cos(\theta))^2 - 4}}{2}$$

$$= \frac{2\cos(\theta) \pm 2\sqrt{\cos(\theta)^2 - 1}}{2}$$

$$= \cos(\theta) \pm \sqrt{-\sin(\theta)^2}$$

$$= \cos(\theta) \pm i\sin(\theta)$$

ונסמן

$$\begin{aligned}x_1 &= \cos(\theta) + i \sin(\theta) \\x_2 &= \cos(\theta) - i \sin(\theta)\end{aligned}$$

אם $\sin(\theta) \neq 0$ נקבל כי אין ערכים עצמיים ממשיים. לכן אין שורשים ממשיים לפולינום p_{ρ_θ} , לכן הוא אינו מתפצל ממכפלה של גורמים לינאריים, ולכן לפי טענה 2.6.11 המטריצה ρ_θ אינה לכסינה.

אחרת, $\sin(\theta) = 0$ ואז

$$\rho_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

והמטריצה לכסינה כמטריצה אלכסונית. נבחר למשל $P = I$ ונקבל כי

$$D := P^{-1} \rho_\theta P = \rho_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

אלכסונית.

2. כאשר $\sin(\theta) = 0$, המטריצה ρ_θ עדיין לכסינה באותו אופן.

כאשר $\sin(\theta) \neq 0$, נקבל הפעם שני ערכים עצמיים $\cos(\theta) \pm i \sin(\theta)$ שונים, כל אחד מריבוי אלגברי 1. כיוון שהריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי שווה לפחות 1 ואינו גדול מהריבוי האלגברי, נקבל כי הריבויים הגיאומטריים של הערכים העצמיים גם הם שווים 1. נמצא וקטורים עצמיים.

• עבור הערך העצמי $x_1 = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$, הוקטורים העצמיים הם הוקטורים בגרעין של

$$x_1 I - \rho_\theta = \begin{pmatrix} x_1 - \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & x_1 - \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \sin(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & i \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

זאת מטריצה שהעמודה הראשונה שלה שווה לעמודה השנייה כפול i , ולכן דרגתה 1, והוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ הינו

וקטור עצמי שלה עם ערך עצמי 0, ולכן וקטור עצמי של ρ_θ עם ערך עצמי x_1 . הראנו כי הריבוי הגיאומטרי שווה 1, ולכן וקטור עצמי זה פורש את כל המרחב העצמי (שהינו ממימד 1) ונקבל כי

$$V_{x_1}^{\rho_\theta} = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right)$$

• עבור הערך העצמי $x_2 = \cos(\theta) - i \sin(\theta)$, הוקטורים העצמיים הם הוקטורים בגרעין של

$$x_2 I - \rho_\theta = \begin{pmatrix} -i \sin(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & -i \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

זאת מטריצה שהעמודה הראשונה שללה שווה לעמודה השנייה כפול $-i$, ולכן דרגתה 1 והוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ הוא

וקטור עצמי שלה עם ערך עצמי 0 ובאותו אופן כמו עם הערך העצמי הקודם,

$$V_{x_2}^{\rho_\theta} = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right)$$

נקבל בסך הכל כי $\mathcal{B} := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix} \right)$ בסיס של V המורכב מוקטורים עצמיים של ρ_θ . אז

$$D := [T_{\rho_\theta}]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(x_1, x_2)$$

ומתקיים

$$D = (M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^{-1} [T_{\rho_{\theta}}]_{\mathcal{E}} M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$

לפי נוסחת מעבר בסיס. לכן אם נסמן

$$P := M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$$

נקבל כי

$$D = P^{-1} \rho_B P$$

מטריצה אלכסונית.

תרגיל 2.15. תהי

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -6 & -3 & -3 & 0 \\ -2 & -3 & -4 & -3 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{C})$$

מיצאו את הערכים העצמיים של A ועבור כל אחד מהם מיצאו ריבוי אלגברי וגיאומטרי.**פתרון.** נחשב ראשית את הפולינום האופייני של A .

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det(xI - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} x+3 & 4 & 6 & 3 & 3 & 0 \\ 2 & x+3 & 4 & 3 & 3 & 0 \\ -3 & -3 & x-5 & -3 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & x-2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -3 & 0 & x-2 & 0 \\ -3 & -3 & -3 & -3 & -3 & x-2 \end{pmatrix} \\ &= (x-2) \begin{pmatrix} x+3 & 4 & 6 & 3 & 3 \\ 2 & x+3 & 4 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & x-5 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 & x-2 & 0 \\ -2 & -1 & -3 & 0 & x-2 \end{pmatrix} \\ &= \dots \\ &= (x-2)(x^5 - 3x^4 + x^3 + x^2 + 4) \end{aligned}$$

ניתן לראות כי 2 הינו ערך עצמי של A , כי הוא שורש של $p_A(x)$. נחשב את הריבוי שלו $r_a(2)$, ששווה לערך $i \in \mathbb{N}$ המינימלי עבורו $p_A(x)^{(i)}(2) \neq 0$ כאשר $f^{(k)}$ הינה הנגזרת ה- k -ית של f . מתקיים

$$\begin{aligned} p_A(x) &= x^6 - 5x^5 + 7x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x - 8 \\ p'_A(x) &= 6x^5 - 25x^4 + 28x^3 - 3x^2 - 4x + 4 \\ p'_A(2) &= 6 \cdot 32 - 20 \cdot 16 + 28 \cdot 8 - 3 \cdot 4 - 4 \cdot 2 + 4 = 0 \\ p''_A(x) &= 30x^4 - 100x^3 + 84x^2 - 6x - 4 \\ p''_A(2) &= 30 \cdot 16 - 100 \cdot 8 + 84 \cdot 4 - 6 \cdot 2 - 4 = 0 \\ p'''_A(x) &= 120x^3 - 300x^2 + 168x - 6 \\ p'''_A(2) &= 120 \cdot 8 - 300 \cdot 4 + 168 \cdot 2 - 6 = 90 \neq 0 \end{aligned}$$

ולכן $r_a(2) = 3$. נקבל כי $(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ מחלק את $p_A(x)$ וכדי למצוא ערכים עצמיים נוספים נבצע חילוק פולינומים.

בכל שלב נכפול את הפולינום בו אנו מחלקות במונום מתאים כך שהכפל יהיה בעל אותו גורם מוביל כמו הפולינום שקיבלנו לאחר חיסור בשלב הקודם, ולאחר מכן נחסר זאת מהפולינום שקיבלנו בשלב הקודם. נסכום את המונמים המתאימים כדי לקבל את המנה, כאשר אם נשארו עם פולינום מדרגה קטנה יותר מזה שאנו מחלקות בו, הוא יהיה שארית החלוקה.

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 6x^2 + 12x - 8 \overline{) \begin{array}{r} x^6 - 5x^5 + 7x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x - 8 \\ - x^6 + 6x^5 - 12x^4 + 8x^3 \\ \hline x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 \\ - x^5 + 6x^4 - 12x^3 + 8x^2 \\ \hline x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x \\ - x^4 + 6x^3 - 12x^2 + 8x \\ \hline x^3 - 6x^2 + 12x - 8 \\ - x^3 + 6x^2 - 12x + 8 \\ \hline 0 \end{array}}
 \end{array}$$

לכן

$$p_A(x) = (x-2)^3(x^3 + x^2 + x + 1)$$

וביתן לראות כי -1 שורש של $x^3 + x^2 + x + 1$ (הוא שורש של כל פולינום ממעלה אי-זוגית שכל מקדמיו 1) נבצע חילוק פולינומים נוסף

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 1 \overline{) \begin{array}{r} x^3 + x^2 + x + 1 \\ - x^3 - x^2 \\ \hline x + 1 \\ - x - 1 \\ \hline 0 \end{array}}
 \end{array}$$

ולכן

$$p_A(x) = (x-2)^3(x+1)(x^2+1) = (x-2)^3(x+1)(x+i)(x-i)$$

ונקבל כי הערכים העצמיים הם 2 מריבוי אלגברי 3, $-i$, i , -1 , כל אחד מריבוי אלגברי 1.

כיוון שהריבוי הגיאומטרי תמיד גדול או שווה ל-1 וקטן או שווה לריבוי האלגברי, נקבל כי $r_g(-1) = r_g(i) = r_g(-i) = 1$ ולכן נותר למצוא את הריבוי הגיאומטרי של 2, ששווה לדרגת המטריצה $A - 2I$. נחשב דרגה זאת.

$$\begin{aligned}
 A - 2I &= \begin{pmatrix} -5 & -4 & -6 & -3 & -3 & 0 \\ -2 & -5 & -4 & -3 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{C_5 \mapsto C_5 - C_4} \begin{pmatrix} -5 & -4 & -6 & -3 & 0 & 0 \\ -2 & -5 & -4 & -3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\begin{matrix} C_1 \mapsto C_1 - C_4 \\ C_2 \mapsto C_2 - C_4 \\ C_3 \mapsto C_3 - C_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} -2 & -1 & -3 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_1 - C_2} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

וניתן לראות מכאן כי $\text{rank}(A - 2I) = 3$ לכן $r_g(2) = 3$

תרגיל 2.16. 1. תהייה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ונניח כי B לבסינה ועם n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, וכי $AB = BA$.

הוכיחו כי A לבסינה.

2. הוכיחו כי

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

הינה לבסינה, מיצאו $P \in M_n(\mathbb{C})$ עבורה $P^{-1}BP$ אלכסונית, והראו כי כל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ עבורה $AB = BA$ גם היא לבסינה.

פתרון. 1. נרצה להשתמש בהגדרה של ערכים עצמיים, ולכן נרצה וקטורים עצמיים מתאימים. יהי $\mathcal{B} := (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של $\mathbb{F}$ עבורו $Bv_i = \lambda_i v_i$ לכל $i \in [n]$.

אז, לכל $i \in [n]$,

$$BAv_i = ABv_i = \lambda_i Av_i$$

אם $Av_i = 0$ נקבל כי v_i וקטור עצמי של A עם ערך עצמי 0, ואחרת נקבל כי Av_i וקטור עצמי של B עם ערך עצמי λ_i , אך כיוון ש- $V_{\lambda_i}^B = \text{Span}(v_i)$ נקבל כי $Av_i \in \text{Span}(v_i)$. כלומר, קיים $\mu_i \in \mathbb{F}$ עבורו $Av_i = \mu_i v_i$, ולכן v_i וקטור עצמי של A עם ערך עצמי μ_i . נקבל בסך הכל כי כל v_i הוא וקטור עצמי של A , ולכן B בסיס מלכסן גם של A .

2. נחפש את הערכים העצמיים האפשריים של B . יהי $\lambda \in \mathbb{C}$ ערך עצמי. אז קיים

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

עבורו

$$\lambda v = Bv = \begin{pmatrix} v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \\ v_1 \end{pmatrix}$$

ולאחר כפל משמאל n פעמים ב- B נקבל

$$\lambda^n v = B^n v = v$$

לכן $\lambda^n = 1$ ולכן

$$\lambda \in \left\{ \text{cis} \left(\frac{2\pi k}{n} \right) \mid k \in [n] \right\}$$

נראה שאכן כל ערך בקבוצה זאת הוא ערך עצמי, ונקבל n ערכים עצמיים שונים. אכן הערך

$$\lambda_k := \text{cis} \left(\frac{2\pi k}{n} \right)$$

הוא ערך עצמי עם וקטור עצמי

$$u_k := \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \end{pmatrix}$$

שכן

$$Au_k = \begin{pmatrix} \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_k \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \end{pmatrix} = \lambda_k u_k$$

בעת, כדי למצוא $P \in M_n(\mathbb{C})$ עבורה $P^{-1}BP$ אלכסונית, ניקח מטריצה שעמודותיה הן איברי הבסיס $\mathcal{B} := (u_1, \dots, u_n)$. כדי לראות זאת, נשים לב כי

$$[T_B]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

ונקבל לפי נוסחאת מעבר בסיס כי

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = [T_B]_{\mathcal{B}}$$

$$= (M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^{-1} [T_B]_{\mathcal{E}} M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$

ולאחר סימון

$$P := M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$

נקבל כי

$$P^{-1}BP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

אלכסונית, בנדרש.

לבסוף, נציין שביוון ש- B לכסינה עם n ערכים עצמיים שונים, לפי הסעיף הראשון כל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ המתחלפת איתה גם היא לכסינה.

לפי דרך הפתרון של הסעיף הראשון נראה אפילו כי $P^{-1}AP$ אלכסונית לכל A כזאת.

הערה 2.6.12. מטריצות המתחלפות עם המטריצה B מהסעיף הקודם נקראות סירקולנטיות (circulant) ויש להן שימושים באנליזה נומרית וקריפטוגרפיה.

פרק 3

משפט ז'ורדן

3.1 משפט קיילי-המילטון

3.1.1 חזרה

משפט 3.1.1 (קיילי-המילטון). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אז $p_T(T) = 0$.

ממשפט קיילי-המילטון נובע שתמיד יש $q \in \mathbb{F}[x]$ מתוקן עבורו $q(T) = 0$. ניתן להסתכל על פולינום כזה ממעלה מינימלית, וראינו בהרצאה כי הוא יחיד.

טענה 3.1.2. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. קיים יחיד פולינום מתוקן $m(x) \in \mathbb{F}[x]$ עבורו

$$1. m(T) = 0$$

$$2. p(x) \mid m(x) \text{ לכל } p \in \mathbb{F}[x] \text{ המקיים } p(T) = 0$$

הגדרה 3.1.3 (פולינום מינימלי). עבור אופרטור $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, הפולינום מהטענה מסומן m_T ונקרא הפולינום המינימלי של T .

טענה 3.1.4. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. אז λ שורש של $m_T(x)$ אם ורק אם הוא ערך עצמי של T .

3.1.2 תרגילים

תרגיל 3.1. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל $\mathbb{C}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ עבורו

$$p_T(x) = x^4 + 3x^2 - 4$$

1. הוכיחו כי T הפיך.

2. מוצאו את T^{-1} כתלות ב- T .

3. מוצאו את הפולינום האופייני של T^{-1} .

4. מוצאו את הפולינומים המינימליים של T, T^{-1} .

פתרון. 1. ניזכר כי הערכים העצמיים של T הם שורשי p_T ונשים לב כי $p_T(0) = 1 \neq 0$. לכן 0 אינו ערך עצמי של T , ולכן T הפיך.

2. לפי קיילי-המילטון, מתקיים

$$T^4 + 3T^2 - 4\text{Id}_V = p_T(T) = 0$$

נכפול את שני האגפים ב- T^{-1} ונעביר אגפים, ונקבל

$$4T^{-1} = T^3 + 3T$$

ולאחר חלוקה

$$T^{-1} = \frac{1}{4}(T^3 + 3T)$$

3. לפי טענה מאלגברה א', אם $\lambda_1, \dots, \lambda_4$ הערכים העצמיים של T כולל ריבויים, הערכים העצמיים של T^{-1} הם $\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_4^{-1}$.

נמצא ערכים עצמיים של T בעזרת $p_T(x)$ מתקיים

$$p_T(x) = (x^2)^2 + 3x^2 - 4$$

נסמן $y = x^2$ ואז

$$p_T(x) = y^2 + 3y - 4$$

זה מתאפס כאשר

$$y = \frac{-6 \pm \sqrt{9 + 16}}{2}$$

כלומר כאשר $y \in \{-4, 1\}$. אז $p_T(x) = 0$ עבור $x \in \{-2i, 2i, -1, 1\}$. כיוון שזה פולינום מתוקן ממעלה 4 נקבל כי

$$p_T(x) = (x + 2i)(x - 2i)(x + 1)(x - 1)$$

וכי הערכים העצמיים של T הם $-2i, 2i, -1, 1$. אז הערכים העצמיים של T^{-1} הם $-\frac{1}{2i}, \frac{1}{2i}, -1, 1$ או באופן שקול $\frac{1}{2}i, -\frac{1}{2}i, -1, 1$. נקבל בסך הכל כי

$$p_{T^{-1}}(x) = \left(x - \frac{1}{2}i\right) \left(x + \frac{1}{2}i\right) (x + 1)(x - 1) = x^4 - \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4}$$

4. יהי $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ כלשהו.

לפי טענה 3.1.2, הפולינום המינימלי של S מחלק את הפולינום האופייני, ולפי 3.1.4 כל שורש של $p_S(x)$ הוא גם שורש של $m_S(x)$.

לכן אם

$$p_S(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)^{r_i}$$

עבור λ_i שונים, קיימים $1 \leq s_i \leq r_i$ עבורם

$$m_S(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)^{s_i}$$

נחזור כעת לדיון ב- T, T^{-1} . הפולינומים האופייניים של שניהם מתפרקים כמכפלות של גורמים לינאריים שונים (כלומר, $r_i = 1$ לכל i), ולכן הפולינומים המינימליים שלהם חייבים להיות שווים בדיוק לאלו האופייניים (כי $1 \leq s_i \leq r_i = 1$).
 $(s_i = 1 = r_i)$ גורר $r_i = 1$.

לכן $m_T(x) = p_T(x)$ וגם $m_{T^{-1}}(x) = p_{T^{-1}}(x)$.

תרגיל 3.2. יהי V מרחב סוף-מימדי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. הראו כי T לכסין אם ורק אם קיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ שונים עבורם

$$m_T(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)$$

היעזרו בעובדה הבאה, שניתן להוכיח באינדוקציה על $k \in \mathbb{N}$ אם $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ שונים, מתקיים

$$\ker \left(\prod_{i \in [k]} (T - \lambda_i \text{Id}_V) \right) = \bigoplus_{i \in [k]} \ker (T - \lambda_i \text{Id}_V)$$

כדי להוכיח את העובדה עבור $k = 2$, מציאו $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ עבורם

$$\forall v \in \ker ((T - \lambda_1 \text{Id}_V)(T - \lambda_2 \text{Id}_V)) : v = \alpha (T - \lambda_1 \text{Id}_V)(v) + \beta (T - \lambda_2 \text{Id}_V)(v)$$

והראו שמתקיים

$$\begin{aligned} (T - \lambda_1 \text{Id}_V)(v) &\in \ker (T - \lambda_2 \text{Id}_V) \\ (T - \lambda_2 \text{Id}_V)(v) &\in \ker (T - \lambda_1 \text{Id}_V) \end{aligned}$$

נשאיר את זה כתרגיל.

פתרון. • נניח כי T לכסין. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו

$$[T]_{\mathcal{B}} = \lambda_1 I_{m_1} \oplus \dots \oplus \lambda_k I_{m_k}$$

כאשר $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ הערכים העצמיים השונים של T וכאשר

$$A_1 \oplus \dots \oplus A_k$$

הוא סימון למטריצה אלכסונית בלוקים עם בלוקים $A_1, \dots, A_k$ על האלכסון.

נסמן

$$p(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)$$

ונקבל כי

$$\begin{aligned} p(T) &= \prod_{i \in [k]} (T - \lambda_i \text{Id}_V) \\ &= (0 \oplus (\lambda_2 - \lambda_1) I_{m_2} \oplus \dots \oplus (\lambda_k - \lambda_1) I_{m_k}) \circ \\ &\quad ((\lambda_1 - \lambda_2) I_{m_1} \oplus 0 \oplus \dots \oplus (\lambda_k - \lambda_2) I_{m_k}) \circ \\ &\quad \vdots \\ &\quad ((\lambda_1 - \lambda_k) I_{m_1} \oplus \dots \oplus (\lambda_{k-1} - \lambda_k) I_{m_{k-1}} \oplus 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

לפי טענה על פולינומים מינימליים נקבל כי $p(x) \mid m_T(x)$, ולכן $m_T(x)$ מתפרק במכלפת גורמים לינאריים שונים, כנדרש.

• נניח כי

$$m_T(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)$$

לפי טענה, הערכים העצמיים של T הם שורשי הפולינום המינימלי, לכן הערכים העצמיים השונים של T הם $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. כעת, מתקיים

$$m_T(T) = \prod_{i \in [k]} (T - \lambda_i \text{Id}_V) = 0$$

ואז

$$\begin{aligned} V &= \ker \left(\prod_{i \in [k]} (T - \lambda_i \text{Id}_V) \right) \\ &= \bigoplus_{i \in [k]} \ker (T - \lambda_i \text{Id}_V) \\ &= V_{\lambda_i} \end{aligned}$$

וקיבלנו ש- V הוא סכום ישר של המרחבים העצמיים של T , מה ששקול לכך ש- T לכסין.

תרגיל 3.3. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4)$ עם פולינום מינימלי

$$m_T(x) = x(x-1)^2$$

מיצאו את כל האפשרויות לפולינום האופייני של T . עבור כל אחת, מיצאו אופרטור עבורו מתקבל הפולינום האופייני המתאים.

פתרון. ידוע כי הפולינום המינימלי מחלק את הפולינום האופייני, וכי כל שורש של הפולינום האופייני הוא גם שורש של הפולינום המינימלי. לכן

$$p_T(x) = x^{r_1} (x-1)^{r_2}$$

עבור $r_1 \geq 1$ ועבור $r_2 \geq 2$. אבל, דרגת הפולינום האופייני היא $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, ולכן

$$p_T(x) \in \{x^2(x-1)^2, x(x-1)^3\}$$

נראה ששתי האופציות האלו אכן יתכנו.

1. נמצא ראשית $T_1 \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4)$ עבור $p_{T_1}(x) = x^2(x-1)^2$ וגם $m_{T_1} = x(x-1)^2$. לצורך פשטות, נסתכל על $T_1 = T_{A_1}$ עבור $A_1 \in M_4(\mathbb{R})$, שכן אז $m_{T_1} = m_{A_1}$, $p_{T_1} = p_{A_1}$. נרצה שלמטריצה A_1 יהיו ערכים עצמיים 0, 1 כל אחד מריבוי אלגברי 2. ניקח מטריצה מהצורה

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ואז אלו אכן הערכים העצמיים כאיברי האלכסון של מטריצה משולשת עליונה. כעת נבחר את שאר המקדמים כך שיתקיים

$$m_T(A_1) = A_1(A_1 - I_4)^2 = 0$$

כדי לפשט את החישוב, נרצה ש- A_1 תהיה אלכסונית בלוקים מהצורה

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{aligned} A_1(A_1 - I_4)^2 &= \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

וכדי שזה יתאפס ניקח $a = 0$.

כדי ש- $m_T(x)$ יהיה אכן מינימלי כפולינום עבורו $m_T(A_1) = 0$, נבחר $b \neq 0$, למשל $b = 1$, שכן אחרת גם $A_1(A_1 - I_4) = 0$. נקבל כי

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אז אכן $m_T(A_1) = 0$ וכן

$$\begin{aligned} A_1(A_1 - I) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0 \\ (A_1 - I)^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \neq 0 \end{aligned}$$

באשר שתי המטריצות שונות מאפס כי

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \neq 0$$

ככפל של מטריצה הפיכה במטריצה שונה מאפס.

נקבל בסך הכל כי $m_T(A_1) = 0$ וכי אף פולינום ממעלה קטנה יותר אינו מתאפס ב- A_1 , ולכן $m_{A_1} = m_T$ בנדרש.

2. נחפש בעת, באותו אופן, מטריצה מהצורה

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עבורה $m_T(A_2) = 0$ אבל

$$A_2(A_2 - I_4)^2, (A_2 - I_4)^3 \neq 0$$

נסמן

$$J := \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

וניקח

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & J \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{aligned} m_T(A_2) &= A_2(A_2 - I_4)^3 \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & (J - I_3)^3 \end{pmatrix} \\ &= 0 \end{aligned}$$

לכל בחירה של a, b, c ובנוסף

$$(A_2 - I_4)^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & (J - I_3)^3 \end{pmatrix} \neq 0$$

לכל בחירה של a, b, c .

נותר לנו לבחור $a, b, c \in \mathbb{R}$ עבורם

$$A_2(A_2 - I_4)^2 \neq 0$$

כלומר עבורם $(J - I_3)^2 \neq 0$, או באופן שקול

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ac \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

קיבלנו את התנאי $a, c \neq 0$ ולכן ניקח למשל $a = c = 1, b = 0$ ונקבל

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עבורה $m_{A_2} = m_T$

הערה 3.1.5. בתרגיל האחרון, מצאנו מטריצות עם בלוקים מהצורה

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

נראה בהמשך כי כל מטריצה דומה למטריצה עם בלוקים כאלו על האלכסון, הנקראת צורת ז'ורדן של המטריצה. לא כל מטריצה ניתן ללכסן, אך לכל מטריצה יש צורת ז'ורדן, וצורת ז'ורדן של מטריצה לכסינה היא המטריצה האלכסונית שדומה לה.

3.2 סכומים ישרים

3.2.1 חזרה

הגדרה 3.2.1 (סכום ישר). יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \dots, V_k \leq V$ תת-מרחבים. נזכיר כי

$$V_1 + \dots + V_k := \{v_1 + \dots + v_k \mid \forall i \in [k]: v_i \in V_i\}$$

נגיד שהסכום הזה הוא סכום ישר אם כל $v \in V_1 + \dots + V_k$ ניתן לכתיבה $v = v_1 + \dots + v_k$ בצורה יחידה עבור $v_i \in V_i$. במקרה זה נסמן את הסכום $V_i = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$.

הערה 3.2.2. באופן שקול, הסכום $V_1 + \dots + V_k$ ישר אם ורק אם $v_1 + \dots + v_k = 0$ עבור $v_i \in V_i$ גורר $v_i = 0$ לכל $i \in [k]$.

טענה 3.2.3. יהי V מרחב וקטורי כלשהו מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \dots, V_m \leq V$ תת-מרחבים של V . התנאים הבאים שקולים.

1. הסכום $V_1 + \dots + V_m$ ישר.
2. לכל בחירה של $v_i \in V_i$ עבורם $v_1 + \dots + v_m = 0$ מתקיים $v_i = 0$ לכל $i \in [m]$.
3. לכל $i \in [m]$ מתקיים

$$V_i \cap \left(\sum_{j \in [m] \setminus \{i\}} V_j \right) = \{0\}$$

טענה 3.2.4. יהי V מרחב וקטורי כלשהו מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \dots, V_m \leq V$. התנאים הבאים שקולים.

1. $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m$.
2. לכל בחירת בסיסים $\mathcal{B}_i$ לכל V_i , הקבוצה הסדורה $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$ היא בסיס של V .
3. קיימים בסיסים $\mathcal{B}_i$ של כל V_i עבורם $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$ בסיס של V .

מסקנה 3.2.5. יהי $V = \bigoplus_{i \in [m]} V_i$ אז

$$\dim(V) = \sum_{i \in [m]} \dim(V_i)$$

3.2.2 תרגילים

תרגיל 3.4. יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $U \leq V$ עם בסיס $\mathcal{B}$. יהי $\mathcal{C}$ בסיס של V . משלים ישר של U הוא תת-מרחב $W \leq V$ עבורו $U \oplus W = V$.

1. הראו שניתן להשלים את $\mathcal{B}$ לבסיס של V על ידי הוספת וקטורים מ- $\mathcal{C}$.
2. הסיקו שקיים משלים ישר W של U עם בסיס של וקטורים מ- $\mathcal{C}$.

פתרון. 1. נסמן $n = \dim(V)$ ונכניח את הטענה באינדוקציה על $|\mathcal{B}|$ על $m := n - |\mathcal{B}|$.

עבור $m = 0$ מתקיים $|\mathcal{B}| = n$ ולכן $U = V$. נניח שהטענה נכונה לכל $k < m$ ונכניח אותה עבור m .

אם $\mathcal{C} \subseteq U$ מתקיים

$$V = \text{Span}(\mathcal{C}) \subseteq \text{Span}(U) = U$$

בסתירה להנחה. לכן קיים $c \in \mathcal{C} \setminus U$. אז $\mathcal{B} \cup \{c\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית כי c אינו צירוף של וקטורי $\mathcal{B}$. נגדיר $U' := \text{Span}(\mathcal{B} \cup \{c\})$ ומהנחת האינדוקציה ניתן להשלים את $\mathcal{B} \cup \{c\}$ לבסיס של U' על ידי וקטורים $c_2, \dots, c_m$. $\mathcal{C} \cap U'$ מכיל את c ומשלימים את $\mathcal{B}$ לבסיס של U' , כנדרש.

2. בסימונים של הסעיף הקודם, $\mathcal{B} \cup \{c, c_2, \dots, c_m\}$ בסיס של V . נסמן $\mathcal{D} := \{c, c_2, \dots, c_m\}$ וגם $W := \text{Span}(\mathcal{D})$. אז $V = U \oplus W$ כי $\mathcal{B}, \mathcal{D}$ בסיסים של U, W כך ש- $\mathcal{B} \cup \mathcal{D}$ בסיס של V .

תרגיל 3.5. יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$, ותהיינה

$$\mathcal{B} = \{1 + x, x + x^2\}$$

$$\mathcal{C} = \{1, x, x^2, x^3\}$$

קבוצות סדורות של וקטורים מ- V . יהי $U = \text{Span}(\mathcal{B})$.

1. מצאו משלים ישר W של U ובסיס עבור W שמורכב מוקטורים ב- $\mathcal{C}$.

2. האם W שמצאתם יחיד? הוכיחו/הפריכו.

פתרון. 1. נשלים את $\mathcal{B}$ לבסיס של V על ידי הוספת וקטורים מ- $\mathcal{C}$. נוסיף את $1 \notin U$ כדי לקבל $\mathcal{B}' = \{1 + x, x + x^2, 1\}$.

ואז את $x^3 \notin \text{Span}(\mathcal{B}')$ כדי לקבל בסיס $\mathcal{B}'' = \{1 + x, x + x^2, 1, x^3\}$ של V .

נסמן $\mathcal{D} := \{1, x^3\}$ וניקח $W = \text{Span}(\mathcal{D})$. אז $\mathcal{B}'' = \mathcal{B} \cup \mathcal{D}$ ולכן $V = U \oplus W$, כנדרש.

2. לא. למשל, יכולנו לקחת

$$\mathcal{B}' = \{1 + x, x + x^2, x^2\}$$

ואז

$$\mathcal{B}'' = \{1 + x, x + x^2, x^2, x^3\}$$

במקרה זה היינו מקבלות משלים ישר $\text{Span}(x^2, x^3)$, ששונה מ- W .

3.3 הטלות

כאשר יש לנו סכום ישר $V = \bigoplus_{i \in [m]} V_i$, ניתן לכתוב כל $v \in V$ בצורה יחידה $v = v_1 + \dots + v_m$ עבור $v_i \in V_i$. הגיוני אז לחשוב על ההעתקה שמחזירה רק את הרכיב v_i בסכום.

הגדרה 3.3.1. יהי V מרחב וקטורי כלשהו ויהיו $V_1, \dots, V_m \leq V$ עבורם $V = \bigoplus_{i \in [m]} V_i$. ההעתקה

$$P_i := V \rightarrow V$$

$$\sum_{j \in [m]} v_j \mapsto v_i$$

כאשר $v_j \in V_j$ לכל $j \in [m]$, נקראת ההטלה על V_i במקביל לסכום $\bigoplus_{j \in [m] \setminus \{i\}} V_j$.

הערה 3.3.2. ניתן להגדיר זאת ראשית עבור סכום ישר של שני מרחבים כדי לקבל אינטואיציה לטרמינולוגיה.

אם $V = U \oplus W$, ההטלה על U במקביל ל- W , שנסמנה $P_{U,W}$, היא ההעתקה עבורה $P_{U,W}(u + w) = u$ לכל $u \in U, w \in W$.

במקרה הכללי, נוכל לקחת $U = V_i$ וגם $W = \bigoplus_{j \in [m] \setminus \{i\}} V_j$ ולקבל $V = U \oplus W$ ואז ההטלה P_i היא בדיוק ההטלה על U במקביל ל- W .

נשים לב שמתקיים $P_i^2 = P_i$ לכל הטלה כזו.

הגדרה 3.3.3. יהי V מרחב וקטורי כללי. אופרטור $T \in \text{End}(V)$ נקרא הטלה אם $P^2 = P$.

טענה 3.3.4. תהי $T \in \text{End}(V)$ הטלה. אז $V = \ker(T) \oplus \text{Im}(T)$ וגם T ההטלה על $\text{Im}(T)$ במקביל ל- $\ker(T)$.

3.3.1 חזרה

3.3.2 תרגילים

תרגיל 3.6. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$. הראו כי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הטלה אם ורק אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו

$$\cdot [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

פתרון. נניח כי T הטלה. במקרה זה $V = \ker(T) \oplus \text{Im}(T)$ עבור בסיסים

$$\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_m) \\ \mathcal{D} = (d_{m+1}, \dots, d_\ell)$$

של $\ker(T)$, $\text{Im}(T)$ בהתאמה, נקבל כי $\mathcal{C} \cup \mathcal{D}$ בסיס של V . לכל $c_i \in \mathcal{C}$ מתקיים $T(c_i) = 0$, לכן $\dim(\ker(T))$ העמודות הראשונות של $[T]_{\mathcal{C} \cup \mathcal{D}}$ הן עמודות אפסים. לכל $d_i \in \mathcal{D}$ יש $u_i \in V$ עבורו

$$d_i = T(u_i) = T^2(u_i) = T(T(u_i)) = T(d_i)$$

לכן

$$[T(d_i)]_{\mathcal{C} \cup \mathcal{D}} = [d_i]_{\mathcal{C} \cup \mathcal{D}} = e_i$$

ולכן העמודה i -י עבור $i \geq m$ היא e_i , ונקבל את הנדרש. להיפך, נניח שקיים בסיס $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ כנ"ל. אז $[T]_{\mathcal{B}}^2 = [T]_{\mathcal{B}}^2 = [T]_{\mathcal{B}}$ ולכן $T^2 = T$ ונקבל כי T הטלה.

תרגיל 3.7. יהי $V = \mathbb{C}_n[x]$ ותהי

$$P: V \rightarrow V \\ p(x) \mapsto p(1)$$

1. הוכיחו כי P הטלה.

2. נניח מעתה כי $n = 3$. מיצאו תת-מרחבים $U, W \leq V$ עבורם $P = P_{U,W}$.

3. מיצאו בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו

$$[P]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0_m & 0 \\ 0 & I_k \end{pmatrix}$$

עבור ערכים כלשהם $m, k \in \mathbb{N}$.

פתרון. 1. יהי $p \in V$. מתקיים $P^2(p) = P(p(1)) = P(p)$ אך $p(1)$ פולינום קבוע ולכן גם $P(p(1)) = p(1) = P(p)$. קיבלנו כי $P^2(p) = P(p)$, ולכן P הטלה.

2. ניזכר כי P הינה ההטלה על $\text{Im}(P)$ במקביל ל- $\ker(P)$. ניקח $W = \ker(P)$, $U = \text{Im}(P)$ ונחשב אותם. מתקיים

$$\text{Im}(P) = \{p(1) \mid p \in V\} = \text{Span}(1)$$

כיוון שכל איבר בתמונה הינו פולינום קבוע, ולכל פולינום קבוע c מתקיים $c = P(c) \in \text{Im}(P)$. בנוגע לגרעין, מתקיים

$$\ker(P) = \{p \in V \mid p(1) = 0\}$$

ממשפט המימדים, מתקיים

$$\dim \ker(P) + \dim \text{Im}(P) = \dim V = 4$$

ולכן מימד הגרעין הוא 3. נשים לב כי $\{x-1, x^2-1, x^3-1\}$ קבוצה בלתי-תלויה לינארית המוכלת בגרעין, ולכן

$$\ker(P) = \text{Span}(x-1, x^2-1, x^3-1)$$

הערה: ניתן למצוא את הגרעין ישירות בעזרת פתירת מערכת משוואות הומוגנית המתאימה למטריצה מייצגת של P . נסו לעשות זאת בעצמכן אם לא ברור לכן איך.

3. ראינו כי (1) בסיס של W וכי $(x-1, x^2-1, x^3-1)$ בסיס של U .

מאחת הטענות על הטלות, מתקיים $V = W \oplus U$. מטענה על תנאים שקולים לסכומים ישרים נקבל כי

$$\mathcal{B} := (1) \cup (x-1, x^2-1, x^3-1) = (1, x-1, x^2-1, x^3-1)$$

הינו בסיס של V . מהגדרת מטריצה מייצגת, נקבל כי

$$[P]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(0, 1, 1, 1)$$

בנדרש.

3.4 מרחבים שמורים

נרצה להבין אופרטורים לינאריים דרך הבנה של צמצום שלהם לתת-מרחבים קטנים יותר. אם $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, נוכל תמיד לצמצם את המקור כדי לקבל העתקה לינארית $T|_W : W \rightarrow V$, אבל לא נוכל ללמוד מספיק כאשר הצמצום אינו אופרטור. לכן נרצה לצמצם גם את הטווח, מה שמוביל להגדרה הבאה.

הגדרה 3.4.1 (מרחב שמור). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $U \leq V$. נגיד כי U הינו T -שמור (או T -אינווריאנטי אם $T(U) \subseteq U$).

הגדרה 3.4.2. במקרה ש- W מרחב T -שמור, נוכל להסתכל על הצמצום $T|_W : W \rightarrow W$ שמוגדר על ידי $T|_W(w) = T(w)$.

הערה 3.4.3. שימו לב שהסימון הוא אותו סימון כמו הצמצום של המקור, אך במסגרת הקורס צמצום אופרטורים יתייחס לזה שבהגדרה אלא אם כן יצוין מפורשות אחרת.

תרגיל 3.8. יהיו V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, יהיו $P, T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ כאשר P איזומורפיזם. יהי $W \leq V$. הראו כי W הינו T -שמור אם ורק אם $P^{-1}(W)$ הינו $P^{-1} \circ T \circ P$ -שמור.

פתרון. נניח כי W הינו T -שמור ויהי $v \in P^{-1}(W)$. נרצה להראות כי $P^{-1} \circ T \circ P(v) \in P^{-1}(W)$. יהי $w \in W$ עבורו $v = P^{-1}(w)$ אז

$$\begin{aligned} P^{-1} \circ T \circ P(v) &= P^{-1} \circ T \circ P \circ P^{-1}(w) \\ &= P^{-1} \circ T(w) \end{aligned}$$

כאשר $T(w) \in W$ הוא T -שמור. נקבל כי $P^{-1} \circ T \circ P(v) \in P^{-1}(W)$. בכיוון השני, נניח כי $U := P^{-1}(W)$ הינו $P^{-1} \circ T \circ P$ -שמור. נגדיר $S = P^{-1} \circ T \circ P$ וגם $Q = P^{-1}$. אז $T = Q^{-1} \circ S \circ Q$ וגם $T \circ Q = Q^{-1} \circ S$. מהכיוון הראשון, נקבל כי $W = P(P^{-1}(W)) = P(U) = Q^{-1}(U)$ הינו $Q^{-1} \circ T \circ Q$ -שמור, כלומר T -שמור.

תרגיל 3.9. יהי $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי ממשי ויהי

$$\begin{aligned} T: \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto iz \end{aligned}$$

מצאו את התת-מרחבים ה- T -שמורים של $\mathbb{C}$ והסיקו כי T אינו לכסין מעל $\mathbb{R}$.

פתרון. $\mathbb{C}, \{0\}$ תת-מרחבים T -שמורים.

נניח כי $W \leq \mathbb{C}$ מרחב T -שמור נוסף. אז $\dim_{\mathbb{R}}(W) = 1$ ולכן יש

$$z_0 \in \mathbb{C}^\times := \{z \in \mathbb{C} \mid z \neq 0\}$$

עבורו $W = \text{Span}\{z_0\}$. נקבל $T(z_0) \in W$ לכן $T(z_0) = cz_0$ עבור $c \in \mathbb{R}$. אבל $cz_0 = iz_0$ גורר $c = i$ בסתירה. תת-מרחבים T -שמורים 1-מימדיים של $\mathbb{C}$ הם $\text{Span}_{\mathbb{R}}(v)$ עבור v וקטור עצמי של T . לכן אין ל- T וקטורים עצמיים, ולכן הוא אינו לכסין מעל $\mathbb{R}$.

תרגיל 3.10. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $W \leq V$ תת-מרחב T -שמור. הראו כי

$$m_{T|_W}(x) \mid m_T(x)$$

פתרון. לפי טענה מההרצאה, לכל $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, אם $q(x) \in \mathbb{F}[x]$ מקיים $q(S) = 0$, מתקיים $q(x) \mid m_S(x)$. לכן די להראות כי

$$m_T(T|_W) = 0$$

אכן, לכל $w \in W$ מתקיים

$$m_T(T|_W)(w) = m_T(T)(w) = 0$$

כיוון ש- $m_T(T) = 0$ לפי ההגדרה. לכן

$$m_T(T|_W) = 0$$

בנדרש.

תרגיל 3.11. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אופרטור לכסין ויהי $W \leq V$ תת-מרחב T -שמו. הראו כי $T|_W$ גם הוא לכסין.

פתרון. ראינו בתרגיל קודם כי אופרטור הינו לכסין אם ורק אם הפולינום המינימלי שלו מתפרק במכפלת גורמים לינאריים שונים.

לכן $m_T(x)$ מתפרק במכפלת גורמים לינאריים שונים. אבל, מהתרגיל הקודם $m_T(x) \mid m_{T|_W}(x)$ ולכן גם $m_{T|_W}$ מתפרק במכפלת גורמים לינאריים שונים, ואז $T|_W$ גם הוא לכסין.

סימון 3.4.4. עבור מטריצות ריבועיות $A_1, \dots, A_k$ נסמן

$$A_1 \oplus \dots \oplus A_k = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{pmatrix}$$

תרגיל 3.12. יהי $V = \mathbb{C}^n$ ותהי

$$T: V \rightarrow V$$

עם

$$[T]_E = \lambda_1 I_{m_1} \oplus \dots \oplus \lambda_k I_{m_k}$$

עבור $\lambda_i \neq \lambda_j$ לכל $i \neq j$. נסמן $n_i = m_1 + \dots + m_{i-1} + 1$. מצאו את כל התת-מרחבים ה- T -שמויים של V .

פתרון. ראשית, אם $W \leq V_i := \text{Span}(e_{n_i}, \dots, e_{n_i+m_i-1})$, נקבל כי $T(w) = \lambda_i w \in W$ לכל $w \in W$. לכן כל תת-מרחב כזה הינו T -שמו. גם סכום של תת-מרחבים כאלה יהיה T -שמו כי אם $v_i \in W_i := W \cap V_i$ לכל $i \in [k]$ אז

$$T(v_1 + \dots + v_k) = T(v_1) + \dots + T(v_k)$$

כאשר $T(v_i) \in W$ וגם $T(v_i) = \lambda_i v_i \in V_i$, כלומר $T(v_i) \in W_i$. נראה שאלו כל האפשרויות לתת-מרחבים שמויים. ראינו כי אם W הינו T -שמו, אז $T|_W$ הינו לכסין. לכן, סכום ישר של המרחבים העצמיים של $T|_W$. לכל ערך עצמי λ , המרחב העצמי W_λ של $T|_W$ הוא החיתוך $W \cap V_\lambda$ כאשר V_λ המרחב העצמי של T . כיוון שעבור אופרטור לכסין המרחב שווה לסכום ישר של המרחבים העצמיים, נקבל כי

$$W = \bigoplus_{i \in [k]} W_{\lambda_i} = \bigoplus_{i \in [k]} W \cap V_{\lambda_i}$$

בנדרש.

הגדרה 3.4.5 (בלוק ז'ורדן). יהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נגדיר בלוק ז'ורדן מגודל m עם ערך עצמי λ בתור

$$J_m(\lambda) := \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in M_m(\mathbb{F})$$

הגדרה 3.4.6 (אופרטור אי-פריד). אופרטור $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ נקרא אי-פרידאם לכל $U, W \leq V$ שהינם T -שמורים ועבורם $U \oplus W = V$, בהכרח $U = V, W = \{0\}$ או $U = \{0\}, W = V$.

תרגיל 3.13. 1. יהי $T = T_{J_n(0)} \in \text{End}(\mathbb{F}^n)$. מציאו את המרחבים ה- T שמורים של $\mathbb{F}^n$.

2. יהי $N \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הראו שהמרחבים ה- S שמורים של V הם המרחבים ה- $(N + \lambda \text{Id}_V)$ שמורים של V .

3. יהי $S = T_{J_n(\lambda)} \in \text{End}_{\mathbb{F}^n}$. הסיקו מה המרחבים ה- S שמורים של $\mathbb{F}^n$.

4. הסיקו כי S הינו אי-פריד.

פתרון. 1. נשים לב כי

$$\begin{aligned} \{0\} \\ \ker(T) &= \text{Span}(e_1) \\ \text{Im}(T) &= \text{Span}(e_1, \dots, e_{n-1}) \\ V &= \text{Span}(e_1, \dots, e_n) \end{aligned}$$

כולם T -שמורים, כיוון שמרחב האפס, הגרעין, והמרחב כולו תמיד T -שמורים. גם, מתקיים

$$\begin{aligned} \forall i > 1: T(e_i) &= e_{i-1} \in \text{Span}(e_1, \dots, e_i) \\ T(e_1) &= 0 \end{aligned}$$

ולכן כל מרחב מהצורה $\text{Span}(e_1, \dots, e_i)$ עבור $i \in \{0, \dots, n\}$ הינו T -שמו. נרצה להראות שהמרחבים ה- T שמורים הם בדיוק אלו מהצורה הזאת.

יהי $W \leq \mathbb{F}^n$ מרחב T -שמו, ויהי $k \in \{0, \dots, n\}$ המקסימלי עבורו $\text{Span}(e_1, \dots, e_k) \subseteq W$ (יש כזה k כיוון שעבור $k=0$ נקבל $\{0\} \subseteq W$). נרצה להראות כי $W = \text{Span}(e_1, \dots, e_k)$.

אחרת, קיים וקטור $v = \sum_{i \in [\ell]} \alpha_i e_i \in W$ עם $\ell > k$ וגם $\alpha_\ell \neq 0$. אם $\ell = k+1$ נקבל כי $\alpha_i e_i \in W$ לכל $i < \ell$ ולכן

$$\alpha_\ell e_\ell = v - \sum_{i \in [\ell-1]} \alpha_i e_i \in W$$

וכיוון ש- $\alpha_\ell \neq 0$ אז $e_\ell \in W$. במקרה זה $e_1, \dots, e_{k+1} \in W$ ולכן $\text{Span}(e_1, \dots, e_{k+1}) \subseteq W$ בסתירה להנחה.

באופן כללי, מתקיים $T^i(v) \in W$ לכל i . כדי שיתקיים $T^i(e_\ell) = e_{k+1}$ צריך לקחת $\ell - i = k+1$ כלומר $i = \ell - (k+1)$ אז

$$\begin{aligned} T^{\ell-(k+1)}(v) &= \sum_{i \in [\ell]} \alpha_i T^{\ell-(k+1)}(e_i) \\ &= \sum_{i=\ell-k}^{\ell} \alpha_i e_{i-\ell+k+1} \\ &= \sum_{j=1}^{k+1} \alpha_{j+\ell-k-1} e_j \in W \end{aligned}$$

ונקבל את הנדרש מהמקרה הקודם $\ell = k+1$.

2. יהי $W \leq V$ תת-מרחב N -שמו. לכל $w \in W$ מתקיים

$$(N + \lambda \text{Id}_V)(w) = N(w) + \lambda w \in W$$

כיוון ש- $N(w), \lambda w \in W$. לכן W הינו $N + \lambda \text{Id}_V$ -שמו.

אם $W \leq V$ תת-מרחב $(N + \lambda \text{Id}_V)$ -שמו, נקבל מהכיוון הראשון שהוא $(N + \lambda \text{Id}_V) + (-\lambda) \text{Id}_V$ -שמו, כלומר N -שמו.

3. מהסעיף הקודם, נקבל כי המרחבים ה- S שמורים הם המרחבים ה- T שמורים, שהינם אלו מהצורה $\text{Span}_{\mathbb{F}}(e_1, \dots, e_i)$ עבור $i \in \{0, \dots, n\}$.

4. נניח כי יש תת-מרחבים S שמורים W_1, W_2 עבורם $W_1 \oplus W_2 = \mathbb{F}^n$. מהסעיף הקודם, יש $i, j \in \{0, \dots, n\}$ כך ש-

$$W_1 = \text{Span}(e_1, \dots, e_i)$$

$$W_2 = \text{Span}(e_1, \dots, e_j)$$

כיוון ש- $W_1 \oplus W_2 = \mathbb{F}^n$, בהכרח $e_n \in W_1 + W_2$ ולכן $i = n$ או $j = n$. במקרה הראשון, $W_1 = \mathbb{F}^n, W_2 = \{0\}$ ובמקרה השני $W_1 = \{0\}, W_2 = \mathbb{F}^n$, ובכל מקרה הפירוק הינו טריוויאלי.

3.5 צורת ז'ורדן

הגדרה 3.5.1 (אופרטור הזזה). יהי V מרחב וקטורי עם בסיס $\mathcal{B} := (v_1, \dots, v_n)$. אופרטור $T \in \text{End}(V)$ נקרא אופרטור הזזה ביחס ל- $\mathcal{B}$ אם

$$T(v_i) = \begin{cases} v_{i-1} & i > 1 \\ 0 & i = 1 \end{cases}$$

הוא נקרא אופרטור הזזה אם קיים בסיס שהוא אופרטור הזזה ביחס אליו.

הגדרה 3.5.2 (בלוק ז'ורדן). יהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נגדיר בלוק ז'ורדן מגודל m עם ערך עצמי λ בתור

$$J_m(\lambda) := \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in M_m(\mathbb{F})$$

מטריצה מהצורה הזאת נקראת בלוק ז'ורדן.

משפט 3.5.3 (משפט ז'ורדן לאופרטורים). יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ כך ש- $p_T(x)$ מתפצל מעל $\mathbb{F}$. אז קיימים $V_1, \dots, V_m \leq V$ עבורם $V = \bigoplus_{i \in [m]} V_i$ וכל שקיימים אופרטורי הזזה $S_i \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V_i)$ וסקלרים $\lambda_i \in \mathbb{F}$ עבורם

$$\forall i \in [m] : T|_{V_i} = S_i + \lambda_i \text{Id}_{V_i}$$

הערה 3.5.4. לפי ההגדרה, אופרטור $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(W)$ הוא אופרטור הזזה אם ורק אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של W לפיו $[S]_{\mathcal{B}} = J_n(0)$.

אז משפט ז'ורדן אומר באופן שקול, שכאשר $p_T(x)$ מתפצל מעל $\mathbb{F}$, קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V וקיימים $k_1, \dots, k_m \in \mathbb{N}_+$ וגם $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{N}_+$ עבורם

$$[T]_{\mathcal{B}} = \bigoplus_{i \in [m]} J_{k_i}(\lambda_i)$$

נקרא למטריצה מהצורה הזאת מטריצת ז'ורדן ובמקרה הזה צורת ז'ורדן של T .

משפט 3.5.5 (משפט ז'ורדן למטריצות). תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $p_A(x)$ מתפצל מעל $\mathbb{F}$. אז דומה למטריצת ז'ורדן ב- $M_n(\mathbb{F})$.

בנוסף, מטריצת ז'ורדן זאת יחידה עד כדי שינוי הסדר של הבלוקים.

טענה 3.5.6. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עם צורת ז'ורדן. מספר הבלוקים עם ערך עצמי λ ומגודל r בצורת ז'ורדן של T הוא

$$2 \dim \ker((T - \lambda \text{Id}_V)^r) - \dim \ker((T - \lambda \text{Id}_V)^{r+1}) - \dim \ker((T - \lambda \text{Id}_V)^{r-1})$$

תרגיל 3.14. מצאו את צורת ז'ורדן של המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

פתרון. המטריצה משולשת עליונה ולכן הערכים העצמיים של A על האלכסון. נקבל כי 1 הערך העצמי היחיד וכי הוא מריבוי n . הדרגה של $A - I$ היא $n - 1$ ולכן הריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 1. לכן יש בלוק יחיד בצורת ז'ורדן, ונקבל כי צורת ז'ורדן היא $J_n(1)$.

תרגיל 3.15. חשבו את צורת ז'ורדן $J(A)$ של המטריצה הבאה,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כאשר נתון כי $p_A(x) = x^4(x-1)$.

פתרון. לפי הפולינום האופייני, 1 ערך עצמי מריבוי אלגברי 1. לכן גם הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1 ונקבל כי יש בלוק יחיד עם ערך עצמי 1, ושגודלו 1.

כמו כן, אנו יודעים כי 0 ערך עצמי מריבוי אלגברי 4. לכן יהיו בלוקי ז'ורדן עם ערך עצמי 0 שסכום הגדלים שלהם הוא 4. ניתן לראות כי $r(A) = 3$, ולכן יש $5 - r(A) = 2$ וקטורים עצמיים עם ערך עצמי 0. אז, $J(A)$ היא אחת מהמטריצות הבאות.

$$J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{diag}(J_1(1), J_2(0), J_2(0))$$

$$J_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{diag}(J_1(1), J_1(0), J_3(0))$$

כדי למצוא איזו מהמטריצות היא צורת ז'ורדן של A ניעזר בנוסחה לחישוב מספר הבלוקים מגודל נתון. מספר הבלוקים מגודל לפחות 2 הוא

$$b_2 = \dim \ker(T_A^2) - \dim \ker(L_A^1)$$

כאשר ניתן לראות כי

$$\dim \ker((T_A)^1) = 2$$

מתקיים

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$\dim \ker(T_A^2) = 3$$

אז $b_2 = 3 - 2 = 1$, כלומר יש בלוק אחד עם ערך עצמי 0 ומגודל לפחות 2. זה לא המקרה עבור J_2 ולכן נקבל כי צורת ז'ורדן של A היא J_1 .

תרגיל 3.16. 1. האם כל המטריצות $A \in M_5(\mathbb{C})$ המקיימות $A^4 \neq 0$ וגם $A^5 = 0$ הן דומות?

2. האם כל המטריצות $A \in M_5(\mathbb{C})$ המקיימות $A^3 \neq 0$ וגם $A^4 = 0$ הן דומות?

3. האם כל המטריצות $A \in M_5(\mathbb{C})$ המקיימות $A^2 \neq 0$ וגם $A^3 = 0$ הן דומות?

פתרון. 1. התנאי $A^4 \neq 0$ וגם $A^5 = 0$ אומר כי

$$\dim \ker(T_A^5) - \dim \ker(T_A^4) \geq 1$$

כלומר יש בלוק מגודל לפחות 5. לכן A דומה ל- $J_5(0)$, ולכן התשובה היא כן.

2. התנאי $A^3 \neq 0$ וגם $A^4 = 0$ אומר כי

$$\dim \ker (T_A^4) - \dim \ker (T_A^3) \geq 1$$

ולכן יש בלוק מגודל לפחות 4. אבל, $A^4 = 0$ ולכן לא יתכן שיש בלוק ז'ורדן מגודל 5. לכן כל A כזאת דומה ל-
 $\text{diag} (J_4(0), J_1(0))$, והתשובה היא כן.

3. התנאים $A^2 \neq 0, A^3 = 0$ מראים כי

$$\dim \ker (T_A^3) - \dim \ker (T_A^2) \geq 1$$

ולכן יש בלוק מגודל לפחות 3. אבל,

$$\begin{aligned} & \text{diag} (J_3(0), J_2(0)) \\ & \text{diag} (J_3(0), J_1(0), J_1(0)) \end{aligned}$$

שתיהן עומדות בתנאים, ואינן דומות.

תרגיל 3.17. מצאו צורת ובסיס ז'ורדן עבור

$$\begin{aligned} D: \mathbb{C}_n[x] &\rightarrow \mathbb{C}_n[x] \\ p &\mapsto p' \end{aligned}$$

פתרון. נשים לב כי

$$\begin{aligned} \text{Im}(D) &= \text{Span}(1, x, \dots, x^{n-1}) \\ &\vdots \\ \text{Im}(D^{n-1}) &= \text{Span}(1) \\ \text{Im}(D^n) &= \{0\} \end{aligned}$$

ובפרט D נילפוטנטית.

ניקח $v_1 = x$. נחפש וקטור v_2 עבורו $D(v_2) = v_1$ ואכן הוקטור x מקיים זאת. נמשיך בכל שלב ונמצא וקטור v_{i+1} עבורו $D(v_{i+1}) = v_i$, ונקבל בסיס ז'ורדן

$$\cdot \left(1, x, \frac{x^2}{2}, \frac{x^3}{6}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}, \frac{x^n}{n!} \right)$$

תרגיל 3.18. הראו כי

$$J_n(\lambda)^r = \begin{pmatrix} \lambda^r & \binom{r}{1} \lambda^{r-1} & \binom{r}{2} \lambda^{r-2} & \dots & & \\ & \lambda^r & \ddots & & \vdots & \\ & & \ddots & \ddots & \binom{r}{2} \lambda^{r-2} & \\ & & & \ddots & \lambda^r \binom{r}{1} \lambda^{r-1} & \\ & & & & \lambda^r & \end{pmatrix}$$

פתרון. מתקיים

$$J_n(\lambda)^r = (J_n(0) + \lambda I)^r$$

כאשר λI , $J_n(0)$ מתחלפות כי λI סקלרית. נקבל מהבינום של ניוטון כי

$$J_n(\lambda)^r = \lambda^r I + \binom{r}{1} \lambda^{r-1} J_n(0) + \binom{r}{2} \lambda^{r-2} J_n(0)^2 + \dots$$

כאשר $J_n(0)^k$ היא מטריצה עם אפסים פרט ל-1 באלכסון ה- k מעל האלכסון הראשי. לכן

$$J_n(\lambda)^r = \begin{pmatrix} \lambda^r & \binom{r}{1} \lambda^{r-1} & \binom{r}{2} \lambda^{r-2} & \dots & & \\ & \lambda^r & \ddots & & \vdots & \\ & & \ddots & \ddots & \binom{r}{2} \lambda^{r-2} & \\ & & & \lambda^r & \binom{r}{1} \lambda^{r-1} & \\ & & & & \lambda^r & \end{pmatrix}$$

בגדרש.

תרגיל 3.19. תהי

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C})$$

חשבו את A^{2026} .

פתרון. נסמן $V = \mathbb{C}^3$ ונמצא בסיס ז'ורדן B עבור A . אז נקבל $P \in M_3(\mathbb{C})$ עבורה $J := PAP^{-1}$ מטריצת ז'ורדן, ואז

$$A^{2026} = (P^{-1}JP)^{2026} = P^{-1}J^{2026}P$$

כאשר מהחישוב הנ"ל נדע לחשב את J^{2026} .

ערכים עצמיים: ניתן לראות כי 9 ערך עצמי של A כי $Ae_3 = 9e_3$. נסמן ב- λ_1, λ_2 את הערכים העצמיים הנוספים ונקבל

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 + 9 &= \text{tr}(A) = 9 \\ 9\lambda_1\lambda_2 &= \det(A) = 9(-4 + 4) = 0 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

נקבל כי 9 ערך עצמי מריבוי אלגברי 1 וכי 0 ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. בפרט, (e_3) שרשרת ז'ורדן עבור הערך העצמי 9.

שרשרת ז'ורדן עבור $\lambda = 0$: מתקיים

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 81 & 81 & 81 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$\ker(T_A^2) = \text{Span}(e_1 - e_2, e_1 - e_3)$$

$$\text{Im}(T_A) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix}, e_3\right)$$

$$\text{Im}(T_A^2) = \text{Span}(e_3)$$

מתוך הגרעין $\ker(T_A^2)$, שנקרא המרחב העצמי המוכלל של 0 בערך עצמי של A נסתכל על בסיס לתמונה

$$\text{Im}(T_A) \cap \ker(T_A^2)$$

של

$$T_A|_{\ker(T_A^2)}$$

נחפש וקטור

$$x(e_1 - e_2) + y(e_1 - e_3) = \begin{pmatrix} x \\ y - x \\ -y \end{pmatrix}$$

בתמונה, וכיוון שבתמונה נמצא כל וקטור מהצורה

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

עבור $\alpha \in \mathbb{C}$, נוכל לקחת $y = 1$ ואז $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. נחפש $u \in \ker(T_A^2)$ עבורו $Au = v$. נכתוב

$$u = a(e_1 - e_2) + b(e_1 - e_3)$$

ואז

$$Au = a \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ניקח $a = 0, b = 1$ ונקבל כי $u = e_1 - e_3$ עונה על הנדרש.

נקבל שרשרת ז'ורדן

$$(A(e_1 - e_3), e_1 - e_3) = (2e_1 - e_2 - e_3, e_1 - e_3)$$

מסקנה: קיבלנו

$$B := (2e_1 - e_2 - e_3, e_1 - e_3, e_3)$$

עבור

$$[T_A]_B = J := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$A = [T_A]_E = [\text{Id}_V]_E^B [T_A]_B [\text{Id}_V]_B^E$$

נסמן

$$P := [\text{Id}_V]_E^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

שעמודותיה הן וקטורי הבסיס B , ונקבל

$$A = PJP^{-1}$$

אז

$$A^{2026} = PJ^{2026}P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9^{2026} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 9^{2026} & 9^{2026} & 9^{2026} \end{pmatrix}.$$

חלק II

מרחבי מכפלות פנימיות

פרק 4

מכפלות פנימיות וניצבות

4.1 מוטיבציה

נסתכל תחילה על המרחב הוקטורי $\mathbb{R}^n$. כיוון שנוכל לחשוב על וקטורים ב- $\mathbb{R}^n$ בתור נקודות במרחב, נוכל לחשוב על המרחק בין שני וקטורים $u, v \in \mathbb{R}^n$, שנסמנו $d(u, v)$. כדי לחשב מרחק כזה, נסתכל על האורך של הקטע המחבר בין u, v , וזה אותו אורך כמו של הקטע המחבר בין $0, u - v$. לכן, $d(u, v) = d(0, u - v)$. נקרא למרחק $d(0, u - v)$ האורך של $u - v$, כיוון שזה האורך של הקו המחבר בין $0, u - v$, ונסמנו $\|u - v\|$ בדומה לסימון $|z|$ של ערך מוחלט ב- $\mathbb{C}$. נוכל להשתמש במשפט פיתגורס כדי לקבל כי

$$\left\| \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{a^2 + b^2} = |a + ib|$$
 ולמשל מתקיים

כשמדובר על גיאומטריה אוקלידית, מושג חשוב בנוסף למרחק ואורך הוא זה של זווית. נסתכל על שני וקטורים u, v באורך 1 ועל הישרים ℓ_u, ℓ_v שעוברים דרכם. הקוסינוס $\cos(\alpha)$ של הזווית מ- ℓ_u ל- ℓ_v שווה לאורך של הוקטור שהקצה שלו הוא החיתוך בין ℓ_u לאנך מ- v ל- ℓ_u . נסמן וקטור זה $\langle v, u \rangle$, כיוון שהוא אכן כפולה של u מהיותו על ℓ_u . במקרה זה נקרא לו ההטלה של v על u . אז יתקיים

$$\cos(\alpha) = \langle v, u \rangle$$

ולכן

$$\alpha = \arccos(\langle v, u \rangle)$$

כדי להכליל את המושג של זווית, נכליל את הביטוי $\langle v, u \rangle$ באמצעות ההגדרה הבאה, של מכפלה פנימית.

4.2 מכפלות פנימיות

הגדרה 4.2.1 (מכפלה פנימית). יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. מכפלה פנימית על V היא פונקציה

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$$

המקיימת את התכונות הבאות.

חיוביות: לכל $v \in V \setminus \{0\}$ מתקיים $\langle v, v \rangle \geq 0$.

סימטריות (הרמיטיות): לכל $u, v \in V$ מתקיים $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.

לינאריות ברכיב הראשון: לכל $u, v \in V$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\langle \alpha u + v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

מרחב וקטורי V יחד עם מכפלה פנימית $\langle \cdot, \cdot \rangle$ נקרא מרחב מכפלה פנימית.

הערה 4.2.2. בודגמא מהמרחב האוקלידי, ניתן לראות שנובע מהדרישה הגיאומטרית שלנו כי

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i \in [n]} u_i v_i$$

עבור $u, v \in \mathbb{R}^n$ מאורך 1. נוכל בעצם להגדיר זאת עבור וקטור כללי, ונשים לב כי הדבר אכן מקיים את שלוש התכונות הדרושות, ולכן הינו מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.

מכפלה פנימית זאת נקראת המכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}^n$ ולעיתים נסמן אותה $u \cdot v := \langle u, v \rangle_{\text{std}}$.

תרגיל 4.1. קיבעו אלו מההעתיקות הבאות הן מכפלות פנימיות.

1.

$$f_1: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) \mapsto ax + by + (cz)^2$$

2.

$$f_2: \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) \mapsto ax + by + cz$$

3.

$$f_3: \mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) \mapsto ax + by + cz$$

פתרון. אף אחת מההעתיקות אינה מכפלה פנימית.

1. ההעתיקה f_1 אינה לינארית ברכיב הראשון, כי

$$f_1 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 1$$

ואילו

$$f_1 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 2^2 = 4 \neq 2 = 2f_1 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

2. ההעתיקה f_2 אינה חיובית, כי

$$f_2 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 0 \leq 0$$

3. ההעתקה f_3 אינה הרמיטית, כי

$$f_3 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ i \end{pmatrix} \right) = i$$

ואילו

$$f_3 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = i \neq -i = \bar{i} = \overline{f_3 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ i \end{pmatrix} \right)}$$

4.3 בסיסים אורתונורמליים והמרחב הניצב

הגדרה 4.3.1 (מטריקה המושרית מנורמה). יהי $(V, \|\cdot\|)$ מרחב נורמי. המטריקה המושרית על V היא $d(x, y) = \|x - y\|$.

כעת, את המרחק בין שני וקטורים קל בדרך כלל לחשב כאשר יש לנו נורמה נתונה. מעט מסובך יותר לחשב את המרחק מוקטור לקבוצה.

הגדרה 4.3.2 (מרחק מקבוצה). יהי (X, d) מרחב מטרי, יהי $x \in X$ ותהי $S \subseteq X$. נגדיר את המרחק של x מ- S להיות

$$d(x, S) := \inf \{d(x, s) \mid s \in S\}$$

תתיקבוצות של מרחב וקטורי שמעניינות אותנו הן בדרך כלל תת-מרחבים. במקרה האוקלידי, אנו יודעות כיצד לחשב את המרחק מתת-מרחב. כדי לחשב את $d(x, W)$ עבור $W \leq \mathbb{R}^n$, נעביר אנך מ- x ל- W ונחשב את המרחק בין x ונקודת החיתוך בין W לאנך.

כדי לעשות דבר דומה במרחבי מכפלה פנימית כלליים, נצטרך לדבר קודם כל על ניצבות.

הגדרה 4.3.3 (זווית במרחב מכפלה פנימית). יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $u, v \in V$. נגדיר את הזווית בין u, v בתור

$$\angle(u, v) = \arccos \left(\frac{\Re(\langle u, v \rangle)}{\|u\| \|v\|} \right)$$

הגדרה 4.3.4 (וקטורים ניצבים). יהי V מרחב מכפלה פנימית. וקטורים $u, v \in V$ נקראים ניצבים אם $\langle u, v \rangle = 0$. במקרה זה נסמן $u \perp v$.

הערה 4.3.5. מעל $\mathbb{R}$, וקטורים ניצבים בדיוק כאשר הזווית בינם היא $\frac{\pi}{2}$.

הגדרה 4.3.6. קבוצה $S \subseteq V$ במרחב מכפלה פנימית נקראת אורתוגונלית אם $s_1 \perp s_2$ לכל $s_1, s_2 \in S$ שונים.

משפט 4.3.7 (פיתגורס). תהי $(v_1, \dots, v_n)$ סדרה של וקטורים אורתוגונליים במרחב מכפלה פנימית V . אז

$$\|v_1 + \dots + v_n\|^2 = \|v_1\|^2 + \dots + \|v_n\|^2$$

כדי לדבר על המרחק של וקטור $v \in V$ מתת-מרחב $W \leq V$, נרצה לכתוב את v בתור סכום של שני וקטורים, כאשר אחד מהם מ- W והשני ניצב ל- W . ראינו כי $V = W \oplus W^\perp$ עבור $W^\perp$ תת-המרחב של הוקטורים הניצבים ל- W ולכן זה אפשרי. ככה, ושהמרחק יצא, כמו במקרה האוקלידי, האורך של החלק הניצב ל- W .

הגדרה 4.3.8 (מרחב ניצב). יהי V מרחב מכפלה פנימית, ותהי $S \subseteq V$. המרחב הניצב ל- S הוא

$$S^\perp = \{v \in V \mid \forall s \in S: v \perp s\}$$

טענה 4.3.9. יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $W \leq V$. מתקיים $V = W \oplus W^\perp$.

תרגיל 4.2. יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף-מימדי ותהי $S, T \subseteq V$.

1. נניח כי $S \subseteq T$. הראו כי $T^\perp \subseteq S^\perp$.

התאמה כזאת, כמו $S \mapsto S^\perp$, שהופכת יחס הבלה, נקראת התאמת גלואה.

2. נסמן $W = \text{Span}(S)$. הראו כי $W^\perp = S^\perp$.

3. הראו כי $(S^\perp)^\perp = \text{Span}(S)$.

פתרון. 1. יהי $v \in T^\perp$ ויהי $s \in S$. אז $s \in T$ כי $S \subseteq T$, ולכן $v \perp s$, כי $v \perp T$ לכל וקטור ב- T . לכן $v \in S^\perp$.

2. מתקיים $S \subseteq W$ ולכן $W^\perp \subseteq S^\perp$. יהי $v \in S^\perp$ ויהי $w \in W = \text{Span}(S)$. כיוון ש- $W = \text{Span}(S)$, יש איברים $s_1, \dots, s_k$ וסקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ עבורם $w = \sum_{i \in [k]} \alpha_i s_i$. אז

$$\langle v, w \rangle = \left\langle v, \sum_{i \in [k]} \alpha_i s_i \right\rangle = \sum_{i \in [k]} \alpha_i \langle v, s_i \rangle \stackrel{0}{=} 0$$

ולכן $v \in W^\perp$.

3. ראינו כי $(W^\perp)^\perp = W$ עבור $W \leq V$. ניקח $W = \text{Span}(S)$. מתקיים $S \subseteq W$ ולכן $W^\perp \subseteq S^\perp$ ואז $(S^\perp)^\perp \subseteq (W^\perp)^\perp = W$. כמו כן, $S^\perp = W^\perp$, תת-מרחב וקטורי ומכיוון ש- $(S^\perp)^\perp = V$, נקבל כי

$$\dim((S^\perp)^\perp) = \dim(V) - \dim(S^\perp) = \dim(V) - \dim(W^\perp) = \dim(W)$$

ולכן יש שוויון $(S^\perp)^\perp = W = \text{Span}(S)$.

הערה 4.3.10. באופן כללי,

$$\text{Span}(S) = \left\{ \sum_{i \in [k]} \alpha_i s_i \mid \begin{array}{l} \alpha_i \in \mathbb{F} \\ s_i \in S \end{array} \right\}$$

גם כאשר S אינסופית.

תרגיל 4.3. מצאו את $W^\perp$ עבור

$$W := \text{Span}(e_1 + e_2) \leq \mathbb{R}^2$$

פתרון. ראינו כי מתקיים $v \in \text{Span}(e_1 + e_2)^\perp$ אם ורק אם $v \perp e_1 + e_2$. זה מתקיים אם ורק אם $v_1 + v_2 = 0$ אם v ורק אם $v_2 = -v_1$ לכן

$$W^\perp = \text{Span}(e_1 - e_2)$$

הגדרה 4.3.11 (בסיס אורתונורמלי). יהי V מרחב מכפלה פנימית. בסיס $B = (v_1, \dots, v_n)$ של V נקרא אורתוגונלי אם

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{i,j} := \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \text{ לכל } i, j \neq 0, \text{ ואורתונורמלי אם}$$

הגדרה 4.3.12 (הטלה אורתוגונלית). יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $W \leq V$. ההטלה האורתוגונלית על W היא ההטלה על W ביחס לסכום הישר $V = W \oplus W^\perp$.

טענה 4.3.13. יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $W \leq V$. יהי $B = (w_1, \dots, w_m)$ בסיס אורתונורמלי של W ויהי $v \in V$. תהי P_W ההטלה האורתוגונלית על W . אז

$$P_W(w) = \sum_{i \in [m]} \langle v, w_i \rangle w_i$$

תרגיל 4.4. יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $u, v \in V$. הראו כי $u \perp v$ אם ורק אם

$$\|u\| \leq \|u + av\|$$

לכל $a \in \mathbb{F}$.

פתרון. אם $u \perp v$ ו- $a \in \mathbb{F}$, נקבל מפיתגורס

$$\|u + av\|^2 = \|u\|^2 + |a|^2 \|v\|^2 \geq \|u\|^2$$

ולכן $\|u\| \leq \|u + av\|$.

נניח כי $\langle u, v \rangle \neq 0$ ונניח תחילה כי $\|v\| = 1$. אז

$$\langle \langle u, v \rangle v, v \rangle = \langle u, v \rangle \langle v, v \rangle = \langle u, v \rangle \|v\|^2 = \langle u, v \rangle \neq 0$$

וגם

$$\langle u - \langle u, v \rangle v, v \rangle = \langle u, v \rangle - \langle \langle u, v \rangle v, v \rangle = 0$$

אז, ממשפט פיתגורס

$$\begin{aligned}\|u\|^2 &= \|u - \langle u, v \rangle v + \langle u, v \rangle v\|^2 \\ &= \|u - \langle u, v \rangle v\|^2 + \|\langle u, v \rangle v\|^2 \\ &> \|u - \langle u, v \rangle v\|^2\end{aligned}$$

כאשר האי-שוויון חזק כי $\langle u, v \rangle v \neq 0$ מההנחה $\langle u, v \rangle \neq 0$. לכן, עבור $a = \langle u, v \rangle$ לא מתקיים $\|u\| \leq \|u + av\|$.
 כעת, אם v כללי, הוקטור $\frac{v}{\|v\|}$ הינו מאורך 1 ולכן יש $a' \in \mathbb{F}$ עבורו $\|u\| > \|u + a' \frac{v}{\|v\|}\|$. אז ניקח $a = \frac{a'}{\|v\|}$ ונקבל כי $\|u\| > \|u + av\|$.

כדי למצוא בסיסים אורתונורמליים ומשלימים ישרים, ניעזר בתהליך שלוקח בסיס כלשהו ומחזיר בסיס אורתונורמלי.

משפט 4.3.14 (גרס־שמידט). יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $B = (u_1, \dots, u_n)$ בסיס של V . קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{C} = (v_1, \dots, v_n)$ של V עבורו

$$\text{Span}(u_1, \dots, u_i) = \text{Span}(v_1, \dots, v_i)$$

לכל $i \in [n]$.

ניסוח זה של המשפט לא מתאר לנו איך למצוא את $\mathcal{C}$, אבל ההוכחה שלו קונסטרוקטיבית ומתארת את האלגוריתם הבא.

$$1. \text{ עבור } i = 1 \text{ ניקח } v_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}.$$

2. עבור כל i לאחר מכן, לפי הסדר, ניקח

$$w_i = u_i - \sum_{j \in [i-1]} \langle u_i, v_j \rangle v_j$$

$$v_i = \frac{w_i}{\|w_i\|}$$

מסקנה 4.3.15. יהי $W \leq V$ תת־מרחב במרחב מכפלה פנימית. כדי למצוא אורתונורמלי של W ושל $W^\perp$ ניקח בסיס $\mathcal{B}_W$ של W ונשלים אותו לבסיס $\mathcal{B} = \mathcal{B}_W \cup \mathcal{B}'_W$ של V . נבצע את תהליך גרס־שמידט על $\mathcal{B}$ ונקבל בסיס $\mathcal{C} = \mathcal{C}_W \cup \mathcal{C}'_W$ כך ש- $\text{Span}(\mathcal{C}_W) = \text{Span}(\mathcal{B}_W) = W$ ו- $W^\perp$ כמו כן, $W' := \text{Span}(\mathcal{C}'_W) \subseteq \mathcal{C}$ אורתונורמלי, ולכן $W' \subseteq W^\perp$.

$$\dim(W') = \dim(V) - \dim(W) = \dim(W^\perp)$$

כי $W' = W^\perp$ יש שוויון $V = W \oplus W' = W \oplus W^\perp$.

משפט 4.3.16 (מרחק של וקטור מתת־מרחב). יהי V מרחב מכפלה פנימית, יהי $W \leq V$, תהי P_W ההטלה האורתוגונלית על W ויהי $v \in V$ מתקיים

$$d(v, W) = d(v, P_W(v))$$

הוכחה. ראינו בהרצאה שמתקיים $v - P_W(v) \in W^\perp$ אז לכל $w \in W$ מתקיים ממשפט פיתגורס

$$d(v, w)^2 = d(w, P_W(v))^2 + d(v, P_W(w))^2 \geq d(v, P_W(w))^2$$

ולכן

$$d(v, w) \geq d(v, P_W(w))$$

■

תרגיל 4.5. יהי $V = M_2(\mathbb{R})$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^t A)$$

ויהי $W \leq V$ התת־מרחב של המטריצות הסימטריות.

1. מציאו בסיס אורתונורמלי עבור W ועבור $W^\perp$.

2. הראו כי $P_W(A) = \frac{A+A^t}{2}$ בשתי דרכים שונות.

3. חשבו את המרחק של $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ מ- W .

פתרון. 1. ניקח בסיס $\mathcal{B}_W = (E_{1,1}, E_{1,2} + E_{2,1}, E_{2,2})$ של W ונשלים אותו לבסיס

$$B = (u_1, u_2, u_3, u_4) = (E_{1,1}, E_{1,2} + E_{2,1}, E_{2,2}, E_{1,2})$$

של V . נבצע את תהליך גרם-שמידט כדי לקבל בסיס אורתונורמלי (v_1, v_2, v_3, v_4) עבורו $W = \text{Span}(v_1, v_2, v_3)$ וגם $W^\perp = \text{Span}(v_4)$.

נחשב

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{\|E_{1,1}\|} E_{1,1} = E_{1,1} \\ w_2 &= u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1 = E_{1,2} + E_{2,1} - 0 = E_{1,2} + E_{2,1} \\ v_2 &= \frac{1}{\|w_2\|} w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (E_{1,2} + E_{2,1}) \\ w_3 &= u_3 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 = u_3 = E_{2,2} \\ v_3 &= \frac{1}{\|w_3\|} w_3 = E_{2,2} \\ w_4 &= u_4 - \langle u_4, v_3 \rangle v_3 - \langle u_4, v_2 \rangle v_2 - \langle u_4, v_1 \rangle v_1 \\ &= E_{1,2} - \left\langle E_{1,2}, \frac{1}{\sqrt{2}} (E_{1,2} + E_{2,1}) \right\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (E_{1,2} + E_{2,1}) \right) \\ &= E_{1,2} - \frac{1}{2} (E_{1,2} + E_{2,1}) \\ &= \frac{1}{2} (E_{1,2} - E_{2,1}) \\ v_4 &= \frac{w_4}{\|w_4\|} = \frac{1}{\|E_{1,2} - E_{2,1}\|} (E_{1,2} - E_{2,1}) = \frac{1}{\sqrt{2}} (E_{1,2} - E_{2,1}) \end{aligned}$$

ונקבל כי

$$(v_1, v_2, v_3) = \left(E_{1,1}, \frac{1}{\sqrt{2}} (E_{1,2} + E_{2,1}), E_{2,2} \right)$$

בסיס אורתונורמלי של W וכי $\frac{1}{\sqrt{2}} (E_{1,2} - E_{2,1})$ בסיס אורתונורמלי של $W^\perp$. אז, $W^\perp$ מרחב המטריצות האנטיסימטריות.

2. בדרך אחת, זכור לנו מאלגברה א' כי

$$A = \frac{A + A^t}{2} + \frac{A - A^t}{2}$$

כאשר $\frac{A + A^t}{2}$ סימטרית ו- $\frac{A - A^t}{2}$ אנטי-סימטרית. אז $\frac{A + A^t}{2} \in W$ וכיוון ש- $W^\perp$ מרחב המטריצות האנטיסימטריות, נקבל גם $\frac{A - A^t}{2} \in W^\perp$. לכן $P_W(A) = \frac{A + A^t}{2}$.

אבל, במקרה הכללי, לא נדע מראש איך לכתוב וקטור $v \in V$ בתור סכום של וקטור ב- W ווקטור ב- $W^\perp$. כדי לחשב את ההטלה $P_W(A)$ נוכל לקחת בסיס אורתונורמלי של W ולהשתמש בנוסחא עבור ההטלה האורתוגונלית לפי בסיס זה.

אכן,

$$\begin{aligned} P_W(A) &= \sum_{i \in [3]} \langle A, v_i \rangle v_i \\ &= \langle A, E_{1,1} \rangle E_{1,1} + \left\langle A, \frac{1}{\sqrt{2}} (E_{1,2} + E_{2,1}) \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (E_{1,2} + E_{2,1}) + \langle A, E_{2,2} \rangle E_{2,2} \\ &= a_{1,1} E_{1,1} + \frac{1}{2} (a_{1,2} + a_{2,1}) (E_{1,2} + E_{2,1}) + a_{2,2} E_{2,2} \\ &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & \frac{a_{1,2} + a_{2,1}}{2} \\ \frac{a_{1,2} + a_{2,1}}{2} & a_{2,2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{A + A^t}{2} \end{aligned}$$

3. נכתוב את A בתור סכום של מטריצה סימטרית ואנטי-סימטרית. ראינו כי

$$A = \frac{A + A^t}{2} + \frac{A - A^t}{2}$$

באשר $\frac{A+A^t}{2}$ סימטרית ו- $\frac{A-A^t}{2}$ אנטי-סימטרית. אז $d_W(A) = \frac{A+A^t}{2}$ ונקבל כי המרחק של A מ- W הוא

$$d\left(A, \frac{A+A^t}{2}\right) = \left\| A - \frac{A+A^t}{2} \right\|$$

מתקיים

$$\begin{aligned} \left\| A - \frac{A+A^t}{2} \right\| &= \left\| \frac{A-A^t}{2} \right\| \\ &= \frac{1}{2} \left\| \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\| \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

ולכן $d(A, W) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

פרק 5

אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית

5.1 המרחב הדואלי, ומשפט ההצגה של ריס

הגדרה 5.1.1 (המרחב הדואלי). יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל שדה $\mathbb{F}$. המרחב הדואלי של V הוא

$$V^* := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F})$$

איבריו נקראים פונקציונלים לינאריים.

משפט 5.1.2 (משפט ההצגה של ריס). יהי V מרחב מכפלה פנימית. לכל $v \in V$ נסמן

$$h_v: V \rightarrow V^* \\ w \mapsto \langle w, v \rangle$$

אז ההעתקה

$$H^V: V \rightarrow V^* \\ v \mapsto h_v$$

הינה איזומורפיזם לינארי.

מסקנה 5.1.3 (ניסוח קונקרטי למשפט ההצגה של ריס). יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף-מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהי $\varphi \in V^*$ פונקציונל לינארי על V . קיים וקטור $w \in V$ יחיד עבורו $\varphi(v) = \langle v, w \rangle$ לכל $v \in V$. בנוסף, אם $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתונורמלי של V , מתקיים

$$w = \sum_{i \in [n]} \langle w, v_i \rangle v_i = \sum_{i \in [n]} \overline{\varphi(v_i)} v_i$$

תרגיל 5.1. יהי $V = M_n(\mathbb{C})$ ותהי $\text{tr}: V \rightarrow \mathbb{C}$ העתקת העקבה. מיצאו מטריצה B עבורה $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A)$ לכל $A \in V$.

פתרון. נסתכל על הבסיס האורתונורמלי $(E_{i,j})_{i,j \in [n]}$ של V וניעזר בנוסחה. נקבל

$$B = \sum_{i,j \in [n]} \overline{\text{tr}(E_{i,j})} E_{i,j} = \sum_{i \in [n]} E_{i,i} = I_n$$

תרגיל 5.2. 1. הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $C > 0$ כך שלכל $p \in \mathbb{R}_n[x]$ מתקיים

$$|p(0)| \leq C \left(\int_{-1}^1 p(x)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

2. חשבו את C המינימלי עבור $n = 2$.

פתרון. 1. נשים לב כי

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$$

מכפלה פנימית. אז

$$\left(\int_{-1}^1 p(x)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\langle p, p \rangle \right)^{\frac{1}{2}} = \|p\|$$

כלומר, עלינו להוכיח

$$|p(0)| \leq C \|p\|$$

ההצבה

$$\begin{aligned} \text{ev}_0: \mathbb{R}_n[x] &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto f(0) \end{aligned}$$

היא פונקציונל לינארי, ולכן ממשפט ריס יש $g \in \mathbb{R}_n[x]$ עבורו

$$p(0) = \text{ev}_0(p) = \langle p, g \rangle$$

עכשיו, מקושי-שוורץ

$$|p(0)| = |\langle p, g \rangle| \leq \|p\| \|g\|$$

לכן ניקח $C = \|g\|$.

2. נסמן $g(x) = ax^2 + bx + c$. נשים לב כי כאשר $p = g$ יש שוויון בקושי-שוורץ ואז

$$|p(0)| = \|p\| \|g\| \leq C \|p\|$$

גורר $C \geq \|g\|$. ראינו כי $C = \|g\|$ מקיים את הנדרש, ולכן נותר למצוא את $\|g\|$.

כדי לא להצטרך בסיס אורתונורמלי, שיהיה פחות יפה במקרה הזה, נשים לב שמספיק לחשב את המכפלות הפנימיות בין g לאיברי בסיס בלשהו. לפי בסיס אורתונורמלי $B = (v_1, \dots, v_n)$ מתקיים

$$g = \sum_{i \in [n]} \langle g, v_i \rangle v_i$$

אם $C = (u_1, \dots, u_n)$ בסיס נוסף, נוכל לכתוב

$$v_i = \sum_{j \in [n]} \alpha_{i,j} u_j$$

ואז

$$g = \sum_{i \in [n]} \langle g, v_i \rangle v_i = \sum_{i,j \in [n]} \bar{\alpha}_{i,j} \langle g, u_j \rangle u_j$$

ונקבל שמהכפלות הפנימיות $\langle g, u_i \rangle$ נותנות מספיק אינפורמציה כדי למצוא את g .

בעת, נחשב את המכפלות הפנימיות של g עם איברי הבסיס הסטנדרטי ונפתור מערכת משוואות שיהיה לה פתרון יחיד שהוא מקדמי g .

$$1 = 1(0) = \langle g(x), 1 \rangle = \int_{-1}^1 g(x) dx = \frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \Big|_{x=-1}^1 = \frac{2a}{3} + 2c$$

$$0 = x(0) = \langle g(x), x \rangle = \int_{-1}^1 g(x) x dx = \frac{ax^4}{4} + \frac{bx^3}{3} + \frac{cx^2}{2} \Big|_{x=-1}^1 = \frac{2b}{3}$$

$$0 = x^2(0) = \langle g(x), x^2 \rangle = \int_{-1}^1 g(x) x^2 dx = \frac{ax^5}{5} + \frac{bx^4}{4} + \frac{cx^3}{3} \Big|_{x=-1}^1 = \frac{2a}{5} + \frac{2c}{3}$$

מהמשוואה השנייה נקבל $b = 0$. מהמשוואה הראשונה פחות 3 פעמים השנייה נקבל

$$1 = \frac{2a}{3} - 3 \cdot \frac{2a}{5} + 0 = \frac{10a - 18a}{15}$$

ולכן $a = -\frac{15}{8}$. אז מהמשוואה השלישית נקבל

$$c = -\frac{3a}{5} = -\frac{9}{8}$$

ולכן

$$g(x) = -\frac{15}{8}x^2 - \frac{9}{8}$$

אז

$$C = \|g\| = \sqrt{\int_{-1}^1 \left(-\frac{15}{8}x^2 - \frac{9}{8} \right)^2 dx} = \frac{27}{4}$$

5.2 ההעתקה הצמודה

משפט 5.2.1 (ההעתקה הצמודה). יהיו V, W מרחבי מכפלה פנימית סוף-מימדיים ותהי $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. קיימת העתקה יחידה $T^* \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V)$ עבורה

$$\langle T(v), w \rangle_W = \langle v, T^*(w) \rangle_V$$

לכל $v \in V$ ולכל $w \in W$.
היא נקראת ההעתקה הצמודה של T .

משפט 5.2.2. יהיו $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V), (W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$ מרחבי מכפלה פנימית סוף מימדיים עם בסיסים אורתונורמליים B, C בהתאמה, ותהי $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ אז $[T^*]_B^C = ([T]_C^B)^*$.

כעת, אם $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, יש לנו דרכים שונות לחשב את T^* . נוכל לנחש איזה אופרטור יקיים $\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$ לכל $v, w \in V$, על ידי מניפולציות של הצגת המכפלה הפנימית. נוכל גם לכתוב את T^* בצורה כללית ולפתור מערכת משוואות. לבסוף, נוכל לקחת בסיס אורתונורמלי B , כדי שיתקיים $[T^*]_B = [T]_B^{-t}$, ואז לשחזר את T^* מהמטריצה המייצגת. נראה דוגמאות לחישוב בכל אחת מהדרכים.

תרגיל 5.3. יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) \bar{g}(x) dx$$

יהי $D \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ אופרטור הגזירה. מציאו את D^* .

פתרון. כדי להראות כי $D^* = S$ די להראות כי $\langle Df, g \rangle = \langle f, Dg \rangle$ עבור f, g בבסיס נתון, מלינאריות. נחשב מה צריך להיות D^* לפי הבסיס $(1, x, x^2)$. יהי $g(x) = ax^2 + bx + c$. נחשב את מכפלת $D(g)$ עם 1

$$\begin{aligned} 0 &= \langle 0, g \rangle \\ &= \langle D(1), g \rangle \\ &= \langle 1, D^*(g) \rangle \\ &= \int_{-1}^1 D^*(g)(x) dx \end{aligned}$$

עם x

$$\begin{aligned} \frac{2a}{3} + 2c &= \left. \frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \right|_{-1}^1 \\ &= \int_{-1}^1 ax^2 + bx + c dx \\ &= \langle 1, g \rangle \\ &= \langle D(x), g \rangle \\ &= \langle x, D^*(g) \rangle \\ &= \int_{-1}^1 x D^*(g)(x) dx \end{aligned}$$

ועם x^2

$$\begin{aligned} \frac{4b}{3} &= \left. \frac{2ax^4}{4} + \frac{2bx^3}{3} + \frac{2cx^2}{2} \right|_{-1}^1 \\ &= 2 \int_{-1}^1 ax^3 + bx^2 + cx dx \\ &= \langle 2x, g \rangle \\ &= \langle D(x^2), g \rangle \\ &= \langle x^2, D^*(g) \rangle \\ &= \int_{-1}^1 x^2 D^*(g)(x) dx \end{aligned}$$

נכתוב $D^*(g) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ונקבל

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 \alpha x^2 + \beta x + \gamma \, dx = \frac{2\alpha}{3} + 2\gamma \\ \frac{2a}{3} + c &= \int_{-1}^1 \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x \, dx = \frac{2\beta}{3} \\ \frac{4b}{3} &= \int_{-1}^1 \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 \, dx = \frac{\alpha x^5}{5} + \frac{\beta x^4}{4} + \frac{\gamma x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{2\alpha}{5} + \frac{2\gamma}{3} \end{aligned}$$

מהמשוואה הראשונה, $\gamma = -\frac{\alpha}{3}$. אז מהמשוואה השלישית, $\frac{4b}{3} = \frac{2\alpha}{5} - \frac{2\alpha}{9}$ כלומר

$$4b = \left(\frac{6}{5} - \frac{2}{3}\right) \alpha = \left(\frac{18}{15} - \frac{10}{15}\right) \alpha = \frac{8\alpha}{15}$$

כלומר $b = \frac{2\alpha}{15}$ כלומר $b = \frac{15}{2} \alpha$. נקבל כי $\gamma = -\frac{5}{2}$ ומהמשוואה השנייה כי $\beta = a + \frac{3c}{2}$. לכן

$$D^*(ax^2 + bx + c) = \frac{15}{2}bx^2 + \left(a + \frac{3c}{2}\right)x - \frac{5}{2}$$

תרגיל 5.4. יהי $V = M_n(\mathbb{C})$ עם המכפלה הפנימית $\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^*, A)$ ויהי

$$\begin{aligned} \Phi: V &\rightarrow V \\ A &\mapsto A^t \end{aligned}$$

חשבו את Φ^* .

פתרון. נוכל לחשב ישירות,

$$\begin{aligned} \langle \Phi(A), B \rangle &= \langle A^t, B \rangle \\ &= \text{tr}(B^* A^t) \\ &= \overline{\text{tr}(B^* A^t)} \\ &= \overline{\text{tr}(B^t A^*)} \\ &= \text{tr}(A^* B^t) \\ &= \overline{\langle B^t, A \rangle} \\ &= \langle A, B^t \rangle \\ &= \langle A, \Phi(B) \rangle \end{aligned}$$

ולכן $\Phi^* = \Phi$.

נוכל לחשב זאת גם בעזרת מטריצה מייצגת בבסיס אורתונורמלי. נסמן ב- $E_{i,j}$ מטריצה עבורה $(E_{i,j})_{k,\ell} = \delta_{i,k} \delta_{j,\ell}$. כלומר, זאת מטריצה עם 0 בכל המקדמים חוץ מזה בשורה ה- i והעמודה ה- j . אז בבסיס

$$B := (E_{1,1}, \dots, E_{n,n}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{1,3}, E_{3,1}, \dots, E_{n-1,n}, E_{n,n-1})$$

נקבל כי

$$[\Phi]_B = I_n \oplus \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \dots \oplus \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

כיוון ש- B בסיס אורתונורמלי נקבל כי $[\Phi^*]_B = \overline{[\Phi]_B}^t$. אך $[\Phi]_B$ מטריצה ממשית סימטרית, ולכן $[\Phi^*]_B = [\Phi]_B$ ואז $\Phi^* = \Phi$.

תרגיל 5.5. יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F}$ ממימד $n \in \mathbb{N}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$

1. הראו כי

$$\ker(T^*T) = \ker(T)$$

2. הראו כי

$$\text{Im}(T^*T) = \text{Im}(T^*)$$

פתרון. 1. יהי $v \in \ker(T)$ אז

$$(T^*T)(v) = T^*(T(v)) = T^*(0) = 0$$

ולכן $v \in \ker(T^*T)$ ונקבל כי $\ker(T) \subseteq \ker(T^*T)$.

יהי $v \in \ker(T^*T)$ אז $T^*T(v) = 0$ נקבל כי

$$\langle T^*T(v), v \rangle = 0$$

אבל

$$\langle T^*T(v), v \rangle = \langle T(v), T(v) \rangle$$

מהגדרת T^* . לכן

$$\langle T(v), T(v) \rangle = 0$$

ומחויבות המכפלה הפנימית נקבל כי $T(v) = 0$ לכן $\ker(T^*T) \subseteq \ker(T)$, ובסך הכל נקבל שוויון.

2. ראינו בהרצאה שמתקיים

$$\operatorname{Im}(S) = \ker(S^*)^\perp$$

לכל $S \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ לכן

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(T^*T) &= \ker((T^*T)^*)^\perp \\ &= \ker(T^*(T^*)^*)^\perp \\ &= \ker(T^*T)^\perp \\ &= \ker(T)^\perp \end{aligned}$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בסעיף הקודם.

ראינו גם שלכל $S \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ מתקיים $\ker(S) = \operatorname{Im}(S^*)^\perp$ ולכן נקבל כי

$$\ker(T)^\perp = \operatorname{Im}(T^*)$$

ובסך הכל נקבל

$$\operatorname{Im}(T^*T) = \operatorname{Im}(T^*)$$

תרגיל 5.6. יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד $n \in \mathbb{F}$ מעל $\mathbb{F}$. הוכיחו כי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הינו נורמלי אם ורק אם קיימים $A, B \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ צמודים לעצמם ומתחלפים עבורם

$$T = A + iB$$

פתרון. נניח תחילה כי קיימים $A, B \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ צמודים לעצמם ומתחלפים עבורם $T = A + iB$ אז

$$\begin{aligned} T^*T &= (A + iB)^*(A + iB) \\ &= (A^* - iB^*)(A + iB) \\ &= (A - iB)(A + iB) \\ &= (A + iB)(A - iB) \\ &= (A + iB)(A^* - iB^*) \\ &= (A + iB)(A + iB)^* \\ &= TT^* \end{aligned}$$

ולכן T נורמלי.

מצד שני, נניח כי T נורמלי, ונרצה למצוא A, B כנ"ל. ניזכר בפירוק של מטריצה בסכום של מטריצה סימטרית ואנטי-סימטרית, ונכתוב

$$\begin{aligned} T &= \frac{T + T^*}{2} + \frac{T - T^*}{2} \\ &= \frac{T + T^*}{2} + i \cdot \frac{T - T^*}{2i} \end{aligned}$$

נסמן

$$A = \frac{T + T^*}{2}$$

$$B = \frac{T - T^*}{2i}$$

ונראה שהם צמודים-לעצמם ומתחלפים. ראשית, כיוון שלכל $\alpha \in \mathbb{F}$, $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, מתקיים $(\alpha S)^* = \bar{\alpha} S^*$, נקבל כי

$$A^* = \frac{1}{2} (T + T^*)^* = \frac{1}{2} (T^* + (T^*)^*) = \frac{1}{2} (T^* + T) = A$$

$$B^* = -\frac{1}{2i} (T^* - (T^*)^*) = -\frac{1}{2i} \cdot -(T - T^*) = B$$

לכן A, B צמודים לעצמם. הם גם מתחלפים כי

$$AB = \left(\frac{T + T^*}{2} \right) \left(\frac{T - T^*}{2i} \right)$$

$$= -\frac{1}{4i} (T^2 - TT^* + T^*T - (T^*)^2)$$

$$= \left(\frac{T - T^*}{2i} \right) \left(\frac{T + T^*}{2} \right)$$

$$= BA$$

תרגיל 5.7. יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד $n \in \mathbb{F}$ מעל $\mathbb{F}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. הוכיחו כי $U \leq V$ הינו T -שמור אם ורק אם $U^\perp$ הינו T^* -שמור.

פתרון. יהי $U \leq V$ תת-מרחב T -שמור. כדי להראות כי $U^\perp$ הינו T^* -שמור, ניקח $v \in U^\perp$ ונראה כי $T^*(v) \in U^\perp$. כלומר, ניקח $u \in U$ ונראה כי $u \perp T^*(v)$. אכן, כיוון ש- U הינו T -שמור, מתקיים $T(u) \in U$, וכיוון ש- $v \in U^\perp$ נקבל כי

$$\langle T^*(v), u \rangle = \langle v, T(u) \rangle = 0$$

מצד שני, נניח כי $U^\perp$ הינו T^* -שמור ונראה כי U הינו T -שמור. נסמן $S = T^*$ וגם $W = U^\perp$. אז מההנחה W הוא S -שמור, ולכן מהכיוון הראשון $W^\perp = (U^\perp)^\perp = U$ הוא S^* -שמור, כנדרש. $S^* = (T^*)^* = T$

תרגיל 5.8. יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד $n \in \mathbb{F}$ מעל $\mathbb{F}$ ותהי $P \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הטלה. הראו שהתנאים הבאים שקולים.

1. P צמודה לעצמו.

2. P נורמלית.

3. קיים $U \leq V$ עבורו $P = P_U$ הטלה האורתוגונלית על U .

פתרון. • נניח כי P צמודה לעצמה. אז $P^* = P$ ובפרט P, P^* מתחלפות. לכן P נורמלית.

• נניח כי P נורמלית ונראה כי $P = P_U$ כאשר $U := \text{Im}(P)$. הטלה P_U היא ההטלה על U במקביל ל- $U^\perp$, וההטלה P היא ההטלה על U במקביל ל- $\ker(P)$, לכן די להראות כי $\ker(P)^\perp = \text{Im}(P)$.

אנו יודעות כי

$$\ker(P^*) = \text{Im}(P)^\perp$$

ולכן נותר להראות כי $\ker(P) = \ker(P^*)$. ניזכר בתרגיל קודם בו ראינו כי לכל אופרטור T מתקיים

$$\ker(T^*T) = \ker(T)$$

ונקבל כי

$$\ker(P) = \ker(P^*P) = \ker(PP^*) = \ker(P^*)$$

כנדרש.

• נניח לבסוף כי $P = P_U$ ונראה כי צמודה לעצמה.

P ההטלה על התמונה במקביל לגרעין ובמקביל למרחב הניצב לתמונה, ולכן

$$\ker(P) = \operatorname{Im}(P)^\perp$$

נסמן $W = \ker(P) = U^\perp$, יהיו $v_1, v_2 \in V$, ונכתוב $v_i = u_i + w_i$ עבור $u_i \in U, w_i \in W$. אז

$$\begin{aligned} \langle P(v_1), v_2 \rangle &= \langle u_1, v_2 \rangle \\ &= \langle u_1, u_2 + w_2 \rangle \\ &= \langle u_1, u_2 \rangle + \langle u_1, w_2 \rangle \xrightarrow{0} \\ &= \langle u_1, u_2 \rangle \end{aligned}$$

ומצד שני

$$\begin{aligned} \langle v_1, P(v_2) \rangle &= \langle v_1, u_2 \rangle \\ &= \langle u_1 + w_1, u_2 \rangle \\ &= \langle u_1, u_2 \rangle + \langle w_1, u_2 \rangle \xrightarrow{0} \\ &= \langle u_1, u_2 \rangle \end{aligned}$$

ולכן בסך הכל

$$\langle P(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, P(v_2) \rangle$$

ביוון שזה מתקיים לכל $v_1, v_2 \in V$, נקבל לפי הגדרת P^* כי $P^* = P$, בנדרש.