

אלגברה ב' (01040168) – חורף 2026
תרגול 10 – פולינומים אופייני ומינימלי, והדטרמיננטה
אלן סורני
הרשימות עודכנו לאחרונה בתאריך ה-6 בינואר 2026

1 פולינומים אופייני ומינימלי

הגדרה 1.1 (פולינום אופייני). יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עם ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ כאשר הערך העצמי λ_i מריבוי אלגברי $r_i := r_a(\lambda_i)$ וכאשר

$$\sum_{i \in [k]} r_i = \dim(V).$$

הפולינום האופייני של T הוא

$$p_T(x) := \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)^{r_i}$$

הגדרה 1.2 (פולינום מינימלי). יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. הפולינום המינימלי של T הוא הפולינום $p \in \mathbb{F}[x]$ המתקן מהמעלה המינימלית עבורו $p(T) = 0$. נסמנו $m_i(x)$.

טענה 1.3. נניח כי \mathbb{F} סגור אלגברית. אז ל- T כ"ל יש פולינום מינימלי, והחזקה של $(x - \lambda_i)$ בפולינום המינימלי היא אינדקס הנילפוטנטיות של $T - \lambda_i \text{Id}_V|_{V_{\lambda_i}'}$, שהוא גודל בלוק ז'ורדן המקסימלי עם ערך עצמי λ_i בצורת ז'ורדן של T .

טענה 1.4. יהי T כ"ל ויהי $f \in \mathbb{F}[x]$ עבורו $f(T) = 0$. אז $f \mid m_T$. כלומר, קיים פולינום $g \in \mathbb{F}[x]$ עבורו $m_T(x) = f(x)g(x)$.

מסקנה 1.5 (משפט קיילי-המילטון). יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל שדה \mathbb{F} . לכל $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ מתקיים $p_T(T) = 0$.

הערה 1.6. עבור מטריצה ריבועית A , נגדיר

$$p_A := p_{L_A}, \\ m_A := m_{L_A}$$

ובאותו אופן אם $f(A) = 0$ אז $f \mid m_A$, ומתקיים $p_A(A) = 0$.

תרגיל 1. יהי $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ותהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. יהי $m \in \mathbb{N}_+$ עבורו $T^m = \text{Id}_V$. הראו כי T לבסין.

פתרון. כדי להראות ש- T לבסין מספיק להראות שכל שורשי m_T הינם מריבוי 1. מההנחה, מתקיים $m_T \mid (x^m - 1)$ ולכן די להראות שכל שורשי $x^m - 1$ הם מריבוי 1. אכן, יש לפולינום זה m שורשים שונים

$$\left\{ e^{\frac{2\pi i k}{m}} \mid k \in [m] \right\} = \left\{ \text{cis} \left(\frac{2\pi k}{m} \right) \mid k \in [m] \right\}$$

תרגיל 2. 1. תהיינה $A, B \in \text{Mat}_6(\mathbb{C})$ המקיימות

$$p_A = p_B \quad (\text{i})$$

$$m_A = m_B \quad (\text{ii})$$

הראו כי $A \sim B$.

2. מצאו $A, B \in \text{Mat}_6(\mathbb{C})$ שאינן דומות וכך שמתקיים

$$p_A = p_B \quad (\text{i})$$

$$m_A = m_B \quad (\text{ii}) \quad \text{וזהו פולינום ממעלה 4.}$$

פתרון. 1. נתון $\deg m_A = 5$, וזהו סכום גדלי הבלוקים המקסימליים של הערכים העצמיים השונים של A . לכן יש ערך עצמי λ מריבוי גיאומטרי 2 ובלוק מגודל 1, וכל ערך עצמי אחר הוא מריבוי גיאומטרי 1. אז

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_m(\lambda_1) & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & J_{m_r}(\lambda_r) \end{pmatrix}$$

נתון $m_A = m_B$ לכן באותו אופן

$$B \sim \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_m(\lambda_1) & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & J_{m_r}(\lambda_r) \end{pmatrix}$$

ונסיק כי $A \sim B$.

2. נסתכל על

$$A := \begin{pmatrix} J_1(0) & & \\ & J_1(0) & \\ & & J_4(0) \end{pmatrix}$$

$$B := \begin{pmatrix} J_2(0) & & \\ & & \\ & & J_4(0) \end{pmatrix}$$

ונקבל $m_A = m_B = x^4$ אבל $A \not\sim B$ כי יש להן צורת ז'ורדן שונה.

2 הדטרמיננטה

הגדרה 2.1 (תמורה). תהי קבוצה X . תמורה על X היא העתקה הפיכה $\sigma: X \rightarrow X$.

סימון 2.2. נסמן ב- $\text{Sym}(n)$ את התמורות על הקבוצה $[n]$.

הגדרה 2.3 (סימן של תמורה). תהי $\sigma \in \text{Sym}(n)$. הסימן של σ הוא

$$\text{sgn}(\sigma) := (-1)^k$$

כאשר

$$k := \left| \left\{ (i, j) \in [n]^2 \mid \begin{matrix} i < j \\ \sigma(i) > \sigma(j) \end{matrix} \right\} \right|$$

הגדרה 2.4 (הדטרמיננטה). תהי $A = (a_{i,j})_{i,j \in [n]} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. הדטרמיננטה של A היא

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in \text{Sym}(n)} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i \in [n]} a_{i, \sigma(i)}$$

הגדרה 2.5 (תבנית k -לינארית). יהי V מרחב וקטורי מעל שדה \mathbb{F} . תבנית k -לינארית על V היא העתקה

$$f(\cdot, \dots, \cdot) : V^k \rightarrow \mathbb{F}$$

שהינה לינארית בכל רכיב.

הגדרה 2.6 (תבנית מתחלפת). תהי f תבנית k -לינארית על מרחב וקטורי V מעל \mathbb{F} . נגיד כי f תבנית מתחלפת אם לכל $\sigma \in \text{Sym}(k)$ ולכל $v_1, \dots, v_k \in V$ מתקיים

$$f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \text{sgn}(\sigma) f(v_1, \dots, v_k)$$

תרגיל 3. נוכל לחשוב על הדטרמיננטה כעל העתקה

$$(\mathbb{F}^n)^n \rightarrow \mathbb{F}$$

שלוקחת וקטורים $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^n$ לדטרמיננטה של

$$\begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$$

1. הראו שהעתקה זאת לינארית בכל רכיב.

2. הראו שמתקיים

$$\det(v_1, \dots, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = -\det(v_1, \dots, v_{i+1}, v_i, \dots, v_n)$$

והסבירו איך נובע ש- \det תבנית n -לינארית מתחלפת. היעזרו בכך שמתקיים

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau)$$

לכל זוג תמורות $\sigma, \tau \in \text{Sym}(k)$.

פתרון. 1. יהיו $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, v_n, u, w \in \mathbb{F}^n$ ותהי $\alpha \in \mathbb{F}$. נסמן $v_i = \alpha u + w$. נראה שמתקיים

$$\det(v_1, \dots, v_{i-1}, \alpha u + w, v_{i+1}, \dots, v_n) = \alpha \det(v_1, \dots, v_{i-1}, u, v_{i+1}, \dots, v_n) + \det(v_1, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

אכן,

$$\begin{aligned} \det(v_1, \dots, v_{i-1}, \alpha u + w, v_{i+1}, \dots, v_n) &= \sum_{\sigma \in \text{Sym}(n)} \prod_{j \in [k]} \text{sgn}(\sigma) (v_i)_{\sigma^{-1}(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in \text{Sym}(n)} \text{sgn}(\sigma) \left(\prod_{\substack{j \in [n] \\ \sigma(j) \neq i}} (v_{\sigma(j)})_j \right) \cdot (v_i)_{\sigma^{-1}(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in \text{Sym}(n)} \text{sgn}(\sigma) \left(\prod_{\substack{j \in [n] \\ \sigma(j) \neq i}} (v_{\sigma(j)})_j \right) \cdot (\alpha u_{\sigma^{-1}(i)} + w_{\sigma^{-1}(i)}) \\ &= \alpha \sum_{\sigma \in \text{Sym}(n)} \text{sgn}(\sigma) \left(\prod_{\substack{j \in [n] \\ \sigma(j) \neq i}} (v_{\sigma(j)})_j \right) \cdot u_{\sigma^{-1}(i)} \\ &\quad + \sum_{\sigma \in \text{Sym}(n)} \text{sgn}(\sigma) \left(\prod_{\substack{j \in [n] \\ \sigma(j) \neq i}} (v_{\sigma(j)})_j \right) \cdot w_{\sigma^{-1}(i)} \\ &= \alpha \det(v_1, \dots, v_{i-1}, u, v_{i+1}, \dots, v_n) + \det(v_1, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בכך ש- u, w העמודות ה- i במטריצות שעמודותיהן $(v_1, \dots, v_{i-1}, u, v_{i+1}, \dots, v_n)$ ו- $(v_1, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_n)$ בהתאמה.

2. תהי $\sigma \in \text{Sym}(k)$. בחישוב הדטרמיננטה באגף שמאל יופיע הגורם

$$\text{sgn}(\sigma) \prod_{j \in [k]} (v_{\sigma(j)})_j$$

ואילו בחישוב הדטרמיננטה של אגף ימין יופיע הגורם

$$\text{sgn}(\sigma) \left(\prod_{\substack{j \in [k] \\ \sigma(j) \notin \{i, i+1\}}} (v_{\sigma(j)})_j \right) \cdot (v_i)_{\sigma^{-1}(i+1)} \cdot (v_{i+1})_{\sigma^{-1}(i)}$$

נסתכל על התמורה $\tau = (i, i+1)$ ועל התמורה $\tilde{\sigma} := \sigma \circ \tau$. אז המכפלה שבגורם הראשון תופיע בגורם

$$\text{sgn}(\tilde{\sigma}) \prod_{j \in [k]} (v_{\tilde{\sigma}(j)})_j$$

בחישוב הדטרמיננטה שבאגף ימין. אבל, $\text{sgn}(\tau) = -1$ ולכן $\text{sgn}(\sigma \circ \tau) = -\text{sgn}(\sigma)$, ולכן

$$\text{sgn}(\sigma) \prod_{j \in [k]} (v_{\sigma(j)})_j = -\text{sgn}(\tilde{\sigma}) \prod_{j \in [k]} (v_{\tilde{\sigma}(j)})_j$$

ונקבל כי

$$\begin{aligned} \det(v_1, \dots, v_n) &= \sum_{\sigma \in \text{Sym}(n)} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j \in [k]} (v_{\sigma(j)})_j \\ &= - \sum_{\sigma \in \text{Sym}(n)} \text{sgn}(\tilde{\sigma}) \prod_{j \in [k]} (v_{\tilde{\sigma}(j)})_j \\ &= - \sum_{\sigma' \in \text{Sym}(n)} \text{sgn}(\sigma') \prod_{j \in [k]} (v_{\sigma'(j)})_j \\ &= - \det(v_1, \dots, v_{i+1}, v_i, \dots, v_n) \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בכך שהעתקה $\sigma \mapsto \tilde{\sigma}$ הפיכה (היא ההופכית של עצמה).

כיוון שכל תמורה ניתן לכתוב כהרכבת חילופים, וכיוון שהסימן הוא כפלי, נקבל מכך את הנדרש. אם $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_m$ עבור חילופים τ_i , נקבל כי הדטרמיננטה $\det(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)})$ היא $(-1)^m$, וגם כי $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^m$.

טענה 2.7. $\det(A) = \det(A^t)$.

מסקנה 2.8. תהי $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. הדטרמיננטה של המטריצה המתקבלת מ- A לאחר

1. הוספת כפולה של שורה או עמודה לשורה או עמודה (בהתאם) אחרת היא $\det(A)$.

2. החלפת שורות או עמודות של A היא $(-1) \det(A)$.

3. כפל של שורה או עמודה בסקלר α היא $\alpha \det(A)$.

בנוסף, אם $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, מתקיים $\det(AB) = \det(BA)$, ואם A הפיכה מתקיים $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.

תרגיל 4. עבור פולינום מתוקן $p \in \mathbb{F}[x]$ נכתוב

$$p(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$$

כאשר $c_n = 1$, ונגדיר את המטריצה המלווה של p על ידי

$$C(p) := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{F})$$

יהי $p \in \mathbb{F}[x]$ ממעלה n . מצאו את הפולינום האופייני ואת הפולינום המינימלי של $C(p)$.

פתרון. • מתקיים

$$p_{C(p)} = \det(I - xC(p)) = \det \begin{pmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & c_0 \\ -1 & x & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x + c_{n-1} \end{pmatrix}$$

ניעזר בכך שהטרמיננטה אינווריאנטית תחת הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת. נוסיף את השורה האחרונה כפול x לזאת שלפניה. לאחר מכן נוסיף את השורה ה- $n-1$ כפול x לזאת שלפניה ונמשיך כך עד שנקבל מטריצה

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & y \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & * \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & * \end{pmatrix}$$

כאשר

$$y = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(\dots(a_{n-2} + x(a_{n-1} + x))\dots))) = \sum_{i=0}^n c_i x^i = f$$

אז

$$p_{C(p)} = (-1)^{n-1} \det \begin{pmatrix} -1 & x & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} = (-1)^{n-1} (-1)^{n-1} f = f$$

• יהי $g \in \mathbb{F}_{n-1}[x]$ ונכתוב

$$g(x) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i$$

אז

$$\begin{aligned} g(C(p))(e_1) &= \sum_{i=0}^{n-1} b_i C(p)^i e_1 \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} b_i e_{1+i} \end{aligned}$$

וביטוי זה שונה מאפס כאשר $g \neq 0$ כי אז יש $b_i \neq 0$ עבור i כלשהו.

לכן $n \leq \deg(m_{C(p)}) = p_{C(p)}$.

תרגיל 5. יהי V מרחב וקטורי ממימד $n \in \mathbb{N}_+$ מעל שדה \mathbb{F} ותהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. נגדיר

$$\det(T) := \det([T]_B)$$

כאשר B בסיס של V .

הראו שהטרמיננטה הזאת מוגדרת היטב.

פתרון. יהיו B, C שני בסיסים של V . עלינו להראות כי $\det([T]_B) = \det([T]_C)$. ניזכר כי מתקיים

$$[T]_B = (M_C^B)^{-1} [T]_C M_C^B$$

אז, מכפלות הדטרמיננטה,

$$\begin{aligned}
 \det([T]_B) &= \det\left((M_C^B)^{-1} [T]_C M_C^B\right) \\
 &= \det\left((M_C^B)^{-1}\right) \det([T]_C) \det(M_C^B) \\
 &= \det((M_C^B))^{-1} \det([T]_C) \det(M_C^B) \\
 &= \det([T]_C)
 \end{aligned}$$

כאשר בשוויון השלישי השתמשנו בכך שאם A הפיכה מתקיים $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.