

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 7

אופרטורים צמודים ופירוק פולארי

25.12.2025

תרגיל 1. יהי $V = \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ עם המכפלה הפנימית $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(Y^t X)$, ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ המוגדר על ידי

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16a & 4b - 6c \\ -6b + 13c & 16d \end{pmatrix}$$

מיצאו בסיס אורתונורמלי B של V עבורו $[T]_B$ אלכסונית, ומיצאו אופרטור $S \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ צמוד לעצמו עבורו $S^2 = T$.

תרגיל 2. יהי V מרחב מכפלה פנימית מרוכב מממד סופי, יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ נורמלי, ונניח כי 3, 4 ערכים עצמיים של T . הראו שיש $v \in V$ עבורו $\|v\| = \sqrt{2}$ וגם $\|Tv\| = 5$.

תרגיל 3. יהי V מרחב מכפלה פנימית מרוכב מממד סופי, יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ ויהי $a \in \mathbb{C}$ עבורו $|a| \neq 1$.

1. הראו כי אם $T^* = aT$ אז $T = 0$.

2. נניח כי T נורמלי, ויהי $S = T - aT^*$. הוכיחו כי $\ker(T) = \ker(S)$.

תרגיל 4. יהי $V = \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ עם המכפלה הפנימית $\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^t A)$, ותהי

$$T: V \rightarrow V \\ A \mapsto \frac{A + A^t}{2}$$

1. מיצאו את T^* . שימו לב כי $T = \frac{T_1 + T_2}{2}$ עבור העתקות $T_i: V \rightarrow V$ עבורן אנו יודעות מי הן T_i^* .

2. מיצאו בסיסים אורתונורמליים B, C של V עבורם $[T]_C^B = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ כאשר $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$.

3. מיצאו העתקה אוניטרית $U \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ והעתקה מוגדרת אי־שלילית $P \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ עבורן $T = UP$.