

**סיכומי הרצאות במבוא לתורת המספרים**  
חורף 2018, הטכניון

*הרצאותיו של פרופסור משה ברוך*  
סוכמו על ידי אלעד צורני



נפת להמר.

עדכון אחרון 16 בינואר 2019

# תוכן העניינים

<b>1</b>	<b>מבוא</b>	<b>1</b>
1	רקע היסטורי	1.1
1	חוגים וחוגים אוקלידיים	1.2
1	חוגים כלליים	1.2.1
2	חוגים אוקלידיים	1.2.2
3	האלגוריתם של אוקלידס	1.3
5	פירוק לראשוניים בחוג אוקלידי	1.4
5	חוג השלמים הגאוסים $\mathbb{Z}[i]$	1.5
8	קונגראנציות ב- $\mathbb{Z}$	1.6
9	המשוואה $ax \equiv b \pmod{m}$	1.6.1
9	הפיכים ב- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	1.6.2
14	המשוואה $x^k = a$ בחבורה ציקלית	1.7
15	הרמה של פתרונות ממודולו $p$ למודולו $p^k$	1.8
<b>17</b>	<b>הדדיות ריבועית</b>	<b>2</b>
21	אלגוריתם מילר-רבין לבדיקת ראשוניות	2.1
<b>27</b>	<b>סכומי גאוס</b>	<b>3</b>
27	סכומי גאוס ריבועיים	3.1
<b>30</b>	<b>הדדיות חזקה שלישית</b>	<b>4</b>
30	שדות שארית	4.1
33	ראשוניים פרימריים	4.2

# הקדמה

## הבהרה

סיכומי הרצאות אלו אינם רשמיים ולכן אין כל הבטחה כי החומר המוקלד הינו בהתאמה כלשהי עם דרישות הקורס, או שהינו חסר טעויות. להיפך, ודאי ישנן טעויות בסיכום! אעריך אם הערות ותיקונים ישלחו אלי בכתובת דוא"ל [tzorani.elad@gmail.com](mailto:tzorani.elad@gmail.com). אלעד צורני.

## ספרות מומלצת.

הספרות המומלצת עבור הקורס הינה כדלהלן.

**Ireland and Rosen:** A classical introduction to modern number theory

## סילבוס

חוגים אוקלידיים, משפט השארית הסיני ושלמים גאוסים. שרשים פרימיטיביים, הדדיות ריבועית, סכומי גאוס, סכומי יעקובי. הדדיות מסדר שלוש, הדדיות מסדר ארבע, מספרים אלגבריים ושדות ריבועיים. הסילבוס יכול את הפרקים הבאים מספר הקורס: 1,3,4,5,6,8,9.

## דרישות קדם

דרישת הקורס העיקרית הינה ידע של קורס מבוא בחבורות. נשתמש גם בידע מקורס בסיס בחוגים על חוגים אוקלידיים, ונניח את ההגדרות הבסיסיות. נחזור על נושא זה בתחילת הקורס.

## ציון:

1. בוחן אמצעי: 20% מגן.
2. שאלת תרגילי בית בבוחן 5% מגן.
3. שאלת תרגילי בית במבחן 5% מגן.
4. מבחן סופי.



# פרק 1

## מבוא

תורת המספרים נחלקת לשני תחומים עיקריים, תורת המספרים האלגברית ותורת המספרים האנליטית. אנו עוסקים בהקדמה לתורת המספרים האלגברית, ונדבר בקורס בין השאר על שדות מספרים אלגבריים. את תוצאות הקורס אפשר להכליל בתחום של תורת שדות מחלקה.

### 1.1 רקע היסטורי

בין שנת 1640 לשנת 1654, מתמטיקאי בשם פרמה<sup>1</sup> הסתכל על מספר שאלות בנוגע למספרים.

**שאלה 1.1.1.** אילו ראשוניים  $p$  הם מהצורה

$$1. \quad x^2 + y^2$$

$$2. \quad x^2 + 2y^2$$

$$3. \quad x^2 + 3y^2$$

כאשר  $x, y \in \mathbb{Z}$ ?

**פתרון.** 1. פרמה ניסח את המשפט הבא

**משפט 1.1.2.** יהא  $p$  ראשוני אי-זוגי. קיימים שלמים  $x, y$  ש- $p = x^2 + y^2$  אם ורק אם  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .

2. נסו למצוא חוקיות לבד.

3. **משפט 1.1.3 (פרמה).** יהא  $p \neq 3$  ראשוני. קיימים  $x, y \in \mathbb{Z}$  כך ש- $x^2 + 3y^2 = p$  אם ורק אם  $p \equiv 1 \pmod{3}$ .

בין השנים 1729 ו-1772 אוילר<sup>2</sup> את שלושת המשפטים של פרמה. אוילר הוכיח את המשפטים בשני שלבים, הורדה descent והדדיות Reciprocity. אנחנו נשתמש בחוגים אוקלידיים עבור השלב הראשון, על מנת לפשט את ההוכחה.

### 1.2 חוגים וחוגים אוקלידיים

#### 1.2.1 חוגים כלליים

ניתן מספר דוגמאות לחוגים.

**דוגמאות.**  $\mathbb{Z}$  •

•  $M_n(R)$  חוג מטריצות  $n \times n$  מעל חוג  $R$ .

• חוג פולינומים  $R[X]$  מעל חוג  $R$ .

בקורס זה נניח כי כל החוגים הינם קומונטיביים עם יחידה וללא מחלקי אפס (כלומר אם  $ab = 0$  אז  $a = 0$  או  $b = 0$ ).

**הגדרה 1.2.1.** חוג עם התכונות הנ"ל נקרא **תחום שלמות**.

יהא  $R$  חוג ויהיו  $a, b \in R$ .

**הגדרה 1.2.2.** נאמר כי  $a$  מחלק את  $b$  אם קיים  $d \in R$  עבורו  $ad = b$ . אם כן, נסמן  $a \mid b$ .



**הגדרה 1.2.3.**  $a$  הפיך אם  $1 \mid a$ .

**הגדרה 1.2.4.**  $a \neq 0$  שאינו הפיך הוא ראשוני ב- $R$  אם  $bc \mid a$  גורר  $a \mid b$  או  $a \mid c$ .

**הגדרה 1.2.5.**  $a \neq 0$  שאינו הפיך נקרא אי-פריק אם  $a = bc$  גורר כי  $b$  הפיך או  $c$  הפיך.

**הגדרה 1.2.6.**  $a \equiv b \pmod{c}$  אם  $c \mid (b - a)$ .

**טענה 1.2.7.** אם  $a$  ראשוני, הוא אי פריק.

הוכחה. יהי  $a$  ראשוני ונכתוב  $a = bc$  אז  $a \mid bc$ . לכן  $a \mid b$  או  $a \mid c$ . אם  $a \mid b$  קיים  $d$  עבורו  $b = ad$ . אז  $a = adc$ . לכן  $a(1 - dc) = 0$ . ולכן  $dc = 1$  לכן  $c$  הפיך. אחרת,  $a \mid c$  ונקבל באותו אופן כי  $b$  הפיך. ■

## 1.2.2 חוגים אוקלידיים

**הגדרה 1.2.8.** חוג  $R$  יקרא חוג אוקלידי אם קיימת פונקצייה  $N: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$  כך שמתקיימות שתי התכונות הבאות.

1. אם  $a, b \in R$  שונים מאפס, קיימים  $q, r \in R$  כך שמתקיים  $r = 0$  או  $N(r) < N(a)$  וגם  $b = qa + r$ .

2. אם  $a \neq 0$  וגם  $a = bc$  כאשר  $b, c$  אינם הפיכים, אז  $N(c), N(b) < N(a)$ .

**הערה 1.2.9.** התכונה השנייה בהגדרה איננה הכרחית.

**דוגמאות.** 1. עם  $\mathbb{Z}$  עם  $N(x) = |x|$ .

2.  $[X]$  פולינומים מעל שדה, עם  $N(p(x)) = \deg(p)$ .

**הערה 1.2.10.** חלוקה בחוג אוקלידי איננה יחידה. אם נדרוש גם  $N(0) \leq N(r) < N(a)$  נקבל כי החלוקה תהיה יחידה.

נניח בקורס כי  $|r| \leq \frac{|a|}{2}$ . אפשר לדרוש זאת במקרה  $r \geq 0$  כי אם  $b = qa + r$  נחליף את  $r$  ב- $r - a$ . נקבל  $b = (q + 1)a + (r - a)$  ואז

$$|r - a| = |a - r| = |a| - |r| \leq |a| - \left| \frac{a}{2} \right| = \left| \frac{a}{2} \right|$$

באופן דומה נוכיח עבור המקרה  $r < 0$ .

**טענה 1.2.11.** בחוג אוקלידי  $R$ , כל אידאל הינו ראשי. כלומר, אם  $I \leq R$  אידאל, הוא מהצורה  $I = (d) = dR = \{dr \mid r \in R\}$  עבור  $d \in R$ .

הוכחה. נמצא ב- $I$  איבר  $d$  עם נורמה מינימלית (כתרגיל) ואז נראה  $I = (d)$ . ניקח איבר  $a \in I$ , נכתוב  $a = qd + r$  אז  $r = 0$  כי לא ייתכן  $N(r) < N(d)$ . ■

**הגדרה 1.2.12.** יהא  $R$  חוג ויהיו  $a, b \in R \setminus \{0\}$ . נקרא מחלק משותף גדול ביותר של  $a$  ו- $b$  אם מתקיימות התכונות הבאות.

1.  $d \mid a, b$ .

2. אם  $d' \in R$  מקיים  $d' \mid a, b$  אז  $d' \mid d$ .

**טענה 1.2.13.** יהא  $R$  חוג אוקלידי ויהיו  $a, b \in R$  שונים מאפס אז קיים מחלק משותף גדול ביותר ל- $a$  ו- $b$ .

הוכחה. יהיו  $a, b \in R \setminus \{0\}$  ויהא  $I = \langle a, b \rangle$  האידאל הנוצר על ידי  $a$  ו- $b$ . לפי הטענה, יש ל- $I$  יוצר  $d$ , ונראה כי זהו ממג"ב (מחלק משותף גדול ביותר) של  $a, b$ .

**מחלק משותף:** ניתן לכתוב  $a = 1 \cdot a \in I$  לכן  $d \mid a$ . גם  $b = 1 \cdot b \in I$  לכן  $d \mid b$ .

**מקסימליות:** אם  $d' \mid b$  וגם  $d' \mid a$  קיימים  $x_1, y_1 \in R$  עבורם  $d = x_1 a + y_1 b$ . כעת  $d' \mid d$  ולכן  $d' \mid d$ . ■

**הגדרה 1.2.14.** איברים  $a, b \in R$  נקראים חברים אם קיים איבר הפיך  $u \in R^\times$  עבורו  $a = bu$ .

**הבחנה 1.2.15.** חברות זה יחס שקילות.

**טענה 1.2.16.** יהיו  $a, b \in R \setminus \{0\}$  עם  $d, d'$  ממג"ב. אז  $d, d'$  חברים.

הוכחה. מהגדרת ממג"ב מתקיים  $d \mid d'$  וגם  $d' \mid d$ . לכן יש  $x, y$  עבורם  $d = xd'$  וגם  $d' = yd$ . נציב את השיויון השני בראשון ונקבל  $d = xyd$ . לכן  $xy = 1$  ונקבל כי  $x, y$  הפיכים. לכן  $d, d'$  חברים. ■

**מסקנה 1.2.17.** יהא  $d$  ממג"ב של  $a, b \in R$ . קיימים  $x, y \in R$  כך שמתקיים  $d = xa + yb$ .

**מסקנה 1.2.18.** נמצא ממג"ב אחד  $d'$  עבורו  $\langle a, b \rangle = (d)$ .  $d, d'$  חברים ולכן יוצרים את אותו האידיאל  $(d) = (d')$ . לכן גם  $d'$  צירוף לינארי של  $a, b$  עם מקדמים ב- $R$ .

**דוגמה 1.2.19 (חוג השלמים הגאוסים).** נגדיר  $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$ .

**טענה 1.2.20.**  $\mathbb{Z}[i]$  חוג אוקלידי.

הוכחה. נזכיר כי בשלמים יש חלוקה עם שארית  $b = qa + r$  עם התנאי  $|r| \leq \frac{|a|}{2}$ . נגדיר  $N(a + bi) = a^2 + b^2 = |a + bi|^2$ . יהיו  $a + bi, c + di \in R$ . נעשה חלוקה עם שארית ל- $a + bi, c + di$  מתקיים קודם כל

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i \quad (1.1)$$

נחפש מספר ב- $\mathbb{Z}[i]$  קרוב ביותר למנה זאת. נעשה חלוקה עם שארית ב- $\mathbb{Z}$  במקום המקדמים במנה.

$$ac + bd = x_1(c^2 + d^2) + r_1$$

$$bc - ad = x_1(c^2 + d^2) + r_2$$

כאשר  $|r_i| \leq \frac{c^2 + d^2}{2}$ . נציב בנוסחה 1.1 ונקבל

$$\begin{aligned} \frac{a + bi}{c + di} &= \frac{x_1(c^2 + d^2) + r_1 + (x_2(c^2 + d^2) + r_2)i}{c^2 + d^2} \\ &= x_1 + x_2i + \frac{r_1 + r_2i}{c^2 + d^2} \end{aligned}$$

או לאחר כפל שני האגפים

$$a + bi = (x_1 + x_2i)(c + di) + \frac{r_1 + r_2i}{c^2 + d^2}(c + di)$$

נטען כי זאת חלוקה עם שארית. יש להראות כי הביטוי  $\frac{r_1 + r_2i}{c^2 + d^2}(c + di)$  שלם גאוסי וכי הנורמה שלו קטנה מזאת של  $c + di$ . אכן זהו שלם גאוסי כיוון שניתן לכתוב

$$\frac{r_1 + r_2i}{c^2 + d^2}(c + di) = a + bi - (x_1 + x_2i)(c + di) \in \mathbb{Z}[i]$$

■

נשאיר את סיום ההוכחה כתרגיל.

**תרגיל 1.** הוכיחו את אי-השוויון הבא כדי לסיים את ההוכחה.

$$\left| \frac{(r_1 + r_2i)(c + di)}{c^2 + d^2} \right|^2 < |c + di|^2$$

## 1.3 האלגוריתם של אוקלידס

יהא  $R$  חוג אוקלידי ויהיו  $a, b \in R \setminus \{0\}$ . האלגוריתם של אוקלידס מוצא ממג"ב של  $a$  ו- $b$ .

**אלגוריתם 1.3.1.** 1. נסמן  $b = r_0$ .

2. נכתוב  $a = q_1b + r_1$ .

3. נחלק את  $r_{i-1}$  ב- $r_i$  עם  $i$  מקסימלי. נכתוב  $r_{i-1} = q_{i+1}r_i + r_{i+1}$ . נפסיק כשנקבל  $r_{n+1} = 0$  ואז  $r_n$  הוא ממג"ב של  $a, b$ .

**תרגיל 2.** מצאו ממג"ב של 91 ו-35.

**פתרון.**

$$91 = 2 \cdot 35 + 21$$

$$35 = 1 \cdot 21 + 14$$

$$21 = 1 \cdot 14 + 7$$

$$14 = 2 \cdot 7 + 0$$

לכן  $\gcd(91, 35) = 7$ .

**תרגיל 3.** מצאו את  $\gcd(13 + 13i, -1 + 18i)$ .

**פתרון.** נציג שני פתרונות.

1. נבצע חלוקה עם שארית. מתקיים

$$\frac{13 + 13i}{-1 + 18i} = \frac{17}{25} - \frac{19}{25}i \quad (1.2)$$

נבצע חלוקה עם שארית בשלמים.

$$\begin{aligned} 17 &= 1 \cdot 25 + (-8) \\ -19 &= -1 \cdot 25 + 6 \end{aligned}$$

נציב ב-1.2 ונקבל

$$\frac{13 + 13i}{-1 + 18i} = \frac{25 - 8 - 25i + 6i}{25} = 1 - i + \frac{-8 + 6i}{25}$$

נכפול ונקבל

$$\begin{aligned} 13 + 13i &= (1 - i)(-1 + 18i) + \frac{-8 + 6i}{25}(-1 + 18i) \\ &= (1 - i)(-1 + 18i) + (-4 - 6i) \end{aligned}$$

כעת נחלק את  $(-1 + 18i)$  בשארית  $-4 - 6i$ . יוצא

$$-1 + 18i = (-2 - 2i)(-4 - 6i) + 3 - 2i$$

מחלקים שוב  $-4 - 6i = (-2i)(3 - 2i) + 0$  ולכן  $\gcd(13 + 13i, -1 + 18i) = 3 - 2i$

2. נזכיר טענה.

**טענה 1.3.2.** יהא  $a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ . אם  $N(a + bi) = a^2 + b^2$  ראשוני ב- $\mathbb{N}$  אז  $a + bi$  ראשוני ב- $\mathbb{Z}[i]$ .

נפרק את  $13 + 13i$  ואת  $-1 + 18i$  למכפלות ראשוניים. מתקיים  $13 + 13i = 13(1 + i)$  כאשר  $13 = 1^2 + 2^2$  ו- $1 + i$  ראשוני. ניתן לכתוב  $13 = (2 + 3i)(2 - 3i)$  כאשר מהטענה זה פירוק לראשוניים. לכן

$$13 + 13i = (2 + 3i)(2 - 3i)(1 + i)$$

פירוק לראשוניים.

נפרק את  $-1 + 18i$ . מתקיים

$$N(-1 + 18i) = 1^2 + 18^2 = 325 = 5^2 \cdot 13$$

הנורמה אצלנו כפלית ולכן למחלקים נורמות בקבוצה  $\{5, 5^2, 13\}$  (נפרט יותר בהרצאה). נחלק את  $-1 + 18i$  ב- $2 + 3i$ . יוצא

$$(-1 + 18i) = (2 + 3i)(1 + 2i)(2 - i)$$

נקבל כי  $2 + 3i$  הוא הגורם המשותף היחיד בפירוק לראשוניים עד כדי חברות (לחברים יש אותה הנורמה) ולכן  $\gcd(13 + 13i, -1 + 18i) = 2 + 3i$

**משפט 1.3.3 (אוקלידס).** יש אינסוף ראשוניים ב- $\mathbb{N}$ .

**הוכחה.** נניח בשלילה שיש מספר סופי של ראשוניים  $p_1, \dots, p_k$  ונסמן  $N = \left(\prod_{i=1}^k p_i\right) + 1$ . אם  $p_i \in N$  אז  $p_i \mid 1$  וזו סתירה לכך שיש ראשוני שמחלק את  $N$ . ■

**תרגיל 4.** יש ב- $\mathbb{N}$  אינסוף ראשוניים  $p$  שמקיימים  $p \equiv 3 \pmod{4}$ .

**פתרון.** נניח שיש מספר סופי של ראשוניים  $p_1, \dots, p_k \equiv 3 \pmod{4}$ . ניקח  $N = 4 \left(\prod_{i=1}^k p_i\right) - 1$  ואז  $N \not\equiv 0 \pmod{p_i}$  לכל  $i$ . נפרק את  $N$  לראשוניים  $N = \prod_{i=1}^m q_i$ . אז קיים  $q_i \equiv 3 \pmod{4}$  כי אחרת

$$N \equiv \prod_{i=1}^m q_i \equiv \prod_{i=1}^m 1 \equiv 1 \pmod{4}$$

בסתירה. אבל  $q_i \neq p_j$  לכל  $j \in [k]$  בסתירה.





**טענה 1.5.4.** יהא  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. אם  $p \in \mathbb{Z}[i]$  אינו ראשוני, אז קיימים שלמים  $x, y \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x^2 + y^2 = p$ .

הוכחה.  $p$  אינו ראשוני ב- $\mathbb{Z}[i]$  לכן קיימים  $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[i]$  שאינם הפיכים עבורם  $p = z_1 z_2$ . לכן

$$p^2 = N(p) = N(z_1 z_2) = N(z_1) N(z_2)$$

ולכן  $N(z_i) \in \{1, p, p^2\}$  כי  $p$  ראשוני ב- $\mathbb{Z}$ . אבל  $z_i$  אינם הפיכים לכן  $N(z_i) = p$ . נכתוב  $z_1 = x + iy$  ואז  $N(z_1) = x^2 + y^2 = p$ . ■

**משפט 1.5.5 (אילר 1729, הורדה).** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. אם קיימים  $x, y, c \in \mathbb{Z}$  כך שמתקיים  $\gcd(c, p) = 1$  וגם  $x^2 + y^2 = cp$  אז קיימים  $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x_1^2 + y_1^2 = p$ .

הוכחה. נניח ש- $x^2 + y^2 = cp$  עם  $\gcd(c, p) = 1$ . אז  $(x + iy)(x - iy) = cp$ . כלומר, מהטענה, צריך להוכיח ש- $p$  אינו ראשוני ב- $\mathbb{Z}[i]$ . נניח בשלילה שהוא כן ראשוני. ב- $\mathbb{Z}[i]$  מתקיים  $p \mid (x + iy)(x - iy)$  לכן  $p \mid (x + iy)$  או  $p \mid (x - iy)$ . בה"כ נניח  $p \mid (x + iy)$ . אז קיימים  $n, m \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x + iy = p(n + mi) = pn + pmi$ . אז  $p \mid x, y$  ב- $\mathbb{Z}$ . אז  $p^2 \mid x^2 + y^2 = cp$  בסתירה לכן ש- $\gcd(c, p) = 1$ . ■

**מסקנה 1.5.6.** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. אז קיימים  $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x_1^2 + y_1^2 = p$  אם ורק אם קיימים  $x, y \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{p}$  וגם  $x, y \not\equiv 0 \pmod{p}$ .

הוכחה. אם  $p = x_1^2 + y_1^2$ , נניח בה"כ  $x_1, y_1 \geq 0$ . אבל,  $p$  ראשוני ולכן  $x_1, y_1 > 0$ . כעת  $0 < x_1, y_1 < p$  ולכן  $x_1^2 + y_1^2 \equiv 0 \pmod{p}$  כאשר  $x_1, y_1 \not\equiv 0 \pmod{p}$ . לכיוון השני, אם יש  $x, y \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{p}$  וגם  $x, y \not\equiv 0 \pmod{p}$ , יש  $c$  עבורו  $x^2 + y^2 = cp$ . נניח בה"כ כי  $0 < x, y < \frac{p}{2}$  ובעצם  $-\frac{p}{2} < x, y < \frac{p}{2}$  כי ניתן להזיז ב- $p$ . בפרט  $\frac{p^2}{4} = \frac{p^2}{2} < x^2 + y^2 < 2 \cdot \frac{p^2}{4}$ . כעת

$$x^2 + y^2 = cp$$

ולכן  $1 \leq c < \frac{p}{2}$  ולכן  $\gcd(c, p) = 1$ . לכן מהשקילות יש  $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x_1^2 + x_2^2 = p$  כנדרש. ■

**משפט 1.5.7 (אילר).** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. אם קיימים  $x, y, c \in \mathbb{Z}$  כך שמתקיים  $\gcd(c, p) = 1$  וגם  $x^2 + 2y^2 = cp$  אז קיימים  $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x_1^2 + 2y_1^2 = p$ .

הוכחה. אותה הוכחה עבור משפט ההורדה של אילר, כאשר נעבוד ב- $\mathbb{Z}[\sqrt{2}i]$ . ■

**משפט 1.5.8 (אילר).** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. אם קיימים  $x, y, c \in \mathbb{Z}$  כך שמתקיים  $\gcd(c, p) = 1$  וגם  $x^2 + 3y^2 = cp$  אז קיימים  $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x_1^2 + 3y_1^2 = p$ .

**מסקנה 1.5.9.** עבור  $k \in \{1, 2, 3\}$  יש פתרון למשוואה  $x^2 + ky^2 \equiv 0 \pmod{p}$  אם ורק אם יש פתרון למשוואה  $x^2 + ky^2 = p$ .

עשינו רדוקציה למציאת ראשוניים מהצורות

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 \\ x^2 + 2y^2 \\ x^2 + 3y^2 \end{aligned}$$

למציאת פתרונות  $(a, b) \neq (0, 0)$  למשוואות

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\ x^2 + 2y^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\ x^2 + 3y^2 &\equiv 0 \pmod{p} \end{aligned}$$

עבור  $k \in \{1, 2, 3\}$  מתקיים  $x^2 + ky^2 \equiv 0 \pmod{p}$  אם ורק אם  $x^2 = -ky^2$  אם ורק אם  $\left(\frac{x}{y}\right)^2 = -k$ . לכן הבעיה שקולה לבדיקת קיום שורש של  $-k$  בשדה  $\mathbb{F}_p$ .

**שאלה 1.5.10.** עבור אילו  $p$  ראשוני ו- $a \in \mathbb{F}_p$ , קיים  $z \in \mathbb{F}_p$  עבורו  $z^2 = a$ ?

בחוג  $\mathbb{Z}[i]$  לקחנו את  $\mathbb{Z}$  והוספנו שורש יחידה מסדר 3. נסתכל על שורשי יחידה מסדר 3. יהא  $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$  ואז  $\omega^2 = \bar{\omega} = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$ . שורש של הפולינום הציקלוטומי  $\Phi_3(x) := x^2 + x + 1$  מכך נובע כי  $\omega^2 = -1 - \omega$ . מתקיים  $\mathbb{Z}[\omega] = \mathbb{Z}[a + b\omega]$  כי הוספנו שורש של פולינום אי-פריק ממעלה 2 (לחלופין, הדבר נובע מכך ש- $\omega^2 = 1 - \omega$ ). מתקיים

$$a + b\omega = a + b \left( \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \right) = a - \frac{b}{2} + \frac{b\sqrt{3}i}{2} \quad (1.3)$$

**טענה 1.5.11.** יהיו  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ . אם  $a + b\omega = c + d\omega$  אז  $a = c, b = d$ .

הוכחה. נובעת מ-1.3.

**משפט 1.5.12.**  $\mathbb{Z}[\omega]$  חוג אוקלידי.

הוכחה. נגדיר  $N(z) := |z|^2$  ואז מתקיים

$$\begin{aligned} N(z) &= |z|^2 \\ &= |a + b\omega|^2 \\ &= (a + b\omega)(a + b\bar{\omega}) \\ &= (a + b\omega)(a + b\omega^2) \\ &= a^2 + ab\omega + ab\omega^2 + b^2 \\ &= a^2 + ab\omega + ab(-1 - \omega) + b^2 \\ &= a^2 - ab + b^2. \end{aligned}$$

קיבלנו  $N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$ . נראה קיום של חלוקה עם שארית. יהיו  $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[\omega]$  ונרצה לחלק עם שארית  $z_1 = qz_2 + r$  נסמן  $\tilde{q} = \frac{z_1}{z_2} \in \mathbb{C}$  וניקח  $q$  את הנקודה הקרובה ביותר ב- $\mathbb{Z}[\omega]$  אם  $r = 0$  סיימנו. אחרת: אם מרחק המרכז של משולש עם צלעות באורך 1 מהקודקוד הוא  $x$  אז  $x^2 = (1-x)^2 + (\frac{1}{2})^2$  ולכן  $x = \frac{5}{8}$  אז

$$N(q - \tilde{q}) \leq \frac{25}{64}$$

ואז

$$N(r) = N(z_1 - qz_2) = N(\tilde{q}z_2 - qz_2) = N(\tilde{q} - q)N(z_2) \leq \frac{25}{64}N(z_2) < N(z_2)$$

כנדרש.

**טענה 1.5.13.**  $N(z) = 1$  אם ורק אם  $z \in \mathbb{Z}[\omega]$  הפיך אם ורק אם  $N(z) = 1$ .

הוכחה. נניח כי  $z$  הפיך. אז יש  $w$  עבורו  $zw = 1$  אז  $N(zw) = N(1) = 1$  ולכן  $N(z)N(w) = 1$ . מתקיים  $N(z), N(w) \in \mathbb{N}$  ולכן  $N(z) = N(w) = 1$ . להיפך, נניח כי  $N(z) = 1$ . נכתוב  $z = a + b\omega$ . אז

$$N(z) = N(a + b\omega) = (a + b\omega)(a + b(-1 - \omega)) = (a + b\omega)(a - b - b\omega) = 1$$

נרצה כעת למצוא את כל ההפיכים בחוג  $\mathbb{Z}[\omega]$ , כלומר כל האיברים מנורמה 1. נניח  $z = a + b\omega \in \mathbb{Z}[\omega]$  מנורמה 1. אז  $N(z) = 1$  ואז  $a^2 - ab + b^2 = 1$

$$\begin{aligned} \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2 &= 1 \\ 4\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + 3b^2 &= 4 \\ (2a - b)^2 + 3b^2 &= 4 \end{aligned}$$

ונקבל ע"י מעבר על כל האפשרויות את הפתרונות הבאים.

$$(a, b) \in \{(0, 1), (0, -1), (1, 0), (1, 1), (-1, 0), (-1, -1)\}$$

מתקיים  $\omega^2 - \omega - 1 = 0$  לכן ההפיכים הם  $\{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}$ .

**מסקנה 1.5.14 (האקסיומה השנייה של הנורמה בחוג אוקלידי).** אם  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{Z}[\omega]$  שונים מאפס וגם  $z_3 = z_1z_2$  כאשר  $z_1, z_2$  אינם **הרצאה 6** **8 בנובמבר 2018**

הפיכים, אז  $N(z_1) < N(z_3)$  ו- $N(z_2) < N(z_3)$ .

**טענה 1.5.15.** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. קיימים  $a, b \in \mathbb{Z}$  כך ש- $a^2 - ab + b^2 = p$  אם ורק אם  $p = p + 0\omega$  אינו ראשוני ב- $\mathbb{Z}[\omega]$ .

**הערה 1.5.16.** הטענה מקבילה לטענה המתאימה ב- $\mathbb{Z}[i]$ . ניתן לכתוב  $p = a^2 + b^2$  אם ורק אם  $p$  אינו ראשוני ב- $\mathbb{Z}[i]$ . ב- $\mathbb{Z}[2\sqrt{i}]$  הטענה המקבילה תתקיים עבור  $p = a^2 + 2b^2$  עם הוכחה אנלוגית.

הוכחה. **כיוון ראשוני:** נניח שקיימים  $a, b \in \mathbb{Z}$  עבורם  $a^2 - ab + b^2 = p$ . אז פירוק של  $p$  ב- $\mathbb{Z}[\omega]$  כי  $a + b\omega$  ו- $a - b - b\omega$  אינם הפיכים<sup>3</sup>, לכן  $p$  אינו ראשוני ב- $\mathbb{Z}[\omega]$ .

<sup>3</sup> כי לכל  $a, b$  כך שאחד מהאיברים הנ"ל שווה לאחד ההפיכים בחוג, נקבל כי  $a^2 - ab + b^2$  אינו ראשוני ב- $\mathbb{Z}$ .

**כיוון שני:** נניח כי  $p = p + 0\omega$  אינו ראשוני ב- $\mathbb{Z}[\omega]$ . אז קיימים  $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[\omega]$  שאינם הפיכים, כך שמתקיים  $p = z_1 z_2$ . אז  $p^2 =$  ■  
 $N(z_1) = a^2 - ab + b^2 = p$  נקבל  $z_1 = a + b\omega$  אם  $N(z_1) = N(z_2) = p$  לכן  $N(p) = N(z_1)N(z_2)$ .

**משפט 1.5.17 (descent).** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. אם קיימים שלמים  $a, b, c \neq 0$  עבורם  $a^2 - ab + b^2 = cp$  כאשר  $(c, p) = 1$  אז קיימים שלמים  $x, y \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x^2 - xy + y^2 = p$ .

**הוכחה.** נניח שקיימים  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  כך שמתקיים  $a^2 - ab + b^2 = cp$  כאשר  $(c, p) = 1$ . אז  $(a + b\omega)(a - b - b\omega) = cp$ . נניח בשלילה כי  $p + 0\omega$  ראשוני ב- $\mathbb{Z}[\omega]$ . אז  $p \mid a + b\omega$  או  $p \mid a - b - b\omega$ . נניח כי  $p \mid a - b - b\omega$  ואז קיימים  $c, d \in \mathbb{Z}$  עבורם

$$\begin{aligned} p(c + d\omega) &= a - b - b\omega \\ pc + pd\omega &= a - b - b\omega \end{aligned}$$

מטענה קודמת, יש שיוויון בין החלקים החופשיים ובין המקדמים של  $\omega$ . לכן

$$\begin{aligned} pc &= a - b \\ pd &= -b \end{aligned}$$

ולכן  $b \mid a - b, p \mid a - b$  כלומר  $p \mid a$ . לכן  $p^2 \mid a^2 - ab + b^2 = cp$  כאשר זאת סתירה כי  $(c, p) = 1$ . ■

**מסקנה 1.5.18.** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. קיימים  $x, y \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x^2 - xy + y^2 = p$  אם ורק אם יש פתרון למשוואה  $a^2 - ab + b^2 \equiv 0 \pmod{p}$  עם  $a, b \not\equiv 0 \pmod{p}$ .

**הערה 1.5.19.** יש מסקנה דומה (עם הוכחה שקולה) עבור  $p = x^2 + 3y^2$  אם ורק אם יש פתרון  $x^2 + 3y^2 \equiv 0 \pmod{p}$  עבור  $x, y \not\equiv 0 \pmod{p}$ .

## 1.6 קונגרואנציות ב- $\mathbb{Z}$

אם רוצים לפתור את אחת המשוואות הבאות

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\ x^2 + 2y^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\ x^2 + 3y^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\ x^2 - xy + y^2 &\equiv 0 \pmod{p} \end{aligned}$$

רוצים להסתכל על המשוואות בקונגרואנציה.

**הגדרה 1.6.1.** יהיו  $a, b, m \in \mathbb{Z}$  עם  $m \neq 0$ . נאמר כי  $a \equiv b \pmod{m}$  אם  $a - b \in m\mathbb{Z}$ .

**טענה 1.6.2.**  $\equiv$  הוא יחס שקילות.

**סימון 1.6.3.** אם  $a \in \mathbb{Z}$  אז  $\bar{a}$  מחלקת השקילות של  $a$ . מתקיים  $\bar{a} = a + \mathbb{Z}m$ .

**טענה 1.6.4.** יש בדיוק  $m$  מחלקות שקילות, והן  $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}$ .

**סימון 1.6.5.** אוסף מחלקות השקילות יסומן  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ .

**הערה 1.6.6.**  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  הוא חוג שנקרא חוג השאריות מוד  $m$  ביחס לפעולות חיבור וכפל המוגדרות על ידי

$$\begin{aligned} \bar{a} + \bar{b} &:= \overline{a + b} \\ \bar{a} \cdot \bar{b} &:= \overline{a \cdot b} \end{aligned}$$

**טענה 1.6.7.**  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  שדה אם  $m$  ראשוני.

**הערה 1.6.8.** אם  $x \in \mathbb{Z}$  ופותר את המשוואה  $ax \equiv b \pmod{m}$  אז כל איבר ב- $\bar{x}$  הוא פתרון. ההוכחה ישירה על ידי הצבה. כלומר, אנחנו מחפשים מחלקות שקילות שפותרות את המשוואה. באופן דומה, אם נחליף את  $a$  באיבר  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  נקבל את אותם הפתרונות למשוואה. כנ"ל עבור  $b$ . כלומר, אנו מחפשים פתרונות ב- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  למשוואה  $\bar{a}x = \bar{b}$ . זה נכון לכל משוואה בקונגרואנציה.

הרצאה 7  
14 בנובמבר  
2018

## 1.6.1 המשוואה $ax \equiv b \pmod{m}$

**דוגמה 1.6.9.** נסתכל על המשוואה  $6x \equiv 9 \pmod{15}$ . נניח ש- $m > 0$  ונניח ש- $a, b \in \mathbb{Z}$  ו- $a \neq 0$ . נסמן ב- $d = (a, m)$  ויהא  $0 < d$ .  $a' = \frac{a}{d}$  ו- $m' = \frac{m}{d}$ .

**טענה 1.6.10.** למשוואה  $ax \equiv b \pmod{m}$  יש פתרונות אם ורק אם  $d \mid b$ .

אם  $b \mid d$  יש בדיוק  $d$  פתרונות.

אם  $x_0$  הוא פתרון, אז הפתרונות האחרים הם  $x_0 + m', x_0 + 2m', \dots, x_0 + (d-1)m'$ .

**הוכחה.** כיוון ראשון: נניח שיש פתרונות ויהי  $x_0 \in \mathbb{Z}$  פתרון. אז  $ax_0 \equiv b \pmod{m}$  ולכן קיים  $y_0 \in \mathbb{Z}$  עבורו  $ax_0 - b = my_0$ . אז  $ax_0 - my_0 = b$ . נתון  $a, m$  ו- $d \mid b$  ולכן  $d \mid b$ .

**כיוון שני:** נניח כי  $b \mid d$ . קיימים  $x'_0, y'_0 \in \mathbb{Z}$  כך שמתקיים  $ax'_0 - my'_0 = d$ . יהי  $c = \frac{b}{d}$  ואז  $c \cdot d = b$  ולכן  $ax'_0 - my'_0 = dc$ . יהי  $ax_0 - my_0 = b$  ואז  $x_0 = x'_0 c$  ומתקיים  $ax_0 \equiv b \pmod{m}$  כנדרש. ■

**תרגיל 5.** כל שני פתרונות נבדלים בכפולה של  $m'$ .

**דוגמה 1.6.11.** נחזור לדוגמה מלמעלה,  $6x \equiv 9 \pmod{15}$ . מתקיים  $d = (6, 15) = 3$ . כאן  $b = 9$  ומתקיים  $3 \mid 9$  כלומר  $d \mid b$  לכן מהטענה יש פתרונות. אנו יודעים שיש 3 פתרונות מודולו 15.  $m' = \frac{m}{d} = 5$  ולכן  $x_0 = 4, x_1 = 9, x_2 = 14$  הם כל הפתרונות.

**מסקנה 1.6.12.** אם  $a, m$  זרים, יש בדיוק פתרון אחד למשוואה  $ax \equiv b \pmod{m}$ . אם  $m = p$  ראשוני ו- $a \equiv 0 \pmod{p}$ , למשוואה  $ax \equiv b \pmod{p}$  יש פתרון יחיד.

## 1.6.2 הפיכים ב- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

$a \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  הוא הפיך ב- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  אם ורק אם יש  $b \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  כך שמתקיים  $ab = 1$ . כלומר יש פתרון למשוואה  $ax \equiv 1 \pmod{m}$ . לפי הטענה, למשוואה יש פתרון אם ורק אם  $d = (a, m) = 1$  כלומר  $d = 1$ , ולכן קיבלנו ש- $\bar{a}$  הפיך. לכן  $(a, m) = 1$ . לכן, יש לנו בדיוק  $\varphi(m)$  הפיכים ב- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ , כאשר  $\varphi(m)$  מספר השלמים הזרים ל- $m$  בין 1 ל- $m-1$ .

**דוגמה 1.6.13.** ב- $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  הפיכים הם  $\{1, 5, 7, 11\}$ .

**הגדרה 1.6.14.** יהי  $R$  חוג עם יחידה ונסמן ב- $R^*$  את חבורת ההפיכים. זו חבורה לגבי כפל.

**דוגמה 1.6.15.**  $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^* = 4$ .

**משפט 1.6.16 (Euler).** אם  $(a, m) = 1$  אז  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ .

**משפט 1.6.17 (פרמה הקטן).** אם  $p$  ראשוני וגם  $p \nmid a$  אז  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

נרצה להבין את  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ . האם חבורות אלו ציקליות? אם לא, מה המבנה שלהן כמכפלה ישירה של חבורות ציקליות?

**דוגמה 1.6.18.** כל האיברים מסדר 2 מודולו 12 הם 5, 7, 11. לכן, החבורה איננה ציקלית (אין איבר מסדר 4) ולכן זאת חבורת קליין.

**דוגמה 1.6.19 (משפט השאריות הסיני).**  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ .

**דוגמה 1.6.20.** נסתכל על המשוואה  $x^2 + y^2 \equiv 3 \pmod{35}$ . אם  $x_0, y_0$  פתרון אז  $(x_0^2 + y_0^2 - 3) \mid 35$ . לכן  $(x_0^2 + y_0^2 - 3) \mid 5$  וגם  $(x_0^2 + y_0^2 - 3) \mid 7$ . לכן  $(x_0^2 + y_0^2 - 3) \equiv 0 \pmod{5}$  ו- $(x_0^2 + y_0^2 - 3) \equiv 0 \pmod{7}$ .

$$x_0 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$x_0 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$y_0 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$y_0 \equiv 2 \pmod{5}$$

ולכן  $x = 17, y = 22$  יפתרו את המשוואה  $x^2 + y^2 \equiv 3 \pmod{35}$ .

**למה 1.6.21.** אם  $a_1, \dots, a_k$  זרים ל- $m$  אז  $a_1 \cdot \dots \cdot a_k$  זר ל- $m$ .

**הוכחה.** נציג שתי הוכחות.

1. נראה שאם  $(a, m) = 1$  ו- $(b, m) = 1$  אז  $(ab, m) = 1$ . נוכיח בדרך השלילה. נניח כי  $(ab, m) \neq 1$ , אז יש ראשוני  $p$  כך ש- $p \mid ab$  ו- $p \mid m$ . אבל,  $p \mid a$  ו- $p \nmid b$  או  $p \mid b$  ו- $p \nmid a$ .<sup>4</sup>

2.  $a_1, \dots, a_k$  זרים ל- $m$  לכן הפיכים ב- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ . אז  $\prod_{i=1}^k a_i$  הפיך ב- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ . אבל, איבר זה הפיך אם ורק אם הוא זר ל- $m$ . ■

**משפט 1.6.22 (משפט השאריות הסיני).** יהיו  $m_1, \dots, m_k$  שלמים כך ש- $(m_i, m_j) = 1$  עבור  $i \neq j$ . יהיו  $b_1, \dots, b_k \in \mathbb{Z}$ . יהי  $m = \prod_{i=1}^k m_i$ . נסתכל על המשוואות  $x \equiv b_i \pmod{m_i}$  לכל  $i \in [k]$ . למשוואות אלו תמיד יש פתרון, וכל שני פתרונות נבדלים בכפולה של  $m$ .

הוכחה. נוכיח באינדוקציה על  $k$ .

**בסיס:** אם יש משוואה אחת  $x \equiv b_1 \pmod{m_1}$  אז  $x = b_1$  פתרון.

**צעד:** נניח שיש  $x_1$  שלם הפותר את  $x_1 \equiv b_i \pmod{m_i}$  לכל  $i \in [k-1]$ . נרצה שגם  $x_1 \equiv b_k \pmod{m_k}$ , אבל זה לא בטוח. אם לא, נחליף את  $x_1$  יהי  $m' = \prod_{i=1}^{k-1} m_i$ . נסתכל על  $x_1 + ym'$  כאשר  $y \in \mathbb{Z}$ . נרצה  $x_1 + ym' \equiv b_k \pmod{m_k}$ . לכן נחפש את  $y$  המתאים, כלומר נפתור  $m'y = b_k - x_1 \pmod{m_k}$ . מתקיים  $(m_i, m_j) = 1$  לכל  $i \neq j$  ולכן לפי הלמה  $m'$  זר ל- $m_k$ . אז  $(m', m_k) = 1$  ולפי הטענה יש פתרון. ■

**תרגיל 6.** כל שני פתרונות נבדלים בכפולה של  $m$ .

נחזור לדוגמה ממקודם.

$$x^2 + y^2 \equiv 3 \pmod{7} \quad x^2 + y^2 \equiv 3 \pmod{5} \quad x^2 + y^2 \equiv 3 \pmod{35}$$

**דוגמה 1.6.23.** ראינו כי

$$\begin{aligned} x_0 &\equiv 3 \pmod{7} & x_0 &\equiv 2 \pmod{5} \\ y_0 &\equiv 1 \pmod{7} & y_0 &\equiv 2 \pmod{5} \end{aligned}$$

ולפי משפט השאריות הסיני, יש פתרון משותף.  $3 - x^2 - y^2$  זרים ל- $5, 7$  ו- $5, 7 \mid 3 - x^2 - y^2$  ונקבל  $35 \mid 3 - x^2 - y^2$ .

**מסקנה 1.6.24.** כדי לפתור משוואה בקונגרואנציה מספיק לפתור את המשוואה מודולו חזקות של ראשוניים.

**הגדרה 1.6.25.** נניח כי  $R_1, \dots, R_n$  חוגים, ונגדיר

$$\bigoplus_{i=1}^n R_i := \{(r_1, \dots, r_n) \mid \forall i: r_i \in R_i\}$$

עם חיבור וכפל לפי רכיבים. זהו חוג ונקרא **הסכום הישר של  $R_i$** .

**דוגמה 1.6.26.** נסתכל על  $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ . מתקיים

$$5^2 = 25 \equiv 4 \pmod{7} \quad 5^3 = 5 \cdot 4 \equiv 6 \pmod{7} \quad 5^4 = 5 \cdot 6 \equiv 2 \pmod{7} \quad 5^5 = 5 \cdot 2 \equiv 3 \pmod{7} \quad 5^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

לכן 5 יוצר של  $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ .

**למה 1.6.27.** יהי  $K$  שדה ויהי  $p(x) \in K[x]$  מדרגה  $n$ . אז לכל היותר  $n$  שורשים שונים.

הוכחה. נניח בשלילה שיש  $n+1$  שורשים שונים. באינדוקציה נקבל  $p(x) = c \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$  ואז לאחר הצבת  $\alpha_{n+1}$  שום גורם לא מתאפס, בסתירה. ■

**הערה 1.6.28.** הכיוון השני של משפט פרמה נכון. אם  $a \mid n$  לא מתקיים  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ . אבל, יש מספרים עבורם אם  $(a, n) = 1$  אז  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ . מספרים אלו נקראים מספרי Carmichael.

**מסקנה 1.6.29.** יהיו  $p_1, p_2 \in k[x]$  מתוקנים מדרגה  $n$ . אם  $p_1(\alpha_i) = p_2(\alpha_i)$  עבור  $n$  איברים שונים  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in k$  אז  $p_1 = p_2$ .

הוכחה. נסתכל על הפולינום  $p(x) = p_1(x) - p_2(x)$ . אז ל- $p$  דרגה לכל היותר  $n-1$ . מתקיים  $p(\alpha_i) = p_1(\alpha_i) - p_2(\alpha_i) = 0$  לכן יש  $n$  שורשים שונים, אבל דרגתו  $n-1$  לכן הינו פולינום האפס. ■

**טענה 1.6.30.** יהי  $p$  ראשוני. אז  $x^{p-1} - 1 \equiv (x-1)(x-2)\dots(x-(p-1)) \pmod{p}$ .

הוכחה. יהיו  $f(x) = x^{p-1} - 1$  ו- $g(x) = (x-1)(x-2)\dots(x-(p-1))$ . אז לכל  $a \in \mathbb{Z}_p^*$  מתקיים  $f(a) = 0$  ממשפט פרמה וגם  $g(a) = 0$  ומהמסקה  $g(a) = 0$ .

**משפט 1.6.31 (Wilson).**  $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ .

הוכחה. נציב  $x = 0$  בטענה.

**תרגיל 7.** אם  $n > 4$  פריק אז  $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$ .

**טענה 1.6.32.** יהי  $p$  ראשוני ו- $d \in \mathbb{N}$  עבורו  $d \mid p-1$ . אז לפולינום  $x^d - 1$  בדיוק  $d$  שורשים שונים מודולו  $p$ .

הרצאה 9  
21 באוקטובר  
2018

הוכחה. יהא  $m = \frac{p-1}{d}$  ואז  $p-1 = dm$ . נקבל

$$\frac{x^{p-1} - 1}{x^d - 1} = \frac{(x^d)^m - 1}{x^d - 1}$$

יהי  $y = x^d$  אז

$$\frac{y^m - 1}{y - 1} = 1 + y + \dots + y^{m-1}$$

ולכן

$$\frac{p r s x^{d^m} - 1}{x^d - 1} = \overbrace{1 + x^d + \dots + x^{(m-1)d}}^{g(x)}$$

ולאחר העברת אגפים

$$x^{p-1} - 1 = (x^d - 1) g(x)$$

לפי הטענה, לפולינום  $x^{p-1} - 1$  יש  $p-1$  שורשים שונים, לכן לפולינום  $x^d - 1$  יש  $d$  שורשים שונים. ■

תהי  $G$  אבליית מסדר  $n$ . נניח שלכל מחלק  $n \mid d$  יש בדיוק  $d$  איברים ב- $G$  שמקיימים  $x^d = e$ . אז ידוע מחבורות כי  $G$  חבורה ציקלית.

**משפט 1.6.33.**  $\mathbb{Z}_p$  ציקלית לכל  $p$  ראשוני.

הוכחה. הראינו שלכל  $p-1 \mid d$  יש בדיוק  $d$  פתרונות למשוואה  $x^d - 1$  כלומר  $x^d = 1$ . ■

נוכיח שאם  $p \neq 2$  ראשוני אז  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$  ציקלית לכל  $k$ . נתחיל עם המקרה  $k=2$ . נסתכל על החבורה  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ . ראינו כי זאת ציקלית, ולכן יש לה יותר  $g$ . הסדר של  $g$  הוא  $p-1$ . מתקיים  $\#(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^* = p^2 - p$ . לכן אם  $a \nmid p$  אז  $a^{p^2-p} \equiv 1 \pmod{p^2}$ . גם  $g$  מקיים  $g^{p^2-p} \equiv 1 \pmod{p^2}$ . יהי  $d = o(g)$  הסדר ב- $(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^*$ . אז  $p^2 \mid g^d - 1$  ולכן  $g^d \equiv 1 \pmod{p}$  כלומר  $p \mid g^d - 1$ . לכן  $d \mid p-1$ . גם  $p-1 \mid d$  ולכן  $d = p-1$  או  $d = (p-1)p$ . אם  $d = (p-1)p$  סיימנו. אחרת נגדיר  $g_1 = g + p$

**טענה 1.6.34.** יהי  $g$  יוצר של החבורה  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$  עבורו  $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ . אז  $g_1 = g + p$  יוצר של  $(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^*$ . כלומר,  $g_1^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ .<sup>5</sup>

הוכחה.

$$\begin{aligned} g_1^{p-1} &= (g+p)^{p-1} \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p-1}{k} g^{p-1-k} p^k \\ &\equiv g^{p-1} + (p-1) g^{p-2} p \pmod{p^2} \\ &\equiv 1 + (p-1) g^{p-2} p \pmod{p^2} \\ &\not\equiv 1 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

■

מהטענה הוכחנו כי  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$  ציקלית עבור  $k=2$ . נוכיח באופן כללי. ניקח  $g$  יוצר של  $(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^*$  ונראה שהוא יוצר של  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ . אז  $g$  יוצר גם של  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ . אז  $g^{p-1} = 1 + ap$  עם  $(a, p) = 1$  (כי  $o(g) = p^2 - p > p-1$ ). ניקח איבר מהצורה  $1 + ap$  ונמצא את הסדר שלו ב- $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ .

**למה 1.6.35.** יהי  $p$  ראשוני ו- $1 \leq k \leq p-1$  שלם. אז  $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$ .

הוכחה.

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$$

■

כאשר  $k! \nmid p$ , לכן  $p \mid \binom{p}{k}$ .

**למה 1.6.36.** אם  $j \geq 1$  ואם  $a \equiv b \pmod{p^j}$  אז  $a^p \equiv b^p \pmod{p^{j+1}}$ .

<sup>5</sup>כי ראינו שהסדר של  $g_1$  צריך להיות  $p-1$  או  $(p-1)p$

הוכחה. מתקיים

$$a = b + cp^j$$

עבור  $c \in \mathbb{Z}$ . כעת

$$\begin{aligned} a^p &= (b + cp^j)^p \\ &= \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} b^{p-k} (cp^j)^k \\ &\equiv b^p + pb^{p-1}cp^j \\ &\equiv b^p + b^{p-1}cp^{j+1} \\ &\equiv b^p \pmod{p^{j+1}} \end{aligned}$$

כנדרש.

**מסקנה 1.6.37.** אם  $j \geq 2$  ו- $p \neq 2$  ראשוני אז  $(1 + ap)^{p^{j-2}} \equiv 1 + ap^{j-1} \pmod{p^j}$ .

הוכחה. נוכיח באינדוקציה על  $j$ .

**בסיס  $j = 2$ :** נקבל כי צריך להראות

$$1 + ap \equiv 1 + ap \pmod{p^2}$$

זוה ברור.

**צעד:** נניח שהטענה נכונה לכל  $j \leq k$  ונוכיח עבור  $j = k + 1$ . צריך להוכיח

$$(a + ap)^{p^{j-1}} \equiv 1 + ap^j \pmod{p^{j+1}}$$

מתקיים מהלמה ומהנחת האינדוקציה

$$(1 + ap)^{p^{j-1}} = \left( (1 + ap)^{p^{j-2}} \right)^p \equiv (1 + ap^{j-1})^p \pmod{p^{j+1}}$$

לכן, כיוון ש- $j \geq 2$  גורר  $j \geq 2$  נקבל כי

$$\begin{aligned} \left( (1 + ap)^{j-1} \right)^p &\equiv 1 + p \cdot 1^{p-1} \cdot a \cdot p^{j-1} + \binom{p}{2} \cdot 1^{p-2} \cdot a^2 \cdot p^{2(j-1)} + \dots + a^p \cdot p^{p(j-1)} \\ &\equiv 1 + ap^j \pmod{p^{j+1}} \end{aligned}$$

**הגדרה 1.6.38.** יהיו  $a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}$  כך שמתקיים  $\gcd(a, m) = 1$ . נקרא **שורש פרימיטיבי מוד  $m$**  אם  $\bar{a}$  יוצר את החבורה  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ .

**דוגמה 1.6.39.** במקרה הקודם, הסדר של 5 מוד 7 הוא 6.

**מסקנה 1.6.40.** אם  $\gcd(a, p) = 1$  אז הסדר של  $1 + ap$  מוד  $p^j$  עבור  $j \geq 2$  הוא  $p^{j-1}$ .

הוכחה. נציב  $j + 1$  בלמה ונקבל

$$(1 + ap)^{p^{j-1}} \equiv 1 + ap^j \pmod{p^{j+1}}$$

לכן מחלק את ההפרש, ולכן גם  $p^j$  מחלק את ההפרש ונקבל

$$(1 + ap)^{p^{j-1}} \equiv 1 \pmod{p^j}$$

לכן הסדר של  $1 + ap$  מוד  $p^j$  מחלק את זה מוד  $p^{j-1}$ . לכן הסדר בקבוצה  $(1, p, \dots, p^{j-1})$  מוד  $p^{j-2}$  נקבל

$$(1 + ap)^{p^{j-2}} \equiv 1 + ap^{j-1} \not\equiv 1 \pmod{p^j}$$

ולכן הסדר הוא  $p^{j-1}$ .

**משפט 1.6.41.** יהי  $k \geq 3$  ויהי  $p \neq 2$  ראשוני. אז  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$  ציקלית.

הוכחה. יהי  $g$  שורש פרימיטיבי מוד  $p^2$  ונראה כי  $g$  שורש פרימיטיבי מוד  $p^k$ . לפי פרמה הקטן,  $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$  לכן  $g^{p-1} = 1 + ap$ . מצד שני  $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$  לכן  $\gcd(a, p) = 1$ . יהי  $m$  הסדר של  $g$  מוד  $p^k$  ונרצה להוכיח  $m = p^k - p^{k-1}$ . כלומר  $m = p^{k-1}(p-1)$ . נקבל  $g^m \equiv 1 \pmod{p^k}$  ואז  $g^m \equiv 1 \pmod{p}$  כלומר  $(p-1) \mid m$ , כי  $g$  יוצר. כעת  $g^m \equiv 1 \pmod{p^k}$  גורר  $(g^m)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^k}$  לכן  $(g^{p-1})^m \equiv 1 \pmod{p^k}$  לכן  $(1 + ap)^m \equiv 1 \pmod{p^k}$  לכן  $(p-1) \mid m$  ולכן  $p^{k-1} \mid m$  ולכן  $m = (p-1)p^{k-1}$  זה הסדר של החבורה.



**טענה 1.6.42.** לכל  $j \geq 3$  מתקיים  $5^{2^{j-1}} \equiv 1 + 2^{j-1} \pmod{2^j}$ .

■

הוכחה. תרגיל, באינדוקציה.

**מסקנה 1.6.43.** הסדר של  $5$  ב- $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^*$  הוא  $2^{j-2}$ .

הוכחה.  $5^{2^{j-2}} \equiv 1 + 2^j \pmod{2^{j+1}}$  לכן  $5^{2^{j-2}} = 1 + 2^j + a2^{j+1}$  או  $5^{2^{j-2}} \equiv 1 \pmod{2^j}$  מצד שני,  $5^{2^{j-3}} \equiv 1 + 2^{j-3} \pmod{2^j}$  ובפרט  $5^{2^{j-3}} \not\equiv 1 \pmod{2^j}$ .

■

**משפט 1.6.44.** אם  $k \geq 3$  אז

$$\left\{ (-1)^a 5^b \mid \begin{matrix} a \in \{0,1\} \\ b \in \{1, \dots, 2^{k-2}\} \end{matrix} \right\}$$

היא חתך של  $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^*$ .

הוכחה. נניח כי  $(-1)^{a_1} 5^{b_1} \equiv (-1)^{a_2} 5^{b_2} \pmod{2^k}$  כאשר  $a_1, a_2 \in \{0,1\}, b_1, b_2 \in \{1, \dots, 2^{k-2}\}$  ו- $k \geq 3$  אז

$$(-1)^{a_1} 5^{b_1} \equiv (-1)^{a_2} 5^{b_2} \pmod{4}$$

ולכן

$$(-1)^{a_1} \equiv (-1)^{a_2} \pmod{4}$$

כלומר  $a_1 = a_2$ .<sup>6</sup> קיבלנו  $5^{b_1} \equiv 5^{b_2} \pmod{2^k}$ . הסדר של  $5$  הוא  $2^{k-2}$  לפי המסקנה. לכן השיויון שקיבלנו גורר  $b_1 = b_2$ . מתקיים  $\#(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}) = 2^{k-1}$  לכן אלו כל האיברים וזה אכן חתך.

■

**מסקנה 1.6.45.** תהא  $C_n$  חבורה ציקלית מסדר  $n$ . קיבלנו שאם  $k \geq 3$  אז  $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^* \cong C_2 \times C_{2^{k-2}}$ .

**הערה 1.6.46.**  $C_n \times C_m$  ציקלית אם ורק אם  $(n, m) = 1$  זרים.

יהי  $m = \prod_{i=1}^r p_i^{k_i}$  פירוק ראשוניים של  $m$ , אז

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \left( \mathbb{Z} / \left( \prod_{i=1}^r p_i^{k_i} \right) \mathbb{Z} \right)^* \cong_{\text{CRT}} \prod_{i=1}^r (\mathbb{Z}/p_i^{k_i})^*$$

**מסקנה 1.6.47.**  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$  ציקלית אם  $m$  הוא  $2, 4, p^k$  או  $2p^k$  עבור  $p \neq 2$ .

נזכיר את הניסוח האחרון שלנו לשאלות של פרמה. עבור  $a \in \mathbb{Z}$  המקיים  $\gcd(a, p) = 1$ , האם יש פתרון למשוואה  $z^2 \equiv a \pmod{p}$ ? ראינו כי  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$  ציקלית ולכן נסתכל על משוואות מהצורה  $g^2 = a$  בחבורות ציקליות.

**משפט 1.6.48.** תהי  $G$  חבורה ציקלית מסדר  $n$ . יהי  $a \in G$ .

1. אם  $n$  אי-זוגי, קיים  $x$  יחיד ב- $G$  עבורו  $x^2 = a$ .

2. אם  $n$  זוגי, קיים  $x$  ב- $G$  כך ש- $x^2 = a$  אם ורק אם  $a^{\frac{n}{2}} = 1$  ובמקרה זה יש בדיוק 2 פתרונות.

הוכחה. נסתכל על ההומומורפיזם

$$\Phi: G \rightarrow G$$

$$x \mapsto x^2$$

(זה הומומורפיזם כי  $G$  אבלית).

1. אם  $n$  אי-זוגי, אין איבר מסדר שתיים לכן הגרעין של  $\Phi$  טריוואלי, לכן ההעתקה חח"ע ולכן על.

2. אם  $n$  זוגי אז  $\ker \Phi = 2$  או  $\frac{n}{2}$ .<sup>7</sup> או  $\frac{\#G}{\#\ker \Phi} = \frac{\#G}{2}$  או  $\frac{\#G}{\frac{n}{2}}$ .

אם קיים  $x$  עבורו  $x^2 = a$ , נעלה את שני האגפים בחזקת  $\frac{n}{2}$  ואז  $a^{\frac{n}{2}} = 1$  או  $a^{\frac{n}{2}} = 1$  אז  $a$  פתרון של  $x^{\frac{n}{2}} = 1$  ויש בדיוק  $\frac{n}{2}$  פתרונות כאלה שהם  $\text{Im } \Phi$ : אם  $y \in \text{Im } \Phi$  קיים  $x \in G$  עבורו  $x^2 = y$  ואז  $x^{\frac{n}{2}} = y^{\frac{n}{2}} = 1$  לכן  $y \in \text{Im } \Phi$ .<sup>8</sup>

■

**הגדרה 1.6.49.** יהי  $a \in \mathbb{Z}$  ויהי  $m \in \mathbb{N}$ . הוא **שארית ריבועית** מודולו  $m$  אם קיים  $x \in \mathbb{Z}$  עבורו  $x^2 \equiv a \pmod{m}$ .

**מסקנה 1.6.50.** יהי  $p \neq 2$  ראשוני ויהי  $a \in \mathbb{Z}$  עבורו  $\gcd(a, p) = 1$ . אז  $a$  הוא שארית ריבועית מודולו  $p$  אם ורק אם  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ .

■

הוכחה.  $n = p-1 = \#(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$  זוגי לכן יש פתרון למשוואה  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  אם ורק אם  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ .

✧

<sup>6</sup> כי לקחנו  $a_1, a_2 \in \{0,1\}$

<sup>7</sup> ראינו שבחבורה ציקלית למשוואה  $x^d = 1$  יש בדיוק  $d$  פתרונות לכל  $d \mid n = \#G$

**1.6.51. מסקנה** יהי  $p \neq 2$  ראשוני.  $-1$  הוא שארית ריבועית מודולו  $p$  אם ורק אם  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .

**הוכחה.**  $-1$  שארית ריבועית מודולו  $p$  אם ורק אם  $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$  אם ורק אם  $\frac{p-1}{2}$  זוגי אם קיים  $k \in \mathbb{Z}$  עבורו  $p-1 = 4k$  אם ורק אם  $p \equiv 1 \pmod{4}$ . ■

**1.6.52. הערה** לכל  $a, a^{\frac{p-1}{2}}$  איבר מסדר 2 מודולו  $p$  לכן הינו  $\pm 1$ .

**1.6.53. דוגמה**

$$(-3)^{\frac{4}{2}} = 9 \equiv -1 \pmod{5}$$

לכן  $-3$  אינו שארית ריבועית מודולו 5.

**1.6.54. דוגמה**

$$(-3)^{\frac{6}{2}} = -27 = -28 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$$

לכן  $-3$  הינו שארית ריבועית מודולו 7.

**1.6.55. דוגמה**

$$(-3)^{\frac{11-1}{2}} = -3^5 \equiv -1 \pmod{11}$$

לכן  $-3$  אינו שארית ריבועית מודולו 11.

## 1.7 המשוואה $x^k = a$ בחבורה ציקלית

**1.7.1. משפט**  $G$  חבורה ציקלית מסדר  $n$  ויהי  $a \in G$ . נסתכל על המשוואה  $x^k = a$ .

1. אם  $\gcd(k, n) = 1$  קיים  $x \in G$  יחידה עבורו  $x^k = a$ .

2. אם  $k \mid n$  יהי  $r = \frac{n}{k}$  קיים  $x \in G$  כך ש- $x^k = a$  אם ורק אם  $a^r = 1$ . אז יש בדיוק  $k$  פתרונות.

**1.7.2. הערה** כדי להוכיח את המשפט מסתכלים על ההומומורפיזם

$$\begin{aligned} \Phi: G &\rightarrow G \\ x &\rightarrow x^k \end{aligned}$$

עשינו דבר דומה עבור  $k = 2$ .

**הוכחה.** נציג הוכחה לחלק 2 של המשפט בלבד. לכיוון אחד, נניח שקיים  $x \in a$  עבורו  $x^k = a$  אז

$$a^r = (x^k)^r = x^{k \frac{n}{d}} = x^{\frac{k}{d} n} = \left(x^{\frac{k}{d}}\right)^n = 1$$

להפך, נניח כי  $a^r = 1$  ונמצא  $x \in G$  עבורו  $x^k = a$ . מההנחה, ומהסעיף הראשון, קיים  $x \in G$  עבורו  $x^d = a$  יש  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$  כך שמתקיים  $\alpha k + \beta n = d$  אז

$$a = x^d = x^{\alpha k + \beta n} = (x^\alpha)^k (x^\beta)^n = (x^\alpha)^k$$

ולכן  $a = y^k$  עבור  $y = x^\alpha$ . ■

במשך נרצה להסתכל על המשוואות  $x^3 \equiv a \pmod{p}$  ו- $x^4 \equiv a \pmod{p}$  כאשר  $(a, p) = 1$ .

**1.7.3. דוגמה** נסתכל על  $k = 3$  ועל  $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ .

1. אם  $3 \nmid p-1$  מתקיים  $(3, p-1) = 1$  לכן  $p \equiv 2 \pmod{3}$  תמיד יש פתרון יחיד למשוואה  $x^3 \equiv a \pmod{p}$ .

2. אם  $3 \mid p-1$  אז  $p \equiv 1 \pmod{3}$ . שליש מהאיברים הם חזקה שלישית כי  $x^3 \equiv a \pmod{p}$  אם ורק אם  $a^{\frac{p-1}{3}} \equiv 1 \pmod{p}$ .

**1.7.4. דוגמה** נסתכל על  $x^4 \equiv a \pmod{p}$ . נניח כי  $p \neq 2$  ואז  $p-1$  זוגי. לכן  $\gcd(4, p-1) \in \{2, 4\}$ . אם  $p \equiv 1 \pmod{4}$  אז ורק אם  $4 \mid (p-1)$  ו- $p \equiv 3 \pmod{4}$  אם ורק אם  $2 \mid (p-1)$  ו- $4 \nmid (p-1)$ . לכן לרבע מהאיברים יש שורש רביעי.

$$a^{\frac{p-1}{4}} \equiv 1 \pmod{p} \iff x^4 \equiv a \pmod{p}$$

## 1.8 הרמה של פתרונות ממודולו $p$ למודולו $p^k$

**טענה 1.8.1.** יהי  $p \neq 2$  ראשוני ויהיו  $a, k$  זרים ל- $p$ . אם יש פתרון למשוואה  $x^k \equiv a \pmod{p}$  אז יש פתרון למשוואה  $x^k \equiv a \pmod{p^e}$  לכל  $e \in \mathbb{N}_+$ .

הוכחה. באינדוקציה על  $e$ .

**בסיס:**  $e = 1$  טריוויאלי.

**צעד:** נניח כי פתרון  $x_0$  ל- $x^k \equiv a \pmod{p^e}$  נמצא פתרון למשוואה  $x^k \equiv a \pmod{p^{e+1}}$  ניקח  $x = x_0 + bp^e$  אז

$$x^k = (x_0 + bp^e)^k = \sum_{i=0}^k x_0^i (bp^e)^{k-i} \equiv x_0^k + kx_0^{k-1}bp^e \pmod{p^{e+1}}$$

ידוע מהגדרת  $x_0$  כי  $x_0^k = a + cp^e$  לכן

$$x^k \equiv a + cp^e + kx_0^{k-1}bp^e \pmod{p^{e+1}} \equiv a + p^e (c + kx_0^{k-1}b) \pmod{p^{e+1}}$$

ולכן צריך  $c + \overbrace{kx_0^{k-1}}^\alpha \cdot \overbrace{b}^y \equiv 0 \pmod{p}$ . כעת  $\gcd(x_0, p) = 1$  אבל  $a \not\equiv 0 \pmod{p}$  ולכן גם  $x_0$ . בנוסף,  $\gcd(k, p) = 1$  ולכן יש פתרון ל- $c + \alpha y \equiv 0 \pmod{p}$ . כלומר, יש  $b$  עבורו  $x = x_0 + b^e$  כנדרש. ■

**טענה 1.8.2.** יהי  $a$  אי-זוגי ויהי  $e \geq 3$ . למשוואה  $x^n \equiv 2 \pmod{2^e}$  יש פתרון אם ורק אם מתקיים לפחות אחד התנאים הבאים.

1.  $n$  אי-זוגי

$$2. \quad d = \gcd(n, 2^{e-2}), \text{ כאשר } a^{\frac{2^{e-2}}{d}} \equiv (2^e)^{-1} a \equiv 1 \pmod{4}$$

הוכחה. משתמשים במבנה של החבורה

$$(\mathbb{Z}/2^e\mathbb{Z})^* \cong C_2 \times C_{2^{e-2}} \quad \blacksquare$$

**הגדרה 1.8.3.** אם  $\gcd(a, m) = 1$  אז  $a$  שארית ריבועית מודולו  $m$  אם קיים  $x \in \mathbb{Z}$  עבורו  $x^2 \equiv a \pmod{m}$ .

**טענה 1.8.4.** יהי  $m = 2^e \prod_{i \in [k]} p_i^{e_i}$  ונניח  $\gcd(a, m) = 1$ . אז  $a$  שארית ריבועית מודולו  $m$  אם ורק אם מתקיימות שתי התכונות הבאות.

$$1. \quad i \in [k] \text{ לכל } a^{\frac{p_i-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p_i}$$

$$2. \quad \text{אם } e = 2 \text{ אז } a \equiv 1 \pmod{4} \text{ או } a \equiv 1 \pmod{8} \text{ אם } e \geq 3$$

הוכחה. ממשפט השאריות הסיני, די לפתור  $x^2 \equiv a \pmod{p_i}$  וגם  $x^2 \equiv a \pmod{2^e}$ . נזכיר כי אם  $\gcd(a, p) = 1$  אז  $a$  שארית ריבועית מודולו  $p$  אם ורק אם  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ . על מנת להמשיך את ההוכחה, ניעזר בהגדרה. נסתכל כעת על  $p$  ראשוני אי-זוגי.

**הגדרה 1.8.5 (סימן Legendre).** יהי  $a \in \mathbb{Z}$  ויהי  $p \neq 2 \in \mathbb{Z}$  ראשוני. נסמן  $\left(\frac{a}{p}\right)$  סימן Legendre שערכו

• 1 אם  $a$  שארית ריבועית מודולו  $p$

• -1 אם  $\gcd(a, p) = 1$  ואינו שארית ריבועית מודולו  $p$

• 0 אם  $p \mid a$

$$1.8.6 \text{ משפט. } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

$$2. \quad \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$

$$3. \quad \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right) \text{ אם } a \equiv b \pmod{p}$$

הוכחה. 1. אם  $a$  שארית ריבועית מודולו  $p$  ראינו  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$  והגדרנו  $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ .

$$\text{אם } p \mid a \text{ אז } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 0 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

אחרת,  $a$  אינו שארית ריבועית מודולו  $p$  ומהמשפט  $a^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{p}$  אז  $c := a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ . כלומר,  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$ .

2. לפי הסעיף הקודם,

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}$$

3. לפי הסעיף הראשון,

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}$$

■

סוף המשפט לא הוכח במהלך ההרצאות (ייתכן כי הינו מופיע ברשימות התרגולים).

■

## פרק 2

# הדדיות ריבועית

**משפט 2.0.1 (הדדיות ריבועית).** יהיו  $p, q$  ראשוניים אי-זוגיים שונים.

$$1. \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

$$2. \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

$$3. \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

**מסקנה 2.0.2** 1.  $-1$  שארית ריבועית מודולו  $p$  אם ורק אם  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .

2. שארית ריבועית מודולו  $p$  אם ורק אם  $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ .

3. אם  $p \equiv 1 \pmod{4}$  או  $q \equiv 1 \pmod{4}$  אז  $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$ .  
אם  $p \equiv 3 \pmod{4}$  או  $q \equiv 3 \pmod{4}$  אז  $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$ .

הוכחה (של המסקנה). 1. אם  $p \equiv 1 \pmod{4}$  אז  $p = 4k + 1$  ואז  $\frac{p-1}{2} = 2k$  ואכן  $(-1)^{2k} = 1$ .  
אם  $p \equiv 3 \pmod{4}$  אז  $p = 4k + 3$  ואז  $\frac{p-1}{2} = 2k + 1$  ואכן  $(-1)^{2k+1} = -1$ .

$$\frac{p^2-1}{8} = \frac{64k^2 \pm 16k}{8} = 8k^2 \pm 2k \in \mathbb{Z}$$

אחרת  $(-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \equiv 1$  ואז  $(-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \equiv -1$  ואז  $p \equiv \pm 3 \pmod{8}$ .

ראינו בעצם כי עבור  $a \in [3]$  יש פתרון ל- $x^2 + ay^2 = p$  אם ורק אם  $\left(\frac{-a}{p}\right) = 1$ .

**משפט 2.0.3 (איילר).** יהי  $p \neq 2$  ראשוני. קיימים  $x, y \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x^2 + 2y^2 = p$  אם ורק אם  $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$ .

**משפט 2.0.4 (איילר).** יהי  $p \neq 3$  ראשוני. קיימים  $x, y \in \mathbb{Z}$  עבורם  $x^2 + 3y^2 = p$  אם ורק אם  $p \equiv 1 \pmod{3}$ .

הוכחה. נכתוב

$$\begin{aligned} \left(\frac{-3}{p}\right) &= \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right) \\ &= (-1)^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right) \\ &= (-1)^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right) \\ &= \left(\frac{p}{3}\right) \end{aligned}$$

**דוגמה 2.0.5**

$$\left(\frac{17}{47}\right) = \left(\frac{47}{17}\right) = \left(\frac{13}{17}\right) = \left(\frac{17}{13}\right) = \left(\frac{4}{13}\right) = 1$$

**דוגמה 2.0.6.** אם  $x^2 + 5y^2 = p$  אז  $\left(\frac{-5}{p}\right) = 1$  כאשר  $p \neq 5$ . באותו אופן עבור  $n$  כללי

$$x^2 + ny^2 = p$$

ולכן  $\left(\frac{-n}{p}\right) = 1$ . נרצה לדעת מתי  $\left(\frac{-n}{p}\right) = 1$  מתקיים מהדדיות

$$\left(\frac{-5}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \cdot \left(\frac{5}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot \left(\frac{p}{5}\right)$$

לכן 1, 4, ריבועים מודולו 5 ו-2, 3 אינם ריבועים מודולו 5. עתה  $\left(\frac{-5}{p}\right) = 1$  אם ורק אם מתקיים אחד המשפטים הבאים.

1. גם  $p \equiv 1 \pmod{4}$  וגם  $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ .

2.  $p \equiv 3 \pmod{4}$  וגם  $p \equiv \pm 2 \pmod{5}$ .

לכן, לפי משפט השאריות הסיני,  $p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{20}$  ולכן קיבלנו כי  $\left(\frac{-5}{p}\right) = 1$  אם ורק אם  $p = 1, 3, 7, 9$ .

**משפט 2.0.7 (לגרנג').** יהי  $p$  ראשוני שונה מ-5. קיימים  $x, y \in \mathbb{Z}$  כך ש- $x^2 + 5y^2 = p$  אם ורק אם  $p \equiv 1, 9 \pmod{20}$ .

**הערה 2.0.8.** מהמשפט, אם 5 שארית ריבועית מודולו 5, לא בהכרח פתרון מהצורה  $x^2 + 5y^2 = p$ .

עבור  $p \equiv 3, 7 \pmod{20}$ , לא ניתן להציג את  $p$  באמצעות  $x^2 + 5y^2$ .

נחשוב מה הסיבה לכך. עבור  $x^2 + ay^2 = p$  עבדנו עם  $\mathbb{Z}[\sqrt{-a}]$  אבל כאשר  $a = 5$  החוג אינו אוקלידי ואפילו אינו PID.

**הגדרה 2.0.9.** יהי  $b$  אי-רציונלי חיובי ויהי  $a \in \mathbb{Z}$ . נניח כי  $b = p_1 \cdot \dots \cdot p_k$  פירוק לראשוניים, ונגדיר את **סימן יעקובי**

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \left(\frac{a}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{a}{p_k}\right)$$

**הערה 2.0.10.** אם  $b$  ראשוני, סימן יעקובי וסימן לז'נדר מזדהים.

**הערה 2.0.11.** • סימן יעקובי מוגדר היטב, כי בפירוק של  $b$  לא מופיע 2, וסימן לז'נדר מוגדר עבור  $p \neq 2$ .

• אם  $b$  אינו ראשוני,  $\left(\frac{a}{b}\right)$  אינו בהכרח בודק אם  $a$  שארית ריבועית מודולו  $b$ .

**דוגמה 2.0.12.** מתקיים

$$\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{5}\right) = 1$$

2 אינו שארית ריבועית מודולו 3 או מודולו 5 לכן  $\left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{5}\right) = 1$ , אבל 2 אינו שארית ריבועית מודולו 5 כי אינו שארית ריבועית מודולו 5, 3.

**הערה 2.0.13.** מה שטוב בסימן יעקובי הוא שלא צריך לפרק את המספרים כפי שראינו בדוגמה עם  $\left(\frac{17}{47}\right)$ . נרצה להראות שלסימן יעקובי אותן תכונות של סימן לז'נדר, ובפרט הדדיות.

**טענה 2.0.14.** 1.

$$\left(\frac{a_1 a_2}{b}\right) = \left(\frac{a_1}{b}\right) \cdot \left(\frac{a_2}{b}\right)$$

2.

$$\left(\frac{a}{b_1 b_2}\right) = \left(\frac{a}{b_1}\right) \cdot \left(\frac{a}{b_2}\right)$$

3. אם  $a_1 \equiv a_2 \pmod{b}$

$$\left(\frac{a_1}{b}\right) = \left(\frac{a_2}{b}\right)$$

1. הוכחה.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_1 a_2}{b}\right) &= \left(\frac{a_1 a_2}{p_1 \cdot \dots \cdot p_k}\right) \\ &= \left(\frac{a_1 a_2}{p_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{a_1 a_2}{p_k}\right) \\ &= \left(\frac{a_1}{p_1}\right) \left(\frac{a_2}{p_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{a_1}{p_k}\right) \left(\frac{a_2}{p_k}\right) \\ &= \left(\frac{a_1}{p_1 \cdot \dots \cdot p_k}\right) \cdot \left(\frac{a_2}{p_1 \cdot \dots \cdot p_k}\right) \\ &= \left(\frac{a_1}{b}\right) \cdot \left(\frac{a_2}{b}\right) \end{aligned}$$

2. מידי מהגדרה.

3. אם  $a_1 \equiv a_2 \pmod{b}$  אז בפרט  $a_1 \equiv a_2 \pmod{p_i}$  לכל  $p_i$  בפירוק של  $b$ , ומכאן ממשיכים עם התכונות של סימן לז'נדר. ■

**למה 2.0.15.** יהיו  $r, s$  אי-זוגיים. אז

1.

$$\frac{rs-1}{2} = \frac{r-1}{2} + \frac{s-1}{2} \pmod{2}$$

2.

$$\frac{r^2s^2-1}{8} = \frac{r^2-1}{8} + \frac{s^2-1}{8} \pmod{2}$$

**הערה 2.0.16.** אם  $a$  אי-זוגי אז  $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$  כי  $a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$  ואז  $(a-1), (a+1)$  זוגיים ולכן המכפלה מתחלקת ב-4.

הוכחה. 1.

$$(r-1)(s-1) \equiv 0 \pmod{4}$$

$$rs - r - s + 1 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$rs - 1 \equiv r - 1 + s - 1 \pmod{4}$$

$$\frac{rs-1}{2} \equiv \frac{r-1}{2} + \frac{s-1}{2} \pmod{2}$$

2.

$$(r^2-1)(s^2-1) \equiv 0 \pmod{16}$$

$$r^2s^2 - 1 \equiv r^2 - 1 + s^2 - 1 \pmod{16}$$

$$\frac{r^2s^2-1}{8} \equiv \frac{r^2-1}{8} + \frac{s^2-1}{8} \pmod{2}$$

■

**מסקנה 2.0.17.** יהיו  $r_1, \dots, r_k$  אי-זוגיים. אז

1.

$$\sum_{i \in [k]} \frac{r_i - 1}{2} \equiv \frac{r_1 \cdot \dots \cdot r_k - 1}{2} \pmod{2}$$

2.

$$\sum_{i \in [k]} \frac{r_i^2 - 1}{8} \equiv \frac{r_1^2 \cdot \dots \cdot r_k^2 - 1}{8} \pmod{2}$$

הוכחה. נוכיח את הסעיף הראשון באינדוקציה.

$$\sum_{i \in [k-1]} \frac{r_i - 1}{2} \equiv \frac{r_1 \cdot \dots \cdot r_{k-1} - 1}{2} \pmod{2}$$

נגדיר  $a = r_1 \cdot \dots \cdot r_{k-1}$  ואז מלמה 2.0.15 סעיף 1 נקבל

$$\frac{a-1}{2} + \frac{r_k-1}{2} \equiv \frac{ar_k-1}{2} \equiv \frac{r_1 \cdot \dots \cdot r_k - 1}{2} \pmod{2}$$

כנדרש. ■

את הסעיף השני נוכיח באותו אופן.

**משפט 2.0.18.** יהי  $b$  שלם חיובי ואי-זוגי.

1.

$$\left(\frac{-1}{b}\right) = (-1)^{\frac{b-1}{2}}$$

.2

$$\left(\frac{2}{b}\right) = (-1)^{\frac{b^2-1}{8}}$$

.3 אם  $a \neq 1$  אזי  $\mathcal{N}(a, b) = 1$ 

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{b}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{b-1}{2}}$$

1. הוכחה.

$$\begin{aligned} \left(\frac{-1}{b}\right) &= \left(\frac{-1}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{-1}{p_k}\right) \\ &= (-1)^{\frac{p_1-1}{2} + \cdots + \frac{p_k-1}{2}} \\ &\stackrel{\text{previous lemma}}{=} (-1)^{\frac{p_1 \cdots p_k - 1}{2}} \\ &= (-1)^{\frac{b-1}{2}} \end{aligned}$$

.2 באותה דרך כמו הסעיף הקודם.

.3 נכתוב  $a = q_1 \cdot \dots \cdot q_m$  מתקיים

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{b}{a}\right) &= \prod_{i,j} \left(\frac{p_i}{q_j}\right) \left(\frac{q_j}{p_i}\right) \\ &= \prod_{i,j} (-1)^{\frac{p_i-1}{2} \cdot \frac{q_j-1}{2}} \\ &= (-1)^{\sum_{i,j} \frac{p_i-1}{2} \cdot \frac{q_j-1}{2}} \\ &= (-1)^{(\sum_{i \in [k]} \frac{p_i-1}{2}) (\sum_{j \in [m]} \frac{q_j-1}{2})} \\ &\stackrel{\text{from corollary}}{=} (-1)^{\frac{p_1 \cdots p_k - 1}{2} \cdot \frac{q_1 \cdots q_m - 1}{2}} \\ &= (-1)^{\frac{b-1}{2} \cdot \frac{a-1}{2}} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

**דוגמה 2.0.19.** נרצה לחשב את  $\left(\frac{1001}{9907}\right)$ .דרך אחת היא פירוק  $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$  ואז חישוב כמכפלת סימני לג'נדר. דרך נוספת היא עם סימן יעקובי.

$$\begin{aligned} \left(\frac{1001}{9907}\right) &= \left(\frac{9907}{1001}\right) \\ &= \left(\frac{898}{1001}\right) = \left(\frac{2}{1001}\right) \left(\frac{449}{1001}\right) \\ &= (-1)^{\frac{1001^2-1}{8}} \left(\frac{449}{1001}\right) = \left(\frac{1001}{449}\right) \\ &= \left(\frac{103}{449}\right) = \left(\frac{449}{103}\right) \\ &= \left(\frac{37}{103}\right) = \left(\frac{103}{37}\right) \\ &= \left(\frac{29}{37}\right) = \left(\frac{37}{29}\right) \\ &= \left(\frac{8}{29}\right) = \left(\frac{4}{29}\right) \cdot \left(\frac{2}{29}\right) \\ &= \left(\frac{2}{29}\right) = -1 \end{aligned}$$



## 2.1 אלגוריתם מילר-רבין לבדיקת ראשוניות

יהי  $n$  שלם אי-זוגי. נרצה לדעת האם  $n$  ראשוני. בעזרת אלגוריתם מילר-רבין ניתן לבדוק בהסתברות גבוהה האם מספר הינו ראשוני. הרעיון הראשון הוא להשתמש במשפט פרמה. נגדיל  $1 < a < n-1$ . אם  $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$  אז  $a$  נקרא "עד" לכך ש- $n$  אינו ראשוני. אחרת,  $a$  איננו עד, אבל ייתכן עדיין כי  $n$  אינו ראשוני. ניקח  $a \neq b$  ונבדוק האם  $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ . לרעיון זה יש בעיה, כי אם  $n$  מספר Carmichael אז אינו ראשוני אבל  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$  לכל  $a$  עבורו  $\gcd(a, n) = 1$ . כדי לתקן זה, נוסיף עוד עדים. אם  $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$  כאשר  $x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$  אז  $n$  אינו ראשוני. כדי לבדוק זאת, אם  $n$  אי-זוגי ניתן לכתוב  $n-1 = 2^d m$  כאשר  $m$  אי-זוגי. אז נכתוב  $a^{n-1} = \left( \left( (a^m)^2 \right)^{\dots} \right)^2$ . אם קיבלנו בשלב מסוים 1 ובשלב לפניו לא קיבלנו  $\pm 1$ , אז  $a$  הוא עד.

### 2.1.1 אלגוריתם

1. נפרק  $n-1 = 2^d m$  עבור  $m$  אי-זוגי.
2. נבחר  $a$  בין 2 ל- $n-1$  באופן אקראי.
3. נחשב  $a^m \pmod{n}$ . אם  $a^m \equiv \pm 1 \pmod{n}$  נסיים ונחזיר כי  $n$  חשוד להיות ראשוני.
4. אם  $a^m \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$ , נרשום  $a^m \equiv b_0 \pmod{n}$  ונסתכל על הסדרה  $b_0, b_1 = b_0^2, \dots, b_{d-1} = b_{d-2}^2$ .

אם בשלב ה- $j$  כלשהו  $b_j \equiv -1 \pmod{n}$ , נחזיר כי  $n$  ראשוני. אחרת הוא בוודאות אינו ראשוני.

**הערה 2.1.2.** נרצה לחשב את  $a^m$  בצורה יעילה. נכתוב  $2^\ell \leq m < 2^{\ell+1}$ . נחשב  $a^2, \dots, a^{2^\ell}$  מודולו  $n$ . אז נכתוב את  $a^m$  כמכפלה של החזקות מלמעלה.

**משפט 2.1.3.** אם  $n > 9$  וקיבלנו בתהליך מילר-רבין ש- $n$  ראשוני אז יש סיכוי של פחות מ- $\frac{1}{2}$  ש- $n$  אינו ראשוני.

**הערה 2.1.4.** סיבוכיות האלגוריתם היא  $\Theta((\log n)^3)$ .

**הערה 2.1.5.** אם נחזור על התהליך עשר פעמים, נקבל שהסיכוי ש- $n$  אינו ראשוני הוא  $\frac{1}{1000000}$ .  $\left(\frac{1}{4}\right)^{10} \sim \frac{1}{1000000}$ .

**משפט 2.1.6.** יהי  $a \in \mathbb{N}$  שלם שאינו ריבוע. יש אינסוף ראשוניים  $p$  עבורם  $a$  אינו שארית ריבועית.

**למה 2.1.7.** נכתוב  $a = b^2 a'$ . אם יש אינסוף ראשוניים  $p$  עבורם  $a'$  אינו שארית ריבועית, אז יש אינסוף ראשוניים עבורם  $a$  אינו שארית ריבועית.

הוכחה. כתרגיל. ■

הוכחה (משפט). נכתוב  $a' = 2^\alpha \prod_{i \in [n]} q_i$  כאשר  $\alpha \in \{0, 1\}$  ו- $q_i$  ראשוניים.

**מקרה א':**  $n \geq 1$ . יהיו  $\{\ell_i\}_{i \in [k]}$  ראשוניים אי-זוגיים ושונים מכל ה- $q_i$ . נמצא פתרון למשוואות

$$\begin{aligned} \forall i \in [k]: x &\equiv 1 \pmod{\ell_i} \\ \forall i \in [n-1]: x &\equiv 1 \pmod{q_i} \\ x &\equiv s \pmod{q_n} \\ x &\equiv 1 \pmod{8} \end{aligned}$$

ולפי משפט השארייות הסיני, יש פתרון  $b$ . נחשב את  $\left(\frac{a'}{b}\right)$ . נכתוב  $b = \prod_{i \in [m]} p_i$ . אז

$$\left(\frac{a'}{b}\right) = \left(\frac{2^\alpha}{b}\right) \prod_{i \in [n]} \left(\frac{a_i}{b}\right) = \prod_{i \in [m]} \left(\frac{a'}{p_i}\right)$$

נחשב את  $\left(\frac{a'}{b}\right)$  לפי הביטוי השמאלי. כיוון ש- $b \equiv 1 \pmod{8}$ , לפי משפט 1.  $\left(\frac{2}{b}\right) = 1$ . לכן לפי משפט  $\left(\frac{q_1}{b}\right) = \left(\frac{b}{q_1}\right)$ . אבל, פתרון של  $x \equiv 1 \pmod{q_1}$ , לכן  $\left(\frac{1}{q_1}\right) = \left(\frac{b}{q_1}\right) = \left(\frac{q_1}{b}\right)$ . באותו אופן לכל  $i \in [n-1]$ , ועבור  $n$  נקבל

$$\left(\frac{q_n}{b}\right) = \left(\frac{b}{q_n}\right) = \left(\frac{s}{q_n}\right) = -1$$

אם נבחר  $s$  שאינו שארית ריבועית מודולו  $q_n$ . לכן קיבלנו

$$-1 = \left(\frac{a'}{b}\right) = \prod_{i \in [m]} \left(\frac{a'}{p_i}\right)$$

ולכן קיים  $p_i$  עבורו  $\left(\frac{a'}{p_i}\right) = -1$ . כלומר,  $a'$  אינו שארית ריבועית מודולו  $p_i$ . נניח בשלילה שיש מספר סופי של ראשוניים  $\{\ell_i\}_{i \in [k]}$  שבהם  $a'$  אינו שארית ריבועית, ומקבלים ראשוני חדש  $p_i$  שאינו שארית ריבועית, בסתירה. לכן יש אינסוף ראשוניים שבהם  $a'$  אינו שארית ריבועית.

**מקרה ב':** יהי  $a' \neq 2$  ונניח בשלילה שיש מספר סופי של ראשוניים  $\ell_1, \dots, \ell_k$  כך ש- $\ell_i \neq 3$  לכל  $i \in [k]$  וגם  $\left(\frac{2}{\ell_i}\right) = -1$ . יהי  $b = 8 \prod_{i \in [k]} \ell_i + 3$ . אז  $b$  לא מתחלק ב-3 וב- $\ell_i$ . אז

$$\left(\frac{2}{b}\right) = (-1)^{\frac{b^2-1}{8}} = 1$$

ולכן

$$\left(\frac{2}{b}\right) = \prod_{i \in [m]} \left(\frac{2}{p_i}\right) = 1$$

ולכן יש  $i$  כך ש- $\left(\frac{2}{p_i}\right) = -1$  כאשר  $b = \prod_{i \in [m]} p_i$ . לכן מצאנו ראשוני חדש שאינו שארית ריבועית מוד 2. ■

**הגדרה 2.1.8.**  $\alpha \in \mathbb{C}$  נקרא מספר אלגברי אם קיים פולינום  $q(x) \in \mathbb{Q}[x]$  שונה מאפס עבורו  $q(\alpha) = 0$ .

**הגדרה 2.1.9.**  $\alpha \in \mathbb{C}$  נקרא שלם אלגברי אם קיים פולינום מתוקן  $q(x) \in \mathbb{Z}[x]$  עבורו  $q(\alpha) = 0$ .

**טענה 2.1.10.** יהי  $\alpha \in \mathbb{C}$  ויהי  $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$  פולינום אי-פריק. נניח כי  $p(\alpha) = 0$ . יהי  $m(x) \in \mathbb{Q}[x]$  פולינום עבורו  $m(\alpha) = 0$ . אז  $(x) \mid m(x)$ .

**טענה 2.1.11.** אם  $r \in \mathbb{Q}$  שלם אלגברי אז  $r \in \mathbb{Z}$ .

**טענה 2.1.12.** יהי  $\alpha \in \mathbb{C}$  ויהי  $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$  פולינום אי-פריק כך ש- $p(\alpha) = 0$ . יהי  $m(x) \in \mathbb{Q}[x]$  פולינום כך ש- $m(\alpha) = 0$ . אז  $p(x) \mid m(x)$ .

**הוכחה.** נניח בשלילה כי  $p(x) \nmid m(x)$ . לכן  $p, m$  זרים<sup>1</sup> ולכן קיימים פולינומים  $a, b$  עבורם  $ap + bm = 1$ . נציב  $\alpha$  ונקבל  $0 = a(\alpha)p(\alpha) + b(\alpha)m(\alpha) = 1$  בסתירה. ■

**טענה 2.1.13.** יהי  $\alpha \in \mathbb{C}$  מספר אלגברי. אז יש פולינום אי-פריק מתוקן **יחיד**  $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$  עבורו  $p(\alpha) = 0$ .

**הוכחה. קיום:** קיים פולינום  $q(x) \neq 0$  כך ש- $q(\alpha) = 0$ . לפי הגדרת  $\alpha$ . נכתוב  $q(x) = \prod_{i \in [k]} q_i(x)$  כאשר  $q_i$  אי-פריקים. אבל,  $q_i(\alpha) = 0$  לכן קיים  $i$  עבורו  $q_i(\alpha) = 0$ .

**יחידות:** אם  $p_1, p_2$  אי-פריקים שמתאפסים ב- $\alpha$  אז  $p_1(x) \mid p_2(x)$  וגם  $p_2(x) \mid p_1(x)$  לפי הטענה. אם  $p_1, p_2$  מתוקנים זה גורר  $p_1 = p_2$ . ■

**הגדרה 2.1.14.** הפולינום היחיד מהמסקנה הנ"ל נקרא הפולינום המינימלי של  $\alpha$ .

**למה 2.1.15 (גאוס).** יהי  $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$  פולינום מתוקן ונניח כי  $p(x) = q_1(x)q_2(x)$  כאשר  $q_1(x), q_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$  פולינומים מתוקנים. אז  $q_1(x), q_2(x) \in \mathbb{Z}[x]$ .

**טענה 2.1.16.** יהי  $\alpha \in \mathbb{C}$  מספר אלגברי. אז  $\alpha$  שלם אלגברי אם ורק אם הפולינום המינימלי  $p_\alpha(x)$  שלו ב- $\mathbb{Z}[x]$ .

**הוכחה.** אם הפולינום המינימלי עם מקדמים שלמים, ברור כי  $\alpha$  שלם אלגברי.

נניח ש- $\alpha$  שלם אלגברי, ונוכיח שהפולינום המינימלי שלו עם מקדמים שלמים.

אם  $\alpha$  שלם אלגברי, קיים  $m(x) \in \mathbb{Z}[x]$  מתוקן עבורו  $m(\alpha) = 0$ . לפי הטענה,  $p_\alpha(x) \mid m(x)$ , כלומר  $m(x) = p_\alpha(x)q(x) \in \mathbb{Z}[x]$  ולפי הלמה של גאוס  $p_\alpha(x) \in \mathbb{Z}[x]$ . ■

**דוגמה 2.1.17.**  $\mathbb{Q}[i]$  שדה בו כל המספרים אלגבריים. זה נובע מהלמה הבאה.

**למה 2.1.18.** יהיו  $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$  אז  $x = r_1 + r_2 i$  מספר אלגברי.

הרצאה 16  
26 בדצמבר  
2018

<sup>1</sup> כי  $p$  ראשוני ולכן אי-פריק בחוג  $\mathbb{Q}[x]$  שהינו אוקלידי

הוכחה. מתקיים

$$x^2 = r_1^2 - r_2^2 + 2r_1r_2i$$

וגם

$$\begin{aligned} x^2 - 2r_1x &= r_1^2 - r_2^2 + 2r_1r_2i - 2r_1^2 - 2r_1r_2i \\ &= -r_1^2 - r_2^2 \end{aligned}$$

וקיבלנו שהפולינום

$$x^2 - 2r_1x + r_1^2 + r_2^2$$

■

ב- $\mathbb{Q}[x]$  מאפס את  $r_1 + r_2i$ .

**דוגמה 2.1.19.** נרצה למצוא את השלמים האלגבריים ב- $\mathbb{Q}[i]$ . אם  $r_2 = 0$  אז  $x \in \mathbb{Q}$  שלם אלגברי. אחרת,  $r_1 + r_2i \notin \mathbb{Q}$  לכן הפולינום המינימלי שלו אינו מדרגה 1.

$$p_1(x) = x^2 - 2r_1x + r_1^2 + r_2^2$$

לפי המשפט,  $r_1 + r_2i$  שלם אלגברי אם ורק אם  $p_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$ . לכן הדרישה היא  $-2r_1 \in \mathbb{Z}$  וגם  $r_1^2 + r_2^2 \in \mathbb{Z}$ . אז ניתן לכתוב  $r_1 = \frac{m}{2}$  כאשר  $m \in \mathbb{Z}$ . נכתוב  $r_2 = \frac{c}{d}$  שבר מצומצם. אז

$$r_1^2 + r_2^2 = \frac{m^2}{4} + \frac{c^2}{d^2} = \frac{d^2m^2 + 4c^2}{4d^2} \in \mathbb{Z}$$

ואז

$$4d^2 \mid d^2m^2 + 4c^2$$

כלומר

$$d^2 \mid d^2m^2 + 4c^2$$

ואז

$$d^2 \mid 4c^2$$

ואז  $4 \mid d^2$  ונקבל  $d \in \{\pm 1, \pm 2\}$ . לכן נכתוב  $r_2 = \frac{c_1}{2}$  כאשר  $c_1$  יכול להיות זוגי. נכתוב

$$r_1^2 + r_2^2 = \frac{m^2 + c_1^2}{4} \in \mathbb{Z}$$

כלומר  $4 \mid m^2 + c_1^2$ . אם  $m, c_1$  אי-זוגיים, אז  $m^2 + c_1^2 \equiv 2 \pmod{4}$  בסתירה! אחרת  $m, c_1$  זוגיים ולכן  $r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$ .

**טענה 2.1.20.**  $\mathbb{Q}[\omega]$  הוא שדה בו כל האיברים הם מספרים אלגבריים. השלמים האלגבריים בתוך  $\mathbb{Q}[\omega]$  הם  $\mathbb{Z}[\omega]$ .

הוכחה. נכתוב  $\alpha = r_1 + r_2\omega$ . נחשב.

$$\begin{aligned} (x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) &= (x - (r_1 + r_2\omega))(x - (r_1 + r_2\bar{\omega})) \\ &= (x - (r_1 + r_2\omega))(x - (r_1 + r_2\omega^2)) \\ &= x^2 + (-2r_1 - r_2\omega - r_2\omega^2)x + r_1^2 - r_1r_2 + r_2^2 \\ &= x^2 + (-2r_1 - r_2(\omega + \omega^2))x + r_1^2 - r_1r_2 + r_2^2 \\ &= x^2 + (-2r_1 + r_2)x + r_1^2 - r_1r_2 + r_2^2 \in \mathbb{Q}[x] \end{aligned}$$

לכן מספר אלגברי. אז  $r_1 + r_2\omega$  שלם אלגברי אם ורק אם  $r_1^2 - r_1r_2 + r_2^2 \in \mathbb{Z}$  וגם  $-2r_1 + r_2 \in \mathbb{Z}$ . במקרה זה

$$(r_2 - 2r_1)^2 + 3r_2^2 = 4(r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2) \in \mathbb{Z}$$

ואז  $3r_2^2 \in \mathbb{Z}$  ולכן  $r_2 \in \mathbb{Z}$ . נתון  $-2r_1 + r_2 \in \mathbb{Z}$  לכן  $-2r_1 \in \mathbb{Z}$  ונכתוב  $r_1 = \frac{m}{2}$ . אז

$$r_1(r_1 - r_2) = \frac{m^2}{4} - \frac{mr_2}{2} \in \mathbb{Z}$$

■

ואפשר לקבל מכאן כי  $r_1 \in \mathbb{Z}$ .

**טענה 2.1.21.** יהי  $\alpha$  מספר אלגברי. אז  $\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}(\alpha)$ .

הוכחה. יהי  $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$  שאינו מתאפס ב- $\alpha$ , ונראה כי  $\frac{1}{p(\alpha)} \in \mathbb{Q}[\alpha]$ . מתקיים  $p_\alpha(x)$  איננו פריק. מתקיים

$$\gcd(p(x), p_\alpha(x)) = 1$$

אז קיימים פולינומים  $a(x), b(x) \in \mathbb{Q}[x]$  עבורם

$$a(x)p(x) + b(x)p_\alpha(x) = 1$$

■

ולאחר הצבה נקבל  $a(\alpha)p(\alpha) = 1$  כלומר  $\frac{1}{p(\alpha)} = b(\alpha)$ .

**טענה 2.1.22.** יהי  $\alpha$  אלגברי עם פולינום מינימלי מדרגה  $n$ . אז

$$[\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}] = n$$

ובסיס ההרחבה הוא  $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ .

**הוכחה.** אם הוקטורים תלויים לינארית, נקבל פולינום שונה מאפס ממעלה קטנה מ- $n$  המאפס את  $\alpha$ . ע"י בידוד  $\alpha^n$  מהמשוואה מקבלים כי  $\alpha^n$  בשדה, ובאופן דומה אפשר להראות שהקבוצה פורשת.

**משפט 2.1.23.** אוסף המספרים האלגבריים הוא שדה.

**הוכחה.** נציג את רעיון ההוכחה.

**הופכי:** אם  $\alpha$  אלגברי או שלם אלגברי, אז  $\bar{\alpha}$  גם כזה.

$$\alpha^n + b_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + b_1\alpha + b_0 = 0$$

לכן

$$(-1)^n (-\alpha)^n + (-1)^{n-1} b_{n-1} (-\alpha)^{n-1} + \dots \pm b_1 (-\alpha) + b_0 = 0$$

לכן

$$b'_n (-\alpha)^n + b'_{n-1} (-\alpha)^{n-1} + \dots + b'_1 (-\alpha) + b_0 = 0$$

מאפס את  $-\alpha$ . אם  $\alpha \neq 0$  מספר אלגברי אז גם  $\frac{1}{\alpha}$  כזה. אז

$$1 + \sum_{k \in [n]} \frac{b_{n-k}}{\alpha^{n-k}} = 0$$

לכן

$$1 + \sum_{k \in [n]} b_{n-k} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^k = 0$$

לכן  $\frac{1}{\alpha}$  מספר אלגברי.

**סגירות:** אם  $\alpha$  מספר אלגברי, ראינו כי השדה  $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}[\alpha]$  מ"ו ממימד  $n$  מעל  $\mathbb{Q}$  כאשר  $n = \deg p_\alpha$ .

**משפט 2.1.24.** אוסף השלמים האלגבריים הוא חוג. נסמן אותו  $\Omega$ .

**מסקנה 2.1.25.** ב- $\mathbb{Q}[\alpha]$  כל איבר הוא מספר אלגברי. חוג השלמים של  $K$  הוא  $O_K := \Omega \cap K$ .

**דוגמה 2.1.26.** הראינו שב- $\mathbb{Q}[i]$  חוג השלמים הוא  $\mathbb{Z}[i]$  וב- $\mathbb{Q}[\omega]$  חוג השלמים הוא  $\mathbb{Z}[\omega]$ . באופן כללי, כל שדה  $K$  שהוא הרחבה סופית של  $\mathbb{Q}$  הוא שדה מספרים אלגבריים.

**הגדרה 2.1.27.**  $a, b, c \in \Omega$ . נאמר כי  $a \equiv b \pmod{c}$  אם  $c \mid (b - a)$ .

**טענה 2.1.28.** יהיו  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ . אם  $a \equiv b \pmod{c}$  אז  $a \equiv b \pmod{\Omega}$  או  $a \equiv b \pmod{\mathbb{Z}}$ .

**הוכחה.**  $c \mid b - a$  לכן קיים  $\alpha \in \Omega$  עבורו  $c\alpha = b - a$  לכן  $\alpha = \frac{b-a}{c} \in \mathbb{Q}$ . קיבלנו כי  $\alpha$  שלם אלגברי ורציונלי לכן  $\alpha$  שלם, ולכן  $a \equiv b \pmod{\mathbb{Z}}$  גם ב- $\mathbb{Z}$ .

**טענה 2.1.29.** יהיו  $a, b \in \Omega$  ו- $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. אז  $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{\Omega}$ .

**הוכחה.** ראינו כי  $\binom{p}{k} \mid p$  לכל  $1 \leq k \leq p-1$  ומכאן נובעת הטענה.

**דוגמה 2.1.30.** נשאל מתי 2 שארית ריבועית מוד  $p$ . מהדדיות

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

2 יהי  $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{8}} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$  וידוע  $\zeta^8 = 1$ . לכן

$$(\zeta^4 - 1)(\zeta^4 + 1) = 0$$

קל לראות  $\zeta^4 + 1 = 0$  ולכן  $\zeta^2 + \zeta^{-2} = 0$ . כעת

$$(\zeta + \zeta^{-1})^2 = \zeta^2 + 2 + \zeta^{-2} = 2$$

נסמן  $\tau = \zeta + \zeta^{-1}$  והראנו  $\tau^2 = 2$ . שלם אלגברי כסכום של שני שלמים אלגבריים. אפשר לראות את זה גם מכיוון שהוא שורש של  $x^2 - 2$ .  
 אנו יודעים ש- $\left(\frac{p-1}{2}\right) \equiv 2^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$  נציב את  $\tau$  ואז

$$\begin{aligned}(\tau^2)^{\frac{p-1}{2}} &\equiv \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p} \\ \tau^{p-1} &\equiv \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p} \\ \tau^p &\equiv \tau \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}\end{aligned}$$

ב- $\Omega$ .

הרצאה 17  
2 בינואר  
2019

**טענה 2.1.31.** יהיו  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  עם  $c \neq 0$ . אם  $a \equiv b \pmod{c}$  ב- $\Omega$  אז  $a \equiv b \pmod{c}$  ב- $\mathbb{Z}$ .

נוכיח כעת הדדיות ריבועית עבור 2, כלומר

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

הוכחה. יהי  $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{8}}$  שלם אלגברי, אז  $\zeta^8 = 2$  כלומר  $\zeta^8 - 1 = 0$  כלומר

$$(\zeta^4 + 1)(\zeta^4 - 1) = 0$$

יהי  $\tau = \zeta + \zeta^{-1}$  ואז  $\tau^2 = \zeta^2 + 2 + \zeta^{-2} = 2$  כי  $\zeta^2 + \zeta^{-2} = 0$ . כתבנו את  $\sqrt{2}$  כסכום שורשי יחידה.  
 יהי  $p \neq 2$  ראשוני, אז

$$\tau^{p-1} = (\tau^2)^{\frac{p-1}{2}} = 2^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}$$

ב- $\Omega$ . לכן

$$\tau^p \equiv \tau \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}$$

מצד שני מתקיים

$$\tau^p = (\zeta + \zeta^{-1})^p \equiv (\zeta^p + \zeta^{-p}) \pmod{p}$$

בניח  $p \equiv 1 \pmod{8}$  כלומר  $p = 8k + 1$  ואז

$$\zeta^p = \zeta^{8k+1} = \zeta^{8k} \zeta = \zeta$$

לכן גם  $\zeta^{-p} = \zeta^{-1}$  ולכן

$$\zeta^p + \zeta^{-p} = \zeta + \zeta^{-1}$$

אם  $p \equiv -1 \pmod{8}$  נקבל באותו אופן  $\zeta^p = \zeta^{-1}$  ולכן שוב

$$\zeta^p + \zeta^{-p} = \zeta + \zeta^{-1}$$

קיבלנו

$$\tau^p \equiv \zeta^p + \zeta^{-p} \equiv \tau \pmod{p}$$

ראינו  $\tau^p \equiv \tau \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}$  לכן

$$\tau \equiv \tau \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}$$

נכפול ב- $\tau$  ואז

$$\tau^2 \equiv \tau^2 \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}$$

כלומר

$$2 \equiv 2 \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}$$

ב- $\Omega$ . לפי הטענה, זה גורר כי

$$2 \equiv 2 \left(\frac{2}{p}\right) \pmod{p}$$

ב- $\mathbb{Z}$ . לכן

$$\left(\frac{2}{p}\right) \equiv 1 \pmod{p}$$

ונקבל

$$\left(\frac{2}{p}\right) \equiv 1$$

כנדרש.

אם  $p \equiv 3 \pmod{8}$  נקבל

$$\zeta^p = \zeta^3 \equiv -\zeta^{-1}$$

אז

$$\zeta^p = -\zeta$$

ולבסוף

$$\zeta^p + \zeta^{-p} = -\zeta - \zeta^{-1} = -\tau$$

אם  $p \equiv \pm 3 \pmod{8}$  אז

$$\tau^p \equiv -\tau \pmod{p}$$

$$\tau \left(\frac{2}{p}\right) \equiv -\tau \pmod{p}$$

$$2 \left(\frac{2}{p}\right) \equiv -2 \pmod{p}$$

כאשר השקילות האחרונה ב- $\Omega$  ולכן ב- $\mathbb{Z}$ . כעת

$$\left(\frac{2}{p}\right) \equiv -1 \pmod{p}$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1$$

ולכן עבור  $p \equiv -3 \pmod{8}$  הטיעון דומה.

# פרק 3

## סכומי גאוס

### 3.1 סכומי גאוס ריבועיים

יהי  $p$  ראשוני אי-זוגי ונסמן  $\zeta := e^{\frac{2\pi i}{p}}$ .

למה 3.1.1.

$$\sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{at} = \begin{cases} p & a \equiv 0 \pmod{p} \\ 0 & a \not\equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

הוכחה. אם  $a \equiv 0 \pmod{p}$  אז  $\zeta^p = 1$  לכן הסכום הוא

$$1 + \dots + 1 \text{ (p times)} = p$$

אחרת,  $\gcd(a, p) = 1$  ואז

$$\zeta^a \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{at} = \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{at}$$

אבל  $\zeta^a \neq 0$  ולכן

$$\sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{at} = 0$$

ניתן לראות זאת בדרך נוספת. הסכום הנדסי ושווה

$$\frac{(\zeta^a)^p - 1}{\zeta^a - 1} = \frac{0}{\zeta^a - 1} = 0 \quad \blacksquare$$

מסקנה 3.1.2.

$$\frac{1}{p} \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{t(x-y)} = \delta(x, y)$$

לכל  $x, y \in \mathbb{Z}$  וכאשר  $\delta(x, y) = 1$  אם  $x \equiv y \pmod{p}$  ואחרת  $\delta(x, y) = 0$ .

■

הוכחה. נבחר  $a = x - y$ .

למה 3.1.3.

$$\sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) = 0$$

■

הוכחה. מתרגיל הבית.

הגדרה 3.1.4. יהי  $a \in \mathbb{Z}$ . נגדיר סכום גאוס ריבועי להיות

$$g_a := \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^{at}$$

## 3.1.5 טענה

$$g_a = \left(\frac{a}{p}\right) g_1$$

הוכחה. אם  $a \equiv 0 \pmod{p}$  אז  $\zeta^{at} = 1$  כי  $\zeta^a = 1$ . אז

$$g_a = \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) = 0$$

לפי הלמה.

אם  $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ , נחשב

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{p}\right) g_a &= \left(\frac{a}{p}\right) \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^{at} \\ &= \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{at}{p}\right) \zeta^{at} \end{aligned}$$

כאשר  $t$  עובר מ-0 עד  $p-1$ , המספרים  $at$  נותנים את כל עהערכים השונים מוד  $p$ . מתקיים  $at \equiv k \pmod{p}$  וגם  $t \equiv$

סימון 3.1.6.  $g = g_1$ .

## 3.1.7 משפט

$$g^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$$

הוכחה. נחשב את

$$\sum_{a=0}^{p-1} g_a g_{-a}$$

בשתי דרכים.

1.

$$\begin{aligned} \sum_{a=0}^{p-1} g_a g_{-a} &= \sum_{a=0}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) g \left(\frac{-a}{p}\right) g \\ &= \sum_{a=0}^{p-1} \left(\frac{-a^2}{p}\right) g^2 \\ &= \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{-1}{p}\right) g^2 \\ &= -(p-2) g^2 \\ &= (-1)^{\frac{p-1}{2}} (p-1) g^2 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \sum_{a=0}^{p-1} g_a g_{-a} &= \sum_{a=0}^{p-1} \left( \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^{at} \right) \left( \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right) \zeta^{-sa} \right) \\ &= \sum_{a=0}^{p-1} \sum_{t=0}^{p-1} \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{ts}{p}\right) \zeta^{a(t-s)} \\ &= \sum_{t=0}^{p-1} \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{a=0}^{p-1} \left(\frac{ts}{p}\right) \zeta^{a(t-s)} \\ &= \sum_{t=0}^{p-1} \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{ts}{p}\right) \sum_{a=0}^{p-1} \zeta^{a(t-s)} \end{aligned}$$



הסכום הימני שונה מאפס רק אם  $t \equiv s \pmod{p}$  מלמה קודמת, וזה נכון אם ורק אם  $t = s$ . לכן

$$\begin{aligned} \sum_{t=0}^{p-1} \sum_{s=0}^{p-1} \left( \frac{ts}{p} \right) \sum_{a=0}^{p-1} \zeta^{a(t-s)} &= \sum_{t=0}^{p-1} \left( \frac{t^2}{p} \right) \sum_{a=0}^{p-1} 1 \\ &= \sum_{t=0}^{p-1} \left( \frac{t^2}{p} \right) p \\ &= (p-1)p \end{aligned}$$

נשווה את הביטויים ונקבל

$$g^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$$

■

כנדרש.

## פרק 4

# הדדיות חזקה שלישית

**טענה 4.0.1.** יהי ראשוני  $p = p + 0\omega$  ב- $\mathbb{N}$ . ראשוני ב- $\mathbb{Z}[\omega]$  אם ורק אם אין שלמים  $a, b \in \mathbb{Z}$  עבורם

$$p = a^2 - ab + b^2$$

אם ורק אם  $p \equiv 2 \pmod{3}$ .

**טענה 4.0.2.** אם  $z \in D$  ראשוני, אז  $N(z) = p$  או  $N(z) = p^2$  כאשר  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני.

הוכחה. נניח

$$N(z) = n \in \mathbb{N}$$

מתקיים  $n > 1$  כי  $z$  אינו הפיך. נניח כי  $n = \prod_{i \in [k]} p_i$  כאשר  $p_i$  ראשוניים. אז  $z\bar{z} = \prod_{i \in [k]} p_i$  ובפרט  $z \mid \prod_{i \in [k]} p_i$  ב- $\mathbb{Z}[\omega]$ . הנחנו כי  $z$  ראשוני לכן יש  $i$  כך ש- $z \mid p_i$ . אז  $N(z) \mid N(p_i) = p_i^2$ . לכן  $N(z) \in \{p_i, p_i^2\}$  כנדרש. ■

**דוגמה 4.0.3.**  $7 = 3^2 - 3 \cdot 1 + 1^2$  ואז

$$7 = (3 + \omega)(2 - \omega)$$

**טענה 4.0.4.** יהי  $z \in D$ . אם  $N(z) = p$  ראשוני, אז  $z$  ראשוני ב- $D$ .

**הערה 4.0.5.** מטענה זו, הפירוק במסקנה הינו פירוק לראשוניים.

**משפט 4.0.6.** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני.

1. אם  $p \equiv 2 \pmod{3}$  אז  $p = p + 0\omega$  ראשוני ב- $D$ .

2. אם  $p \equiv 1 \pmod{3}$ , קיימים ראשוניים  $z, \bar{z} \in D$  שאינם חברים ושעבורם  $p = z\bar{z}$ .

3. עבור  $p = 3$  מתקיים  $3 = -\omega^2(1 - \omega)^2$  וגם  $1 - \omega$  ראשוני ב- $D$ .

## 4.1 שדות שארית

**טענה 4.1.1.** יהי  $R$  תחום שלמות ויהי  $I$  אידאל מקסימלי ב- $R$ . אז  $R/I$  שדה.

הוכחה. יהי  $a \in R \setminus I$ , ונראה שיש הפיך ל- $a + I$ . נסתכל על  $\langle a, I \rangle = R$  מקסימלי לכן  $\langle a, I \rangle = R$ . לכן קיימים  $r_1, \alpha \in I$  עבורם  $r_1 a + \alpha = 1$ . לכן  $r_1 a \in 1 + I$  ולכן  $(r_1 + I)(a + I) = 1 + I$  כנדרש. ■

**טענה 4.1.2.** יהי  $R$  חוג שבו כל אידאל הינו ראשי. אם  $x \in R$  אי-פריק, אז  $\langle x \rangle$  אידאל מקסימלי. ■

הוכחה. נניח שיש אידאל  $I$  עבורו  $\langle x \rangle \subseteq I$  ונכתוב  $I = \langle y \rangle$ . כעת  $x \in I$  לכן יש  $b \in R$  עבורו  $x = yb$ . לכן  $b$  הפיך ואז  $\langle x \rangle = \langle y \rangle$ . או ש- $y$  הפיך ואז  $\langle y \rangle = R$ . לכן  $\langle x \rangle$  מקסימלי. ■

**טענה 4.1.3.** יהי  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני ו- $p \equiv 2 \pmod{3}$ . אז

$$|D/pD| = p^2$$

וגם

$$D/pD = \{a + b\omega \mid 0 \leq a, b \leq p-1\}$$

הוכחה. יהי  $z \in \mathbb{Z}[\omega]$ . נכתוב  $z = c + d\omega$  וגם

$$c = q_1p + r_1$$

$$d = q_2p + r_2$$

כאשר  $0 \leq r_i \leq p-1$ . אז  $c + d\omega = p(q_1 + q_2\omega) + r_1 + r_2\omega$  ונקבל במנה את הנדרש. ■

**טענה 4.1.4.** יהי  $\pi \in D$  ראשוני כך שמתקיים

$$N(\pi) = \pi\bar{\pi} = p \equiv 3$$

כאשר  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני. אז

$$|D/\pi D| = p$$

עם איברים  $0, 1, \dots, p-1$ .

הוכחה. יהי  $z = m + n\omega \in D$  ונראה שהוא קונגרואנטי מוד  $\pi$  ל- $0, 1, \dots, p-1$ .

נראה כי  $z$  קונגרואנטי למספר שלם, ואחר כך ניקח  $0 \leq r \leq p-1$  עם  $t \equiv r \pmod{p}$  ונקבל  $t \equiv r \pmod{\pi}$  כלומר  $t \equiv r \pmod{\pi}$ . נעשה זאת. נכתוב  $z = m + n\omega$  מתקיים

$$\forall c \in \mathbb{Z}: z \equiv z + c\pi \pmod{\pi}$$

נכתוב  $\pi = a + b\omega$  ו- $p \nmid b$  כי אחרת

$$\pi \mid b$$

$$\pi \mid a$$

$$\pi^2 \mid a$$

$$p \mid a$$

ואז  $\pi \mid \pi$  בסתירה. נכתוב

$$z + c\pi = m + n\omega + c(a + b\omega) = m + ca + (n + cb)\omega$$

ונבחר  $c \in \mathbb{Z}$  עבורו  $cb \equiv 0 \pmod{p}$  ו- $n + cb \equiv 0 \pmod{p}$ . במקרה זה נקבל

$$p \mid (z + c\pi - (m + ca))$$

$$z + c\pi \equiv m + ca \pmod{p}$$

$$z + c\pi \equiv m + ca \pmod{\pi}$$

$$z \equiv m + ca \pmod{\pi}$$

נשאר להראות כי אם  $0 \leq r_1, r_2 \leq p-1$  כאשר  $r_1 \equiv r_2 \pmod{\pi}$  אז  $r_1 \equiv r_2 \pmod{p}$ .

$$\pi \mid (r_1 - r_2)$$

$$\exists z \in D: r_1 - r_2 = \pi z$$

$$N(r_1 - r_2) = N(\pi) N(z)$$

$$(r_1 - r_2)^2 = pN(z)$$

ונקבל ב- $\mathbb{Z}$  כי

$$p \mid (r_1 - r_2)^2$$

$$p \mid (r_1 - r_2)$$

$$r_1 = r_2$$

כנדרש. ■

**מסקנה 4.1.5.** אם  $\pi \in D$  ראשוני, יש  $p \in \mathbb{N}$  ראשוני עבורו  $\pi \mid p$ .

הוכחה (משפט 4.0.6). 1. לפי משפט אוילר.

2. אם  $p \equiv 1 \pmod{3}$  קיימים  $a, b \in \mathbb{Z}$  עבורם  $p = a^2 - ab + b^2$  לכן

$$p = (a + b\omega)(a - b - b\omega) = \pi\bar{\pi}$$

עבור  $\pi = a + b\omega$ .

3. השיוויון ברור, וגם  $1 - \omega$  ראשוני ב- $D$  כי

$$N(q - \omega) = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$$

כנדרש. ■

אם  $p \equiv 1 \pmod{3}$  נרצה לפתור  $x^3 \equiv a \pmod{p}$  אז  $\#(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = p-1$  ומתקיים  $3 \mid (p-1)$  ואז בדיוק שליש מאברי  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$  הם חזקה שלישית.

אם  $p \equiv 2 \pmod{3}$ , אז כל  $a$  זר ל- $p$  הינו חזקה שלישית כי  $\#(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = p-1$  ו- $3 \nmid (p-1)$ . לעומת זאת, ב- $D$ , אם  $p \equiv 2 \pmod{3}$  אנו יודעים כי ראשוני ב- $D$  או

$$\#(D/pD)^* = p^2 - 1 = (p+1)(p-1)$$

כאן  $3 \mid (p^2 - 1)$ . אם יש  $z \in D$  זר ל- $p$  נרצה  $x^3 \equiv z \pmod{p}$ . נכתוב  $\pi = a + b\omega$  ו- $\pi \equiv 1 \pmod{3}$ . מתקיים

$$\#(D/pD)^* = p-1$$

כאשר  $3 \mid p-1$  נקבל  $x^3 \equiv z \pmod{\pi}$ .

**הערה 4.1.6.** לכל  $p$  ראשוני שאינו מתחלק ב-3 מתקיים

$$3 \mid \#(D/pD)^*$$

**טענה 4.1.7.** יהי  $\pi \in D$  ראשוני כך שמתקיים  $3 \nmid N(\pi)$ . אז האיברים  $1, \omega, \omega^2$  יוצרים חבורה יחידה מסדר 3 בתוך  $(D/\pi D)^*$  כלומר

$$H = \{1 + \pi D, \omega + \pi D, \omega^2 + \pi D\}$$

תת-חבורה מסדר 3 של החבורה הכפלית.

הוכחה. אם  $\omega \equiv 1 \pmod{\pi}$  אז  $1 - \omega \equiv 0 \pmod{p}$  ואז  $1 - \omega \mid \pi$  ונקבל  $N(\pi) = 3$  בסתירה. לכן  $1 + \pi D \neq \omega + \pi D$  ובאותו האופן נראה כי אלו שונים מהאיבר השלישי. ■

**טענה 4.1.8.** יהי  $\pi \in D$  ראשוני כך ש- $3 \nmid N(\pi)$  ויהי  $a \in D$  עבורו  $\gcd(a, \pi) = 1$ . קיים  $z \in D$  עבורו  $z^3 \equiv a \pmod{\pi}$  אם ורק אם  $a^{\frac{N(\pi)-1}{3}} \equiv 1 \pmod{\pi}$ .

**טענה 4.1.9.** יהי  $\pi \in D$  ראשוני כך ש- $3 \nmid N(\pi)$  ויהי  $a \in D$  אז

$$a^{\frac{N(\pi)-1}{3}} \equiv \begin{cases} 0 & \pi \mid a \\ 1 & \pi \nmid a \wedge \exists z \in D: a = z^3 \pmod{\pi} \\ \omega & \text{other case} \\ \omega^2 & \text{other case} \end{cases}$$

כי למשוואה

$$x^3 \equiv 1 \pmod{\pi}$$

יש בדיוק 3 פתרונות שהם  $1 + \pi D, \omega + \pi D, \omega^2 + \pi D$

**הגדרה 4.1.10 (סימן לז'נדר מסדר 3).** נסמן

$$\left(\frac{z}{\pi}\right)_3 = z^{\frac{N(\pi)-1}{3}} \pmod{\pi}$$

**דוגמה 4.1.11.** ניקח  $p = 13$  ו- $\pi = 3 - \omega$  אז

$$\begin{aligned} \pi &\equiv 0 \pmod{\pi} \\ 3 - \omega &\equiv 0 \pmod{\pi} \\ 3 &\equiv \omega \pmod{\pi} \end{aligned}$$

ניקח  $a = 2$  מתקיים

$$2^{\frac{N(\pi)-1}{3}} = 2^{\frac{13-1}{3}} = 2^4 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$$

אז  $16 \equiv 3 \pmod{\pi}$  ואז  $\pi \mid 16 - 3$  אז

$$2^{\frac{N(\pi)-1}{3}} \equiv \omega \pmod{\pi}$$

מתקיים

$$3^4 \equiv \omega^4 \equiv \omega \pmod{\pi}$$

לכן  $\left(\frac{3}{\pi}\right)_3 = \omega$  מתקיים

$$4^4 = (2^4)^2 \equiv \omega^2 \pmod{\pi}$$

לכן  $\left(\frac{4}{\pi}\right)_3 = \omega^2$

הרצאה 18  
16 בינואר  
2019

## 4.2 ראשוניים פרימיים

**4.2.1 הגדרה**  $\pi \in D$  נקרא ראשוני פרימי אם  $\pi \equiv 2 \pmod{3}$ .

**4.2.2 טענה**  $\pi \in D$  ראשוני כך ש- $N(\pi) \neq 3$ . אז ל- $\pi$  יש חבר פרימי יחיד.

הוכחה. יהי  $\pi = a + b\omega$ . החברים שלו הם

$$\begin{aligned} & a + b\omega \\ & -a - b\omega \\ & -b + (a - b)\omega \\ & b + (b - a)\omega \\ & b - a - a\omega \\ & a - b + a\omega \end{aligned}$$

נחלק את  $\pi$  ב- $1 - \omega$ .

$$\begin{aligned} a + b &= \frac{a + b\omega}{1 - \omega} (1 - \omega) \\ &\equiv a + b\omega \pmod{1 - \omega} \end{aligned}$$

לכן  $a + b\omega \equiv a + b \pmod{1 - \omega}$ . כעת  $a + b$  ב- $1, -1, 0$  מודול  $1 - \omega$ , אבל אינו 0 כי אחרת  $N(a + b\omega) = N(\pi)$  ויתן לראות  $\blacksquare$

**4.2.3 טענה**  $p \equiv 1 \pmod{3}$  ראשוני ב- $\mathbb{N}$ . נכתוב  $p = \pi \bar{\pi}$  עם  $N(\pi) = p$ . אז  $\pi, \bar{\pi}$  ראשוניים שאינם חברים.

הוכחה. 1. אם  $\pi = a + b\omega$  ראשוני פרימי, אז

$$\bar{\pi} = a + b\bar{\omega} = a + b\omega^2 = a + b(-1 - \omega) = (a - b) - b\omega$$

גם הוא ראשוני פרימי.

2. אם  $\pi, \bar{\pi}$  ראשוניים חברים, קיים הפיך  $c$  עבורו  $c\pi$  פרימי. נכתוב

$$p = c\pi \bar{c}\bar{\pi}$$

ואז  $\bar{c}\bar{\pi}$  גם פרימי. זה בדיוק המקרה הקודם.

**4.2.4 טענה**  $\pi \in D$  ראשוני עבורו  $N(\pi) \neq 3$  ויהיו  $a, b \in D$ .

1.

$$\left(\frac{ab}{\pi}\right)_3 = \left(\frac{a}{\pi}\right)_3 \left(\frac{b}{\pi}\right)_3$$

2. אם  $a \equiv b \pmod{\pi}$  אז

$$\left(\frac{a}{\pi}\right)_3 = \left(\frac{b}{\pi}\right)_3$$

3. אם  $\gcd(a, \pi) = 1$  אז  $\left(\frac{a}{\pi}\right)_3 = 1$  אם ורק אם  $a$  שארית חזקה שלישית מוד  $\pi$ .

הוכחה (של 1). נשתמש בהגדרה ונקבל

$$\left(\frac{a}{3}\right)_3 \left(\frac{b}{\pi}\right)_3 = (ab)^{\frac{N(\pi)-1}{3}} (ab)^{\frac{N(\pi)-1}{3}} \equiv \left(\frac{ab}{\pi}\right)_3 \pmod{\pi}$$

לכן

$$\left(\frac{a}{3}\right)_3 \left(\frac{b}{\pi}\right)_3 \equiv \left(\frac{ab}{\pi}\right)_3 \pmod{\pi}$$

מכיוון שסימן הוא  $\omega, 1$  או  $\omega^2$  ואלו איברים שונים, נקבל שיוויון

$$\left(\frac{ab}{\pi}\right)_3 = \left(\frac{a}{\pi}\right)_3 \left(\frac{b}{\pi}\right)_3$$

$\blacksquare$

**משפט 4.2.5 (הדדיות חזקה שלישית).** יהי  $\pi_1 = a + b\omega$  ראשוני פרימרי עם  $a = 3m - 1, b = 3n$  ו- $N(\pi_1) \neq 3$ .

1.

$$\left(\frac{-1}{\pi_1}\right)_3 = 1$$

2.

$$\left(\frac{\omega}{\pi_1}\right)_3 = \omega^{m+n}$$

3.

$$\left(\frac{1-\omega}{\pi_1}\right)_3 = \omega^{2m}$$

4. יהיו  $\pi_1, \pi_2 \in D$  ראשוניים פרימריים כך שמתקיים  $N(\pi_i) \neq 3$ .

$$\left(\frac{\pi_1}{\pi_2}\right)_3 = \left(\frac{\pi_2}{\pi_1}\right)_3$$