

סיכומי הרצאות ותרגולים במבוא לתורת המספרים
חורף 2018, הטכניון

הרצאות ותרגולים של פרופסור משה ברוך
סוכמו על ידי אלעד צורני



נפת להמר.

תוכן העניינים

1		מבוא	1
1	רקע היסטורי	1.1
1	חוגים וחוגים אוקלידיים	1.2
1	1.2.1 חוגים כלליים	
2	1.2.2 חוגים אוקלידיים	
3	1.3 האלגוריתם של אוקלידס	

הקדמה

הבהרה

סיכומי הרצאות אלו אינם רשמיים ולכן אין כל הבטחה כי החומר המוקלד הינו בהתאמה כלשהי עם דרישות הקורס, או שהינו חסר טעויות. להיפך, ודאי ישנן טעויות בסיכום! אעריך אם הערות ותיקונים ישלחו אלי בכתובת דוא"ל tzorani.elad@gmail.com. אלעד צורני.

ספרות מומלצת.

הספרות המומלצת עבור הקורס הינה כדלהלן.

Ireland and Rosen: A classical introduction to modern number theory

סילבוס

חוגים אוקלידיים, משפט השארית הסיני ושלמים גאוסים. שרשים פרימיטיביים, הדדיות ריבועית, סכומי גאוס, סכומי יעקובי. הדדיות מסדר שלוש, הדדיות מסדר ארבע, מספרים אלגבריים ושדות ריבועיים. הסילבוס יכולול את הפרקים הבאים מספר הקורס: 1,34,5,6,8,9.

דרישות קדם

דרישת הקורס העיקרית הינה ידע של קורס מבוא בחבורות. נשתמש גם בידע מקורס בסיס בחוגים על חוגים אוקלידיים, ונניח את ההגדרות הבסיסיות. נחזור על נושא זה בתחילת הקורס.

ציון:

1. בוחן אמצעי: 20% מגן.
2. שאלת תרגילי בית בבוחן 5% מגן.
3. שאלת תרגילי בית במבחן 5% מגן.
4. מבחן סופי.

פרק 1

מבוא

1.1 רקע היסטורי

בין שנת 1640 לשנת 1654, מתמטיקאי בשם פרמה¹ הסתכל על מספר שאלות בנוגע למספרים.

שאלה 1.1.1. אילו ראשוניים p הם מהצורה

$$x^2 + y^2 \quad 1.$$

$$x^2 + 2y^2 \quad 2.$$

$$x^2 + 3y^2 \quad 3.$$

כאשר $x, y \in \mathbb{Z}$?

פתרון. 1. פרמה ניסח את המשפט הבא

משפט 1.1.2. יהא p ראשוני אי-זוגי. קיימים שלמים x, y ש- $p = x^2 + y^2$ אם ורק אם $p \equiv 1 \pmod{4}$.

2. נסו למצוא חוקיות לבד.

3. **משפט 1.1.3 (פרמה).** יהא $p \neq 3$ ראשוני. קיימים $x, y \in \mathbb{Z}$ כך ש- $x^2 + 3y^2 = p$ אם ורק אם $p \equiv 1 \pmod{3}$.

בין השנים 1729 ו-1772 אוילר² את שלושת המשפטים של פרמה. אוילר הוכיח את המשפטים בשני שלבים, הורדה descent והדדיות Reciprocity. אנחנו נשתמש בחוגים אוקלידיים עבור השלב הראשון, על מנת לפשט את ההוכחה.

1.2 חוגים וחוגים אוקלידיים

1.2.1 חוגים כלליים

ניתן מספר דוגמאות לחוגים.

דוגמאות. \mathbb{Z} .

• $M_n(R)$ חוג מטריצות $n \times n$ מעל חוג R .

• חוג פולינומים $R[X]$ מעל חוג R .

בקורס זה נניח כי כל החוגים הינם קומוטטיבים עם יחידה וללא מחלקי אפס (כלומר אם $ab = 0$ אז $a = 0$ או $b = 0$).

הגדרה 1.2.1. חוג עם התכונות הנ"ל נקרא **תחום שלמות**.

יהא R חוג ויהיו $a, b \in R$.

הגדרה 1.2.2. נאמר כי a מחלק את b אם קיים $d \in R$ עבורו $ad = b$. אם כן, נסמן $a \mid b$.

הגדרה 1.2.3. a הפיך אם $a \mid 1$.

הגדרה 1.2.4. $a \neq 0$ שאינו הפיך הוא **ראשוני** ב- R אם $a \mid bc$ גורר $a \mid b$ או $a \mid c$.



הגדרה 1.2.5. $a \neq 0$ שאינו הפיך נקרא **אייפריק** אם $a = bc$ גורר כי b הפיך או c הפיך.

הגדרה 1.2.6. $a \equiv b \pmod{c}$ אם $a \mid (b - a)$.

טענה 1.2.7. אם a ראשוני, הוא אי פריק.

הוכחה. יהי a ראשוני ונכתוב $a = bc$. אז $a \mid bc$. לכן $a \mid b$ או $a \mid c$. אם $a \mid b$ קיים d עבורו $b = ad$. אז $a = adc$. לכן $a(1 - dc) = 0$. ולכן $dc = 1$ לכן c הפיך. אחרת, $a \mid c$ ונקבל באותו אופן כי b הפיך. ■

1.2.2 חוגים אוקלידיים

הגדרה 1.2.8. חוג R יקרא **חוג אוקלידי** אם קיימת פונקצייה $N: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ כך שמתקיימות שתי התכונות הבאות.

1. אם $a, b \in R$ שונים מאפס, קיימים $q, r \in R$ כך שמתקיים $r = 0$ או $N(r) < N(a)$ וגם $b = qa + r$.

2. אם $a \neq 0$ וגם $a = bc$ כאשר b, c אינם הפיכים, אז $N(c), N(b) < N(a)$.

הערה 1.2.9. התכונה השנייה בהגדרה איננה הכרחית.

דוגמאות. 1. עם \mathbb{Z} עם $N(x) = |x|$.

2. $k[X]$ פולינומים מעל שדה, עם $\deg(p) = N(p(x))$.

הערה 1.2.10. חלוקה בחוג אוקלידי איננה יחידה. אם נדרוש גם $N(0) \leq N(r) < N(a)$ נקבל כי החלוקה תהיה יחידה.

נניח בקורס כי $|r| \leq \frac{|a|}{2}$. אפשר לדרוש זאת במקרה $r \geq 0$ כי אם $b = qa + r$ נחליף את r ב- $r - a$. נקבל $b = (q + 1)a + (r - a)$ ואז

$$|r - a| = |a - r| = |a| - |r| \leq |a| - \left| \frac{a}{2} \right| = \left| \frac{a}{2} \right|$$

באופן דומה נוכיח עבור המקרה $r < 0$.

טענה 1.2.11. בחוג אוקלידי R , כל אידאל הינו ראשי. כלומר, אם $I \leq R$ אידאל, הוא מהצורה $I = (d) = dR = \{dr \mid r \in R\}$ עבור $d \in R$.

הוכחה. נמצא ב- I איבר d עם נורמה מינימלית (כתרגיל) ואז נראה $I = (d)$. ניקח איבר $a \in I$, נכתוב $a = qd + r$. אז $r = 0$ כי לא ייתכן $N(r) < N(d)$. ■

הגדרה 1.2.12. יהא R חוג ויהיו $a, b \in R \setminus \{0\}$. נקרא **מחלק משותף גדול ביותר של a ו- b** אם מתקיימות התכונות הבאות.

1. $d \mid a, b$.

2. אם $d' \in R$ מקיים $d' \mid a, b$ אז $d' \mid d$.

טענה 1.2.13. יהא R חוג אוקלידי ויהיו $a, b \in R$ שונים מאפס אז קיים מחלק משותף גדול ביותר ל- a ו- b .

הוכחה. יהיו $a, b \in R \setminus \{0\}$ ויהא $I = \langle a, b \rangle$ האידאל הנוצר על ידי a ו- b . לפי הטענה, יש ל- I יוצר d , ונראה כי זהו ממג"ב (מחלק משותף גדול ביותר) של a, b .

מחלק משותף: ניתן לכתוב $a = 1 \cdot a \in I$ לכן $d \mid a$. גם $b = 1 \cdot b \in I$ לכן $d \mid b$.

מקסימליות: אם $d' \mid b$ וגם $d' \mid a$ קיימים $x_1, y_1 \in R$ עבורם $d = x_1 a + y_1 b$. כעת $d' \mid a, b$ ולכן $d' \mid d$. ■

הגדרה 1.2.14. איברים $a, b \in R$ נקראים **חברים** אם קיים איבר הפיך $u \in R^\times$ עבורו $a = bu$.

הבחנה 1.2.15. חברות זה יחס שקילות.

טענה 1.2.16. יהיו $a, b \in R \setminus \{0\}$ עם d, d' ממג"ב. אז d, d' חברים.

הוכחה. מהגדרת ממג"ב מתקיים $d \mid d'$ וגם $d' \mid d$. לכן יש x, y עבורם $d = xd'$ וגם $d' = yd$. נציב את השיויון השני בראשון ונקבל $d = xyd$ לכן $xy = 1$ ונקבל כי x, y הפיכים. לכן d, d' חברים. ■

מסקנה 1.2.17. יהא d ממג"ב של $a, b \in R$ קיימים $x, y \in R$ כך שמתקיים $d = xa + yb$.

מסקנה 1.2.18. נמצא ממג"ב אחד d' עבורו $\langle d \rangle = \langle a, b \rangle$. d, d' חברים ולכן יוצרים את אותו האידאל $(d) = (d')$. לכן גם d' צירוף לינארי של a, b עם מקדמים ב- R .

דוגמה (חוג השלמים הגאוסים). נגדיר $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$.

טענה 1.2.19. $\mathbb{Z}[i]$ חוג אוקלידי.

הוכחה. נזכיר כי בשלמים יש חלוקה עם שארית $b = qa + r$ עם התנאי $|r| \leq \frac{|a|}{2}$. נגדיר $N(a + bi) = a^2 + b^2 = |a + bi|^2$. יהיו $a + bi, c + di \in R$. נעשה חלוקה עם שארית ל- $a + bi, c + di$ מתקיים קודם כל

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i \quad (1.1)$$

נחפש מספר ב- $\mathbb{Z}[i]$ קרוב ביותר למנה זאת. נעשה חלוקה עם שארית ב- \mathbb{Z} במקום המקדמים במנה.

$$\begin{aligned} ac + bd &= x_1(c^2 + d^2) + r_1 \\ bc - ad &= x_1(c^2 + d^2) + r_2 \end{aligned}$$

כאשר $|r_i| \leq \frac{c^2 + d^2}{2}$. נציב בנוסחה 1.1 ונקבל

$$\begin{aligned} \frac{a + bi}{c + di} &= \frac{x_1(c^2 + d^2) + r_1 + (x_2(c^2 + d^2) + r_2)i}{c^2 + d^2} \\ &= x_1 + x_2i + \frac{r_1 + r_2i}{c^2 + d^2} \end{aligned}$$

או לאחר כפל שני האגפים

$$a + bi = (x_1 + x_2i)(c + di) + \frac{r_1 + r_2i}{c^2 + d^2}(c + di)$$

נטען כי זאת חלוקה עם שארית. יש להראות כי הביטוי $\frac{r_1 + r_2i}{c^2 + d^2}(c + di)$ שלם גאוסי וכי הנורמה שלו קטנה מזאת של $c + di$. אכן זהו שלם גאוסי כיוון שניתן לכתוב

$$\frac{r_1 + r_2i}{c^2 + d^2}(c + di) = a + bi - (x_1 + x_2i)(c + di) \in \mathbb{Z}[i]$$

■

נשאיר את סיום ההוכחה כתרגיל.

תרגיל. הוכיחו את אי-השוויון הבא כדי לסיים את ההוכחה.

$$\left| \frac{(r_1 + r_2i)(c + di)}{c^2 + d^2} \right|^2 < |c + di|^2$$

1.3 האלגוריתם של אוקלידס

יהא R חוג אוקלידי ויהיו $a, b \in R \setminus \{0\}$. האלגוריתם של אוקלידס מוצא ממג"ב של a ו- b .

אלגוריתם 1.3.1. 1. נסמן $b = r_0$.

2. נכתוב $a = q_1 b + r_1$.

3. נחלק את r_{i-1} ב- r_i עם i מקסימלי. נכתוב $r_{i-1} = q_{i+1} r_i + r_{i+1}$. נפסיק כשנקבל $r_{n+1} = 0$ ואז r_n הוא ממג"ב של a, b .

תרגיל. מצאו ממג"ב של 91 ו-35.

פתרון.

$$\begin{aligned} 91 &= 2 \cdot 35 + 21 \\ 35 &= 1 \cdot 21 + 14 \\ 21 &= 1 \cdot 14 + 7 \\ 14 &= 2 \cdot 7 + 0 \end{aligned}$$

לכן $\gcd(91, 35) = 7$.

תרגיל. מצאו את $\gcd(13 + 13i, -1 + 18i)$.

פתרון. נציג שני פתרונות.

1. נבצע חלוקה עם שארית. מתקיים

$$\frac{13 + 13i}{-1 + 18i} = \frac{17}{25} - \frac{19}{25}i \quad (1.2)$$

נבצע חלוקה עם שארית בשלמים.

$$\begin{aligned} 17 &= 1 \cdot 25 + (-8) \\ -19 &= -1 \cdot 25 + 6 \end{aligned}$$

נציב ב-1.2 ונקבל

$$\frac{13 + 13i}{-1 + 18i} = \frac{28 - 8 - 25i + 6i}{25} = 1 - i + \frac{-8 + 6i}{25}$$

נכפול ונקבל

$$\begin{aligned} 13 + 13i &= (1 - i)(-1 + 18i) + \frac{-8 + 6i}{25}(-1 + 18i) \\ &= (1 - i)(-1 + 18i) + (-4 - 6i) \end{aligned}$$

כעת נחלק את $(-1 + 18i)$ בשארית $-4 - 6i$. יוצא

$$-1 + 18i = (-2 - 2i)(-4 - 6i) + 3 - 2i$$

מחלקים שוב $-4 + 6i = (-2i)(3 - 2i) + 0$ ולכן $\gcd(13 + 13i, -1 + 18i) = 3 - 2i$

2. נזכיר טענה.

טענה 1.3.2. יהא $a + bi \in \mathbb{Z}[i]$. אם $N(a + bi) = a^2 + b^2$ ראשוני ב- \mathbb{N} אז $a + bi$ ראשוני ב- $\mathbb{Z}[i]$.

נפרק את $13 + 13i$ ואת $-1 + 18i$ למכפלות ראשוניים. מתקיים $13 + 13i = 13(1 + i)$ כאשר $N(1 + i) = 1^2 + 1^2 = 2$ ראשוני, לכן $1 + i$ ראשוני. ניתן לכתוב $13 = (2 + 3i)(2 - 3i)$ כאשר מהטענה זה פירוק לראשוניים. לכן

$$13 + 13i = (2 + 3i)(2 - 3i)(1 + i)$$

פירוק לראשוניים.

נפרק את $-1 + 18i$. מתקיים

$$N(-1 + 18i) = 1^2 + 18^2 = 325 = 5^2 \cdot 13$$

הנורמה אצלנו כפליית ולכן למחלקים נורמות בקבוצה $\{5, 5^2, 13\}$ (נפרט יותר בהרצאה). נחלק את $-1 + 18i$ ב- $2 + 3i$. יוצא

$$(-1 + 18i) = (2 + 3i)(1 + 2i)(2 - i)$$

נקבל כי $2 + 3i$ הוא הגורם המשותף היחיד בפירוק לראשוניים עד-כדי חברות (לחברים יש אותה הנורמה) ולכן $\gcd(13 + 13i, -1 + 18i) = 2 + 3i$

משפט 1.3.3 (אוקלידס). יש אינסוף ראשוניים ב- \mathbb{N} .

הוכחה. נניח בשלילה שיש מספר סופי של ראשוניים p_1, \dots, p_k ונסמן $N = \left(\prod_{i=1}^k p_i\right) + 1$. אם $p_i \in N$ אז $p_i \mid 1$ וזו סתירה לכך שיש ראשוני שמחלק את N . ■

תרגיל. יש ב- \mathbb{N} אינסוף ראשוניים p שמקיימים $p \equiv 3 \pmod{4}$.

פתרון. נניח שיש מספר סופי של ראשוניים $p_1, \dots, p_k \equiv 3 \pmod{4}$. ניקח $N = 4 \left(\prod_{i=1}^k p_i\right) - 1$ ואז N ואז $p_i \nmid N$ לכל i . נפרק את N לראשוניים $N = \prod_{i=1}^m q_i$. אז קיים $q_i \equiv 3 \pmod{4}$ כי אחרת

$$N \equiv \prod_{i=1}^m q_i \equiv \prod_{i=1}^m 1 \equiv 1 \pmod{4}$$

בסתירה. אבל $q_i \neq p_j$ לכל $j \in [k]$ בסתירה.