

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

1. Atendiendo a la clasificación de agentes biológicos según su peligrosidad, ¿cuál es el que puede causar una enfermedad en ser humano, puede suponer un peligro para los trabajadores, es poco probable que se propague a la colectividad, y generalmente existen profilaxis o tratamientos eficaces para él?
A) Agente biológico del grupo 1
B) Agente biológico del grupo 2
C) Agente biológico del grupo 3
D) Agente biológico del grupo 4
2. En la desinfección de instrumental y equipo clínico, no se considera de alto nivel:
A) Alcohol
B) Glutaraldehído
C) Formaldehído
D) Ácido peracético
3. Las cabinas de seguridad biológica que consisten en una cabina cerrada para aislar al analista del experimento, de la que se extrae el 100 % del aire y contienen varios filtros, ¿de qué clase son?
A) Clase I.
B) Clase II.
C) Clase III.
D) Ninguna de las anteriores.
4. La formación de aerosoles en el laboratorio puede ser debida a todas estas causas:
A) Apertura de tubos y recipientes
B) Pipeteo
C) Agitación de tubos
D) Todas las anteriores son correctas
5. En relación a los agentes biológicos del grupo de riesgo 2 ¿qué respuesta es la INCORRECTA?
A) Pueden causar una enfermedad en el hombre.
B) Pueden suponer un riesgo para los trabajadores.
C) Poco probable de que se propague por la colectividad.
6. El método de esterilización por calor húmedo se lleva a cabo mediante:
A) Autoclave.
B) Estufa poupinel.
C) Cámara de rayos ultravioleta.
D) Líquidos desinfectantes.
7. El proceso físico o químico de eliminar microorganismos, pero no necesariamente esporas, es:
A) Antiséptico.
B) Esterilización.
C) Antimicrobiano.
D) Desinfección.
8. ¿Cuál de los siguientes NO es un método para el control de la eficacia de la esterilización?
A) Marcador químico.
B) Temperatura.
C) Esporas específicas.
D) Cultivo de Lactobacillus.
9. ¿Cuál de las siguientes No se encuentra entre las recomendaciones generales en la prevención y protección personal?
A) El uso de guantes es importante cuando se manipula el material biológico.
B) No es necesario quitarse los guantes antes de descolgar el teléfono.
C) Es necesario mantener el orden en el puesto de trabajo.
D) Hay que seguir el protocolo de lavado de higiene de manos.
10. Los agentes antisépticos:
A) Se emplean para habitualmente para descontaminar la piel



- B) Se emplean habitualmente para descontaminar instrumentos o superficies
- C) Destruyen todo tipo de agentes infecciosos
- D) Son más potentes que los agentes desinfectantes

11. Un producto desinfectante

- A) Es un producto químico cuyo uso conlleva la destrucción de microorganismos patógenos
- B) No debe ser tóxico
- C) Debe ser fácil de usar
- D) Todas son correctas

12. Respecto a los antisépticos y desinfectantes, ¿qué afirmación es verdadera?:

- A) El desinfectante se utiliza sobre superficies inertes u objetos inanimados.
- B) El antiséptico es más potente que el desinfectante.
- C) El antiséptico se utiliza en concentraciones que pueden tener efectos tóxicos o irritantes sobre los organismos vivos.
- D) Al bajar la temperatura aumenta la acción desinfectante.

Explicación: en general aumenta la capacidad de desinfección al aumentar la temperatura

13. Un antiséptico

- A) Se puede usar sobre piel y mucosas
- B) Es una solución química que se utiliza sobre superficies corporales
- C) Reduce la flora normal y microorganismos patógenos
- D) Todas son correctas

14. Señale la respuesta CORRECTA en relación a la higiene de las manos.

- A) El uso de soluciones alcohólicas por frotación se considera de primera elección, siempre y cuando no se aprecie suciedad visible en las manos.

- B) El lavado de manos tradicional se considera de primera elección frente al resto de tipos de higiene de las manos.
- C) El hecho de utilizar guantes reemplaza la necesidad de lavarse las manos.
- D) El lavado de manos quirúrgico tiene una duración de 1 a 2 minutos.

15. Entre los principales elementos de la cadena epidemiológica se encuentra: Señale la respuesta INCORRECTA.

- A) El agente causal.
- B) La fuente de infección.
- C) El medio ambiente.
- D) El estado emocional del huésped.

16. Señale la respuesta correcta en relación a la higiene de las manos con agua y jabón:

- A) Se debe realizar cuando las manos están visiblemente sucias o manchadas de sangre u otros fluidos corporales.
- B) El tiempo para realizar correctamente un lavado de manos con agua y jabón según la OMS es entre 20-30 segundos.
- C) Este método no disminuye la transmisión de los microorganismos desde la fuente de infección al paciente.
- D) No es necesaria en casos de exposición a organismos potencialmente formadores de esporas, en cuyo caso se utilizan exclusivamente preparados en base alcohólica.

17. Señale la respuesta incorrecta en relación a la higiene de las manos, según la propuesta de “Los cinco momentos de la OMS”:

- A) Se debe realizar antes y después del contacto con el paciente.
- B) Después del contacto con excreciones o fluidos corporales, membrana mucosa, piel no intacta o vendaje de heridas.
- C) No debe realizarse después del uso de guantes.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Se debe realizar antes de una tarea limpia o aséptica.

18. Según las recomendaciones de la OMS, el procedimiento de higiene de manos por fricción con un preparado en base alcohólica debe durar:

- A) 40 segundos.
- B) 20 - 30 segundos.
- C) 45 segundos.
- D) 50-60 segundos.

19. En relación a los factores que afectan a la eficacia de los desinfectantes, indica cuál es la respuesta correcta.

- A) Es independiente de la temperatura.
- B) No depende del microorganismo.
- C) Varía en función de la presencia de materia orgánica.
- D) No se tiene en cuenta la duración de la exposición.

20. Los desinfectantes son:

- A) Sustancias que se aplican sobre material inerte sin alterarlo de forma apreciable con el fin de destruir los microorganismos.
- B) Sustancias químicas de aplicación tópica sobre tejidos vivos que inhiben o destruyen el crecimiento de microorganismos sin afectar a los tejidos sobre los que actúan.
- C) Sustancias que facilitan el crecimiento de microorganismos.
- D) A) y B) son ciertas.

21. ¿Qué debe de utilizar quien trabaja en un laboratorio clínico para evitar el riesgo biológico?:

- A) Bata quirúrgica de manga larga con puño, guantes industriales, gafas protectoras, mascarilla quirúrgica.
- B) Bata cerrada por delante, guantes de un solo uso, gafas protectoras, mascarilla.
- C) Bata, botas, delantal que retenga el agua, guantes dobles, gafas protectoras, mascarilla.

D) Delantal plomado, guantes, gafas protectoras, mascarilla.

22. Una campana de seguridad con presión negativa:

A) Es un habitáculo que extrae cualquier partícula contaminante de su interior.

B) Sirve para evitar que el manipulador contamine la muestra.

C) Es un habitáculo que impide que cualquier partícula contaminante entre en su interior.

D) Las respuestas B y C son correctas.

Explicación. Estas cabinas se hallan herméticamente cerradas, separando completamente al operador del trabajo que está realizando, mediante barreras físicas como panel frontal completamente cerrado o manipulación a través de guantes de goma. El recinto se mantiene en depresión y es alimentado por aire tomado del local y filtrado por un filtro de alta eficacia. El aire extraído, que es el 100% del aspirado, atraviesa uno de los filtros de alta eficacia para su completa purificación. También puede incluir un prefiltro para la adsorción de contaminantes químicos. Estas cabinas están diseñadas para manipular agentes biológicos de los grupos de riesgo 3 y 4.

23. De los siguientes compuestos, indique cuál no es un antiséptico:

- A) Clorexidina.
- B) Cloramina T.
- C) Formol.
- D) Povidona yodada.

24. El agente biológico que puede causar una enfermedad en el ser humano y puede suponer un peligro para los trabajadores, es poco probable que se propague a la colectividad y generalmente existen profilaxis o tratamientos eficaces, es del grupo:

- A) Uno.
- B) Dos.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>


Síguenos:



Contrastedefases

- C) Tres.
D) Cuatro.
25. El laboratorio de contención máxima se corresponde con un nivel de bioseguridad:
A) Tres.
B) Cinco.
C) Cuatro.
D) Todo lo anterior es falso.
26. Las cabinas de seguridad biológica I y II se utilizan en los siguientes procedimientos:
A) Riesgo de producción de aerosoles por la técnica utilizada o bien procesos contaminantes.
B) Para la siembra de cualquier medio de cultivo.
C) Cuando se rompe un tubo después de ser centrifugado.
D) Si vamos a usar lejía, ya que es muy volátil.
27. A qué grupo de riesgo pertenece un agente patógeno que suele provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que de ordinario no se propaga de un individuo a otro, y para el que existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces:
A) Grupo de riesgo 2.
B) Grupo de riesgo 3.
C) Grupo de riesgo 4.
D) Grupo de riesgo 1.
28. En medicina preventiva, ¿qué tipo de prevención es la que se realiza sobre población de riesgo para la detección precoz de enfermedades?
A) Prevención primaria.
B) Prevención secundaria.
C) Prevención terciaria.
D) Prevención cuaternaria.
29. ¿Cuál de los siguientes es un equipo de protección colectiva?
A) Guantes.
B) Cabina de seguridad biológica.
C) Gafas de protección.
D) Mascarillas.
30. En la clasificación de agentes biológicos según el riesgo que presentan de provocar una enfermedad infecciosa, un agente que puede causar enfermedad grave con probable propagación a la población y existencia de tratamiento o profilaxis se clasifica en:
A) Grupo 1.
B) Grupo 2.
C) Grupo 3.
D) Grupo 4.
31. De los siguientes productos ¿Cuál se considera que produce cáncer?
A) Glutaraldehído.
B) Formaldehído.
C) Azul de metileno.
D) Acetona.
32. Dentro del ámbito de la prevención y protección personal, ¿cuál NO es una recomendación general?
A) Se debe cumplir con la higiene de lavado de manos, antes de entrar y salir del laboratorio.
B) Se recomienda el uso de bata cuando se trabaja con sustancias químicas peligrosas y prendas de aislamiento.
C) En algunas condiciones usaremos elementos de protección: gafas, tapones, mascarillas ...
D) El uso de guantes no es importante al manipular sustancias biológicas peligrosas y tóxicas.
33. En un laboratorio clínico, las muestras respiratorias con sospecha de tuberculosis ¿a partir de qué clase de cabina de bioseguridad (CBS) se pueden trabajar?
A) CBS tipo I.
B) CBS tipo II tipo A.
C) CBS tipo II tipo B.





CONTRASTE DE FASES

Centro de formación de TEL

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

Página 5 de 49

D) CBS tipo III.

Explicación. Se pueden utilizar de tipo II y de tipo III.

Preguntan a partir de cuál. En orden de seguridad serían: CBS III > CBS tipo II B > CBS tipo II A. Las que no se pueden utilizar son las de tipo I

34. El estudio de la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo identificando las diferentes fases, se denomina:

A) Semiología.

B) Etiología.

C) Patogenia.

D) Patocronia.

Comentario. -cronos- etimológicamente es tiempo.

Semiología sería la parte de la medicina que estudia los síntomas de la enfermedad; Etiología la causa; Patogenia estudio de los factores que contribuyen a la enfermedad tanto en la causa como en la evolución (progresión y mantenimiento).

35. Según la clasificación de Spaulding, el material que entra en contacto con mucosas intactas o piel no intacta, es:

A) Material de nivel crítico.

B) Material de nivel semicrítico.

C) Material no crítico.

D) Material de un solo uso.

36. Dentro de las características de un laboratorio de nivel de bioseguridad 3, NO están incluidas:

A) Entrada con doble puerta.

B) El laboratorio debe estar aislado, en una sala que pueda precintarse para ser descontaminada.

C) Debe tener cabina de seguridad biológica.

D) Debe tener ventanas con la suficiente capacidad de ventilación.

37. ¿Qué recomendaciones establece la OMS para protegernos y proteger a los demás si desconocemos quién está infectado?:

A) Mantener el distanciamiento físico, utilizar mascarilla, mantener las habitaciones bien ventiladas, evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas, lavarse las manos de forma periódica.

B) La OMS establece que es suficiente con el distanciamiento físico entre personas.

C) No salir de nuestra vivienda.

38. Para evitar el riesgo de inflamación del óxido de etileno, éste se diluye con:

A) Cloroformo.

B) Dióxido de carbono.

C) Cloruro potásico.

D) Nitrato de plata.

39. ¿Cuál de los siguientes métodos de esterilización utilizaría un sistema de calor húmedo?

A) Estufa Pasteur.

B) Horno Poupinell.

C) Autoclave.

D) Formaldeído.

40. La higiene de manos, como el pilar en la prevención y la contención de las infecciones transmisibles, se considera un proceso:

A) Antiséptico.

B) De esterilización.

C) De fumigación.

41. ¿Cuál de los siguientes es un método de esterilización?:

A) Filtración.

B) Lavado con ácido Bórico.

C) Aplicación de alcohol.

42. Para esterilizar material plástico que resiste hasta 90°C, usaríamos:

A) Óxido de etileno.

B) Un autoclave.

C) Hipoclorito Sódico.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

43. Los agentes antisépticos son aquellos que:

A) Destruyen microorganismos en superficies e instrumentos.

B) Son germicidas químicos para utilización en la piel.

C) Destruyen todo tipo de microorganismos, incluidas las esporas.

44. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo es:

A) Equipo de protección individual.

B) Equipo de trabajo.

C) Condición de trabajo.

D) Productos potencialmente peligrosos

45. La epidemiología se define como:

A) La disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución de fenómenos relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio al control de problemas de salud.

B) La disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución de fenómenos relacionados con la salud y sus determinantes en individuos concretos, y la aplicación de este estudio al control de problemas de salud.

C) La disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución de enfermedades nosocomiales.

46. Pretendemos esterilizar vidrio por calor seco mediante estufa Poupinel programando un tiempo de 60 minutos ¿Que temperatura debemos seleccionar?

A) 180 °C.

B) 170 °C.

C) 160 °C.

D) 150 °C.

47. La ausencia absoluta de microorganismos de carácter patógeno, se conoce como:

A) Asepsia.

B) Antisepsia.

C) Desinfección.

D) Esterilización.

48. Los sistemas de esterilización por calor seco.

A) Emplean óxido de etileno a altas temperaturas.

B) Son de alta penetración y con facilidad para difundir.

C) Oxidan proteínas.

49. ¿Cuál de los siguientes agentes biológicos está clasificado dentro del grupo de riesgo 4?

A) Mamarenavirus de Lassa.

B) Virus de Norwalk.

C) Virus Mopeia.

50. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es correcta respecto a las cabinas de Flujo Laminar?

A) Son cabinas de Seguridad Biológica.

B) Son recintos que emplean un ventilador para forzar el paso del aire a través de un filtro.

C) Estas cabinas ofrecen protección al material que se manipula en su interior.

51. ¿Cuál de los siguientes agentes biológicos está clasificado dentro del grupo de riesgo 3?

A) Virus de Lassa.

B) Virus de Powassan.

C) Virus de Machupo.

52. Señale la opción verdadera:

A) La eliminación completa de todos los microorganismos presentes se denomina desinfección

B) La eliminación única de patógenos se denomina esterilización

C) El calor seco es un método físico de esterilización

D) El calor húmedo es un método químico de esterilización



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03


Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

Página 7 de 49

53. ¿Cuál de los siguientes procedimientos destruye totalmente todos los microorganismos, incluyendo las formas más resistentes como las esporas?
- A) Esterilización
B) Desinfección
C) Antisepsia
D) Todas son correctas.
54. La destrucción de todos los microorganismos patógenos, excepto las formas de resistencia como las esporas se denomina
- A) Asepsia
B) Antisepsia
C) Desinfección
D) Esterilización
55. Dentro de los procedimientos físicos de desinfección no están
- A) Antisépticos.
B) Ultrasonidos.
C) Radiación ultravioleta.
D) Ebullición.
56. La técnica de desinfección que consiste en introducir instrumentos en una solución desinfectante durante cierto tiempo se denomina
- A) Pulverización.
B) Vaporización.
C) Inmersión.
D) Desinfección UV.
57. La esterilización mediante autoclave se basa en
- A) Un método físico que usa el frío.
B) Un método físico que usa radiaciones.
C) Un método químico que usa el alcohol.
D) Un método físico que usa calor húmedo (vapor de agua a presión).
58. El flameado se utiliza habitualmente para esterilizar
- A) Jeringas de cristal.
- B) Paños quirúrgicos.
C) Asas de siembra.
D) Gasas.
59. Los indicadores colorimétricos son métodos de control de esterilización que utilizan
- A) Control físico.
B) Control químico.
C) Control biológico.
D) Control temperatura.
60. ¿Qué son las infecciones nosocomiales? Señale la respuesta CORRECTA.
- A) Las que los enfermos adquieren en el propio domicilio.
B) Las que los enfermos adquieren en el propio hospital o centro asistencial.
C) Las que están en periodo de incubación al ingreso y se manifiestan en las primeras 72 horas.
D) Ninguna de las respuestas es correcta.
61. A qué se debe el mayor número de muertes relacionadas con infecciones nosocomiales. Señale la respuesta CORRECTA.
- A) Bacteriemias por candidas.
B) Tuberculosis.
C) Neumonías.
D) Heridas quirúrgicas.
62. Señale la respuesta CORRECTA en relación con las infecciones nosocomiales.
- A) Son causa de elevada morbi-mortalidad.
B) Producen un aumento de las estancias hospitalarias.
C) Suponen un gran coste para el sistema sanitario.
D) Todas las respuestas son correctas.
63. Señale la respuesta CORRECTA en relación al tipo de higiene de las manos que tiene como objetivo eliminar la suciedad, materia orgánica y flora transitoria.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

- A) Lavado de manos higiénico.**
- B) Lavado antiséptico de manos.
- C) Antisepsia de manos por frotación.
- D) Lavado de manos quirúrgico.
- 64. Las estrategias generales de prevención para evitar el riesgo de contagio en un laboratorio de microbiología se basan en el establecimiento de:**
- A) Barreras físicas
- B) Barreras químicas
- C) Precauciones universales o códigos de buenas prácticas
- D) Todas son correctas**
- 65. En las cabinas de seguridad biológica, indique cuál de estas afirmaciones es cierta:**
- A) Cada cabina debe tener una ficha de mantenimiento y control situada en lugar visible
- B) La limpieza y desinfección de la superficie se realiza con hipoclorito sódico al 10%
- C) La desinfección se realiza con una solución bactericida de alto poder esterilizante o bien empleando alcohol al 70% (alcohol isopropílico)
- D) Son correctas A y C**
- 66. Al proceso de eliminación con medios mecánicos o físicos de cualquier materia extraña, como polvo, grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos y materiales de laboratorio, se define como:**
- A) Limpieza.**
- B) Eliminación.
- C) Esterilización.
- D) Desinfección.
- 67. En el método de esterilización por agentes mecánicos, ¿Cuál es el tipo de agente que actúa?**
- A) Filtración.**
- B) Calor.
- C) Radiación.
- 68. De las siguientes respuestas sobre los métodos útiles para la esterilización ¿Cuál es la INCORRECTA?**
- A) No se puede alcanzar con calor húmedo a 100° C durante 5 minutos.
- B) Con el calor seco se requieren temperaturas más altas que con el calor húmedo.
- C) El óxido de etileno se está retirando su uso debido a su toxicidad.
- D) Con el glutaraldehído nunca se puede alcanzar la esterilización.**
- 69. De las siguientes respuestas sobre las medidas de aislamiento hospitalario por microorganismos ¿Cuál es la CORRECTA?**
- A) En el caso de detección de *Staphylococcus aureus* meticilín resistente (MRSA) se debe hacer aislamiento de contacto sólo si el paciente está infectado, no si sólo está colonizado.
- B) En el caso de infección renal por *Mycobacterium tuberculosis*, sin afectación pulmonar, siempre está indicado hacer aislamiento aéreo del paciente.
- C) En el caso de una identificación, en un líquido cefalorraquídeo, de una *Neisseria meningitidis*, siempre se debe hacer profilaxis antimicrobiana a los profesionales que han estado manipulando dicha muestra.
- D) En general, la detección de *Aspergillus fumigatus* en muestra pulmonares, de un paciente ingresado en una planta de hospitalización, con pacientes no inmunodeprimidos, no requiere ningún tipo de aislamiento.**
- 70.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**
- A) La desinfección asegura una descontaminación total del material
- B) El método de esterilización más común es la ebullición durante 20 minutos del material
- C) El óxido de etileno es un producto químico que se utiliza en la esterilización del material**



D) El autoclave es el instrumento que esteriliza el material por calor seco

71. ¿Cómo hacer la manipulación del esputo que llega al Laboratorio?

A) Manipularemos la muestra siempre en cabinas de seguridad biológica de tipo I.

B) Manipularemos la muestra en cabinas de seguridad biológica tipo II o III.

C) Manipularemos la muestra en cabinas de seguridad biológica tipo I o II sin mascarilla FFP2.

D) No es necesaria la manipulación de la muestra en cabina de seguridad si se utiliza mascarilla FFP2.

72. Los eslabones de la cadena epidemiológica son:

A) Reservorio.

B) Mecanismo de transmisión.

C) Huésped susceptible.

D) Todos son correctos.

73. La fase de la enfermedad que se caracteriza por la presencia de manifestaciones clínicas inespecíficas, que suelen pasar inadvertidas y son difíciles de distinguir, es:

A) La fase de incubación.

B) La fase latente.

C) La fase de estado.

D) La fase prodrómica.

74. Según las barreras de protección:

A) Barrera primaria es aquella que está localizada más próxima al riesgo potencial (contenedores, equipos, instrumental) y "buena praxis" del profesional.

B) Barrera secundaria incluyen la higiene personal, vacunación y la vestimenta.

C) Barrera terciaria son las localizadas en el entorno del laboratorio y tienen como función evitar que los riesgos del laboratorio puedan repercutir en la comunidad.

D) Todas son correctas.

75. Señale la afirmación correcta:

A) La antisepsia aplica un conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de microorganismos.

B) La asepsia utiliza los desinfectantes para conseguir su fin.

C) En la práctica la antisepsia utiliza un conjunto de agentes desinfectantes para destruir los microorganismos contaminantes.

D) La A y C son correctas.

76. El uso de guantes será obligatorio:

A) Cuando el trabajador sanitario presente heridas no cicatrizadas.

B) Si maneja sangre.

C) Al realizar procesos invasivos.

D) Todas son ciertas

77. De estos elementos de protección, ¿cuáles son de barrera?:

A) Guantes.

B) Mascarillas y protección ocular.

C) Batas.

D) Todas son ciertas

78. ¿Cómo se deben manipular las muestras biológicas?:

A) Como material potencialmente infeccioso.

○ B) Como material no infeccioso.

○ C) Sin guantes.

○ D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

○

79. ¿Cómo actúan los desinfectantes químicos?:

A) Desnaturalizando las proteínas o destruyendo sistemas enzimáticos de los microorganismos.

B) Incinerando los microorganismos.

C) Embalando los susodichos.

D) Todas son correctas.

80. ¿Qué tipo de filtros utilizan las cabinas de seguridad biológica?:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03


Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

Página 10 de 49

Explicación. Hay diferentes tipos de mascarilla: FFP1, FFP2 y FFP3 con una eficacia de filtración mínima respectiva de 78%, 92% y 98%. EL % Fuga hacia el interior Máxima es respectivamente 22%, 8%, 2%

- A) Filtros ALFA.
- B) Filtros DELTA.
- C) Filtros HEPA.**
- D) Filtros BRAVO

81. Señala la respuesta INCORRECTA. Los guantes se utilizan...:

- A) Como barrera protectora.
- B) Para prevenir la contaminación de las manos cuando se manipula sangre o derivados.
- C) No se emplean específicamente para proteger al personal sanitario, salvo enfermedades de la piel.
- D) Reemplazan la necesidad de lavado y desinfección de manos.**

82. Las cabinas de seguridad biológica que generan una barrera vertical de aire protegiendo al trabajador, entorno y producto son de:

- A) Tipo I.
- B) Tipo II.**
- C) Tipo IV
- D) Todas lo hacen

83. ¿Cómo se realiza la limpieza de superficies para evitar la infección nosocomial se realiza? Señale la CORRECTA:

- A) Limpieza con agua y jabón y desinfección con lejía 1/10 solo en superficies metálicas.
- B) Limpieza con agua y jabón y desinfección con lejía 1/100 solo en superficies metálicas.
- C) Limpieza con agua y jabón y desinfección con lejía 1/5 excepto en superficies metálicas.
- D) Limpieza con agua y jabón y desinfección con lejía 1/10 excepto en superficies metálicas.**

84. Una mascarilla auto-filtrante tipo FFP2, tiene una eficacia de filtración de:

- A) 50%
- B) 78%
- C) 92%**
- D) 98%

85. ¿A qué grupo de riesgo pertenece un agente biológico que puede causar enfermedad grave en el hombre, supone un serio peligro para los trabajadores, tiene un probable riesgo de propagación y existe frente a él profilaxis o tratamiento eficaz?:

- A) 1
- B) 2
- C) 3**
- D) 4

86. ¿Qué profilaxis se utiliza esencialmente en las infecciones nosocomiales?:

- A) Quimioprofilaxis.
- B) Profilaxis de exposición.**
- C) Profilaxis de disposición.
- D) Sero profilaxis.

87. ¿Cuándo es importante la utilización de guantes?:

- A) Al manejar sueros
- B) Al manejar líquidos biológicos
- C) Al abrir controles de calidad
- D) En todos los casos**

88. ¿Cuál de los siguientes no debe ser empleado para la limpieza de las superficies de trabajo?

- A) Detergente amónico.
- B) Amoniaco.**
- C) Lejía diluida al 1:20.
- D) Lejía diluida al 1:10.

89. La medida más importante para reducir los riesgos de transmisión de microorganismos de una persona a otra o desde una localización a otra en el mismo paciente, es:

- A) El buen uso de guantes.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

B) El uso de mascarillas.

C) El lavado de manos frecuente.

D) El aislamiento de pacientes que lo necesiten.

90. De los siguientes desinfectantes, cuál es el más activo frente a: hongos, bacterias gram+, bacterias gram -, mycobacterias esporas y virus:

A) Alcoholes.

B) Formaldehído.

C) Glutaraldehído.

D) B y C

91. Para realizar la esterilización del material en un autoclave por vapor de agua, ¿qué rango de temperaturas más idóneo utilizaríamos para conseguir una adecuada esterilización?:

A) 63-90°C

B) 150-170°C

C) 101-120°C

D) 121-134°C

92. Respecto a la asepsia, señale la RESPUESTA INCORRECTA:

A) Es un conjunto de medidas y técnicas para impedir la contaminación.

B) Son las acciones que se realizan para conseguir la sepsis en el empleo del material estéril.

C) Es un método empleado frente a la contaminación.

D) Sirve para evitar la proliferación de los microorganismos.

93. Señale la respuesta correcta en relación con la definición de antiséptico:

A) Agente que mata únicamente los microorganismos.

B) Agente que mata los microorganismos y las esporas.

C) Agente que inhibe el crecimiento y el desarrollo de los microorganismos pero no necesariamente los mata.

D) Agente que mata únicamente las esporas.

94. Un antiséptico es:

A) Sustancia química de aplicación sobre objetos inanimados que destruye o inhibe los microorganismos patógenos.

B) Sustancia química de aplicación tópica sobre tejidos que destruye o inhibe los microorganismos patógenos sin afectar a los tejidos.

C) Sustancia química de aplicación tópica que no destruye o inhibe los microorganismos patógenos sin afectar a los tejidos.

D) Ninguna es correcta.

95. Entre los métodos físicos de esterilización se encuentran:

A) Calor seco.

B) Formaldehído.

C) Luz ultravioleta

D) A y C son correctas.

96. Una de las características del horno incinerador de residuos sanitarios de tipo III es:

A) Tiene que estar situado dentro de la zona asistencial del centro.

B) Sistema manual de entrada de residuos.

C) Tiene que estar situado fuera de la zona asistencial del centro.

D) La temperatura de combustión de al menos 500°C.

97. La técnica de saneamiento mediante la cual se trata de destruir los microorganismos patógenos existentes en la piel, ropa, ambiente, objetos, excretas, etc se denominan:

A) Esterilización.

B) Antisepsia.

C) Desinfección.

D) Sepsis.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

98. La sustancia química de aplicación sobre objetos inanimados que destruye o inhibe los microorganismos patógenos se denomina:
A) Antiséptico.
B) Desinfectante.
C) Bactericida.
D) Todas son incorrectas.
99. El coeficiente fenólico dentro de los métodos de valoración de los desinfectantes, está basado en:
A) En determinar la dilución máxima de desinfectante.
B) Comparar la capacidad bactericida de un desinfectante en relación con el fenol.
C) Comprobar, en condiciones reales, la eficacia de un desinfectante.
D) Valorar la toxicidad en varios tipos de células animales.
100. ¿Cuál de las siguientes es una esterilización por agentes químicos?:
A) Esterilización por calor húmedo.
B) Esterilización por radiación en frío.
C) Esterilización por calor seco.
D) Esterilización por óxido de etileno.
101. Se denomina antibiótico bacteriostático a aquel que es capaz de:
A) Destruir las bacterias.
B) Detener solamente el crecimiento bacteriano.
C) Detener el crecimiento y destruir la bacteria.
D) Provocar la muerte de la bacteria solo in vitro.
102. La ebullición es un método:
A) Para la desinfección.
B) Para la esterilización.
C) De limpieza.
D) Muy usado para esterilizar jeringas y agujas
103. La destrucción de todos los microorganismos patógenos, con exclusión de las esporas se denomina:
A) Asepsia.
B) Antisepsia.
C) Desinfección.
D) Esterilización
104. No es un antiséptico:
A) La povidona yodada.
B) El alcohol.
C) La clorhexidina.
D) El hipoclorito sódico.
105. El proceso en el que el material del laboratorio queda libre de microorganismos, incluso de las esporas, se denomina:
A) Esterilización.
B) Desinfección física.
C) Desinfección química.
D) Limpieza.
106. Haciendo referencia a las cabinas de seguridad y de flujo laminar, entre los requisitos de mantenimiento, sería:
A) Limpieza de objetivos.
B) Revisión y cambio de filtros.
C) Limpieza de los electrodos.
D) Sustitución de cartucho y membrana.
107. La ruta de transmisión más frecuente en las infecciones nosocomiales es:
A) Transmisión aérea
B) Transmisión por contacto
C) Transmisión por vectores
D) Transmisión por gotículas
108. El agente biológico que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo a que se



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

propague a la colectividad existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz:

- A) Se clasifica como grupo 1
- B) Se clasifica como grupo 2
- C) Se clasifica como grupo 3**
- D) Se clasifica como grupo 4

109. ¿Qué grupo de medidas de seguridad se deben emplear para la manipulación de muestras del tracto respiratorio inferior?:

- A) EPI y cabina de seguridad grupo II y III**
- B) EPI
- C) Sólo mascarilla
- D) Cabina de seguridad grupo IV

110. En un laboratorio de bioseguridad de nivel III:

- A) Se lleva a cabo la manipulación de los patógenos exclusivamente dentro de campanas de flujo laminar.**
- B) Las instalaciones no se encuentran asiladas del resto de los laboratorios.
- C) El aire es limpiado por filtros THEPA (Therapy High Efficiency Particulate Air Filter).
- D) El material utilizado debe reciclarse.

111. ¿Cuándo se deben añadir sustancias antisépticas o bacteriostáticas a los productos sanguíneos?:

- A) Cuando se va a conservar refrigerada sólo 48 horas.
- B) Cuando la sangre se ha recogido previamente con CPD.
- C) Cuando la sangre va destinada a pacientes inmunodeprimidos.
- D) En ningún caso deben añadirse sustancias antisépticas o bacteriostáticas.**

112. Normas generales de conducta para la prevención de riesgos en el laboratorio:

- A) La consulta de etiquetas y fichas de datos de seguridad de los productos.**
- B) El uso de guantes evitará el lavado de manos.

- C) Al finalizar el trabajo, recoger todo el material y abrir ventanas para airear la sala.
- D) Las gafas graduadas son suficiente protección para los ojos.

113. Son elementos de protección individual (EPI) en el laboratorio:

- A) Gafas de seguridad, guantes de látex, lentillas.
- B) Bata, tapones, guantes.**
- C) Guantes específicos, pipeteadores, gomas recoge pelos.
- D) Extintor, recipiente con agua, mantas ignífugas.

114. En el contexto de una infección por un agente patógeno que se transmite por gotitas, indique la opción incorrecta:

- A) Se pueden ubicar a los pacientes por cohortes si comparten el mismo diagnóstico etiológico.
- B) Un ejemplo de agente patógeno que se transmite por gotitas es el virus de Influenza Humana A.
- C) El equipo de protección personal debe utilizarse cuando se trabaja dentro de un radio de 1 metro alrededor del paciente.
- D) La prevención de la transmisión exige una manipulación especial del aire y de la ventilación.**

115. Indique la secuencia correcta para ponerse un equipo de protección personal compuesto por mascarilla, bata, guantes y gafas protectoras cuando administra cuidados a un paciente que tiene una infección transmisible:

- A) Guantes -gafas protectoras-bata-mascarilla
- B) Bata-mascarilla-gafas protectoras-guantes**
- C) Mascarilla-bata-gafas protectoras-guantes
- D) El orden en el que se coloca el equipo de protección personal es irrelevante

116. Dentro de los "5 momentos" para la higiene de las manos recomendamos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "después de la exposición a



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

líquidos corporales” ¿a qué momento corresponde?:

- A) Momento 2
- B) Momento 3**
- C) Momento 4
- D) Momento 5

117. ¿Cuál de las siguientes actuaciones frente a una exposición accidental al VIH no es correcto realizar?:

- A) En caso de exposición percutánea, permitir el sangrado.
- B) En caso de contaminación cutánea, lavar con agua y jabón.
- C) En caso de exposición sexual, lavar las mucosas con “ducha-chorro de agua”.
- D) En caso de contaminación percutánea, aplicar un agente cáustico.**

118. Si el lavado de manos se produce con jabón de tocador y tiene una duración de 15 segundos:

- A) Eliminaremos la flora habitual y disminuimos la flora transitoria
- B) Solo eliminaremos la flora habitual
- C) Solo eliminaremos la flora transitoria**
- D) Eliminaremos la flora transitoria y disminuimos la habitual

119. En relación a las infecciones intrahospitalarias, señale cuál de las siguientes respuestas no es correcta:

- A) Pueden aparecer después de que el paciente reciba el alta.
- B) También se denominan infecciones asociadas a la atención sanitaria.
- C) Pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno en el que reciban atención sanitaria.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.**

120. El uso de desinfectantes y antisépticos, quimioterápicos y antibióticos se considera un tipo de barrera:

- A) Biológica.
- B) Química.**
- C) Física.
- D) Todas las respuestas son falsas.

121. En la prevención de la infección hospitalaria se llaman precauciones universales:

- A) Las medidas que deben adoptarse en todos los usuarios, estén enfermos o no**
- B) Las medidas consensuadas científicamente en la mayoría de los países
- C) Las medidas que deben aplicarse en todas las enfermedades
- D) Son correctas todas

122. ¿Qué es una zona séptica?:

- A) Una zona esterilizada.
- B) Una zona desinfectada.
- C) Una zona sucia.**
- D) Una zona no contaminada.

123. La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la infección nosocomial como:

- A) La que se agrava durante la hospitalización del paciente como consecuencia del empeoramiento del estado general y las manipulaciones diagnósticas o terapéuticas.
- B) La que motiva a que el paciente sea derivado al hospital por no responder al tratamiento habitual.
- C) La que aparece durante la hospitalización del paciente y no se hallaba presente.
- D) Cualquier enfermedad microbiana que afecta al paciente ingresado sometido a tratamiento y al personal sanitario como consecuencia de su trabajo.**

124. La medida más importante para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas en las personas hospitalizadas es:



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

- A) Uso de guantes
- B) Lavado de manos**
- C) Mascarillas
- D) Lavado de material (desinfección)

125. La desinfección tiene por objeto:

- A) Destruir gérmenes patógenos existentes en los pacientes.
- B) Destruir microorganismos patógenos y no patógenos.
- C) Destruir gérmenes patógenos existentes en personales, animales y/o cosas.**
- D) Reducir las infecciones.

126. En cuanto a las medidas de prevención y control de las infecciones nosocomiales, señale la respuesta correcta:

- A) Las precauciones estándar se aplicarán a determinados pacientes y en según qué circunstancias.
- B) El objetivo de las precauciones específicas es evitar la transmisión de patógenos desde un paciente colonizado o con infección activa a otros pacientes o al personal sanitario.**
- C) Ante un paciente con una infección activa muy grave, las precauciones específicas se pueden anteponer a la calidad asistencial prestada.
- D) Un empleo adecuado de los guantes puede sustituir la necesidad de la higiene de manos, previa y posterior al uso de los mismos.

127. ¿Cuál se considera la principal medida para prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria?:

- A) La higiene de manos**
- B) El uso de guantes
- C) El uso de bata y mascarilla
- D) No acercarse demasiado al paciente

128. Al conjunto de técnicas utilizadas para la eliminación de microorganismos de los objetos

materiales, superficies, etc., se las conoce genéricamente como:

- A) Antisepsia
- B) Desinfección**
- C) Limpieza
- D) Asepsia

129. Respecto a la esterilización, señale la respuesta correcta:

- A) El empaquetado del material estéril tiene como objetivo mantener el instrumental aislado de toda fuente de contaminación.**
- B) El proceso de esterilización, a diferencia de la desinfección, solo es capaz de eliminar la mayor parte de los gérmenes patógenos (pero no todos).
- C) Como paso previo a la esterilización, no es necesaria la limpieza exhaustiva del material a esterilizar.
- D) La esterilización con formol es el método que presenta mayor margen de seguridad por su fiabilidad, consistencia y letalidad.

130. El contagio directo se produce por:

- A) Por el agua
- B) Por los alimentos
- C) Por contacto sexual**
- D) Por insectos

131. Indique la respuesta incorrecta respecto a las infecciones nosocomiales:

- A) Son contraídas en hospitales.
- B) Pueden ser contraídas en instituciones de asistencia sanitaria aunque no sean hospitales.
- C) El concepto incluye las infecciones ocupacionales del personal de los hospitales.
- D) No se consideran como tales si los síntomas aparecen después de alta hospitalaria.**

132. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

A) La asepsia es la utilización de procedimientos que impidan el acceso de microorganismos patógenos a un medio libre de ellos.

B) La antisepsia es el conjunto de procedimientos o actividades destinados a inhibir o destruir los microorganismos potencialmente patógenos.

C) El vapor es un método de esterilización rápido y no tóxico.

D) La clorhexidina no debe usarse como antiséptico sobre mucosas.

133. En un hospital grande de nuestra región, cuál de las siguientes infecciones nosocomiales es menos frecuente:

A) Infección urinaria en paciente portador de sonda vertical.

B) Neumonía en paciente sometido a ventilación mecánica invasiva.

C) Bacteriemia en paciente portador de una vía venosa central.

D) Otitis en paciente operado de apendicitis.

134. El proceso por el cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas bacterianas, recibe el nombre de:

A) Antisepsia

B) Desinfección

C) Limpieza con detergentes químicos

D) Esterilización

135. La limpieza es una medida eficaz en la prevención y control de la infección ya que:

A) Permite eliminar por arrastre muchos de los microorganismos presentes en la superficie de un instrumento de uso clínico y reducir la carga microbiana hasta un nivel adecuado para que los procesos de desinfección y/o esterilización posteriores se desarrollen correctamente.

B) Destruye las formas vegetativas de bacterias (no las formas esporuladas), hongos y virus.

C) Destruye todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas bacterianas.

D) Sustituye a la esterilización por vapor

136. Entre las medidas más sencillas y eficaces para la prevención de la infección nosocomial está:

A) La higiene de manos con agua y jabón

B) El uso periódico o continuo de guantes estériles desechables

C) La administración de antibióticos

D) El uso de mascarilla, delantal y gorro quirúrgico.

137. Señale cuál de los siguientes no es uno de los indicadores que tienen como objetivo validar que el proceso de esterilización se efectuó de manera adecuada:

A) Indicadores de proceso

B) Indicadores físicos

C) Indicadores químicos

D) Indicadores biológicos

138. Señale cuál de los siguientes se considera como óptimo en el proceso de lavado de manos:

A) Lavabo de agua corriente con dispositivo contra salpicaduras y controles sin activación manual

B) Uso de jabón o solución antiséptica

C) Secado en toallas desechables

D) Todas son correctas

139.Cuál de los siguientes agentes biológicos bacterianos está clasificado dentro del grupo de riesgo 3:

A) Bordetella Pertussis

B) Chlamydia pneumoniae

C) Enterobacter spp

D) Mycobacterium Tuberculosis

140. Consideramos Zona de Alto Riesgo Hospitalario:

A) Laboratorios, UCI, Bloque quirúrgico y habitaciones de aislamiento.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03


Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de T.E.

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

Página 17 de 49

- B) Esterilización, UCI, Bloque quirúrgico y habitaciones de aislamiento.
- C) Salas de espera de URG, laboratorios, UCI y vestuarios.
- D) Consultas generales, laboratorios y unidades de quemados.
141. La infección que se presenta en un paciente internado en un hospital en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento del internamiento, se denomina:
- A) Infección oportunista
- B) Infección diferida
- C) Infección parasitaria
- D) Infección nosocomial
142. Señale la afirmación correcta:
- A) la transmisión de un agente infeccioso a través de mosquitos se conoce como transmisión por vehículos comunes.
- B) La transmisión por aerosoles de partículas inferiores o iguales a 5 micras de diámetro se conoce como transmisión por gotículas.
- C) La transmisión de un microorganismo a través de la comida o el agua, entre otros, se conoce como transmisión por vectores.
- D) Ninguna es correcta.
143. Señale la respuesta correcta en relación con la definición de antiséptico:
- A) Agente que mata únicamente los microorganismos.
- B) Agente que mata los microorganismos y las esporas.
- C) Agente que inhibe el crecimiento y el desarrollo de los microorganismos pero no necesariamente los mata.
- D) Agente que mata únicamente las esporas.
144. El objetivo del aislamiento hospitalario es evitar la transmisión de infecciones dentro del mismo. Para que esto ocurra se requieren tres elementos:
- A) Una fuente, un huésped y un medio de transmisión.
- B) La correcta limpieza, desinfección y esterilización.
- C) Uso obligatorio de mascarilla, bata y guantes.
- D) Aplicación del aislamiento aéreo, de gotitas y de contacto.
145. El grado de Patogenicidad se denomina:
- A) Infectividad
- B) Toxicidad
- C) Virulencia
- D) Adherencia
146. Los programas de cribado poblacional para la detección precoz del cáncer constituyen una medida de prevención:
- A) Primaria
- B) Secundaria
- C) Terciaria
- D) Cuaternaria
147. ¿Qué es una pandemia?:
- A) Es una enfermedad endémica que se extiende a muchos países y personas.
- B) Es una enfermedad autóctona
- C) Se refiere al nº de casos nuevos de una enfermedad en un espacio de tiempo
- D) Todas son correctas.
148. Respecto a la prevención secundaria, no es cierto que:
- A) Las actividades de cribado o screening son medidas de prevención secundaria.
- B) Actúa en el período patológico de la enfermedad.
- C) Pretende disminuir la incidencia de la enfermedad.
- D) Son medidas que se aplican con el objeto de disminuir las consecuencias y mejorar el pronóstico



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

de la enfermedad mediante el diagnóstico y tratamiento precoz.

149. ¿Cómo se denominan las claves o inferencias observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnóstico real, de salud o de promoción de la salud?:

- A) Etiquetas diagnosticas
- B) Características definitorias**
- C) Factores de riesgo
- D) Factores relacionados

150. ¿Qué norma de higiene deben cumplir Amalia y Fernando para la prevención de infección hospitalaria?

- A) Utilizar mascarilla de alta resolución para el tratamiento con enfermos ingresados por infecciones respiratorias.**
- B) Llevar ropa séptica, mascarilla, calzas y gorro, en todas las zonas donde se exija.
- C) Seguir todas las recomendaciones del servicio de medicina preventiva y, en especial, el lavado de manos.
- D) Todas son correctas.

151. ¿Cómo realizarán el lavado de manos especial?

- A) La duración será de tres minutos.
- B) Utilizarán jabón antiséptico.**
- C) Se aclararán con agua fría.
- D) Todas son correctas.

152. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión más frecuente respecto a la exposición laboral a los patógenos transmitidos por la sangre?

- A) La inoculación accidental por pinchazos.**
- B) Las salpicaduras a los ojos.
- C) El contacto con prendas o equipos contaminados.
- D) Las salpicaduras a la piel donde existan pequeños cortes o abrasiones.

153. Los materiales que se esterilizan en autoclave pueden ir envueltos en papel:

- A) Crepé.
- B) Celofán.
- C) Las respuestas A) y B) son correctas.**
- D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

154. ¿Cómo realizará Luis la desinfección de manos con solución hidroalcohólica?

- A) Duración de todo el proceso: 20 - 30 segundos.
- B) Depositando en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir toda la superficie.
- C) Frotándose las palmas de las manos entre sí.
- D) Todas las respuestas son correctas.**

155. El conjunto de técnicas que garantiza la ausencia de materia séptica o microorganismos infecciosos, tanto en la superficie como en la profundidad, de los materiales expuestos o de los seres vivos, se conoce como:

- A) Desinfección.
- B) Esterilización.
- C) Antisepsia.
- D) Asepsia.**

156. ¿Cuál sería el tiempo necesario para esterilizar un material en la estufa Poupinel a una temperatura de 150º?

- A) 30 minutos.
- B) 60 minutos.
- C) 120 minutos.
- D) 150 minutos.**

157. ¿Qué tipo de aislamiento se utilizará en pacientes inmunodeprimidos?

- A) Aislamiento inverso.**
- B) Aislamiento entérico.
- C) Aislamiento estricto.
- D) Aislamiento respiratorio.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

158. Al conjunto de métodos empleados en suprimir los microorganismos patógenos existentes en la habitación del enfermo, ropa, manos, piel, lo llamamos:
- A) Pasteurización ultrasónica.
 - B) Infestación.
 - C) Desinfección.
 - D) A) y B) son correctas.
159. La asepsia es:
- A) Un conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de materia séptica o microorganismos infecciosos, tanto en superficie como en profundidad, de los materiales expuestos o de los seres vivos.
 - B) La invasión y entrada en el organismo de agentes extraños vivos ya sean bacterias, virus u hongos.
 - C) La agresión que se produce por parásitos.
 - D) B) y C) son correctas.
160. Los guantes:
- A) Reducen al menos un 50% el volumen de sangre transferida tras un pinchazo.
 - B) No son obligatorios cuando el trabajador presenta cortes, heridas o lesiones cutáneas.
 - C) No es la barrera de protección más importante.
161. Según La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), ¿cómo debemos protegernos a nosotros y a los pacientes frente a la COVID-19?
- A) Manteniendo el distanciamiento físico; utilizar mascarilla, especialmente cuando no se pueda mantener el distanciamiento.
 - B) No ventilando las habitaciones.
 - C) Evitando lavarse las manos de forma periódica.
162. El conjunto de técnicas que garantiza la ausencia de materia séptica o microorganismos infecciosos, tanto en la superficie como en la profundidad, de los materiales expuestos o de los seres vivos, se conoce como:
- A) Desinfección.
 - B) Esterilización.
 - C) Antisepsia.
 - D) Asepsia.
163. ¿Cuál sería el tiempo necesario para esterilizar un material en la estufa Poupinel a una temperatura de 150°?
- A) 30 minutos.
 - B) 60 minutos.
 - C) 120 minutos.
 - D) 150 minutos.
164. ¿Cómo se podría definir el lavado de manos?
- A) Es la eliminación de microorganismos que contaminan las manos.
 - B) Es la eliminación de suciedad y parte de los microorganismos que puedan estar en las manos, utilizando agua y jabón no antiséptico.
 - C) Es la que se consigue utilizando un producto antiséptico, bien sea solución hidroalcohólica o jabón antiséptico.
 - D) Es la reducción del recuento bacteriano en las manos, realizando una frotación antiséptica.
165. Respecto a las recomendaciones para el uso de guantes, NO se considera necesario su uso:
- A) Cuando se pueda contactar con sangre.
 - B) Cuando hemos tocado una zona sucia y vamos a tocar una zona limpia.
 - C) Cuando circulemos por las diferentes zonas del Centro.
 - D) Es posible el lavado de guantes si se van a utilizar con otro paciente.
166. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:
- A) El uso de guantes reemplaza la necesidad de una correcta higiene de manos.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

B) Cuando nos retiramos los guantes, es posible que se contaminen nuestras manos.

C) No hay diferencia en la colonización de las manos de aquellas personas que utilizan anillos.

D) Es una recomendación mantener el borde natural de las uñas por debajo de los 4 mm de longitud.

167. Respecto a la Vigilancia Epidemiológica, NO es cierto que:

A) Es un Sistema de Vigilancia creado por la pandemia de la COVID-19, para poder hacer un seguimiento, y su finalidad es recoger información de los nuevos casos para definir estrategias de prevención y control, o establecer medidas sobre los contactos o el medio.

B) La Vigilancia Epidemiológica es la observación sistemática, activa y prolongada de la presencia y distribución de una enfermedad dentro de una comunidad, y de los factores que influyen en el riesgo de presentarla.

C) El objetivo fundamental de la vigilancia de las infecciones nosocomiales es la prevención y control de dichas infecciones en los pacientes, y en todo el personal que pueda verse involucrado en el cuidado y la atención del paciente.

D) La vigilancia consiste en recoger, procesar, analizar, interpretar, presentar y difundir de manera sistemática y continua los datos sanitarios, incluidos los estudios epidemiológicos relativos a las categorías de enfermedades transmisibles, en particular los relativos a la forma de propagación temporal y espacial de estas enfermedades.

168. En relación con la retirada del EPI (equipo de protección individual), tras la atención de un paciente con COVID-19, se procede de la siguiente manera:

A) Bata, calzas, gorro, mascarilla FFP2, protector ocular/pantalla y guantes.

B) Bata, gorro, mascarilla FFP2, protector ocular/pantalla, guantes y calzas.

C) Guantes, bata, calzas, gorro, protector ocular/pantalla y mascarilla FFP2.

D) Guantes, calzas, bata, gorro, mascarilla FFP2 y protector ocular/pantalla.

169. Según la clasificación de Eickoff (1981) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), son actividades preventivas con poca o nula eficacia probada en la prevención de la infección nosocomial:

A) Esterilización y desinfección.

B) Higiene de manos de los profesionales sanitarios.

C) Técnicas de aislamiento preventivo.

D) Desinfección de suelos, paredes y lavabos.

170. ¿Cuáles serán los eslabones de la cadena epidemiológica sobre los que es preciso actuar en la prevención de la Infección Nosocomial?

A) Infección, periodo de incubación y enfermedad infecciosa.

B) Huésped, portador, localizador y periodo de incubación.

C) Mecanismo de transmisión, portador, localizador.

D) Agente infeccioso, mecanismo de transmisión y receptor o huésped.

171. Señale qué es un equipo de protección individual:

A) El uso de mascarillas.

B) El uso de uniforme.

C) El uso de gafas protectoras.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

172. Respecto a los medios y equipos de protección individual facilitados a los trabajadores:

A) Es obligatorio su uso por parte del trabajador.

B) Es un derecho del trabajador, y no una obligación de suministrarlos por parte de la empresa.

C) Es una obligación de la empresa el proporcionarlos, pero no es obligatorio el uso por parte del trabajador.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

173. Marta debe saber que, el lugar en el cual los microorganismos viven y se desarrollan, se denomina:

A) Fuente de infección.

B) Huésped.

C) Reservorio.

D) Agente causal.

174. ¿En qué tipo de aislamiento deberá conocer Marta, que se protege al paciente con una sábana limpia, y las posibles heridas deberán estar tapadas durante su traslado a otra zona del hospital?

A) Aislamiento de contacto.

B) Aislamiento por gotas.

C) Aislamiento inverso.

D) Aislamiento aéreo.

175. Se le enseña a Marta como realizar adecuadamente la técnica del lavado de manos. En relación con la técnica, uno de los siguientes pasos NO sería correcto. ¿Cuál de ellos?

A) Rodeando un pulgar de una mano con la palma de la otra mano, frotándose con un movimiento de rotación y viceversa.

B) Antes de terminar, enjuagarse las manos con abundante agua caliente y corriente.

C) Secarse las manos hasta asegurarse que no quede nada de humedad con papel o toallas desechables.

D) Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano y frotar las manos entre sí.

176. Marta deberá conocer los factores de riesgo intrínsecos que pueden favorecer la aparición de infecciones en un paciente, entre los que debe identificar:

A) Sistema inmunitario débil, y excesivo consumo de antibióticos.

B) Presencia de dispositivos invasivos, como vías venosas.

C) Tratamiento con terapias inmunosupresoras.

D) Realización de pruebas diagnósticas o invasivas.

177. En el lavado de manos de tipo preventivo, señale la respuesta CORRECTA:

A) Se aplica agua y jabón sobre las manos y se frota entre 20 – 30 segundos, prestando especial atención a los espacios interdigitales y uñas.

B) Se aplica agua y jabón antiséptico sobre las manos y se frota entre 10 - 30 segundos, prestando especial atención a los espacios interdigitales y uñas.

C) Se aplica agua y jabón sobre las manos frotándose entre 40 - 60 segundos, prestando especial atención a los espacios interdigitales y uñas.

D) Se aplica agua y jabón antiséptico sobre las manos y se frota entre 20 – 30 segundos, prestando especial atención a los espacios interdigitales y uñas.

178. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las indicaciones y acciones de la higiene de manos son:

A) Si las tienes limpias no es necesario que te las laves, si a continuación te vas a poner los guantes.

B) La realización de una higiene de manos efectiva incluye que los profesionales sanitarios tomen conciencia de las indicaciones y de cuándo y en qué orden se aplican durante las actividades asistenciales. La acción de higiene de manos puede realizarse frotándose las manos con un preparado de base alcohólica o lavándose con agua y jabón.

C) Solo con agua sería suficiente.

179. Los llamados cinco momentos para el lavado de manos en el contexto hospitalario según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son:

A) Antes de entrar en contacto con el paciente, antes de realizar una técnica aséptica, después de exponerse a fluidos corporales, después de entrar en contacto con el paciente y después de entrar en contacto con el entorno que rodea al paciente.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03


Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

Página 22 de 49

- B) Antes de comenzar el turno de trabajo, antes de realizar una técnica aséptica, después de exponerse a fluidos corporales, después de entrar en contacto con el paciente y después de entrar en contacto con el entorno que rodea al paciente.
- C) Antes de realizar una técnica aséptica, antes de exponerse a fluidos corporales, después de entrar en contacto con el paciente, después de entrar en contacto con el entorno que rodea al paciente y después de realizar el registro de los cuidados realizados al paciente.
180. ¿Es necesario el lavado de manos antes de ponerse los guantes?
- A) No.
- B) Solo si las manos están sucias.
- C) El uso de guantes no modifica ni sustituye la realización de la higiene de manos.
181. Una zona séptica es una zona
- A) Contaminada.
- B) Limpia.
- C) Estéril.
- D) Ninguna de las anteriores.
182. Inicialmente, las precauciones que deben aplicarse a todos los pacientes atendidos en los hospitales, independientemente su diagnóstico o presunto grado de infección se denominan:
- A) Precauciones básicas.
- B) Precauciones estándar.
- C) Precauciones preventivas.
- D) Precauciones basadas en la transmisión.
183. El riesgo de lesión por objeto cortopunzante, se clasifica como:
- A) Mecánico.
- B) Biológico.
- C) Físico.
- D) Químico.
184. Según la O. M. S. cualquier enfermedad microbiana clínicamente reconocible, que afecta a los pacientes que son atendidos en un Hospital y al personal que atiende a dichos pacientes, se denomina:
- A) Infección nosocomial u hospitalaria.
- B) Enfermedad laboral.
- C) Infección vírica.
- D) Enfermedad profesional.
185. De las siguientes medidas higiénicas solo una es imprescindible para el manejo de un paciente ingresado con tuberculosis:
- A) Utilizar ropa aséptica.
- B) Uso de mascarilla de alta resolución.
- C) Uso de gorro y guantes.
- D) Es suficiente con extremar la profilaxis.
186. ¿Cuándo debe realizar un lavado ordinario de manos?
- A) Antes de ayudar al aseo de una paciente.
- B) Antes de ir a la cafetería.
- C) Después de ayudar al aseo de una paciente.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
187. El conjunto de técnicas utilizadas para la eliminación o inhibición de los gérmenes patógenos que existen sobre objetos y superficies, lo llamamos:
- A) Pasteurización.
- B) Esterilización.
- C) Desinsectación.
- D) Desinfección.
188. ¿Cuáles son los equipos de protección individual?
- A) Ropa de trabajo, guantes, mascarillas y calzado antideslizante.
- B) Ropa de trabajo, calzas, mandiles y calzado antideslizante.
- C) Mascarillas, polainas, ropa de trabajo y calzado antideslizante.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

D) Ropa de trabajo, zuecos, mascarilla y gorro.

189. Antes, durante y después de mantener contacto con pacientes, es muy importante el lavado higiénico de manos. ¿Qué elementos esenciales no pueden faltar en el lavado de manos?

A) Es preciso el uso de agua, jabón, cepillado de uñas y aplicación de desinfectante.

B) Si se hace repetidamente, es suficiente el empleo del agua.

C) Es preciso el empleo de agua y jabón.

D) Ha de permanecer con guantes toda la jornada.

190. Durante la punción, Marta accidentalmente se pincha con la aguja que se está utilizando.

A) Acudirá al servicio de medicina preventiva si aparecen síntomas de alguna enfermedad.

B) Se realizará un hemograma inmediatamente, esperará al resultado del mismo para decidir cuando acudir al servicio de medicina preventiva.

C) Avisará a su responsable para que active el protocolo y acudirá al servicio de medicina preventiva en un plazo no superior a 24 horas.

D) Preguntará al paciente del que proceden las sustancias biológicas si padece alguna enfermedad contagiosa y lo corroborará en la historia.

191. El lavado de manos rutinario o higiénico debe durar alrededor de:

A) 10 segundos.

B) 30 segundos.

C) 90 segundos.

D) 3 minutos.

192. El aislamiento parenteral, se utiliza:

A) En enfermedades que se propagan por vía aérea.

B) Para evitar la propagación de enfermedades que se transmiten por sangre o líquidos orgánicos o por objetos contaminados con los mismos.

C) Para proteger a pacientes que tienen el sistema inmunológico débil.

D) En las enfermedades que se contagian a través de las heces.

193. ¿Cómo denominaremos a la desinfección hospitalaria realizada cuando el paciente está ingresado?

A) Desinfección de alto nivel.

B) Desinfección de nivel medio.

C) Desinfección concurrente.

D) Desinfección en estancia.

194. En el procedimiento de colocación de guantes NO estériles, deberemos seguir el siguiente orden:

A) Retirar todo tipo de joyas de las manos y colocar los guantes.

B) Deberemos retirar todos objetos y joyas de las manos y antebrazos, a excepción de alianzas lisas, si fuera necesario el reloj para el procedimiento se deslizará hacia el codo, lavarse las manos y colocar los guantes.

C) Colocar primero el guante derecho siempre para evitar roturas.

D) Con el guante puesto en la mano derecha, tomar el guante izquierdo por el doblado del guante y elevar la entrada para meter la mano izquierda, corrigiendo la adaptación de los guantes a las manos.

195. ¿Qué nivel de filtrado de aire presenta una mascarilla FFP3?

A) 98%

B) 100%

C) 78%

D) 92%

196. El lavado de manos del personal sanitario es una práctica higiénica muy importante para prevenir la transmisión de agentes infecciosos a los pacientes. Cuando éste se realiza con jabón antiséptico y con una duración de 1 minuto aproximadamente,



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

secándose con una toalla desechable, ¿qué nombre posteriormente recibirá?

- A) Lavado de manos quirúrgico.
- B) Lavado de manos higiénico.
- C) Lavado de manos antiséptico.
- D) Lavado de manos rutinario.

197. Según el mecanismo de transmisión de la infección, de las siguientes afirmaciones NO se considera correcta:

- A) La Meningitis meningocócica se transmite por vía aérea, se deberá usar mascarilla quirúrgica.
- B) El Sarampión se transmite por gotas suspendidas en el aire, la puerta de la habitación permanecerá cerrada.
- C) Para la atención a un paciente con Rubeola será siempre obligatorio el uso de guantes.
- D) Ante una transmisión por contacto, las visitas al paciente y la entrada del personal sanitario se hará con restricciones.

198. Cuando la infección nosocomial es causada por microorganismos adquiridos desde una fuente externa al paciente, bien en otros pacientes, personal sanitario o en objetos inanimados, es una infección:

- A) Endógena.
- B) Exógena.
- C) Nosocomial primaria.
- D) Exógena seguida de la endógena.

199. Según Spaulding un material sanitario clasificado como semicrítico por su peligrosidad infectiva, ¿qué método antimicrobiano requiere?

- A) Desinfección.
- B) Limpieza.
- C) Esterilización.
- D) Limpieza o/y desinfección.

200. ¿Qué nombre reciben las infecciones adquiridas durante la hospitalización de un paciente?

- A) Infección hospitalaria.
- B) Infección extrahospitalaria.
- C) Infecciones cosocomiales.
- D) Infecciones nosocomiales.

201. Según el sistema de CDC/HICPAC, la categoría IC de recomendación para la higiene de manos del personal sanitario dice:

- A) Sugerido para la puesta en práctica y apoyado por estudios clínicos o epidemiológicos sugestivos o un análisis teórico razonado.
- B) Requerido para la puesta en práctica, siguiendo legislación federal, estatal o estándar.
- C) Fuertemente recomendado para la puesta en práctica y apoyado por multitud de estudios experimentales, clínico, o epidemiológicos y Un fuerte análisis teórico razonado,
- D) No existe tal recomendación.

202. Los protocolos de aislamiento y asepsia de la UCI, UVI y de la unidad de grandes quemados se aplican para:

- A) Prevenir las agresiones al personal sanitario.
- B) Evitar la entrada de ruidos indeseados en la habitación del paciente.
- C) Prevenir las agresiones al personal facultativo.
- D) Prevenir la aparición y transmisión de infecciones, manejando los dispositivos con este fin.

203. El lavado de manos del personal sanitario es una práctica higiénica muy importante para prevenir la transmisión de agentes infecciosos a los pacientes. Cuando éste se realiza con jabón antiséptico y con una duración de 1 minuto aproximadamente, secándose con una toalla desechable, ¿qué nombre posteriormente recibirá?

- A) Lavado de manos quirúrgico.
- B) Lavado de manos higiénico.
- C) Lavado de manos antiséptico.
- D) Lavado de manos rutinario.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

204. Según Spaulding un material. sanitario clasificado. como semicrítico por su peligrosidad infectiva, ¿qué método antimicrobiano requiere?

A) Desinfección.

B) Limpieza.

C) Esterilización.

D) Limpieza o/y desinfección.

205. Cuando la infección nosocomial es causada por microorganismos adquiridos desde una fuente externa al paciente, bien en otros pacientes, personal sanitario o en objetos inanimados, es una infección:

A) Endógena.

B) Exógena.

C) Nosocomial primaria.

D) Exógena seguida de la endógena.

206. Según Spaulding un material. sanitario clasificado. como semicrítico por su peligrosidad infectiva, ¿qué método antimicrobiano requiere?

A) Desinfección.

B) Limpieza.

C) Esterilización.

D) Limpieza o/y desinfección.

207. ¿Qué nombre reciben las infecciones adquiridas durante la hospitalización de un paciente?

A) Infección hospitalaria.

B) Infección extrahospitalaria.

C) Infecciones cosocomiales.

D) Infecciones nosocomiales.

208. Respecto al aislamiento inverso ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

A) Se utiliza para proteger al paciente inmunodeprimido.

B) El lavado de manos es obligatorio.

C) Las personas que entren deberán retirarse toda la ropa antes de salir de la habitación y depositarla en los contenedores.

D) La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada.

209. El método idóneo para la esterilización de material eléctrico y electrónico es:

A) Calor seco.

B) Óxido de etileno.

C) Autoclave por vapor de agua.

D) La prueba de vacío.

210. En relación a las infecciones nosocomiales ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?:

A) Son infecciones intrahospitalarias.

B) Entre las precauciones estándar que deben adoptarse para controlar satisfactoriamente las infecciones nosocomiales se encuentra el lavado de manos.

C) Se trata de infecciones que estaban en incubación en el momento de la admisión del paciente.

D) Las infecciones nosocomiales más frecuentes son las de heridas quirúrgicas, las vías urinarias y las vías respiratorias.

211. ¿Qué materiales no se puede esterilizar en autoclave?:

A) Instrumental quirúrgico de acero inoxidable.

B) Instrumental óptico.

C) Textiles.

D) Objetos de vidrio: frascos de líquido y medios de cultivo.

212. Para proteger al paciente trasplantado se utiliza el aislamiento:

A) Austero.

B) Inverso.

C) De contacto.

D) Respiratorio.

213. EL PREFIJO "EPI" INDICA LA POSICIÓN:

A) Encima.

B) Debajo.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

- C) Lateral.
D) Inferior.

214. Es un método físico de desinfección de material sanitario:

- A) La inmersión.
B) La fumigación.
C) Los rayos ultravioletas.
D) La pulverización.

215. Un recipiente de cierre hermético con un lugar de entrada que consta de una cámara de esterilización, un termómetro, un manómetro para medir presiones, una entrada de agua y una válvula de seguridad, es:

- A) Una estufa Poupinel.
B) Un horno de Pasteur.
C) Un Tyvek.
D) Un autoclave.

216. La ausencia de todo agente infeccioso, tanto en superficie como en profundidad, en los seres vivos y en los materiales expuestos se denomina:

- A) Formaldehído.
B) Asepsia.
C) Glutaraldehído.
D) Flameado.

217. Vestimenta de quirófano. La mascarilla colocada correctamente deberá cubrir:

- A) Boca, mentón y ojos.
B) Nariz, boca y mentón.
C) Nariz, boca y pómulos.
D) Nariz, boca, ojos, pómulos y mentón.

218. La incineración es un método de esterilización por:

- A) Calor húmedo.
B) Calor seco.
C) Agentes químicos.
D) Formaldehído.

219. En la protección contra la infección la utilización de batas, guantes, y mascarillas es una barrera de tipo:

- A) Químico.
B) Físico.
C) Biológico.
D) Educativo.

220. El procedimiento empleado para la destrucción de todos los microorganismos y sus formas de resistencia (esporas) se denomina:

- A) Esterilización.
B) Desinfección.
C) Antisepsia.
D) Desintoxicación.

221. ¿Qué tipo de rayos ultravioleta se usan habitualmente para eliminar gérmenes en los procesos de esterilización?

- A) UVA.
B) Uve.
C) UVD.
D) Todas son falsas.

222. El aislamiento que está previsto para prevenir infecciones que son transmitidas por contacto directo o indirecto con las heces se denomina:

- A) Aislamiento de contacto.
B) Aislamiento estricto.
C) Aislamiento respiratorio.
D) Aislamiento entérico.

223. El reservorio en el que el agente etiológico de una enfermedad infecciosa vive y se reproduce ...

- A) Sólo puede ser animado.
B) Sólo puede ser inanimado.
C) Puede ser animado o inanimado.
D) No puede ser ni animado ni inanimado.

224. ¿Qué tipo de aislamiento requiere un paciente que padece neumonía estafilocócica?



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

A) Respiratorio.

B) Entérico.

C) Estricto.

D) No es necesaria ninguna medida de prevención porque no es una enfermedad contagiosa.

225. Con respecto al lavado de manos rutinario, es cierto que:

A) Precisa gran dedicación.

B) Debe realizarse como medida de higiene personal después de las tareas habituales y cotidianas.

C) Se hace con jabón antiséptico.

D) Debe realizarse durante dos minutos.

226. El aislamiento entérico es necesario realizarlo en caso de:

A) Parotiditis.

B) Sepsis Puerperal.

C) Fiebre tifoidea.

D) Tos ferina.

227. ¿Cómo se denominan aquellos productos químicos utilizados para la desinfección de piel, heridas y cavidades del organismo?

A) Desinfestantes.

B) Desinfectantes.

C) Antisépticos.

D) Ninguna es correcta.

228. Los métodos de esterilización por calor seco son tres:

A) Flambeado, incineración y Estufa Poupinel.

B) Flameado, incineración y Estufa Opinel.

C) Flambeado, incineración y Estufa Opinel.

D) Flameado, incineración y Estufa Poupinel.

229. En el control biólogo de la esterilización por óxido de etileno, la espora que se utiliza es:

A) Enterococcus Faecalis.

B) Pnemocystis.

C) Bacillus subtilis.

D) Ficomycatos.

230. ¿Qué entendemos como infección nosocomial?

A) Una infección por VIH.

B) Una infección por VPH.

C) Una infección adquirida en la hospitalización.

D) Una neumonía para estudio.

231. De las siguientes, ¿cuál es la principal causa que facilita las infecciones hospitalarias?

A) Ingesta desmedida de antibióticos.

B) Habitaciones individuales.

C) Contaminación medioambiental en las salas de RX.

D) Ruptura de las barreras de defensa natural por técnicas diagnósticas o terapéuticas.

232. Los indicadores colorimétricos son métodos de control de esterilización que emplean control:

A) Físico.

B) Químico.

C) Biológico.

D) Bioquímico.

233. El aparato urinario es uno de los asientos más frecuentes de las infecciones nosocomiales. El riesgo de contraer una infección urinaria depende de dos tipos de factores: los modificables y los no modificables. Dentro de estos últimos se encuentran:

A) La diabetes, insuficiencia renal, disfunción neurológica del esfínter.

B) La duración del sondaje.

C) La técnica del sondaje.

D) Contaminación a través de las manos del personal sanitario.

234. El procedimiento utilizado para lograr una adecuada asepsia es:

A) El uso de agentes bactericidas.

B) La esterilización.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

- C) La utilización de agentes antisépticos.
D) La desinfección.

235. Los métodos de esterilización por calor seco son tres:

- A) Flambeado, incineración y Estufa Poupinel.
B) Flameado, incineración y Estufa Opinel.
C) Flambeado, incineración y Estufa Opinel.
D) Flameado, incineración y Estufa Poupinel.

236. Cuando se trabaja en zonas donde puede existir riesgo biológico debido a salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular o a la cara, ¿qué equipo de protección individual es adecuado usar para evitarlo?

- A) Pantalla facial.
B) Capuz.
C) Guantes y bata.
D) Son correctas las opciones A y B.

237. Desde el punto de vista de la peligrosidad infectiva y a efectos de limpieza, ¿cuál de las siguientes sería una zona de bajo riesgo en un hospital?

- A) Vestuarios.
B) Laboratorios.
C) Capilla.
D) Son correctas las opciones A y C.

238. ¿Cuál de las siguientes es una característica ideal de un desinfectante de alto nivel?

- A) Que deje coloreada la piel y las superficies de equipos e instalaciones para que quede constancia de su buena eficacia.
B) Que alcance un alto nivel de desinfección en menos de 20 minutos para minimizar el tiempo de rotación entre enfermos.
C) Que tenga requerimientos especiales para su eliminación.
D) Son correctas las opciones B y C.

239. La supervisora de la planta le ordena que en el desempeño de sus funciones extreme la profilaxis. ¿Qué entiende usted con esta medida?

- A) Que es una medida curativa.
B) Que es una medida preventiva.
C) Que es una medida de Farmacoterapia.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

240. En muchos laboratorios para la esterilización de material de vidrio se usa la estufa Poupinel; si se trabaja con la estufa a 160°C, ¿cuánto tiempo durará el proceso?

- A) 120 minutos.**
B) 150 minutos.
C) 60 minutos.
D) 180 minutos.

241. Cuando se usa plasma de peróxido de hidrógeno como método de esterilización hay que saber que es un proceso:

- A) Tóxico.
B) Lento.
C) Idóneo para materiales sensibles al calor.
D) Son correctas las opciones A y C.

242. ¿Qué nivel de asepsia requieren los termómetros rectales?

- A) Esterilización por tratarse de material crítico.
B) Desinfección por tratarse de material semicrítico.
C) Limpieza a fondo por tratarse de material no crítico.
D) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

243. Los mecanismos más importantes para reducir los riesgos de contaminación en un centro sanitario son:

- A) Limpieza.
B) Desinfección.
C) Esterilización.
D) Todos.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

244. En el aislamiento protector, señale la respuesta correcta:

- A) Se protege a pacientes con sarampión
- B) Se protege a pacientes con hepatitis A
- C) Se protege a pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo grandes quemados o trasplantados
- D) Se necesita habitación con presión negativa

245. En el lavado de manos rutinario o higiénico, el frotado de manos con agua y jabón tendrá una duración aproximada de:

- A) 7 minutos
- B) 3 minutos
- C) 5 minutos
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

246. De las siguientes opciones, indique cuál es el principal mecanismo de transmisión directa en las infecciones nosocomiales:

- A) Los fómites
- B) Las manos
- C) Las enfermedades de los pacientes
- D) La temperatura de la habitación

247. En la técnica de la higiene de manos, ¿cuál de los siguientes pasos NO es correcto?

- A) Aclararse con abundante agua
- B) Secarse con la máquina de aire caliente
- C) Aplicar jabón
- D) Humedecer las manos

248. Indique la respuesta correcta en relación a las situaciones en las que se indica el lavado de manos:

- A) Antes de atender a un paciente y entre paciente y paciente
- B) Siempre que se tenga contacto con sangre y/o fluidos corporales
- C) Antes y después del uso de guantes
- D) Todas las opciones anteriores son correctas

249. Señale la respuesta correcta:

A) Nos referimos a asepsia cuando un objeto o superficie no está libre de cualquier microorganismo que pueda causar una infección

B) Los elementos o eslabones necesarios para que se propague una enfermedad transmisible son el agente infeccioso y el huésped

C) La esterilización es el conjunto de procedimientos físicos o químicos que destruyen todos los microorganismos y sus formas de resistencia

D) No es necesario limpiar previamente el instrumento o material antes de proceder a cualquiera de las técnicas de desinfección o esterilización

250. Para esterilizar gasas, ropa, vendas o gomas, el procedimiento más adecuado es el que consiste en...

A) Exponer el material por un largo periodo de tiempo a aire caliente sirviéndose de una estufa Poupinel

B) Introducir los materiales en una cámara y exponerlos a determinadas concentraciones de óxido de etileno

C) Someter el material a vapor de agua a presión y elevadas temperaturas

D) Sumergir el material en agua con desinfectante y frotar con cepillo y detergente

251. Los productos químicos usados para la desinfección del piel, heridas y cavidades del organismo se denominan...

A) Desinfectantes

B) Asépticos

C) Antisépticos

D) Antibacterianos

252. La operación de desinfección tiene por objeto...

A) Eliminar los gérmenes y bacterias

B) Destruir completamente los organismos patógenos

C) Limpiar las heridas sin utilizar medicamentos



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Conseguir la esterilización de los instrumentos

253. La esterilización por calor seco se utiliza básicamente para:

A) Vidrio y material de laboratorio, polvos y sustancias oleosas

B) Instrumental termosensible sin empaquetar

C) Materiales clínicos a baja temperatura

D) Material sanitario termosensible

254. De las siguientes medidas higiénicas sólo una es imprescindible para el manejo de un enfermo ingresado en planta con tuberculosis:

A) Utilizar ropa aséptica

B) Uso de gorro, mascarilla y guantes

C) Uso de calzas, mascarilla, guantes y extremar la profilaxis

D) Uso de mascarilla de alta resolución

255. En los tipos de aislamientos, estrictos e inversos no se incluye:

A) El lavado de manos

B) El lavado corporal

C) La restricción de visitas

D) Señalización del aislamiento

256. La utilización de productos químicos para intentar destruir los microorganismos contaminantes se denomina:

A) Desinfección

B) Antisepsia

C) Esterilización

D) Ninguna es correcta

257. El aislamiento es una medida contra:

A) El paciente

B) El enfermo

C) La enfermedad

D) La sociedad

258. ¿Qué tipo de material debe estar rigurosamente limpio y en la medida de lo posible desinfectado?

A) No crítico

B) Crítico

C) Semicrítico

D) Semicrítico de grado 1

259. Dentro de las medidas a seguir ante las enfermedades infecciosas, cabe destacar:

A) Es de carácter obligatorio declarar las enfermedades transmisibles

B) Aislamiento de los enfermos contagiosos

C) Desinfección en caso de epidemias o brotes

D) Todas las respuestas anteriores son correctas

260. Es un método de esterilización por calor seco:

A) Autoclave

B) Estufa Poupinel

C) Tindalización

D) Las respuestas A y B son correctas

261. A la invasión en el organismo de microorganismos patógenos que se multiplican y lesionan los tejidos se le denomina:

A) Asepsia

B) Infección

C) Enfermedad

D) Lesión

262. ¿Cuál es el desinfectante más común utilizado en las autopsias?

A) Detergente

B) Fenoles

C) Biguanidas

D) Hipoclorito Sódico

263. ¿Qué persigue el aislamiento protector o inverso?

A) Una habitación aireada

B) Proteger a pacientes con rubéola

C) Proteger a pacientes con sarampión



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Proteger a pacientes con defensas disminuidas como por ejemplo pacientes inmunodeprimidos

B) Es igual o inferior a 5 micras de diámetro

C) Es igual o superior a 10 micras de diámetro

D) Ninguna respuesta es correcta

264. ¿Cuál de las siguientes características es inherente a un buen desinfectante?

A) Tiene un amplio espectro

B) No es tóxico ni corrosivo

C) Es de bajo coste

D) Todas son correctas

269. En el servicio de esterilización de un hospital, la clasificación y empaquetado del material se realiza en:

A) La zona sucia

B) La zona limpia

C) La zona estéril

D) Ninguna respuesta es correcta

265. El conjunto de normas que hay que adoptar para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas entre los pacientes ingresados se agrupan bajo la denominación de:

A) Desinfección

B) Asepsia

C) Antisepsia

D) Aislamiento hospitalario

270. Respecto a las precauciones a adoptar en los aislamientos para prevenir la transmisión por gotas de enfermedades infecciosas, señale cuál de ellas no se considera correcta:

A) Ponerse una mascarilla al entrar a la habitación del paciente

B) Se debe limitar el traslado del paciente fuera de la habitación a fines clínicamente necesarios

C) Las habitaciones serán siempre y en todas las circunstancias individuales

D) No es necesario de forma rutinaria la protección para los ojos

266. Señale cuál de los siguientes métodos de esterilización se realiza a alta temperatura (>100°C):

A) Óxido de etileno

B) Autoclave

C) Glutaraldehído

D) Ácido peracético

271. Dentro de los métodos de esterilización, aquel que se basa en el calentamiento del interior de un aparato de acero inoxidable, en el que se eleva la temperatura, por energía eléctrica, y que es controlada por un termostato, se conoce como:

A) Flameado

B) Incineración

C) Autoclave de vapor

D) Horno Pasteur

267. La infección que se presenta en un paciente internado en un hospital en quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del internamiento, se denomina:

A) Infección oportunista

B) Infección diferida

C) Infección parasitaria

D) Infección nosocomial

272. Señale cuál de los siguientes se considera como óptimo en el proceso del lavado de manos:

A) Lavado de agua corriente con dispositivo contra salpicaduras y controles sin activación manual

B) Uso de jabón o solución antiséptica

C) Secado en toallas desechables

268. La transmisión por aire de una infección hospitalaria se produce por partículas cuyo tamaño:

A) Es superior a 5 micras de diámetro



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Todas son correctas

273. El agente biológico que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz:

- A) Se clasifica como grupo 1
- B) Se clasifica como grupo 2
- C) Se clasifica como grupo 3
- D) Se clasifica como grupo 4

274. Señale cuál de los siguientes no es uno de los indicadores que tienen como objetivo validar que el proceso de esterilización se efectuó de forma adecuada:

- A) Indicadores de proceso
- B) Indicadores físicos
- C) Indicadores químicos
- D) Indicadores biológicos

275.Cuál de las afirmaciones siguientes referidas al material esterilizado no es correcta:

- A) El material debe guardarse en cámaras frigoríficas (0º-10º C) para evitar contaminación posterior
- B) El material se dejará enfriar una vez esterilizado para evitar condensaciones
- C) Se comprobará que el paquete tenga su identificación así como la fecha de caducidad
- D) Se comprobará que el envoltorio esté intacto

276. La asepsia es un método cuyo objetivo es eliminar los microorganismos o gérmenes, tanto en superficie como en profundidad. El procedimiento utilizado para ello se denomina:

- A) Desinfección
- B) Esterilización
- C) Desparasitación
- D) Desinsectación

277. Entre las características de la esterilización por autoclave no está:

- A) Es un procedimiento seguro
- B) Es un proceso muy caro
- C) No contamina
- D) Es cómoda puesto que los autoclaves son automáticos

278. Los productos químicos usados para la desinfección de objetos y materiales clínicos, se denominan:

- A) Desinfectantes
- B) Cloruros
- C) Desinsectantes
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

279. La Estufa Poupinel es un método de esterilización por:

- A) Calor húmedo
- B) Radiación Ionizante
- C) Calor seco
- D) Óxido de Etileno

280. Señale la opción FALSA. El lavado de manos en clínica se puede clasificar, según la tarea a desarrollar, en:

- A) Aséptico
- B) Preventivo
- C) Especial
- D) Quirúrgico

281. La esterilización del material puede conseguirse por varios métodos. El autoclave es un recipiente que utiliza:

- A) Calor seco
- B) Calor húmedo
- C) Procedimientos químicos
- D) Radiación en caliente

282. Dentro del procedimiento de lavado de manos rutinario de tipo preventivo, una de las siguientes respuestas es FALSA:



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

A) Secado con toalla desechable de papel desde la punta de los dedos hacia el codo.

B) Se aplica sobre las manos agua y jabón, frotándolas entre 5 y 8 segundos, prestando especial atención a los espacios interdigitales y uñas.

C) Cerrar el grifo con el codo, si tiene el dispositivo adecuado o bien con una toalla seca de papel.

D) Aclarado con agua templada.

283. No es un método de esterilización por calor seco:

A) Autoclave

B) Flameado

C) Incineración

D) Estufa Poupinel

284. Con respecto al óxido de etileno, señale la afirmación errónea:

A) Su olor es parecido al cloroformo

B) Es un gas incoloro

C) No es tóxico

D) Es altamente inflamable en presencia de aire

285. El método que elimina gérmenes o microorganismos, tanto en superficie como en profundidad, es conocido como:

A) Asepsia

B) Analepsia

C) Desinfección

D) Antisepsia

286. Para realizar el control biológico de la esterilización se emplean:

A) Indicadores colorimétricos

B) Indicadores calorimétricos

C) Termómetros

D) Esporas atenuadas

287. Se denominan productos bacteriostáticos:

A) Los que inhiben el crecimiento de bacterias

B) Los que matan bacterias

C) Los que matan virus

D) Los que matan bacterias y espiroquetas

288. La estufa Poupinel:

A) Esteriliza mediante calor húmedo

B) Esteriliza mediante calor seco

C) Esteriliza mediante radiaciones

D) No es un instrumento para esterilizar

289. La tintura de yodo es un:

A) Agente esterilizante

B) Detergente

C) Antiséptico

D) Desinfectante

290. El producto gaseoso que se emplea entre otros para esterilizar plásticos, material de goma y caucho se llama:

A) Citostático

B) Protóxido de nitrógeno

C) Óxido de etileno

D) Formol

291. Para realizar el control químico de la esterilización se emplean:

A) Indicadores colorimétricos

B) Indicadores calorimétricos

C) Termómetros

D) Esporas atenuadas

292. ¿Cuál de las siguientes es una forma de esterilización por radiaciones ionizantes?

A) Estufa Poupinel

B) El autoclave

C) Óxido de etileno

D) Rayos gamma

293. Entre las características de un buen desinfectante no se encuentra:

A) Que su coste sea bajo

B) Que sea corrosivo

C) Que pueda ser diluido en agua o alcohol



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Que no sea tóxico

294. No es una forma de esterilización por agentes físicos:

- A) Calor seco
- B) Óxido de etileno
- C) Calor húmedo
- D) Radiaciones ionizantes

295. La diferencia entre esterilización y desinfección es:

- A) Ninguna, ya que ambas tienen la misma capacidad destructiva.
- B) La desinfección destruye microorganismos patógenos y la esterilización destruye todo tipo de microorganismos y formas de resistencia.
- C) La esterilización se aplica sobre piel y heridas y la desinfección sobre objetos.
- D) La esterilización no es tan eficaz como la desinfección.

296. La desinfección es sinónimo de:

- A) Asepsia
- B) Antisepsia
- C) Las dos
- D) Ninguna de las dos

297. Cuando hablamos de esterilización del material nos referimos a:

- A) Empleo de desinfectantes
- B) Empleo de antisépticos
- C) Empleo de material estéril
- D) Destruir todos los microorganismos y sus formas de resistencia

298. ¿En qué método se utiliza calor húmedo para esterilizar?

- A) Óxido de etileno
- B) Flameado
- C) Autoclave
- D) Incineración

299. Entre las siguientes, elija la afirmación falsa:

- A) Un objeto esterilizado se considera aséptico
- B) Todo objeto esterilizado está desinfectado
- C) Todo objeto desinfectado está esterilizado
- D) Con la esterilización se destruyen todos los organismos y sus esporas

300. Los elementos (eslabones) necesarios para que se propague una enfermedad transmisible se llama:

- A) Cadena infecciosa
- B) Cadena nosocomial
- C) Cadena epidemiológica
- D) Ninguna es correcta

301. ¿Qué se entiende por infección nosocomial?

- A) Que es endémica en una zona del país
- B) Que es estacional
- C) Que aparece sólo en niños/as
- D) Que es relativa al hospital o se adquiere en él

302. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de transmisión directa de gérmenes desde la fuente de infección al sujeto sano?

- A) Por fómites
- B) Por mordeduras
- C) Por el agua
- D) Por los alimentos

303. Los seres animados o inanimados en los que el agente etiológico se reproduce en un ambiente natural (hábitat del agente infeccioso) del que depende para su supervivencia, se denomina:

- A) Cadena epidemiológica
- B) Huésped
- C) Mecanismo de transmisión
- D) Reservorio

304. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de transmisión indirecta de gérmenes desde la fuente de infección al sujeto sano?

- A) Transplacentaria



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**



PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

Página 35 de 49

B) Arañazos

C) Por el agua

D) Por mordeduras

305. La desinfección que se realiza en la habitación de un/a enfermo/a que ha estado sometido a aislamiento cuando éste/a es dado de alta y se ha marchado de la habitación, se denomina:

A) Desinfección final

B) Desinfección parcial

C) Desinfección continua

D) Desinfección periódica

306. El tipo de aislamiento de pacientes que tiene por objeto la transmisión de infecciones muy contagiosas o virulentas que pueden propagarse fácilmente por vía aérea y por contacto directo recibe el nombre de:

A) Aislamiento respiratorio

B) Aislamiento parenteral

C) Aislamiento entérico

D) Aislamiento estricto

307. El aislamiento en el que el/la paciente no es contagioso/a sino que el medio que le rodea es altamente peligroso para él/ella, con elevado riesgo de adquirir infecciones (Ej.: pacientes inmunodeprimidos, quemados, etc.) se denomina:

A) Aislamiento respiratorio

B) Aislamiento protector

C) Aislamiento entérico

D) Aislamiento estricto

308. El aislamiento que trata de prevenir el contagio de enfermedades infecciosas que se transmite por vía digestiva se denomina:

A) Aislamiento respiratorio

B) Aislamiento protector

C) Aislamiento entérico

D) Aislamiento estricto

309. Los desinfectantes que inhiben el crecimiento de las bacterias se denominan:

A) Bacteriostáticos

B) Bactericidas

C) Fungicidas

D) Viricidas

310. La técnica de esterilización en la que se expone el material a una llama durante un tiempo determinado se denomina:

A) Flameado

B) Flambeado

C) Autoclave

D) Calor Húmedo

311. ¿Quién define la infección nosocomial como cualquier enfermedad microbiana, reconocible clínicamente, que afecta a los/as pacientes como consecuencia de ser admitidos/as en el hospital, o atendidos/as para tratamiento y al personal sanitario como consecuencia de su trabajo?

A) La Organización Mundial de la Salud

B) La Ley General de Sanidad

C) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales

D) Las distintas notas técnicas elaboradas por el instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

312. Los elementos (eslabones) necesarios para que se propague una enfermedad transmisible se llama:

A) Cadena infecciosa

B) Cadena nosocomial

C) Cadena epidemiológica

D) Ninguna es correcta

313. Los seres animados o inanimados en los que el agente etiológico se reproduce en un ambiente natural (hábitat del agente infeccioso) del que depende para su supervivencia, se denomina:

A) Cadena epidemiológica

B) Huésped



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

C) Mecanismo de transmisión

D) Reservorio

314. La técnica de esterilización en la que se expone el material a una llama durante un tiempo determinado se denomina:

A) Flameado

B) Flambeado

C) Autoclave

D) Calor Húmedo

315. Con respecto al óxido de etileno, señale la afirmación errónea:

A) Su olor es parecido al cloroformo

B) Es un gas incoloro

C) No es tóxico

D) Es altamente inflamable en presencia de aire

316. El producto gaseoso que se emplea entre otros para esterilizar plásticos, material de goma y caucho se llama:

A) Citostático

B) Protóxido de nitrógeno

C) Óxido de etileno

D) Formol

317. Se denomina antisepsia a:

A) Esterilización que se realiza sobre objetos inanimados

B) Desinfección sobre tejidos vivos

C) Presencia de microorganismos en los tejidos contaminados

D) Ninguna de las anteriores

318. El prefijo "EPI" indica la posición:

A) Encima

B) Debajo

C) Lateral

D) Inferior

319. La desinfección es sinónimo de:

A) Asepsia

B) Antisepsia

C) Las dos

D) Ninguna de las dos

320. Atendiendo a su peligrosidad infectiva los hilos de sutura son material:

A) Fungible

B) Crítico

C) Inventariable

D) No crítico

321. Los productos químicos usados en la desinfección de materiales clínicos y cavidades del organismo son:

A) Desinfectantes

B) Antisépticos

C) Desinsectantes

D) Ninguna es correcta

322. Dentro de las infecciones hospitalarias, las infecciones urinarias:

A) Suponen el 80% de las infecciones nosocomiales

B) Suponen el 30-40% de las infecciones nosocomiales

C) Suponen el 10-25% de las infecciones nosocomiales

D) Las heridas quirúrgicas son más abundantes que las infecciones urinarias

323. La desinfección que se realiza cuando el paciente está ingresado, con carácter general se llama:

A) Concomitante

B) Bactericida

C) Antiséptica

D) Bacteriostática

324. ¿Qué es una zona séptica?

A) Una zona desinfectada

B) Una zona con riesgo de contaminación

C) Una zona infectada



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Una zona sucia

325. En un aislamiento entérico, debemos prestar especial atención:

- A) Al contacto directo o indirecto con las excreciones**
- B) Al contacto con heridas y piel del paciente
- C) A la transmisión de enfermedades infecciosas, sobre todo a través del aire
- D) A la presencia de infecciones nosocomiales

326. En relación con la esterilización por óxido de etileno, señala la respuesta correcta:

- A) No deja residuos
- B) Se necesita entre 1 y 2 horas de esterilización
- C) Deteriora los materiales de goma y plástico
- D) Ninguna afirmación es correcta**

327. Usted ayudó a la auxiliar de enfermería a asear al paciente infeccioso de la habitación 1301. ¿cuál será el primer tipo de protección individual que se retire usted?

- A) La bata
- B) La mascarilla
- C) Gorro y calzas
- D) Guantes**

328. Desde el punto de vista de la peligrosidad infectiva, consideramos para la limpieza del área de fisioterapia:

- A) Área semicrítica**
- B) Área crítica
- C) Área no crítica
- D) Todas son correctas

329. El lavado de manos constituye una de las medidas de eficacia probada para evitar la infección o:

- A) Contaminación**
- B) Asepsia
- C) Esterilización
- D) Profilaxis

330. Dentro de las medidas a seguir ante las enfermedades infecciosas, cabe destacar:

- A) Es de carácter obligatorio declarar las enfermedades transmisibles
- B) Aislamiento de los enfermos contagiosos
- C) Desinfección en caso de epidemias o brotes
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas**

331. A la invasión en el organismo de microorganismos patógenos que se multiplican y lesionan los tejidos se le denomina:

- A) Asepsia
- B) Infección**
- C) Enfermedad
- D) Lesión

332. Es un método de esterilización por calor seco:

- A) Autoclave
- B) Estufa Poupinel**
- C) Tindalización
- D) Las respuestas A y B son correctas

333. El aislamiento es una medida contra:

- A) El paciente
- B) El enfermo
- C) La enfermedad**
- D) La sociedad

334. La utilización de productos químicos para intentar destruir los microorganismos contaminantes se denomina:

- A) Desinfección
- B) Antisepsia**
- C) Esterilización
- D) Ninguna es correcta

335. ¿Qué persigue el aislamiento protector o inverso?

- A) Una habitación aireada
- B) Proteger a pacientes con rubéola
- C) Proteger a pacientes con sarampión



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Proteger a pacientes con defensas disminuidas como por ejemplo pacientes inmunodeprimidos

336. ¿Cuál de las siguientes características es inherente a un buen desinfectante?

- A) Tiene un amplio espectro
- B) No es tóxico ni corrosivo
- C) Es de bajo coste
- D) Todas son correctas**

337. ¿Qué tipo de material debe estar rigurosamente limpio y en la medida de lo posible desinfectado?

- A) No crítico**
- B) Crítico
- C) Semicrítico
- D) Semicrítico de grado 1

338. Características del óxido de etileno como agente esterilizante. Señale la incorrecta:

- A) Relativa rapidez de acción
- B) Posibilidad de acción a bajas temperaturas
- C) Es corrosivo y puede deteriorar el material con filo**
- D) Es tóxico

339. Cada proceso de esterilización de material, tiene unos controles, tanto químicos, como biológicos, independientemente de los propios de las máquinas. ¿qué utilizamos como control biológico?

- A) Esporas**
- B) Reactivos químicos
- C) Pintura
- D) Alcoholes especiales

340. ¿Quién se ocupa de los estudios de vigilancia epidemiológica de las infecciones hospitalarias?

- A) La Jefatura de Celadores
- B) El Servicio de Medicina Preventiva**
- C) La Dirección de Enfermería
- D) El Servicio de Prevención de Riesgos

341. Entre las barreras higiénicas, hay distintos niveles de confianza. Dentro de las de eficiencia dudosa encontramos:

- A) Los rayos ultravioleta en los quirófanos**
- B) El lavado de manos
- C) La esterilización
- D) Los procedimientos de aislamiento

342. Se entiende por reservorio:

- A) El lugar donde los microorganismos viven, se desarrollan y multiplican indefinidamente**
- B) El lugar donde los seres vivos se desarrollan y multiplican indefinidamente
- C) Las respuestas A y B son correctas
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

343. LA ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE:

- A) Utiliza calor seco
- B) Utiliza fuego directo
- C) No existe el autoclave
- D) Utiliza vapor de agua a presión**

344. ¿Cuál de estas condiciones no se considera infección?

- A) Una infección asociada a una complicación
- B) Una infección adquirida por vía transplacentaria
- C) Diseminación de otra infección ya existente
- D) Inflamación por respuesta tisular a una agresión o estimulación por agentes no infecciosos**

345. ¿Cuál de estas enfermedades no es transmitida por la sangre?

- A) Fiebre por mordedura de rata
- B) Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
- C) Meningitis**
- D) Hepatitis C

346. ¿Cuáles son los eslabones de la cadena de infección?

- A) La fuente del agente infeccioso y el huésped**
- B) El reservorio y el huésped o receptor



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

C) El agente etiológico, el medio ambiente y el huésped

347. En una enfermedad infecciosa el contagio directo se realiza a través de:

- A) Objetos contaminados
- B) Agua y otros líquidos
- C) Gotas de Flügge

348. Una zona séptica es:

- A) Una zona desinfectada
- B) Una zona sucia
- C) Una zona con riesgo parcial de contaminación

349. Se denomina antisepsia a:

- A) Esterilización que se realiza sobre objeto inanimados
- B) Desinfección sobre tejidos vivos
- C) Presencia de microorganismos en los objetos contaminados

350. De las siguientes unidades de hospitalización, cuál es la que ostenta mayor prevalencia en infecciones nosocomiales:

- A) Hematología
- B) Rehabilitación
- C) Unidad de Cuidados Intensivos
- D) Oncología

351. De los siguientes métodos de desinfección, cuál no es un procedimiento químico:

- A) Antisépticos
- B) Cloruros
- C) Aldehídos
- D) Pasteurización

352. Es un método de esterilización por calor húmedo:

- A) Estufa Poupinel
- B) Flameado
- C) Autoclave
- D) Incineración

353. En una desinfección de alto nivel el tiempo de actuación del desinfectante será de:

- A) 40-50 minutos
- B) 60 minutos
- C) 10 minutos
- D) 20-30 minutos

354. De las siguientes afirmaciones cuál es correcta:

- A) Un material desinfectado no está esterilizado
- B) Todo material desinfectado está esterilizado
- C) Un material esterilizado está desinfectado
- D) A y C son correctas

355. La desinfección es:

- A) Un tratamiento de destrucción de microorganismos patógenos
- B) Un procedimiento de antisepsia
- C) El resultado de una limpieza continua
- D) Las respuestas A y B son correctas

356. En relación a las infecciones intrahospitalarias, señale cuál de las siguientes respuestas no es correcta:

- A) También se denominan infecciones asociadas a la atención sanitaria
- B) Pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno en el que reciban atención sanitaria
- C) Pueden aparecer después de que el paciente reciba el alta
- D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

357. Es un método de esterilización por calor seco:

- A) Autoclave
- B) Estufa Poupinel
- C) Tindalización
- D) Las respuestas A y C son correctas

358. A la invasión en el organismo de microorganismos patógenos que se multiplican y lesionan los tejidos, se denomina:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

- A) Asepsia
- B) Infección**
- C) Enfermedad
- D) Lesión

359. Una zona séptica es una zona:

- A) Contaminada**
- B) Limpia
- C) Escéptica
- D) Estéril

360. Una vez limpias las manos, cuál de los siguientes agentes tiene mayor eficacia antiséptica:

- A) Agua y jabón
- B) Clorhexidina
- C) Povidona yodada
- D) Solución hidroalcohólica**

361. Una estufa "Poupinel" es un método de esterilización por:

- A) Óxido de etileno
- B) Calor seco**
- C) Calor húmedo
- D) Radiaciones ionizantes

362. ¿Qué método es el más radical para la destrucción de gérmenes, ya sean patógenos o no patógenos?

- A) Desinfección
- B) Desinsectación
- C) Esterilización**
- D) Antisepsia

363. ¿Cuál de los siguientes controles integrados en los aparatos esterilizadores (autoclaves, cámaras de vaporización...) Es falso:

- A) Biológicos**
- B) Químicos
- C) Físicos
- D) A y B son verdaderas

364. La esterilización del material puede conseguirse con varios métodos. Indicar el no verdadero:

- A) Calor seco
- B) Calor húmedo
- C) Procedimientos químicos
- D) Radiación en caliente**

365. La esterilización del material puede conseguirse con varios métodos. Indicar en cual se utiliza autoclave:

- A) Calor seco
- B) Calor húmedo**
- C) Procedimientos químicos
- D) Radiación en caliente

366. En el caso de utilizar la estufa de Poupinel para la esterilización de vidrio, indicar cuántos minutos debe funcionar la estufa si el termostato marca 140° C:

- A) 80 min.
- B) Entre 100 y 120 min.
- C) Entre 120 y 150 min.
- D) 180 min.**

367. Los productos químicos que se usan para la desinfección de la piel, heridas y cavidades del organismo se denominan:

- A) Desinfectantes
- B) Antisépticos**
- C) Esterilización
- D) Todas son incorrectas

368. ¿Qué tipo de barrera contra la infección es el uso de batas, mascarillas y guantes?

- A) Física**
- B) Biológica
- C) Química
- D) Educativa

369. Señale la respuesta correcta en cuanto al óxido de etileno:

- A) No es tóxico



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

- B) Es tóxico exclusivamente por la vía respiratoria
C) Es tóxico si se mezcla con agua
D) Es fundamentalmente tóxico por las vías cutánea y respiratoria

370. La higiene de manos se debe hacer con:

- A) Agua y jabón
B) Productos preparados con jabón y base alcohólica
C) Agua y jabón o con productos preparados con base alcohólica y emolientes
D) Agua y jabón y nunca utilizar productos preparados con base alcohólica y emolientes

371. ¿Qué son las infecciones nosocomiales?

- A) Las infecciones producidas por accidentes laborales
B) Las infecciones derivadas por intoxicación por gases
C) Las infecciones adquiridas durante la estancia en un centro hospitalario
D) Las infecciones adquiridas durante la estancia en un centro comercial

372. ¿Qué se entiende por desinfección?

- A) La limpieza extraordinaria, total
B) La limpieza que suprime los microorganismos patógenos
C) La limpieza que destruye todo organismo vivo
D) La limpieza que elimina los virus y los hongos

373. De los siguientes materiales cuál no conviene esterilizar en el autoclave:

- A) Textiles
B) Materiales de goma o plástico
C) Frascos de líquidos
D) Medios de cultivo

374. Una vez esterilizado el material, el transporte de éste, ha de hacerse:

- A) En bolsa de plástico cerrada cuando es voluminoso

- B) En carros herméticos cuando es pequeño
C) De forma que se garantice la integridad del envoltorio
D) A y B son correctas

375. El lavado quirúrgico y el uso de guantes forman parte de:

- A) Una técnica higiénica
B) Una técnica aséptica
C) La técnica de Kocher o Pean
D) Todas son correctas

376. Las normas y directrices más habituales en materia de higiene hospitalaria recomiendan que, para movilizar a pacientes inmunodeprimidos, y con independencia del uso de cualquier otro medio de protección:

- A) Se debe llevar a cabo un lavado de manos de tipo quirúrgico
B) Se debe llevar a cabo un lavado de manos con una solución hidroalcohólica
C) Es suficiente con un lavado de manos con un jabón con pH neutro
D) Es suficiente con un lavado de manos higiénico

377. De entre los siguientes, ¿qué método esteriliza a más baja temperatura?

- A) Método físico por calor seco
B) Método físico por calor húmedo
C) Método físico por autoclave de vapor
D) Método químico por plasma de peróxido de hidrógeno

378. La técnica de saneamiento cuya finalidad es la destrucción de toda forma de vida, aniquilando todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, incluidas sus formas esporuladas, altamente resistentes, se denomina:

- A) Esterilización
B) Desinfección
C) Limpieza



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Descontaminación

379. La medida más eficaz para evitar la transmisión de enfermedades nosocomiales o intrahospitalarias por contacto directo es:

- A) La esterilización del material sanitario
- B) El lavado de manos**
- C) La desinfección de las habitaciones
- D) La limpieza de toallas, sábanas y vajillas

380. Según la organización mundial de la salud, desde el punto de vista de la higiene (especialmente de la higiene de manos), el entorno asistencial del paciente se divide en:

- A) Área y zona de asistencia
- B) Área y zona del paciente
- C) Área de asistencia y zona del paciente**
- D) Área del paciente y zona de asistencia

381. Cuando llegamos a la habitación 401 se nos informa que al paciente se le va a aplicar el protocolo de aislamiento inverso. Este tipo de aislamiento, ¿a quién trata de proteger?

- A) Al equipo que ha tratado o en lo sucesivo va a tratar al paciente, ya que pueden resultar contagiados
- B) Trata de proteger tanto al paciente como al personal que va a tratar al paciente
- C) Este tipo de aislamiento trata de proteger al paciente**
- D) Este tipo de aislamiento no existe, el que se utiliza es el aislamiento de contacto

382. En la unidad de esterilización, la supervisora le indica que recoja el material que hay en la zona séptica y lo cargue en el carro destinado para su transporte. ¿qué se entiende por zona séptica?

- A) Una zona tóxica
- B) Una zona sucia**
- C) Una zona desinfectada por agentes químicos
- D) Una zona esterilizada por agentes físicos

383. Todo el material sujeto a esterilización:

- A) Debe ser previamente lavado**
- B) Debe ser previamente lavado, solamente si tiene restos orgánicos
- C) Debe ser previamente lavado, solamente si el procedimiento de esterilización es de tipo químico, pero no cuando sea por calor.
- D) No debe ser sometido necesariamente a lavado previo ya que el proceso de esterilización garantiza la destrucción de todo microorganismo.

384. En el quirófano se plantea la necesidad de utilizar un equipo considerado, según la clasificación de Spaulding, como un artículo semicrítico. ¿qué nivel de desinfección deberá aplicársele?

- A) Esterilización
- B) Desinfección de nivel alto**
- C) Desinfección de nivel medio
- D) Desinfección de nivel bajo

385. Las recomendaciones de la OMS sobre la duración de todo el proceso de higiene de manos por lavado es de:

- A) 10 segundos
- B) 15 segundos
- C) 40-60 segundos**
- D) 1-2 minutos

386. Las recomendaciones de la OMS sobre la duración del proceso de higiene de manos por fricción con un preparado de base alcohólica (PBA) es de:

- A) 10 segundos
- B) 20-30 segundos**
- C) 50-60 segundos
- D) 1-2 minutos

387. La higiene de manos por fricción con un preparado de base alcohólica se caracteriza por:

- A) Precisa mayor tiempo que la higiene de manos por lavado



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

B) Precisa de mayor infraestructura que la higiene de manos por lavado

C) La mala tolerancia de la piel

D) Elimina la mayoría de los gérmenes, incluyendo los virus

388. Sobre el proceso de la higiene de manos por fricción con un preparado de base alcohólica (PBA):

A) Es la forma más efectiva de asegurar una higiene de manos óptima

B) El jabón y el preparado de base alcohólica pueden utilizarse conjuntamente

C) Los profesionales lo llevan a cabo en el momento de cambiarse de ropa en el vestuario

D) Precisa de una toalla para el secado posterior

389. El aislamiento parenteral, se utiliza:

A) En enfermedades que se propagan por vía aérea

B) Para evitar la propagación de enfermedades que se transmiten por sangre o líquidos orgánicos o por objetos contaminados con los mismos

C) Para proteger a pacientes que tienen el sistema inmunológico débil

D) En las enfermedades que se contagian a través de las heces

390. El lavado de manos rutinario o higiénico debe durar alrededor de:

A) 10 segundos

B) 30 segundos

C) 90 segundos

D) 3 minutos

391. En la relación temperatura/tiempo en programas de esterilización por calor seco, señale la respuesta correcta:

A) 160° C - 60 min.

B) 150° C - 150 min.

C) 220° C - 30 min.

D) 100° C - 30 min.

392. La esterilización a través de la estufa Poupinel se considera:

A) Esterilización por radiación gamma

B) Esterilización por radiaciones ionizantes o esterilización en frío

C) Esterilización por calor húmedo o vapor

D) Esterilización por calor seco

393. El óxido de etileno es un medio de esterilización:

A) Por productos físicos

B) Por productos químicos

C) Por calor seco

D) Por flujo laminar

394. En un hospital se entiende por zona aséptica:

A) Una zona contaminada

B) Una zona desinfectada

C) Una zona sucia

D) Una zona barrida

395. Es un desinfectante catalogado como potente y de acción rápida pero que presenta el inconveniente de que es muy neutralizable:

A) Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno

B) Yodo

C) Detergente

D) Fenol

396. La esterilización por autoclave:

A) Genera residuos y es contaminante

B) No sirve para esterilizar materiales textiles (paños, gasas, ropas, etc.)

C) Deteriora los materiales de goma o plástico

D) Es una forma de esterilización por radiaciones ionizantes o esterilización en frío

397. Una vez esterilizado el material, el transporte de éste ha de hacerse:

A) En bolsas de plástico cerradas cuando es voluminoso

B) En carros herméticos cuando es pequeño



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases



PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

Página 44 de 49

C) De forma que se garantice la integridad del envoltorio

D) En bolsas herméticas para evitar la condensación debida al calor

398. Señale el enunciado INCORRECTO en relación con la antisepsia:

A) La antisepsia consigue la esterilización

B) La antisepsia consiste en utilizar productos químicos para destruir microorganismos

C) La antisepsia es sinónimo de desinfección

D) La antisepsia consiste en el uso de desinfectantes

399. Señale el enunciado INCORRECTO en relación con la esterilización por óxido de etileno:

A) El óxido de etileno se diluye con ácido clorhídrico para evitar el riesgo de inflamación

B) El óxido de etileno es un gas incoloro

C) El óxido de etileno es altamente inflamable en presencia de aire

D) El óxido de etileno tiene un olor parecido al cloroformo

400. Los indicadores colorimétricos que se utilizan en esterilización son un tipo de control:

A) Químico

B) Físico

C) Ambiental

D) Biológico

401. De los antisépticos es incorrecto afirmar:

A) Que son utilizados para la desinfección de objetos animados

B) Que pueden ser bactericidas

C) Que son de uso frecuente el agua oxigenada y el alcohol

D) Que pueden ser bacteriostáticos

402. ¿Cuál es el procedimiento utilizado para lograr una adecuada asepsia?

A) El uso de agentes bactericidas

B) La esterilización

C) La desinfección

D) El uso de agentes antisépticos

403. Los agentes que inhiben el crecimiento de las bacterias se denominan:

A) Bactericidas

B) Bacteriales

C) Bacteriostáticos

D) Bacterísticos

404. Una zona aséptica es una zona:

A) Contaminada

B) Limpia

C) Sucia

D) Estéril

405. ¿En qué diluimos el óxido de etileno para evitar el riesgo de inflamación?

A) En cloroformo

B) En dióxido de carbono

C) En cloruro potásico

D) En nitrato de plata

406. ¿En qué método se basa la esterilización en autoclave?

A) En un método físico que usa calor seco

B) En un método físico que utiliza radiaciones

C) En un método químico que usa óxido de etileno

D) En un método físico que usa calor húmedo

407. Se entiende por reservorio:

A) El lugar donde los microorganismos viven, se desarrollan y multiplican indefinidamente

B) El lugar donde los seres vivos se desarrollan y multiplican indefinidamente

C) Las respuestas A y B son correctas

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

408. ¿Qué aparato de esterilización por calor húmedo actúa como una olla de presión?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

- A) Cisternas
- B) Bolsas acuáticas
- C) Autoclave**
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas

- A) Infección**
- B) Clasificación de enfermos
- C) Clasificación de las enfermedades
- D) Ninguna de las anteriores es correcta

409. ¿Qué temperatura debemos programar en una estufa Poupinel para que quede el material perfectamente esterilizado en un tiempo de 30 minutos?

- A) 150º C
- B) 160º C
- C) 170º C
- D) 180º C**

410. El calor seco:

- A) No actúa por oxidación física
- B) Es bactericida**
- C) Las respuestas A y B son correctas
- D) Las respuestas A y B son incorrectas

411. El proceso que consiste en la supresión de los microorganismos patógenos sin eliminar todos los microorganismos ni sus formas de resistencia, en la habitación del enfermo, se denomina:

- A) Desinfección**
- B) Desinsectación
- C) Esterilización
- D) Antisepsia

412. ¿Qué tipo de agente es el mercurocromo?

- A) Limpiador
- B) Bactericida
- C) Antiséptico**
- D) Desinfectante

413. Es un método de esterilización por calor seco:

- A) Tindalización
- B) Autoclave
- C) La estufa Poupinel**
- D) Las respuestas A y B son correctas

414. El término nosocomial se refiere a:

415. El conjunto de técnicas utilizadas para la destrucción de todos los gérmenes patógenos que existen sobre objetos y superficies lo llamamos:

- A) Antisepsia
- B) Limpieza
- C) Desinsectación
- D) Desinfección**

416. En las técnicas de higiene, el lavado de manos quirúrgico:

- A) Hay que enjabonarse las manos y antebrazos con jabón antiséptico durante dos minutos**
- B) Se realiza durante un minuto y se hace con jabón antiséptico
- C) Es el que utilizamos al llegar al trabajo y al terminar la jornada
- D) Se hace con jabón antiséptico durante tres minutos

417. De los siguientes desinfectantes, ¿cuál no sería apropiado para la limpieza de superficies o instrumental?

- A) Peróxido de hidrógeno**
- B) Formol
- C) Hipoclorito sódico
- D) Detergente

418. En lo relativo a las normas de higiene, la desinfección consiste en:

- A) Suprimir los microorganismos patógenos. No elimina todos los microorganismos ni sus formas de resistencia**
- B) Una técnica que se aplica en la exterminación de múridos
- C) La destrucción de todos los microorganismos y formas de resistencia de los mismos



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) Un conjunto de técnicas que eliminan gérmenes o microorganismos, tanto en superficie como en profundidad, de los materiales expuestos

419. ¿Cuánto debe de durar la desinfección de manos, según la O.M.S., cuando se utilizan soluciones alcohólicas?

A) Entre 10-15 segundos

B) Como mínimo, 40 segundos

C) Entre 20-30 segundos

D) Nada más entrar en contacto con la solución alcohólica, ya se considera que las manos están desinfectadas

420. En cuanto a la higiene de manos y según la O.M.S., los momentos para la higiene de manos son:

A) Después del riesgo a exposiciones a líquidos corporales.

B) Antes y después de tocar al paciente sin guantes.

C) Antes de tocar al paciente, antes de realizar una técnica limpia/aséptica, después del riesgo de exposiciones a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente.

D) Antes de tocar al paciente, antes de realizar una técnica limpia/aséptica, después del riesgo de exposiciones a líquidos corporales y después de tocar al paciente.

421. El proceso a través del cual se consigue la destrucción de toda forma de vida microbiana, virus, hongos y bacterias, incluidas sus formas esporuladas, habitualmente mediante la utilización de calor seco o húmedo, se denomina:

A) Antisepsia

B) Desinfección

C) Esterilización

D) Limpieza con vapor

422. Según la O.M.S., la descontaminación de las manos con solución alcohólica, como método de higiene

de manos, se realiza en todos los casos a excepción de:

A) Después de quitarse los guantes

B) Después del contacto con el paciente

C) Cuando las manos estén visiblemente sucias

D) Después del contacto con objetos del paciente

423. ¿Cuál es el vehículo más importante de contaminación exógena de infección nosocomial?

A) El medio aéreo

B) Las secreciones nasales y cutáneas

C) La sangre

D) Las manos

424. El uso de guantes en materia de higiene:

A) No sustituye al lavado de manos

B) Evita el lavado de manos antes del contacto con el paciente

C) Evita el lavado de manos después del contacto con el paciente

D) Evita el lavado de manos entre pacientes

425. En el lavado de manos quirúrgico:

A) Las manos deben mantenerse más bajas que los codos

B) Incluye el lavado con agua durante 30 segundos

C) Las manos deben mantenerse a la misma altura que los codos

D) Las manos deben mantenerse más altas que los codos

426. Las directrices de la OMS para la higiene de las manos en la atención sanitaria, se denominan:

A) Los tres momentos para la higiene de las manos

B) Los cinco momentos para la higiene de las manos

C) Decálogo de higiene de manos

D) Protocolo de higiene de manos

427. En relación con la infección nosocomial, señale la respuesta correcta:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03


Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TSE

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES

TEMA 23: Epidemiología

Página 47 de 49

A) Es cualquier enfermedad microbiana, reconocible clínicamente, que afecta a los pacientes como consecuencia de ser admitidos en el hospital o atendidos para tratamiento, y al personal sanitario como consecuencia de su trabajo.

B) La infección se considera endógena cuando está causada por

microorganismos adquiridos desde una fuente externa al paciente, bien en otros pacientes, personal sanitario o en objetos inanimados.

C) Las infecciones de heridas quirúrgicas ocupan el tercer lugar en el número total de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

D) Si no se utilizan guantes, el lavado de manos no tiene ninguna incidencia en la transmisión de enfermedades nosocomiales.

428. Al conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de microorganismos y sus formas de resistencia, tanto en superficie como en profundidad, de los materiales expuestos o de los seres vivos, se le denomina:

A) Antisepsia.

B) Desinfección.

C) Pasteurización.

D) Esterilización.

429. En la higiene de manos:

A) Es necesario el cambio de guantes entre el cuidado de un paciente y otro, e incluso en el cuidado de un mismo paciente si nos hemos de desplazar desde una zona contaminada a una limpia.

B) En el procedimiento de lavado de manos con agua y jabón, basta con frotar la punta de los dedos de la mano que habitualmente se utiliza contra la palma de la mano contraria haciendo un movimiento de rotación.

C) Es necesario el cambio de guantes entre el cuidado de un paciente y otro, e incluso en el cuidado de un mismo paciente si nos hemos de desplazar desde una zona limpia a una contaminada.

D) En el procedimiento de desinfección de manos, deberá cerrarse el grifo del agua con la toalla desechable utilizada.

430. El método que consigue la ausencia total de gérmenes, incluidas las esporas, se denomina:

A) Desinfección

B) Asepsia

C) Esterilización

D) Antisepsia

431. ¿Cuál de las siguientes no es una sustancia utilizada en los métodos químicos de esterilización?

A) Formaldehído

B) Óxido de etileno

C) Clorhexidina

D) Plasma gas

432. Constituye una medida de aislamiento frente a las infecciones nosocomiales:

A) El aislamiento estricto

B) El aislamiento inverso

C) El aislamiento de contacto

D) Todas las respuestas anteriores son correctas

433. ¿Cuál es la fuente de infección más frecuente para los microorganismos responsables de las infecciones asociadas a los cuidados?

A) El sistema de agua del hospital

B) El aire hospitalario

C) Los microorganismos que colonizan al paciente, y cuidadores

D) El medio hospitalario (superficies, aparataje)

434. Sobre la higiene de manos y uso correcto de guantes en los centros sanitarios, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es incorrecta?

A) Cuando se va a realizar un procedimiento quirúrgico se deben frotar las manos y antebrazos con jabón antiséptico durante el tiempo recomendado por el fabricante, generalmente entre



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

2 y 6 minutos. Mayor tiempo de frotamiento (p.e.: 10 minutos) no es necesario

B) Descontaminación de manos antes y después del contacto con piel intacta o ropa no manchada del paciente (por ejemplo: toma de constantes)

C) El uso de guantes evita la necesidad de descontaminación de manos

D) No añadir jabón en un dispensador parcialmente vacío. Esta práctica del "relleno" puede provocar la contaminación bacteriana del jabón

435. El personal sanitario informa a mariano que para el traslado que va a realizar de un paciente debe usar medidas profilácticas, y hará uso de:

A) Una camilla especial

B) No hace caso ya que no es su superior

C) Una sábana limpia

D) Guantes

436. ¿Cuál de las siguientes es la vía principal para la transmisión cruzada de microorganismos potencialmente patógenos en una institución sanitaria?

A) El aire que circula en el hospital

B) Las manos de los trabajadores sanitarios cuando no están limpias

C) La exposición del paciente a superficies colonizadas (camas, sillas, mesas...)

D) El uso compartido entre pacientes de objetos no invasivos (estetoscopios, manguitos de presión...)

437. En las infecciones nosocomiales, ¿qué barrera higiénica es la más importante?

A) El uso de guantes estériles.

B) El uso de mascarillas.

C) Lavado de manos.

D) Frotarse las manos.

438. Los agentes responsables de un mayor número de muertes relacionados con las infecciones nosocomiales son:

A) Bacterias gram positivas.

B) Bacterias gram negativas.

C) Hongos.

D) Virus

439. Las infecciones que se adquieren en el hospital, sobre todo en las unidades de vigilancia intensiva, se denominan:

A) Infecciones nosocomiales.

B) Infecciones comunitarias.

C) Infecciones relacionadas con la actividad sanitaria.

D) Infecciones graves.

440. La infección nosocomial se hace posible debido a la presencia de cuál de estos factores

A) Microorganismos de ambiente hospitalario.

B) Estado comprometido del paciente.

C) Cadena de transmisión hospitalaria del microorganismo.

D) La interacción de todos los anteriores

441. De los siguientes mecanismos de transmisión, ¿cuál es el directo?

A) Transmisión aérea.

B) Alimentos.

C) Baños (leptopirosis).

D) Artrópodos

442. En las infecciones nosocomiales debida a agentes microbianos (señale la RESPUESTA INCORRECTA):

A) Son contraídas por un microorganismo de persona a persona

B) Son contraídas por una infección exógena

C) Son contraídas por una infección ambiental

D) Son contraídas por agentes desinfectantes

443. En las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en España: ¿Qué bacteria presenta mayor prevalencia?

A) Staphylococcus aureus.

B) Escherichia coli.

C) Enterococcus faecalis.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03


Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES TEMA 23: Epidemiología

Página 49 de 49

D) *Pseudomonas aeruginosa*

444. Seleccione la definición correcta de “prevalencia de una enfermedad”:

- A) El porcentaje de resultados positivos en una población.
- B) Los casos nuevos de la enfermedad en una población en un año.
- C) La frecuencia de la enfermedad en una población dada.**
- D) La probabilidad de un resultado de prueba positivo para la enfermedad.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases