

Tema 23. Estadística

1. **Asociación entre variables cuantitativas: Señale la afirmación correcta acerca de la pendiente:**

- A) Si la pendiente es positiva, la recta es descendiente.
- B) Nos da idea de la inclinación de la recta de regresión.
- C) Mide el grado de asociación entre las variables.

2. **Un valor de hemoglobina en sangre de 13 mg/dl, es una variable:**

- A) Cualitativa ordinal
- B) Cualitativa nominal
- C) Cuantitativa continua
- D) Cuantitativa discreta

3. **El coeficiente de correlación entre dos variables es de 0.998. Indica cuál de las siguientes opciones es la correcta:**

- A) A medida que una de las variables aumenta, la otra también aumenta.
- B) A medida que una de las variables aumenta, la otra disminuye.
- C) No existe relación entre ambas variables.

NOTA. El coeficiente de correlación (r) permite predecir el valor de una variable dado un valor determinado de otra variable. Si $r=0$ no hay correlación entre las variables. Si $r > 0$ será positiva (si una $\uparrow$ la otra también $\uparrow$). Si $r < 0$ la correlación será negativa (si una $\uparrow$ la otra $\downarrow$). Cuanto más cercana a la unidad mayor será la correlación

4. **¿Qué característica debe cumplir la distribución de una variable para poder considerarse "normal"?**

- A) Debe ser una variable cuantitativa continua, con distribución simétrica respecto a su valor central.
- B) La variable puede ser cuantitativa o cualitativa pero con distribución simétrica.
- C) La variable puede ser cuantitativa o cualitativa pero con distribución asimétrica respecto a su valor central.

5. **Los test paramétricos se utilizan cuando la distribución de los datos es**

- A) Chi cuadrado

B) Poisson

C) Normal

D) Exponencial

6. **Dentro de los conceptos estadísticos básicos, se define como Media:**

- A. La diferencia entre el valor mayor y el menor de un conjunto de datos.
- B. Valor que tiene mayor frecuencia en un conjunto de datos.
- C. Media aritmética donde se suma todos los datos y se divide por el número total de ellos.
- D. La suma de frecuencia de los valores menores o iguales a un valor dado.

7. **Con relación al valor del coeficiente de correlación entre dos variables:**

- a) Un valor negativo indica que ambas variables aumentan o disminuyen juntas
- b) Puede tener valores desde -1 hasta +1, donde el signo indica la dirección de la relación entre las dos variables
- c) Un valor positivo indica que cuando una variable aumenta la otra disminuye
- d) Un valor de 1 indica que no existe relación lineal

8. **En el campo de la investigación, según su naturaleza, las variables se clasifican en:**

- A) Nominales.
- B) Independientes.
- C) Cuantitativas-cualitativas.

9. **Señale lo falso:**

- A) Si una variable cualitativa solo acepta dos posibilidades se llamará dicotómica
- B) El número de hijos es una variable cuantitativa discreta
- C) Las variables cualitativas proporcionan más información que las cuantitativas



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

D) El nivel de colesterol es una variable cuantitativa continua

10. Los grupos de elementos extraídos de una población de igual configuración es:

A) La muestra de registro.

B) La muestra representativa.

C) La muestra de tiempo.

D) Nada de lo anterior



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases