

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

1. ¿Qué método utilizado en la detección/cuantificación de grasas fecales presenta menor sensibilidad en el diagnóstico de la esteatorrea?
A) Tinción con Sudán III
B) Método titulométrico de Van de Kamer
C) Métodos gravimétricos
D) Prueba de la trioleína-14C
2. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos se usa para el diagnóstico de la anemia perniciosa?:
A) Anti-células parietales
B) Anti-peroxidasa tiroidea
C) Anti receptor de TSH
D) Anti IgGfc
3. La tinción de sudan III es útil para identificar en heces:
A) Sangre oculta.
B) Almidón.
C) Grasas neutras.
D) Proteínas.
4. La presencia de grasas en heces se denomina:
A) Creatorrea.
B) Diarrea.
C) Esteatorrea.
D) Amilorrea.
5. Unas heces inoloras se deben en muchos casos a:
A) Neoplasias.
B) Fístulas anales.
C) Tratamientos antibióticos.
D) Diarreas de fermentación.
6. En el estudio de las heces, ¿qué reactivo se utiliza para demostrar la existencia de polimorfonucleares indicando un proceso inflamatorio?
A) Azul de metileno.
B) Sudán.
C) Azul de Prusia.
D) Lugol.
- 7.Cuál de las siguientes no es una prueba química para la detección de sangre oculta en heces:
A) Primaquina.
B) Bencidina.
C) Guayacon.
D) Piramidón.
8. La calprotectina y la lactoferrina en heces tienen en común:
A) Son proteínas derivadas de los neutrófilos.
B) Se emplean en el diagnóstico de enterocolitis necrotizante del lactante.
C) Su estabilidad en heces es baja.
D) Deben determinarse en heces de 24 horas.
9. El método de Van de Kramer sirve para determinar en el estudio de heces:
A) Sangre oculta.
B) Creatorrea.
C) Esteatorrea.
D) Leucocitos.
10. Para la determinación de leucocitos en heces, usaremos la tinción de:
A) Wright.
B) Sudán III.
C) Verde malaquita.
D) Naranja de acridina.
11. En la determinación de sangre oculta en heces, señale la RESPUESTA INCORRECTA:
A) Las pruebas inmunoquímicas tienen numerosas interferencias.
B) Las pruebas de detección de hemoglobina pueden ser químicas e inmunoquímicas.
C) Las pruebas químicas suelen ser cualitativas.
D) Las pruebas inmunoquímicas pueden ser cualitativas y cuantitativas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

12. Las sales biliares son esenciales para la absorción de:

- A) Lactosa
- B) Hierro
- C) Vitamina B12
- D) Grasas**

13. Para la investigación de la digestión de principios inmediatos en las heces debe seguirse:

- A) Una dieta especial en la que se hayan restringidas las grasas
- B) Una dieta especial a base exclusivamente de proteínas
- C) Una dieta especial a base de almidones y fibras vegetales
- D) La alimentación habitual siempre que contenga grasas, proteínas y almidones**

14. El método de Van Kamer determina:

- A) Lípidos fecales totales.
- B) Cuantificación de grasas totales.**
- C) Malabsorción de grasas.
- D) Titulación de ácidos grasos.

15. ¿Cómo se denomina la presencia de grasa en las heces?:

- A) Melenas.
- B) Lipidosis.
- C) Esteatorrea.**
- D) Grasorrea.

16. La prueba de la sangre oculta en heces será positiva si aparece:

- A) Burbujas.
- B) Una línea rosada.
- C) Un halo azulado.**
- D) Un punto rojo.

17. Señale "lo falso" en relación al test de tolerancia a la lactosa:

- A) Se ingiere una cantidad conocida de lactosa disuelta.

B) Se mide la lactosa en sangre en diferentes tiempos después de la ingesta.

- C) Se busca la deficiencia de lactasa.
- D) El paciente debe estar en ayunas.

18. Señale la respuesta correcta:

- A) La calprotectina fecal no es útil como indicador de actividad en la enfermedad intestinal inflamatoria.
- B) La elastasa fecal se utiliza en el diagnóstico de enfermedades pancreáticas.
- C) La tripsina en heces es útil para el seguimiento de la fibrosis quística del páncreas.
- D) B y C son ciertos.**

19. La determinación de calprotectina fecal es útil para el manejo de:

- A) Insuficiencia pancreática
- B) Malabsorción intestinal.
- C) Insuficiencia hepática
- D) Inflamación intestinal**

20. Para la cuantificación de nutrientes en heces ¿cuál es la técnica más recomendada?

- A) Espectroscopia de Absorción atómica
- B) Espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano
- C) Método basado en la absorción de las moléculas entre 1400 y 2600nm
- D) B y C**

21. La alta fiabilidad de la prueba ha hecho que la quimotripsina fecal sea particularmente útil en la valoración y seguimiento de:

- A) Enfermedad celíaca
- B) El tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas orales
- C) Los niños con fibrosis quística**
- D) Insuficiencia pancreática exocrina leve-moderada



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

22. ¿Qué método utilizado en la detección/cuantificación de grasas fecales presenta menor sensibilidad en el diagnóstico de la esteatorrea?

A) Tinción con Sudán III

B) Método título métrico de Van de Kamer

C) Métodos gravimétricos

D) Prueba de la trioleína-14C

23. La sacarosa es un disacárido formado por:

A) Dos moléculas de glucosa

B) Una molécula de glucosa y una de galactosa

C) Una molécula de glucosa y una de fructosa

D) Una molécula de galactosa y una de fructosa

24. ¿Cuál de los siguientes datos clínico-analíticos es más característico del déficit de disacaridasas intestinales?:

A) Diarrea.

B) pH ácido de las heces.

C) Hipoglucemia.

D) Vómitos

25. ¿Cuál de las siguientes vitaminas se afectaría menos por largos periodos de malabsorción de grasas?:

A) Vitamina A

B) Vitamina C

C) Vitamina D

D) Vitamina E

26. La colestasis prolongada puede provocar déficit de las siguientes vitaminas EXCEPTO:

A) A

B) B

C) D

D) K

27. Cuando hablamos de esteatorrea, nos referimos a:

A) Heces blanquecinas

B) De olor pétrido

C) Contenido en grasas aumentado

D) Poca cantidad

28. El método Van de Kamer es el de referencia para análisis de:

A) Grasas fecales.

B) Proteínas fecales.

C) Proteínas en orina.

D) Hidratos de carbono fecales.

29. Indica la técnica que se emplea para la detección microscópica de grasa en heces:

A) Lugol

B) Sudán III

C) Azul de toluidina

D) Giemsa

30. Para la investigación de sangre en heces, ¿cuál de estas reacciones es más sensible y presenta un menor número de interferencias?

A) Método del piramidón

B) Reacción de bencidina

C) Tabletas reactivas con guayaco

D) Técnica basada en anticuerpos monoclonales

31. Al realizar un estudio de digestión de principios inmediatos mediante examen microscópico de una muestra de heces, añadiendo lugol a la preparación se facilita la investigación de:

A) Grasas neutras

B) Ácidos grasos

C) Proteínas en forma de tejido muscular

D) Hidratos de carbono

32. Para la investigación de la digestión de principios inmediatos en las heces debe seguirse:

A) Una dieta especial en la que se hayan restringidas las grasas

B) Una dieta especial a base exclusivamente de proteínas

C) Una dieta especial a base de almidones y fibras vegetales



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

D) La alimentación habitual siempre que contenga grasas, proteínas y almidones

33. ¿Cuál es el principal biomarcador fecal para diagnóstico y seguimiento de enfermedad inflamatoria intestinal (EII)?

- A) Sangre oculta en heces
- B) Cuerpos reductores
- C) Calprotectina
- D) Determinación de leucocitos en heces

34. ¿Qué nombre reciben las heces pastosas de color negro brillante?

- A) Esteatorrea
- B) Melenas
- C) Amilorrea
- D) Creatorrea

35. En relación a la tinción de Sudán es cierto que:

- A) Los glóbulos de grasa de las heces, al microscopio simple, aparecen de color rojo.
- B) Se emplea en el test del aliento y se puede cuantificar el CO₂ espirado tras ingerir una comida prueba marcada con el colorante Sudán.
- C) Se emplea en el análisis de reflectancia con infrarrojos para ver la malabsorción de grasas.
- D) Se emplea, junto con trioleína marcada, en el test del aliento.

36. La determinación cuantitativa de la excreción de grasas en heces se realiza mediante el test de:

- A) Van de Kamer
- B) Sudán III
- C) Lugol
- D) Azul de Nilo.

37. Es un marcador en heces de enfermedad inflamatoria intestinal uno de los siguientes parámetros:

- A) Osmolaridad.
- B) Calprotectina
- C) Grasa

D) Quimotripsina

38. En el estudio de heces, la presencia de fibras musculares agrupadas en manojos y con abundantes restos de tejido conectivo es característico de:

- A) Insuficiencia gástrica con aquilia.
- B) Insuficiencia pancreática crónica
- C) Tránsito intestinal rápido
- D) Parasitosis.

39. ¿Cómo se llama la presencia de grasa en heces?

- A) Grisorrea
- B) Lipidosis
- C) Esteatorrea
- D) Melenas

40. ¿Para qué sirve el test de Van de Kramer?

- A) Medir nivel de glucosa
- B) Cuantificar la grasa fecal
- C) Detecta la anemia ferropénica
- D) Detecta déficits vitamínicos

41. ¿Cómo se llama la presencia de almidón en heces?

- A) Creatorrea
- B) Amilorrea
- C) Esteatorrea
- D) Melenas

42. La pérdida intestinal de proteínas se valora con:

- A) Van de Kramer
- B) Calprotectina
- C) Alfa 1 antitripsina
- D) Prueba D xilosa

43. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera, en el caso de determinación de sangre en heces?

- A) Debe tomarse abundante cantidad de vitamina C en los días previos a la prueba
- B) Debe tomarse abundante cantidad de carne en los días previos a la prueba



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

- C) No debe tomarse ninguna cantidad de vitamina C
D) Ninguna de las anteriores
44. En condiciones normales, la cantidad de agua diaria que se pierde en las heces es de:
A) 250 ml
B) 200 ml
C) 150 ml
D) 100 ml
45. Una disminución, o ausencia de bilis en las heces, da a éstas un color de:
A) Ladrillo
B) Oro
C) Cemento
D) Yeso
46. La muestra en sangre extraída para la determinación de gastrina requiere:
A) Refrigeración de la muestra en hielo
B) Calentamiento en estufa a 40°C
C) Mantener la muestra a temperatura ambiente
D) Congelación, en nitrógeno líquido
47. En una muestra fecal, en presencia de peroxidasa o pseudoperoxidasa, al añadir peróxido de nitrógeno el indicador es oxidado, originando un compuesto de quinona que, en la técnica con guayaco, genera color:
A) Verde
B) Rojo
C) Amarillo
D) Azul
48. Las sales biliares son esenciales para la absorción de:
A) Lactosa
B) Hierro
C) Vitaminas B12
D) Grasas
49. El reactivo para la determinación de la presencia de almidón en heces es:
A) Sudán III
B) Lugol
C) Ácido acético
D) Bencidina
50. Para la determinación de sustancias reductoras en heces, la muestra:
A) Debe recogerse en medio de conservación
B) Debe ser una muestra fresca
C) Puede guardarse en nevera hasta el siguiente día
D) Puede analizarse al día siguiente pero nunca refrigerarse
51. ¿Qué enzima está elevada en la pancreatitis aguda en el líquido ascítico?
A) Lipasa
B) Amilasa
C) A y B son ciertas
D) Sólo se elevan en la sangre, no el líquido ascítico
52. Para la investigación de sangre en heces, ¿cuál de estas reacciones es más sensible y presenta un menor número de interferencias?
A) Método del piramidón
B) Reacción de bencidina
C) Tabletas reactivas con guayaco
D) Técnicas basadas en anticuerpos monoclonales
53. ¿Cuál de las siguientes determinaciones ha demostrado una mayor utilidad en el screening universal de cáncer de colon rectal?
A) CA19.9
B) CEA
C) Sangre oculta en heces
D) CYFRA 21
54. La amilasa aumenta en:
A) Pancreatitis
B) Parotiditis
C) Embarazo ectópico



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

D) todos ellos

55. En cuanto a la lipasa, es cierto que:

- A) Su determinación no tiene ventajas sobre la amilasa
- B) Es menos específica del páncreas que la amilasa
- C) También se eleva en la hepatitis y la parotiditis
- D) Todas las respuestas son falsas

56. Las proteínas en el estómago:

- A) Se absorben en la sangre y van al músculo a dar energía
- B) Se hidrolizan en sus aminoácidos correspondientes
- C) No se hidrolizan en sus aminoácidos correspondientes
- D) Ninguna respuesta es correcta

57. ¿Qué se entiende por macroamilasemia?

- A) Hiperamilasemia acompañada de hiperamilasuria
- B) Hiperamilasemia acompañada de hiperlipasemia
- C) Corresponde a la actividad de la amilasa detectada en el jugo pancreático
- D) Unión de la amilasa a una globulina sérica formando un complejo macromolecular

58. En ausencia de pancreatitis, es posible encontrar hiperamilasuria en:

- A) Cólico hepático
- B) Parotiditis
- C) Insuficiencia renal
- D) Amigdalitis

59. En una pancreatitis aguda, la hiperamilasemia máxima se alcanza al cabo de:

- A) Un mes
- B) 24-28 h
- C) Una semana
- D) 5 días

60. La amilasa sérica procede del páncreas exocrino y:

- A) Glándulas sudoríparas

B) Glándulas salivares

- C) Páncreas exocrino
- D) Metabolismo hepático

61. El hierro se absorbe por:

- A) Acción del pH ácido del estómago y del ácido ascórbico
- B) Se absorbe como Fe⁺⁺
- C) Al aumentar la ferritina sérica aumenta la absorción de hierro
- D) A y B son ciertas

62. El hierro se absorbe en forma de:

- A) Fe⁺⁺ en el hígado
- B) Fe⁺⁺ en duodeno
- C) Fe⁺⁺⁺ en duodeno
- D) Fe⁺⁺ en íleon

63. Son vitaminas liposolubles:

- A) B12 y ácido fólico
- B) Vit C y vit B12
- C) A, E, D, K
- D) Ácido ascórbico

64. Observaciones del paciente para recoger muestra de heces:

- A) Hacer la recogida en recipientes perfectamente limpios
- B) Mezclar heces y orinas
- C) Llenar el recipiente hasta el borde
- D) A y B son correctas

65. La absorción de la vitB12 depende de:

- A) Factor V
- B) Factor X
- C) Factor intrínseco
- D) Factor extrínseco

66. En la enfermedad celíaca hay una sensibilización a:

- A) Glucosa
- B) Insulina
- C) Gliadina



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

D) Ninguna es correcta

67. Una característica de las fibras musculares

digeridas es:

- A) Aparición de estrías
- B) Extremos cuadrados
- C) Extremos redondeados**
- D) Todas las anteriores son ciertas

68. La aparición de almidón en heces sin digerir se

conoce como:

- A) Creatorrea
- B) Amilorrea**
- C) Esteatorrea
- D) Melenas

69. La aparición de fibras de carne en heces sin digerir

se conoce como:

- A) Creatorrea**
- B) Amilorrea
- C) Esteatorrea
- D) Melenas

70. La prueba del sudor se emplea en el diagnóstico

de:

- A) Enfermedad celíaca
- B) Enfermedades metabólicas
- C) Intolerancia al ejercicio
- D) Fibrosis quística**

71. ¿Qué se determina en el sudor para el diagnóstico de la fibrosis quística?

- A) Cl**
- B) K
- C) Sales biliares
- D) Mg

72. Es una enzima no digestiva del jugo gástrico

- A) Pepsina
- B) Lipasa gástrica
- C) Fosfatasa alcalina**
- D) Todas son ciertas

73. Para obtener una muestra de sudor usaremos

- A) Pilocarpina**
- B) Esfingomielina
- C) Cefalosporina
- D) Glicerina

74. La prueba de Van de Kamer en una muestra de heces, se utiliza para:

- A) La determinación de proteínas.
- B) Determinar la cantidad de grasas.**
- C) Detectar la presencia o ausencia de enzimas pancreáticos.
- D) Realizar el recuento de leucocitos

75. Para detectar alteraciones relacionadas con la función gastrointestinal en una muestra de heces se puede realizar:

- A) La determinación de calprotectina.
- B) El estudio de la sangre oculta.
- C) La determinación de quimotripsina.
- D) Hay más de una respuesta correcta.**

76. Para el diagnóstico de la enfermedad celiaca se realiza la determinación en sangre de:

- A) Gastrina.
- B) Antitransglutaminasa.**
- C) Cobalofilinas.
- D) Albúmina.

77. La calprotectina fecal:

- A) Está disminuida en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
- B) Es una hormona antidiurética.
- C) Es una proteína procedente de los neutrófilos.**
- D) Es una enzima proteolítica liberada por el páncreas

78. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es hidrosoluble?:

- A) Vitamina A.
- B) Vitamina C.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

- C) Vitamina D.
- D) Vitamina E.

79. La esteatorrea es la presencia anormal en heces de:

- A) Hidratos de carbono.
- B) Proteínas.
- C) Grasa.**
- D) Creatinina.

80. La prueba de Apt - Downey se utiliza:

- A) Ante la presencia de sangre en el tracto gastrointestinal o en las heces de los neonatos.**
- B) Para detectar la presencia de amilasa en heces.
- C) Para determinar si el color negro de las heces es debido al consumo de hierro.
- D) Para detectar la presencia de principios inmediatos no digeridos en heces.

81. El análisis de Guayacol en heces se utiliza para:

- A) Detectar la presencia de sangre oculta.**
- B) Determinar la concentración de urobilinógeno.
- C) Determinar la presencia de hidratos de carbono.
- D) Cuantificar los nutrientes en heces.

82. En jóvenes y adultos ¿con qué prueba/s se debe iniciar el diagnóstico serológico de la enfermedad celíaca?

- A) Anticuerpo anti-transglutaminasa IgG
- B) Anticuerpos anti-transglutaminasa IgA
- C) Anticuerpos anti-péptidos deaminados de gliadina
- D) Inmunoglobulina A y anticuerpos anti-transglutaminasa Ig A**

83. Para la detección precoz del cáncer de colon, la prueba de laboratorio que se utiliza como cribado es:

- A) Alfafetoproteína (AFP)
- B) Mutaciones de K-RAS
- C) Sangre oculta en heces**
- D) Antígeno carcinoembrionario (CEA)

84. La determinación de calprotectina fecal es útil para el manejo de:

- A) Insuficiencia pancreática
- B) Malabsorción intestinal
- C) Insuficiencia hepática
- D) Enfermedad inflamatoria intestinal**

85. La tinción de Sudán III es útil para identificar en heces:

- A) Sangre oculta
- B) Grasas neutras**
- C) Almidón
- D) Proteínas

86. Los anticuerpos contra la transglutaminasa tisular se asocian sobre todo a cuál de las siguientes enfermedades autoinmunes:

- A) Artritis reumatoide
- B) Enfermedad celíaca**
- C) Diabetes tipo I
- D) Tiroiditis de Hashimoto

87. Una alteración de las heces hipocólicas puede aparecer por:

- A) Hemorragias.
- B) Ingesta de verduras.
- C) Ausencia de bilis en el intestino.**
- D) Melenas.

88. La cadena lineal de aminoácidos se considera como estructura:

- A) Primaria de las proteínas.**
- B) Secundaria de las proteínas.
- C) Terciaria de las proteínas.
- D) Las proteínas no se componen de aminoácidos.

89. De la medida de la Quimotripsina en heces señale lo correcto:

- A) Se usa únicamente heces de 24 horas.
- B) El método de elección es el RIA (radioinmunoanálisis).



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

C) Valores inferiores a la normalidad indican insuficiencia pancreática exocrina.

D) Se usa en el control diabético.

90. Señale lo correcto de la Elastasa pancreática:

A) Se mide habitualmente en muestra aislada de heces.

B) Es muy usada en el control de la malabsorción de la fibrosis quística del páncreas.

C) Habitualmente se mide por enzoinmunoanálisis.

D) A, B, y C son ciertas.

91. De la Calprotectina en heces es cierto que:

A) Es una proteína muy estable y refrigerada permite demorar su análisis.

B) Es usada para detectar déficit de lactasa.

C) Es usada para detectar inflamación intestinal.

D) A, y C son ciertas.

92. La observación al microscopio de la digestión de proteínas en heces requiere la tinción con:

A) Sudan III.

B) Eosina.

C) Solución yodo/yodurada.

D) Tinta china.

93. Señale lo correcto de los análisis cuantitativos de principios inmediatos en heces

A) Es útil la espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano.

B) La medición de nitrógeno no tiene utilidad.

C) Un fecalograma es la cuantificación de nutrientes en heces.

D) A, y C son ciertas.

94. La Lipoproteinlipasa o Lipasa es una enzima fundamental en el metabolismo de los lípidos. Señale cuál es su función:

A) Esterifica el colesterol libre de la dieta.

B) Hidroliza triglicéridos ingeridos de la dieta y los convierte en ácidos grasos y glicerol.

C) Esterifica el colesterol endógeno.

D) Ninguna de las funciones anteriores.

95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdad, cuando se compara la lipasa y la amilasa?:

A) La amilasa se libera significativamente antes que la lipasa

B) La lipasa se libera significativamente antes que la amilasa.

C) La amilasa es más específica que la lipasa

D) La lipasa es más específica que la amilasa

96. ¿Cuál de los siguientes haplotipos HLA constituye un factor genético de mayor susceptibilidad de padecer enfermedad celiaca?

A) HLA DR 1

B) HLA Aw68

C) HLA DQ2

D) HLA B27

97. La determinación de enzimas pancreáticas en suero (amilasa, lipasa) es esencial en:

A) El diagnóstico de pancreatitis aguda.

B) El diagnóstico de pancreatitis crónica.

C) El diagnóstico de ambas pancreatitis.

D) No tiene una importancia real.

98. La localización de la lipasa como enzima más usual analizada para el diagnóstico clínico es:

A) En las células hepáticas.

B) En el tejido cardíaco.

C) En el páncreas.

D) En el tejido muscular.

99. Los anticuerpos contra la transglutaminasa tisular se asocian sobre todo a cuál de las siguientes enfermedades autoinmunes:

A) Artritis reumatoide

B) Enfermedad celiaca

C) Diabetes tipo I

D) Tiroiditis de Hashimoto



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

100. Si observamos una muestra de heces con tonalidades negras pensaremos:

- A) Que el paciente está tomando hierro.
- B) Que el paciente es vegetariano.
- C) Que el paciente presenta una infección bacteriana.
- D) No se pueden encontrar heces de esta tonalidad.

101. ¿Qué hormona regula la secreción pancreática?

- A) Secretina.
- B) Angiotensina.
- C) Eritropoyetina.
- D) Vasopresina.

102. ¿Cuál es la prueba inicial de elección para la investigación de la Celiaquía?:

- A) Anticuerpos antiendomio IgA.
- B) Anticuerpos antigliadina IgA.
- C) Anticuerpos antitransglutaminasa IgA.
- D) HLA DQ2/DQ8.

103. La mutación en el gen CFTR es responsable de:

- A) El hipotiroidismo congénito.
- B) La fenilcetonuria.
- C) La tirosinemia tipo I.
- D) La fibrosis quística

104. La principal fuente de energía para el organismo es:

- A) Proteínas
- B) Lípidos
- C) Hidratos de carbono
- D) Vitaminas

105. Los estados de oxidación del hierro son:

- A) Se absorbe como Fe 2+ y se transporta como Fe 2+.
- B) Se absorbe como Fe 2+ y se transporta como Fe 3+.
- C) Se absorbe como Fe 3+ y se transporta como Fe 2+.
- D) Se absorbe como Fe 3+ y se transporta como Fe

106. ¿Qué alelos HLA se asocian con mayor susceptibilidad para desarrollar enfermedad celíaca?:

- A) HLA DQ1 y DQ2.
- B) HLA DR2 y DR3.
- C) HLA DR3 y DR4.
- D) HLA DQ2 y DQ8

107. Para la cuantificación de nutrientes en heces, ¿qué técnica es la más recomendada?:

- A) Espectroscopía de absorción atómica.
- B) Espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano.
- C) Método basado en la absorción de las moléculas entre 1400nm y 2600nm.
- D) B y C

108. ¿Cuál de los siguientes hidratos de carbono se considera como disacárido?

- A) Almidón.
- B) Lactosa.
- C) Glucógeno.
- D) Heparina.

109. La gastrina está elevada en:

- A) Síndrome de Zollinger-Ellisón.
- B) Acromegalia.
- C) Waldenstrom.
- D) Tumor de Wilms.

110. Denominamos hematoquecia a:

- A) Aparición de vómitos sanguíneos.
- B) Aparición de heces negras
- C) Aparición de sangre roja brillante en heces.
- D) Hemorroides.

111. El pH de las heces normales tiene valores comprendidos entre:

- A) 5,5 y 6,2.
- B) 6,8 y 7,2.
- C) 7,9 y 8,4.
- D) 8,5 y 9,5.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

112. Una muestra de heces teñida con SUDAN III, es útil para la visualización microscópica de:

- A) Leucocitos
- B) Cuerpos reductores
- C) Grasas**
- D) Almidón

113. ¿Qué tipo de anticuerpos son específicos para determinar celiacía?

- A) Anti-DNA
- B) Anti-SPM
- C) Antitransglutaminasa IgA**
- D) Ninguna es correcta

114. Para eliminar los efectos de una galactosemia detectada en un programa de cribado neonatal, tendremos que eliminar de la dieta:

- A) Grasas
- B) Azúcares
- C) Leche y productos lácteos**
- D) Aminoácidos

115. La acolia se caracteriza por:

- A) Ausencia de urobilinógeno en heces
- B) Ausencia de bilirrubina heces
- C) Ausencia de estercobilinógeno en heces**
- D) Ausencia de biliverdina en heces

116. La determinación de alfa-1-antitripsina en heces se utiliza porque:

- A) Es un importante marcador de la pérdida de proteínas plasmáticas por alteraciones de la permeabilidad intestinal**
- B) Es un marcador de cáncer de esófago
- C) Es un importante marcador del metabolismo de los lípidos
- D) Es un importante marcador de la enfermedad celiaca

117. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) La elastasa fecal sirve para determinar la existencia de posibles alteraciones pancreáticas
- B) La determinación de calprotectina en heces indica el grado de inflamación intestinal
- C) El método del guayaco determina la existencia de sangre oculta en heces
- D) El test de Van de Kamer es un método cualitativo**

118. La principal aplicación de la alfa-amilasa es

- A) El diagnóstico y evolución de los infartos de miocardio
- B) El diagnóstico de las pancreatitis agudas**
- C) La actividad osteoblástica del hueso
- D) El diagnóstico de las enfermedades hepatobiliares

119. El test de Schilling es un análisis que se utiliza para el examen de:

- A) Déficit de ácido fólico
- B) Déficit de vitamina B12**
- C) Déficit de hierro
- D) Talasemia

120. Para la prueba de sangre oculta en heces, ¿cuál diría que es más específica?

- A) Tableta reactivas con guayacol
- B) Tabletas reactivas con ortotolidín
- C) Reacción del perclorato de hierro
- D) Métodos inmunoquímicos**

121. El método de guayaco:

- A) Se basa en la capacidad de la hemoglobina para actuar como peroxidasa y catalizar una reacción entre el peróxido de hidrógeno y un compuesto orgánico cromogénico.**
- B) Detecta las hemorragias digestivas debido a la acción del grupo hemo de las hemoglobinas en contacto con las heces.
- C) Es un método cuantitativo para la determinación de sangre en heces.
- D) A y C son correctas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

122. ¿Cuál de los siguientes parámetros es útil como indicador de actividad en la enfermedad intestinal inflamatoria?

- A) Quimiotripsina
- B) Elastasa
- C) Alfa-1-antritipsina
- D) Calprotectina

123. ¿Qué test puede ayudar a diferenciar entre un déficit de vitamina B12 y uno de Factor intrínseco?

- A) Test de Shotton
- B) Test de Standford
- C) Test de Schilling
- D) Test de Smillie

124. Respecto al síndrome de Zollinger-Ellison, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- A) El pH del jugo gástrico es elevado.
- B) La concentración de gastrina en plasma es elevada.
- C) Se detecta infección por *Helicobacter pylori*.
- D) No se detecta factor intrínseco.

125. El guayacol es un indicador cromogénico, ¿para qué se utiliza en heces?

- A) Detectar la presencia de sangre oculta en heces.
- B) Cuantificar los nutrientes en las heces.
- C) Determinar la presencia de amilasa en heces.
- D) Determinar la presencia de hidratos de carbono en heces.

126. ¿Para qué se utiliza el test de Kleihauer-Betke?

- A) Es un test que cuantifica la hemoglobina fetal en el torrente sanguíneo materno.
- B) Es un test que detecta la hemoglobina S de la anemia falciforme.
- C) Es un test que detecta la hemoglobina C en la anemia hemolítica.
- D) Es un test que detecta la hemoglobina A2 en las talasemias.

127. Señale la respuesta correcta, el test de Schilling determina:

- A) El porcentaje de transferrina sanguínea
- B) La saturación de la hemoglobina
- C) El tamaño medio de los eritrocitos presentes en sangre.
- D) La absorción de Vit. B12.

128. ¿Cuál es la enzima pancreática que se aclara más rápidamente de la circulación y puede volver a la normalidad a las 48-72 horas del comienzo del cuadro clínico de la pancreatitis aguda?:

- A) Amilasa
- B) Lipasa
- C) Tripsina
- D) Elastasa

129. ¿Cuál es la causa más común de las hemorragias digestivas bajas?

- A) Diverticulitis crónicas.
- B) Úlceras de estómago.
- C) Angiodisplasia.
- D) Neoplasia de colon.

130. Para obtener una muestra de jugo gástrico

- A) Provocaremos el vómito del paciente.
- B) Pediremos al paciente que escupa en un tarro.
- C) Colocaremos una sonda nasogástrica.
- D) Todas son falsas.

131. Las heces hipocólicas aparecen por

- A) Melenas.
- B) Hemorragias.
- C) Ingestión de verduras
- D) Ausencia de bilis en el intestino.

132. El método de Van de Kamer nos sirve para determinar en el estudio de heces:

- A) Leucocitos
- B) Esteatorrea
- C) Sangre oculta
- D) Creatorrea



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

133. Unas heces inodoras se deben en muchos casos a

- A) Diarreas de fermentación.
- B) Fístulas anales.
- C) Tratamientos antibióticos.**
- D) Neoplasias.

134. De las siguientes opciones. ¿Cuál es un valor normal de laboratorio?

- A) Estudio de amilasa en plasma 150-160 U/L.
- B) Estudio de amilasa en suero 145-155 U/L.
- C) Estudio de amilasa en suero 0-130 U/L.**
- D) Estudio de amilasa en plasma 140-150 U/L.

135. ¿Qué es falso sobre la fibrosis quística?

- A) Origina una proteína defectuosa, la CFTR que provoca alteraciones en la sínfisis de los canales de cloro
- B) Defecto cromosoma 9**
- C) Enfermedad congénita
- D) Test del sudor: estimulación con pilocarpina para su diagnóstico

136. ¿Dónde se encuentra la amilasa?

- A) Riñón
- B) Hígado
- C) Páncreas**
- D) Corazón

137. ¿Cuál es la causa más común de pancreatitis?

- A) Anemia
- B) Cáncer
- C) Alcohol**
- D) Grasas

138. ¿Qué enzima permanece más tiempo elevada en sangre en una pancreatitis aguda?

- A) Amilasa.
- B) Lipasa.**
- C) Insulina.
- D) Glucagón.

139. ¿Cuál de las siguientes determinaciones se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad celiaca?:

- A) IgD.
- B) La concentración de neutrófilos.
- C) Estudio de poblaciones por citometría de flujo.
- D) La antitransglutaminasa.**

140. En la observación y búsqueda de leucocitos en heces en procesos diarreicos:

- A) Se necesitan tres muestras secuenciales.
- B) La presencia de leucocitos en heces en la evaluación microscópica puede ser la única "pista" acerca de la existencia de inflamación.**
- C) El microscopio debe ser de luz polarizada.
- D) No añade información al clínico.

141. La determinación de calprotectina fecal es útil para el manejo de:

- A) Insuficiencia pancreática.
- B) Malabsorción intestinal.
- C) Insuficiencia hepática.
- D) Inflamación intestinal.**

142. En un examen macroscópico de las heces podemos encontrar:

- A) Grasas.
- B) Cristales.
- C) Trozos de mucosa epitelial.
- D) A y C son ciertas.**

143. La determinación de la homocisteína y ácido metilmalónico se utiliza para detectar el déficit de:

- A) Vitamina B12.**
- B) Vitamina K.
- C) Vitamina D.
- D) Hierro.

144. Una alteración de las heces hipocólicas puede aparecer por:

- A) Hemorragias.
- B) Ingesta de verduras.
- C) Ausencia de bilis en el intestino.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

D) Melenas.

145. No es una prueba química para la detección de sangre oculta en heces:

A) Primaquina.

B) Bencidima.

C) Guayacon.

D) Piramidón.

146. ¿Cómo se denomina la presencia de grasa en las heces?

A) Gratorrea.

B) Esteatorrea.

C) Lipidosis.

D) Melenas.

147. La pérdida de proteínas en heces se denomina:

A) Acolia.

B) Esteatorrea.

C) Creatorrea.

D) A, B y C son correctas.

148. Las heces de color negro se deben a:

A) Dieta vegetariana.

B) Hemorragias digestivas bajas.

C) Estreñimiento.

D) Hemorragias digestivas altas.

149. ¿Cuál es la función de la lipasa pancreática?:

A) Emulsionar las grasas en presencia de sales biliares.

B) Hidrolizar los ésteres de glicerol de los ácidos grasos de cadena larga.

C) Catalizar la hidrólisis de los polisacáridos.

D) Degradar las proteínas.

150. Señale la respuesta incorrecta en referencia a la prueba de la D-xilosa:

A) El paciente ingiere 100 gramos de D-xilosa.

B) Se obtendrán muestras de orina por un período de 5 horas tras la toma de la D-xilosa.

C) El paciente tiene que estar en ayunas.

D) Mide la capacidad de absorción del intestino delgado proximal.

151. La colonoscopia es la prueba diagnóstica más utilizada para el diagnóstico del cáncer colorrectal, esta prueba se realiza:

A) Para todas las personas comprendidas entre 50 y 69 años.

B) Habitualmente en los casos en los que la prueba de sangre oculta en heces sea positiva.

C) No es la prueba diagnóstica más utilizada.

D) Solo en los casos en los que la prueba de sangre oculta en heces sea negativa.

152. ¿La determinación de cuál de las siguientes enzimas podría ser de interés para el diagnóstico de enfermedades del páncreas?

A) ALP.

B) Lipasa.

C) CPK.

D) ALT.

153. ¿Cuál de las siguientes determinaciones ha demostrado mayor utilidad en el cribado del cáncer colorrectal?

A) Ca 19,9.

B) CEA.

C) Sangre oculta en heces.

D) CYFRA 21.

154. El olor de las heces proviene fundamentalmente de:

A) La estercobilina.

B) La urobilina.

C) Los procesos microbianos.

D) El hierro.

155. El reactivo para detectar presencia de almidón en heces es:

A) Sudán III.

B) Lugol.

C) Ácido acético.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

156. ¿Qué queremos valorar con una tinción de Sudán III en heces?:

- A) Grasas.
- B) Almidón.
- C) Leucocitos.

157. Los métodos inmunoquímicos para la detección de sangre en heces tienen en común:

- A) La capacidad de inmunofluorescencia de la hemoglobina debido a su unión con las porfirinas originadas en el colon.
- B) Anticuerpos monoclonales o policlonales específicos para la fracción globina de la hemoglobina humana.
- C) Biomarcadores enzimáticos que producen glucólisis a nivel intestinal.
- D) Isótopos generados por la actividad peroxidasa de la hemoglobina en reacción con la bencidina.

158. Señala la respuesta incorrecta respecto a las funciones del páncreas:

- A) Una función endocrina consiste en producir insulina.
- B) Una función endocrina consiste en producir glucagón.
- C) El Glucagón se produce en las células alfa de los islotes de Langerhans.
- D) La función endocrina consiste en segregar encimas digestivas.

159. ¿Cuál de los siguientes glúcidos es un disacárido?

- A) Fructosa.
- B) Maltosa.
- C) Galactosa.
- D) Glucosa.

160. ¿Para qué se utiliza el test de Van der Kamer en el estudio de las heces?

- A) Determinar la presencia de parásitos intestinales.
- B) Cuantificar las grasas eliminadas por las heces.
- C) Diagnosticar la enfermedad celíaca.

D) Analizar la presencia de glúcidos en las heces.

161. ¿Qué vitamina no es liposoluble?

- A) La vitamina A.
- B) La vitamina D.
- C) La vitamina K.
- D) La vitamina C.

162. ¿Cuál es la prueba más importante para el cribado en la prevención del cáncer de colon?

- A) La prueba de grasas en las heces.
- B) La prueba de sangre oculta en las heces.
- C) La determinación de la calprotectina.
- D) La determinación de la elastasa fecal

163. El método Van de Kamer es de referencia para detectar:

- A) Proteínas fecales.
- B) Grasas fecales.
- C) Hidratos de carbono fecales.

164. En pacientes con colitis ulcerosa crónica, las heces presentan con frecuencia:

- A) Pus, moco y sangre
- B) Restos de simientes y piel de vegetales
- C) Parásitos
- D) Bilis y sulfato de bario

165. Señale la respuesta falsa.

- A) La cantidad normal de heces secretadas diariamente oscila entre 100-200 gramos al día
- B) Con la técnica de Sudán III, las grasas oscuras aparecen como grandes gotas de color verdoso
- C) El color pardo de las heces se debe a la estercobilina y la urobilina
- D) El color verde de las heces se debe a la presencia de biliverdina

166. Respecto al ácido fólico, indique la afirmación correcta:

- A) Es el nombre para una familia de derivados denominados comúnmente como vitamina B12



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

B) Se unen dos proteínas para su transporte plasmático, transcobalamina y haptocorrina.

C) La absorción tiene lugar casi exclusivamente en íleon mediante dos mecanismos.

D) Se puede denominar folato, posee una estructura común de ácido pteroilglutámico.

167. Una de las patologías más frecuentemente asociada a la presencia de sangre oculta en heces es:

A) Cirrosis.

B) Cáncer de colon.

C) Pancreatitis

D) Litiasis Renal.

168. Respecto a la aparición de moco en heces, señale la respuesta incorrecta:

A) En pequeña cantidad es normal

B) El moco sanguinolento puede indicar neoplasia o proceso inflamatorio del canal rectal

C) El moco asociado con pus y sangre se encuentra en colitis ulcerosa y disentería bacilar

D) En heces normales el moco es inexistente

169. El empleo de lugol en el estudio microscópico para la digestión de heces:

A) Es útil para determinar restos de grasa

B) Se utiliza para ver restos de almidón y fibra muscular

C) Se mezcla con Sudan III para ver restos de grasa

D) La observación de restos de almidón indica una correcta digestión de hidratos de carbono

170. La presencia de Almidón sin digerir en las heces se denomina:

A) Calprotectina.

B) Bilirrubina.

C) Amilorrrea.

D) Esteatorrea.

171. Dependiendo de la dieta, ¿cuál es la cantidad normal diaria que se excreta de heces?

A) < 50 g.

B) Entre 150 - 250 g.

C) 1000 g.

D) > 31.

172. ¿Qué magnitud bioquímica es esencial para el diagnóstico de pancreatitis?

A) Amonio.

B) Amilasa.

C) Creatinina.

D) AST.

173. La determinación de Calprotectina en heces es un marcador que se utiliza para descartar:

A) Enfermedad inflamatoria intestinal.

B) Alteración de la absorción de alimentos.

C) Pancreatitis.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

174. Para la realización del test de la D-xilosa se requiere:

A) Muestra de sangre basal y orina elemental.

B) Muestra de sangre a los 60 minutos, tras la ingesta de D-xilosa y orina de 24 h.

C) Muestra de sangre a los 60 minutos, tras la ingesta de D-xilosa. No hace falta la orina.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

175. ¿Qué prueba se emplea para el cribado del cáncer de colon?

A) Sangre oculta en heces.

B) Cuerpos reductores.

C) Determinación de leucocitos en sangre.

D) Calprotectina.

176. Entre otras causas, el déficit de Vitamina B12 puede estar causado por una disminución de las proteínas plasmáticas. Señale que proteína plasmática se asocia a déficit de Vitamina B12:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

A) Disminución de la Proteína Reguladora de Retinol (RBP).

B) Disminución de la Transcobalamina.

C) Disminución de la Proteína C Reactiva.

D) Disminución de la Crioglobulinas.

177. Indique la variante genética del HLA que expresa el 90% de los pacientes celíacos:

A) DQ8

B) DQ2

C) B57

D) B27

E) B12

178. La prueba de sangre oculta en heces:

A) Actualmente es la única prueba recomendada para el cribado de cáncer colorrectal en población general.

B) Es muy específica de enfermedad inflamatoria intestinal.

C) La sensibilidad analítica de los métodos químicos suele ser superior a la de los métodos inmunológicos.

D) Se usa para el diagnóstico de Colitis ulcerosa

E) Los métodos químicos presentan la desventaja de requerir restricción dietética en los 3 días previos al análisis.

179. Para el diagnóstico bioquímico de la Pancreatitis Aguda (PA), señale la correcta.

A) Amilasa y Lipasa son dos enzimas igual de específicas para su diagnóstico.

B) Existen casos de PA donde se puede elevar la lipasa y no la Amilasa.

C) Las transaminasas son los parámetros bioquímicos más adecuados para el diagnóstico de PA

D) La Amilasa y la TBil son fundamentales en el diagnóstico.

E) Todas son falsas.

180. Para la determinación de leucocitos en heces, teñiremos la muestra con:

A) Eosina.

B) Azul de metileno de Loeffler.

C) Verde Jano.

D) Nigrosina.

181. La prueba de sangre oculta en heces, como prueba de cribado:

A) Actualmente la colonoscopia es la prueba recomendada para el cribado de cáncer colorrectal en población general.

B) Es muy específica de enfermedad inflamatoria intestinal.

C) La sensibilidad analítica de los métodos químicos suele ser superior a la de los métodos inmunológicos.

D) Los métodos químicos presentan la desventaja de requerir restricción dietética en los 3 días previos al análisis.

182. Cite cuál es la principal función de la bilis:

A) Intervenir en la digestión de las proteínas.

B) Intervenir en la digestión de los hidratos de carbono.

C) Intervenir en la digestión de las grasas.

D) Intervenir en todo lo citado en las respuestas anteriores.

183. El resultado de amilasa obtenido en el analizador, en un paciente con alta sospecha de pancreatitis aguda, es de -1 UI/L. ¿Cuál sería la primera actitud del técnico/a?

A) Revisar la curva de reacción de la amilasa en el analizador y alarmas.

B) Pedir que extraigan un nuevo espécimen.

C) Informar como resultado < 1 UI/L.

D) Calibrar y pasar controles a la amilasa.

184. La calprotectina:

A) Es una proteína que sintetizan los leucocitos, con actividad bacteriostática y fungistática, que se



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

encuentra en concentraciones elevadas en las heces.

B) Es una proteína que se sintetiza en el hígado y que se elimina, en parte, con las heces.

C) Es una enzima que se encuentra en el jugo pancreático. Concentraciones disminuidas en heces alertarían de una posible alteración pancreática.

185. Sobre la amilasa, indique la respuesta correcta:

A) Se fracciona en ocho isoenzimas.

B) Hidroliza los triglicéridos.

C) Degrada carbohidratos, complejos como el almidón.

D) Se emplea en el diagnóstico de la diabetes mellitus.

186. Indique la opción incorrecta en relación con la esteatorrea:

A) Su presencia indica trastornos de malabsorción.

B) La tinción de Sudán III tiñe de azul los lípidos.

C) Las muestras de casos sospechosos pueden evaluarse microscópicamente.

D) Se muestra en el tránsito intestinal acelerado.

187. Señale la opción correcta sobre la calprotectina:

A) Es un glucolípido que sintetizan los leucocitos.

B) La disminución de su concentración en heces indica inflamación intestinal.

C) Tiene su actividad bacteriostática y fungistática.

D) Su aumento es indicador de alteraciones pancreáticas.

188. Sobre la elastasa I, es incorrecto que:

A) Se determina en heces mediante la titulación de Van de Kamer.

B) La prueba es específica para diferenciar las causas pancreáticas de las no pancreáticas en pacientes con esteatorrea.

C) Es una enzima producida por el páncreas.

D) Es un indicador muy sensible de la insuficiencia pancreática exocrina.

189. El método Van de Kamer -en heces- nos sirve para determinar la presencia de:

A) Leucocitos.

B) Esteatorrea.

C) Creatorrea.

D) Sangre oculta.

190. Sobre la muestra de heces, señale la afirmación correcta:

A) El sangrado del tracto gastrointestinal superior origina heces de color rojo.

B) El color verde de las heces puede deberse a la ingesta de carbón vegetal.

C) Un color arcilloso indica una disminución o ausencia de bilis.

D) El color pardo de las heces se debe a la biliverdina.

191. La tinción usada para observar la presencia de grasas en el estudio microscópico de las heces se llama:

A) Sudán III.

B) Azul de metileno.

C) Lugol.

D) Wright.

192. ¿Qué enzima pediremos al laboratorio si sospechamos de una pancreatitis aguda?

A) Amilasa.

B) Alanina-aminotransferasa.

C) Aspartato-aminotransferasa.

D) Creatinacinasa.

193. En la prueba de la D-xilosa, tras el ayuno y posterior ingesta de 25 g de D-xilosa, se recoge la orina de:

A) 1 hora.

B) 5 horas.

C) 12 horas.

D) 24 horas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

194. Para realizar un examen microscópico de grasas en heces es necesario añadir a la preparación:

- A) Lugol.
- B) Bencidina.
- C) Sudán III.**
- D) Alcohol etílico.

195. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de pancreatitis aguda?:

- A) Traumatismo abdominal.
- B) Ingesta aguda de alcohol.
- C) Abuso crónico del alcohol y enfermedad del tracto biliar.**
- D) Hipertrigliceridemia.

196. La prueba de elección para valorar la integridad de la mucosa intestinal proximal es:

- A) Prueba de la D-Xilosa.**
- B) Prueba de la trioleína.
- C) Prueba del aliento para lactosa.
- D) Prueba de Schilling.

197. La fibrosis quística es una enfermedad de origen genético con tipo de herencia:

- A) Mendeliana autosómica recesiva.**
- B) Mendeliana ligada al sexo.
- C) No es una enfermedad genética.
- D) Mendeliana autosómica dominante.

198. La mutación en el gen CFTR es responsable de:

- A) El hipotiroidismo congénito.
- B) La fenilcetonuria.
- C) La tirosinemia tipo I.
- D) La fibrosis quística**

199. NO se recomienda actualmente, en el estudio de celiaquía, determinar de forma sistemática:

- A) Los anticuerpos antitransglutaminasa IgA.
- B) Los anticuerpos antigliadina nativa.**
- C) Los anticuerpos antiendomiso.
- D) La IgA total.

200. En un paciente que presenta enfermedad celíaca, ¿qué haplotipo supone un factor genético de mayor predisposición a padecerla?:

- A) HLA B27.
- B) HLA DR1.
- C) HLA Aw68.
- D) HLA DQ2**

201. ¿Cuál de los siguientes procedimientos para estudiar la sangre en heces, utiliza un anticuerpo monoclonal con adición de luminol y peróxido de hidrógeno, y permite que las restricciones dietéticas previas a la prueba no sean necesarias?

- A. Enzimoinmunoanálisis.
- B. Método tradicional.
- C. Técnicas inmunoquímicas.
- D. Técnicas de inmunoluminiscencia.**

202. La galactosa es:

- A) Una pentosa.
- B) Una hexosa.**
- C) Una triosa.
- D) Un disacárido

203. El diagnóstico de pancreatitis aguda se basa en un aumento de los niveles de amilasa o lipasa en el suero:

- A) Mayor o igual a 2 veces el límite superior de lo normal.
- B) Mayor o igual a 3 veces el límite superior de lo normal.**
- C) Mayor o igual a 4 veces el límite superior de lo normal.
- D) Mayor o igual a 10 veces el límite superior de lo normal.

204. El marcador serológico más sensible y específico en el diagnóstico de la celiaquía es:

- A) Anticuerpos antigliadina (AGA) de isotipos IgA.
- B) Anticuerpos antigliadina (AGA) de isotipos IgG.
- C) Anticuerpos transglutaminasa Ig A tisular.**
- D) Anticuerpos antiendomiso (EMA) IgA.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

205. Para formar las proteínas, los aminoácidos se unen mediante enlaces:

- A) Hidrófilos.
- B) Peptídicos.**
- C) Hidrofóbicos.
- D) Básicos.

206. La fibrosis quística es debida a una mutación en el gen que codifica:

- A) La enzima 21-hidroxilasa implicada en la función respiratoria.
 - B) La distrofina ligada al cromosoma X.
 - C) El canal de conductancia transmembrana de cloruro, CFTR.**
- El canal de conductancia transmembrana de fluoruro, RFTK.

207. Si se sospecha de una pancreatitis aguda el diagnóstico del laboratorio se basa en:

- A) Determinación en suero de amilasa/lipasa.**
- B) Determinación en sangre de glucógeno y colesterol.
- C) Determinación de fosfatasa alcalina.
- D) Ninguna es correcta.

208. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la clasificación de proteínas según su estructura secundaria?

- A) Proteínas de membrana, proteínas globulares.
- B) Transporte, protección.
- C) Hélice alfa, hélice plegada beta.**
- D) Energética, hormonal.

209. Según su morfología y solubilidad las proteínas fibrosas son:

- A) Solubles en agua.
- B) Insolubles en agua.**
- C) Están plegadas en forma más o menos esféricas.
- D) Su estructura es compacta casi esférica.

210. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la clasificación de proteínas según su estructura secundaria?

- A) Proteínas de membrana, proteínas globulares.
- B) Transporte, protección.
- C) Hélice alfa, hélice plegada beta.**
- D) Energética, hormonal.

211. Respecto a la calprotectina, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

- A) Es una proteína que se sintetiza en los hematíes.
- B) Un aumento de su concentración indica el grado de inflamación intestinal.**
- C) Se encuentra elevada en el sedimento urinario.
- D) Una disminución de su concentración indica un aumento del grado de inflamación intestinal.

212. ¿Cuál es la proteína sintetizada por los leucocitos que se encuentra en concentraciones elevadas en las heces e indica el grado de inflamación intestinal?

- A) Elastasa
- B) Calprotectina**
- C) Quimiotripsina
- D) Alfa-1-antitripsina

213. El diagnóstico de pancreatitis aguda se basa en un aumento de los niveles de amilasa o lipasa en el suero:

- A) Mayor o igual a 2 veces el límite superior de lo normal.
- B) Mayor o igual a 3 veces el límite superior de lo normal.**
- C) Mayor o igual a 4 veces el límite superior de lo normal.
- D) Mayor o igual a 10 veces el límite superior de lo normal.

214. El marcador serológico más sensible y específico en el diagnóstico de la celiaquía es:

- A) Anticuerpos antigliadina (AGA) de isotipos IgA.
- B) Anticuerpos antigliadina (AGA) de isotipos IgG.
- C) Anticuerpos transglutaminasa Ig A tisular.**
- D) Anticuerpos antiendomiso (EMA) IgA.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 4: Función digestiva

215. La galactosa es:

- A) Una pentosa.
- B) Una hexosa.**
- C) Una triosa.
- D) Un disacárido.

216. La alfa-amilasa se encuentra en concentraciones más elevadas en:

- A) Hígado
- B) Páncreas**
- C) Músculo
- D) Hueso



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases