

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

1. La respuesta de hipersensibilidad tipo 1 del sistema inmune se acompaña de eosinofilia. ¿Contra cuál de las siguientes estructuras podría ir dirigida una respuesta tipo 1 adecuada y efectiva?
A) Proteína amiloide
B) Espiroquetas
C) Inhalación de polvo
D) Nematodos
2. Un trasplante entre individuos de la misma especie es un:
A) Autotrasplante
B) Isotrasplante
C) Xenotrasplante
D) Alotrasplante
3. Las células infectadas por virus pueden ser directamente matadas por:
A) C5a
B) Interferón
C) Células NK
D) Eosinófilos
4. ¿Cuál de las siguientes no es una célula del sistema inmune?:
A) Linfocitos.
B) Monocitos.
C) Hematíes.
D) Neutrófilos.
5. El lugar donde maduran y se diferencian los precursores de los linfocitos B en los mamíferos es:
A) Timo.
B) Médula ósea.
C) Bazo.
D) Riñón.
6. Las inmunoglobulinas están constituidas por cadenas ligeras y pesadas. De las siguientes opciones, indicar cuál es una cadena ligera:
A) Alfa.
B) Delta.
C) Mu.
D) Kappa.
7. ¿Qué célula fagocítica desempeña un papel de primer orden en la respuesta inmunitaria?
A) Eosinófilos.
B) Macrófagos.
C) Polimorfonuclear basófilo.
D) Mastocitos.
8. Se considera como evidencia de infección activa la detección de:
A) IgG
B) IGA
C) IgM
D) IgD
9. Dentro del grupo linfoide, son denominados linfocitos helper o colaboradores:
A) Linfocitos B.
B) Linfocitos T8.
C) Linfocitos T4.
D) Células NK.
10. El linfocito T:
A) Se forma principalmente en la respuesta primaria.
B) Es casi exclusiva de la respuesta secundaria.
C) Es el productor de los anticuerpos.
D) Su receptor tiene como función principal reconocer al antígeno.
11. En la citometría de Flujo, para cuantificar los linfocitos B totales se utiliza como marcador:
A) CD23.
B) CD19.
C) HLA-DR.
D) CD3.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

12. ¿Qué autoanticuerpo es específico del Lupus eritematoso sistémico (LES)?

- A) Anti-ENA.
- B) Anti-DNA.**
- C) Anti-Scl70.
- D) Anti-Histona.

13. ¿Cuál es la Inmunoglobulina más abundante en el suero humano?

- A) IgM.
- B) IgD.
- C) IgA.
- D) IgG**

14. En las infestaciones por parásitos es característica:

- A) Eosinofilia.**
- B) Basopenia.
- C) Neutropenia.
- D) Eosinopenia.

15. ¿Qué es el sistema HLA?

- A) Un grupo de moléculas que permite diferenciar unos linfocitos de otros.
- B) Un grupo de antígenos que proporcionan a las células de un individuo su propia especificidad dentro de la especie.**
- C) Un grupo de antígenos que el sistema inmune reconoce en los microorganismos invasores y frente a los cuales desarrolla una respuesta inmune.
- D) Un grupo de genes que determina la diferenciación funcional de los linfocitos.

16. La prueba de Waaler-Rose se aplica para la detección de:

- A) Salmonelosis.
- B) Factores reumatoides.**
- C) Proteína C reactiva.
- D) Brucelosis.

17. Un antígeno es:

A) Molécula de bajo peso molecular capaz de reaccionar con un Ac determinado.

B) Molécula capaz de generar una respuesta del sistema inmunológico cuando penetra en el organismo.

C) Conformación molecular de la superficie del Ag capaz de combinarse específicamente con una zona complementaria que existe en el Ac.

D) Ninguna es cierta.

18. ¿Cuál de las siguientes no es una célula del sistema inmune?

- A) Linfocitos.
- B) Monolitos.
- C) Hematíes.**
- D) Neutrófilos.

19. En los procesos alérgicos encontramos inmunoglobulinas del tipo:

- A) IgA.
- B) IgE.**
- C) IgD.
- D) IgM.

20. La defensa principal contra los organismos intracelulares la constituye:

- A) La inmunidad humoral.
- B) La respuesta inmune celular.**
- C) Las células nulas.
- D) La opsonización.

21. Como ayuda en el diagnóstico de la espondiloartritis anquilosante está indicado el estudio de la presencia de:

- A) Marcadores de superficie.
- B) HLA B8.
- C) HLA B27.**
- D) Complejo mayor de histocompatibilidad.

22. La protección contra los microorganismos intracelulares es proporcionada por:

A) Linfocitos T.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

- B) Anticuerpos.
- C) C3b.
- D) C1q.

23. Paciente varón de 50 años de edad, presenta anticuerpos antimitocondriales (AMA) con un título 1/ 160:

- A) Nos sugieren infección crónica como mononucleosis.
- B) Nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de la cirrosis biliar primaria.
- C) Nos sugiere cirrosis antigua de carácter grave.
- D) Todo dependerá de si el patrón es moteado o periférico.

24. En la defensa inmune contra virus se implican varios mecanismos, indica cuál de los siguientes no se produce al inicio de la infección sino de forma más tardía:

- A) Inmunidad celular específica con multiplicación de los linfocitos T citotóxicos.
- B) Producción de interferón.
- C) Inmunidad humoral con aparición de anticuerpos locales (IgA).
- D) Respuesta inflamatoria inespecífica.

25. Tras un resultado de anticuerpos antinucleares (ANA) positivo, con un título superior a 1 /160, en paciente mujer de 82 años, ¿qué valoración sería la más correcta?

- A) Son indicativos inequívocos de LES
- B) Dada la avanzada edad de la paciente deberíamos repetir la prueba, ya que es muy infrecuente que presente títulos detectables
- C) Deberíamos considerarlo significativo, a pesar de ser mujer de edad avanzada
- D) Descarta en cualquier caso tanto enfermedades autoinmunes sistémicas como limitadas a órganos específicos

26. Señale cuál de estas enfermedades autoinmunes, NO es órgano-específica:

- A) Anemia hemolítica.
- B) Hemoglobinuria paroxística nocturna.
- C) Lupus Eritematoso sistémico.
- D) Diabetes tipo 1.

27. La inmunidad adaptativa humoral está secretada por:

- A) Células diana.
- B) Toxinas.
- C) Células plasmáticas derivadas de los linfocitos B.
- D) Corpúsculos.

28. Respecto a las enfermedades reumáticas autoinmunes, señale la RESPUESTA CORRECTA:

- A) Tienen relación con el complejo mayor de histocompatibilidad.
- B) Afectan solo al aparato locomotor.
- C) En ellas detectamos antígenos que atacan a antígenos propios.
- D) La espondilitis anquilosante no pertenece a este grupo de enfermedades

29. ¿Cuál de estos anticuerpos NO es un anticuerpo antinuclear?

- A) Anti SCL70.
- B) Anti SM.
- C) ANCA.
- D) Anti RO/SSA.

30. ¿Cuál de las siguientes células sanguíneas se encargan de la inmunidad?

- A) Leucocitos.
- B) Plaquetas.
- C) Eritrocitos.
- D) Ninguna de las anteriores.

31. Las inmunoglobulinas son:

- A) Glucoproteínas.
- B) Lipoproteínas.
- C) Fosfoproteínas.
- D) Hidratos de Carbono.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

32. Son funciones de los anticuerpos:

- A) Aglutinar bacterias.
- B) Neutralizar toxinas.
- C) Favorecer la fagocitosis de las bacterias.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.**

33. La histamina es una sustancia que se libera tras la reacción del Ag-Ac y su función es:

- A) Anticoagulante
- B) Inhibir el complemento
- C) Vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular**
- D) Inhibir a los eosinófilos

34. Los leucocitos responsables de la inmunidad humoral son:

- A) Linfocitos B**
- B) Linfocitos T
- C) Neutrófilos
- D) Monocitos

35. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a lo que es un epítipo?

- A) Una sustancia que incrementa la respuesta inmune a un antígeno
- B) La zona del anticuerpo a la que se une un antígeno
- C) La parte del antígeno que es reconocida por su anticuerpo específico**
- D) Una molécula de gran tamaño que puede actuar como antígeno

36. Los anticuerpos anti-Scl 70 son frecuentes en pacientes con:

- A) Artritis reumatoide
- B) Lupus eritematoso sistémico
- C) Esclerodermia**
- D) Anemia perniciosa

37. ¿Dónde radican los lugares de reconocimiento de las inmunoglobulinas?

- A) Las cadenas ligeras

- B) Las cadenas pesadas

C) Fragmento Fab

- D) Fragmento Fac

38. En la vía alternativa del complemento ¿con que factor se une el C3b?

- A) C6
- B) C8
- C) Factor B**
- D) Factor C

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees que es cierta sobre el Lupus eritematoso sistémico?

- A) Es un desorden de carácter contagioso
- B) Es un desorden del sistema inmunológico**
- C) Es un desorden del sistema epidérmico
- D) Es un desorden del sistema nervioso

40. ¿De cuál de los siguientes anticuerpos es característica su presencia en el Lupus eritematoso sistémico?

- A) Anticuerpos anti Fosfolípidos
- B) Anticuerpos anti Gliadina
- C) Anticuerpos anti Nucleares**
- D) Anticuerpos anti TPO

41. El resultado final de los ANA ha sido expresado como positivo 1/160 patrón homogéneo. ¿Cuál ha sido la técnica utilizada para obtenerlo?

- A) ELISA
- B) RIA
- C) IFI**
- D) MEIA

42. Los interferones:

- A) Son un grupo de proteínas importantes en la inflamación.
- B) Son un grupo de sustancias que intervienen en la infección por hongos.
- C) Son bactericidas.
- D) Son proteínas que intervienen en la infección por virus.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

43. Señala el enunciado incorrecto:

- A) Los Ac son específicos para un Ag.
- B) Un Ag puede tener varios Ac específicos.
- C) Cada Ac se acopla a una zona del Ag llamada determinante antigénico.
- D) Cada Ac se acopla a una zona del antígeno denominada idiotipo.

44. Los anticuerpos:

- A) Son fosfolípidos presentes en el suero.
- B) Son producidos en grandes cantidades por las células plasmáticas.
- C) Son proteínas exclusivas de la membrana de los linfocitos T.
- D) No se encuentran en los líquidos orgánicos.

45. ¿Qué inmunoglobulina atraviesa la placenta y da protección al feto?

- A) IgA.
- B) IgG.
- C) IgM.
- D) IgE.

46. El 80% de las inmunoglobulinas corresponde al tipo:

- A) IgG.
- B) IgA.
- C) IgM.
- D) IgD.

47. Señala cuál es una cadena ligera de las inmunoglobulinas:

- A) Alfa.
- B) Lambda.
- C) Delta.
- D) Epsilon.

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los linfocitos T es correcta?

- A) Maduran en el Bazo.

B) Los linfocitos B controlan su producción.

C) No forman parte de la inmunidad celular.

D) Los linfocitos T no reconocen al Ag cuando está libre, sino cuando éste viene presentado por un macrófago.

49. ¿Qué son los inmunocomplejos?

- A) Respuestas inmunes complejas.
- B) Complejos formados por la unión antígeno-anticuerpo.
- C) Complejos formados tras la fagocitosis de microorganismos.
- D) El sistema del complemento.

50. ¿Cuál de las células sanguíneas presenta una función inmunitaria?

- A) Eritrocitos.
- B) Leucocitos.
- C) Plaquetas.
- D) Todas son ciertas.

51. ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas se sintetiza de forma rápida y masiva en la respuesta inmune secundaria?

- A) IgG.
- B) IgD.
- C) IgA.
- D) IgM.

52. En las infecciones crónicas se detectan inmunoglobulinas del tipo:

- A) IgG.
- B) IgM.
- C) IgE.
- D) Todas son correctas

53. El Factor Reumatoide consiste en anticuerpos dirigidos contra la IgG del propio paciente y son anticuerpos de tipo:

- A) IgD.
- B) IgE.
- C) IgG, IgM o IgA.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

D) Ninguno de los anteriores.

54. Los linfocitos CD4+ (Th) reconocen:

- A) Ag (antígenos) unidos a MHC (complejo mayor de histocompatibilidad) clase III.
- B) Ag unidos a MHC clase II.**
- C) Ag unidos a MHC clase I.
- D) Ag mediante sus Ig de superficie.

55. En el complemento, el MAC (Complejo de Ataque a Membrana) está formado por:

- A) Los componentes de la membrana y el 9.
- B) Los componentes 5b al 9.**
- C) Los componentes 1 al 9.
- D) Los componentes 5 al 9.

56. Los Ag (antígenos) endógenos son procesados y presentados al TCR del CD8 por:

- A) MHC (Complejo Mayor de Histocompatibilidad) de clase I.**
- B) MHC de clase II.
- C) MHC de clase III.
- D) Ig (inmunoglobulinas) de superficie.

57. En relación a los Ac (anticuerpos), las variaciones en las regiones constantes, de las cadenas pesadas y ligeras, presentes en todos los individuos sanos de la especie se denominan:

- A) Idiotipos.
- B) Alotipos.
- C) Isotipos.**
- D) Idiotipos públicos.

58. Un componente del complemento con función de opsonización es el fragmento:

- A) C3a.
- B) C3b.**
- C) C4b.
- D) C4b2.

59. La positividad de algunos de los siguientes anticuerpos por su especificidad, es de utilidad

para el diagnóstico de la Artritis Reumatoide. Señálelo:

- A) Anticuerpos Anti Acido Desoxirribonucleico (ADN).
- B) Anticuerpos antinucleares (ANA).
- C) Anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP).**
- D) Anticuerpos antihistonas (proteínas básicas del núcleo celular).

60. ¿Cuál de las siguientes células participa tanto en la respuesta celular como humoral?

- A) Células B
- B) Células T**
- C) Células NK
- D) IgG

61. De los siguientes tipos de células que intervienen en la respuesta inmune, indique el que NO SE ENCUENTRA habitualmente en sangre:

- A) Linfocitos B y T.
- B) Células NK.
- C) Granulocitos.
- D) Mastocitos.**

62. ¿Con cuál de los siguientes autoanticuerpos iniciarías el cribado de enfermedad autoinmune sistémica?:

- A) Anti ENA
- B) Anti IgM
- C) Anti nuclear**
- D) Anti IgG

63. Las inmunoglobulinas más frecuentemente encontradas en la superficie de los linfocitos B como inmunoglobulinas de membrana son:

- A) IgG e IgE
- B) IgA e IgM
- C) IgM e IgD**
- D) IgM e IgE



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

64. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos se usa para el diagnóstico de la anemia perniciosa?:
A) Anti células parietales
 B) Anti peroxidasa tiroidea
 C) Anti receptor de TSH
 D) Anti IgG Fc
65. Los anticuerpos anti-peptido citrulinado cíclico son característicos y ayudan en el diagnóstico de:
 A) Lupus eritematoso sistémico
B) Artritis Reumatoide
 C) Diabetes Mellitus insulino dependiente
 D) Hepatitis autoinmune
66. ¿Cuál de los siguientes hallazgos serológicos aparece con mayor frecuencia en los pacientes con lupus eritematoso sistémico?:
A) Anticuerpos anti DNAn
 B) Anticuerpos anti-Ro/SS-A
 C) Anticuerpos anti-La/SS-B
 D) Anticuerpos anti RNP
67. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no se clasifica como autoinmune?:
 A) Anemia perniciosa
 B) Lupus eritematoso generalizado
C) Hipersensibilidad por contacto
 D) Artritis reumatoide
68. La detección de anticuerpos antinucleares es una técnica de:
A) Inmunofluorescencia indirecta
 B) Técnica de detección de anticuerpos por precipitación en gel
 C) Detección de anticuerpos por Elisa
 D) Detección por Inmunoblotting
69. ¿Cuál de las inmunoglobulinas es secretora?
 A) IgG
 B) IgE
 C) IgD
D) IgA
70. Señale la respuesta correcta:
 A) Los linfocitos B son los responsables de la inmunidad celular.
 B) Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad humoral.
C) Los anticuerpos producidos contra los antígenos "propios" se llaman autoanticuerpos.
 D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
71. De las siguientes inmunoglobulinas, ¿cuál corresponde a una estructura pentamérica?:
 A) Ig A.
 B) Ig E
C) Ig M
 D) Ig D
72. Una de las siguientes sustancias no interviene en la hipersensibilidad tipo I. ¿Cuál?
 A) Histamina.
 B) Heparina.
 C) Serotonina
D) C3a
73. En la respuesta inmune humoral, señala la frase correcta:
A) Las IgA se pueden encontrar en mayor proporción en secreciones como la saliva.
 B) Las inmunoglobulinas tipo IgD son las de mayor tamaño.
 C) La tipo IgG son las de mayor tamaño.
 D) Las IgE suelen aparecer en enfermedades autoinmunes.
74. De los componentes del sistema del complemento, el más abundante es el:
A) C3.
 B) C4.
 C) C5.
 D) C6.
75. En las reacciones de aglutinación directa intentáremos utilizar como anticuerpos:
 A) Ig A
 B) Ig G
C) Ig M



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

D) Ig E

76. La capacidad de una sustancia de inducir una respuesta inmune se denomina propiamente:

A) Inmunogenicidad.

B) Afinidad

C) Antigenidad.

D) Inmunotolerancia

77. ¿Qué es un isoantígeno?

A) Es un Ag extraño a la especie a la que pertenece el organismo

B) Es un Ag propio de la especie, pero extraño al individuo

C) Es un Ag que pertenece al propio individuo

D) Ninguna es correcta

78. Los anticuerpos:

A) Son glicoproteínas presentes en el suero y líquidos del organismo.

B) Son producidos por las células plasmáticas procedentes de los linfocitos T.

C) Son producidos por las células plasmáticas procedentes de los linfocitos B.

D) Son correctas las respuestas a y c.

79. La lisis de las inmunoglobulinas con papaína origina:

A) Dos fragmentos idénticos llamados Fab.

B) Tres fragmentos, dos idénticos Fab y un tercero Fc.

C) Tres fragmentos, dos idénticos Fc y un tercero Fab.

D) Cuatro fragmentos iguales dos a dos, Fab y Fc.

80. En cuanto al sistema del complemento es falso que:

A) La vía clásica se activa por microorganismos o células tumorales.

B) Facilita la eliminación de microbios y células dañadas.

C) Es un importante componente soluble del sistema inmunitario.

D) Todas son ciertas.

81. ¿Cuál de las siguientes frases es falsa en cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad?

A) Está situado en el cromosoma 6.

B) Su función principal es unirse a antígenos con el fin de presentar el antígeno a una célula T apropiada.

C) Los más conocidos son los antígenos eritrocitarios del sistema ABO (HLA de clase II).

D) Los HLA de clase I (A, B y C) se expresan en todas las células nucleadas.

82. En la vía alternativa del complemento ¿con qué factor se une el C3b?:

A) C6

B) C8

C) Factor B

D) Factor C

83. Generalmente, en un paciente que se sospecha síndrome de Sjögren, ¿cuál de los siguientes anticuerpos será más determinante en el diagnóstico?

A) Anti- Sm.

B) Anti- SS-B/LA.

C) Anti-centrómeros.

D) Anti-Jo-1.

84. El fragmento C1s actúa sobre el componente:

A) C4.

B) C3.

C) C5.

D) C6

85. La detección de los anticuerpos anti-Jo-1, ¿para cuál de estos síndromes es más específico?

A) Esclerodermia.

B) Síndrome de CREST.

C) Polimiositis.

D) Lupus.

86. ¿Cuál de las siguientes respuestas es incorrecta?:

A) La IgG no puede traspasar la placenta.

B) La IgE se encuentra en la primera línea de actuación frente a los helmintos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

- C) La IgA es específica de las zonas mucosas.
D) La IgD es una inmunoglobulina con una vida media corta.

87. Con respecto a la respuesta inmune celular señala la respuesta correcta:

- A) Está mediada por anticuerpos.
B) Está mediada por los linfocitos T citotóxicos.
C) Es una inmunidad inespecífica.
D) Todas son correctas.

88. Los anticuerpos protegen al organismo mediante mecanismos de:

- A) Neutralización de toxinas.
B) Opsonización.
C) Activación del sistema complemento.
D) Todas son ciertas.

89. ¿Cómo se denomina la hipersensibilidad de respuesta inmediata en la que intervienen alérgenos, reagentes, basófilos, mastocitos y eosinófilos?:

- A) Tipo I o anafiláctica.**
B) Tipo II o citotóxica.
C) Tipo IV o celular.
D) Tipo V.

90. Señale la afirmación verdadera respecto a los mastocitos:

- A) Se forman en el bazo.
B) Abundan en sangre periférica.
C) Poseen receptores de superficie para IgE.
D) No se encuentran en piel y mucosas.

91. ¿Qué tipo de hipersensibilidad puede darse en las reacciones transfusionales?:

- A) Anafilaxia.
B) Citotóxica.
C) Mediada por inmunocomplejos.
D) Celular o retardada.

92. Señala la correcta:

- A) Las células T helper o CD4 ayudan a los linfocitos B en la producción de anticuerpo.**

B) Las células T supresoras o CD8 regulan de forma positiva la respuesta inmune.

C) El fragmento Fc de las inmunoglobulinas es común en todas ellas.

D) El fragmento Fab de las inmunoglobulinas es variable en todas las inmunoglobulinas.

93. ¿Qué tipo de linfocitos T son los encargados de localizar las células diana?:

- A) Linfocitos Tm.
B) Linfocitos Tc.
C) Linfocitos Ts.
D) Linfocitos Th.

94. En las enfermedades autoinmunes, señala la correcta:

- A) La respuesta inmune está dirigida a células del propio organismo.
B) La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune.
C) Pueden ser generadas por determinados medicamentos.
D) Todas correctas.

95. Señala la afirmación correcta con respecto al sistema del complemento:

- A) Es un conjunto de proteínas que intervienen en la defensa inespecífica del organismo.
B) Participan en los procesos inflamatorios y alérgicos.
C) Destruye el antígeno por fagocitosis.
D) Todas correctas.

96. ¿Cuál de estas enfermedades no es autoinmune?:

- A) Dermatitis.
B) Miastenia gravis.
C) Lupus eritematoso diseminado.
D) Anafilaxia

97. Una técnica muy adecuada para la determinación de los anticuerpos antinucleares es:

- A) Reacción enzimática directa.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

B) Inmunofluorescencia.

- C) Nefelometría.
- D) Hemaglutinación.

98. Un hapteno es:

A) Molécula de bajo peso molecular capaz de reaccionar con un Ac determinado

- B) Molécula capaz de generar una respuesta del sistema inmunológico cuando penetra en el organismo
- C) Conformación molecular de la superficie del Ag capaz de combinarse específicamente con una zona complementaria que existe en el Ac
- D) Ninguna es cierta

99. Epítipo es:

- A) Molécula de bajo peso molecular capaz de reaccionar con un Ac determinado
- B) Molécula capaz de generar una respuesta del sistema inmunológico cuando penetra en el organismo
- C) Conformación molecular de la superficie del Ag capaz de combinarse específicamente con una zona complementaria que existe en el Ac
- D) Ninguna es cierta

100. La inmunidad innata

- A) Se posee desde el momento del nacimiento
- B) La transmite la madre al feto en el primer mes de vida intrauterina
- C) Dura solamente unos meses en el recién nacido
- D) Actúa a través de los Ac monoclonales

101. Respecto al sistema inmunitario innato o inespecífico se puede decir que:

- A) Está mediado por Ac y células
- B) Es la primera barrera de defensa tanto física como bioquímica
- C) Las células más importantes de este sistema son los glóbulos blancos
- D) Las opciones b y c son correctas

102. El sistema inmunitario de adaptación o adquirido:

- A) Se posee desde el nacimiento
- B) Es específico
- C) Es inespecífico
- D) Opciones b y c son correctas

103. El idiotipo de un Ac está determinado por:

- A) La región constante de la cadena ligera
- B) La región variable de la cadena ligera y pesada
- C) La región constante de la cadena ligera y pesada
- D) La región variable de la cadena ligera

104. La IgA:

- A) Activa el complemento por la vía clásica
- B) Activa mastocitos
- C) Es neutralizante en las mucosas
- D) Atraviesa la placenta

105. Señalar la respuesta incorrecta:

- A) Las moléculas de inmunoglobulinas están constituidas por dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes de hidrógeno
- B) Estas cadenas son de dos tipos: ligeras (L) y pesadas (H)
- C) Tanto las cadenas L como H poseen un sector invariable, característico de la inmunoglobulina y un sector variable específico de cada Ac
- D) Existen cinco tipos de inmunoglobulinas

106. La principal inmunoglobulina secretada por el sistema linfático mucoso es:

- A) IgA
- B) IgE
- C) IgM
- D) IgD

107. ¿Cuál corresponde a una estructura pentamérica?

- A) IgA
- B) IgE
- C) IgM
- D) IgD



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

108. ¿Qué inmunoglobulina puede transportarse a través de las barreras mucosas del organismo?

- A) IgA
- B) IgG
- C) IgM
- D) IgE

109. ¿Qué inmunoglobulina encontramos en la leche materna?

- A) IgM
- B) IgA
- C) IgE
- D) IgD

110. En los procesos alérgicos encontramos inmunoglobulina del tipo:

- A) IgA
- B) IgE
- C) IgD
- D) IgM

111. La sustancia con capacidad de reaccionar con su Ac específico, pero no de inducir su síntesis es:

- A) Ag conjugado
- B) Inmunógeno
- C) Hapteno
- D) Adyuvante

112. El fragmento variable de las inmunoglobulinas se denomina:

- A) Fab
- B) Fa
- C) Fac
- D) Fc

113. Los Ac pueden inactivar los Ag por diversas formas:

- A) Por aglutinación
- B) Por precipitación
- C) Por neutralización
- D) Todas son correctas

114. Las Ig están constituidas por cadenas ligeras y pesadas. De las siguientes opciones, indicar cuál es una cadena ligera:

- A) Alfa
- B) Delta
- C) Mu
- D) Lambda

115. Señala cuál es una cadena pesada de las Ig

- A) Alfa
- B) Delta
- C) Mu
- D) Todas son cadenas pesadas

116. En qué lugar se sintetizan la mayor parte de los componentes del complemento:

- A) Sangre
- B) Hígado
- C) Bazo
- D) Páncreas

117. La combinación Ag-Ac es capaz de activar el Sistema del complemento:

- A) A través de la vía clásica
- B) A través de la vía alternativa
- C) Ninguna es verdadera
- D) Las respuestas a y b son correctas

118. Las alergias se caracterizan:

- A) Porque en un primer contacto con el alérgeno no se produce ningún síntoma.
- B) En un primer contacto se origina una activación de los linfocitos B.
- C) Porque en un primer contacto se produce la reacción alérgica.
- D) Todas son correctas.

119. La hipersensibilidad tipo II esta mediada por:

- A) IgE y mastocitos.
- B) IgG y respuestas citolíticas.
- C) Inmunocomplejos.
- D) Linfocitos T.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

120. La hipersensibilidad tipo IV esta mediada por:

- A) IgE y mastocitos.
- B) Inmunocomplejos.
- C) Linfocitos T.**
- D) Linfocitos B.

121. El tratamiento de una hipersensibilidad anafiláctica local consiste en:

- A) Evitar el contacto.
- B) Hiposensibilización (vacunación).
- C) Antihistamínicos.
- D) Todas son correctas.**

122. ¿Dónde se encuentran los mastocitos?

- A) Tejido conectivo del tracto respiratorio y digestivo.
- B) Piel y mucosas.
- C) Órganos linfoides.
- D) Las respuestas a, b y c son correctas.**

123. No es una función de la heparina:

- A) Formación de prurito.**
- B) Anticoagulante.
- C) Estimulación de la fagocitosis.
- d) Inhibir al complemento

124.Cuál es el primer mediador de anafilaxia:

- A) Heparina.
- B) Dopamina.
- C) Serotonina.
- D) Histamina**

125. La reacción del Manteaux (Mycobacterium TBC) es un ejemplo de:

- A) Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica.
- B) Hipersensibilidad tipo II o citotóxica.
- C) Hipersensibilidad tipo III o mediada por inmunocomplejos.
- D) Hipersensibilidad tipo IV, celular o retardada.**

126. Uno de los siguientes efectos es producido por la histamina:

A) Inflamación.

- B) Activación del complemento.
- C) Vasoconstricción.
- D) Coagulación.

127. Los leucocitos responsables de la inmunidad humoral son:

- A) Linfocitos B**
- B) Linfocitos T
- C) Neutrófilos
- D) Monocitos

128. ¿Cuál de las subpoblaciones de linfocitos T proporciona la ayuda necesaria a las células B para que éstas proliferen y se diferencien hacia células productoras de anticuerpos?:

- A) T5
- B) T8
- C) T4**
- D) T10

129. En los anticuerpos, las propiedades biológicas (pasaje placentario, fijación de complemento...) dependen de:

- A) regiones N y e terminales.
- B) fracción Fab.
- C) Peso molecular.
- D) fracción Fc.**

130. Ante una reacción alérgica grave, se debe realizar la determinación de triptasa en suero. Los niveles máximos se alcanzarán:

- A) Entre 15 y 30 minutos del inicio de los síntomas.
- B) Entre 60 y 120 minutos del inicio de los síntomas.**
- C) A las 12 horas del inicio de los síntomas.
- D) A las 24 horas del inicio de los síntomas.

131. ¿Cuál de los siguientes, es un anticuerpo ANTI-ENA?

- A) ANCA.
- B) LKM.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

C) RNP.

D) ASMA.

132. ¿Cuál es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor concentración en la saliva?:

A) IgA.

B) IgE.

C) IgG.

D) IgM

133. ¿Con cuál de los siguientes autoanticuerpos iniciaría el cribado de enfermedad autoinmune sistémica?:

A) Anti ENA.

B) Anti IgM.

C) Anti nuclear.

D) Anti IgG.

134. ¿Qué tipo de molécula HLA de las siguientes no es de clase I?:

A) HLA-A.

B) HLA-C.

C) HLA-DR.

D) HLA-B

135. ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas es la que se sintetiza de manera más precoz?

A) IgM.

B) IgG.

C) IgA.

D) IgE.

136. La enfermedad autoinmune que se manifiesta como una afectación inflamatoria crónica de las glándulas salivales y lagrimales se conoce como:

A) Fenómeno de Raynaud.

B) Síndrome de Sjögren.

C) Enfermedad de Basedow.

D) Enfermedad de Crohn.

137. Las sustancias de bajo peso molecular que no son capaces, por sí mismas, de inducir una respuesta inmune, pero que cuando se unen a moléculas de

peso molecular alto forman conjugados capaces de inducir una respuesta inmune, se denominan:

A) Portadores.

B) Anticuerpos.

C) Antígenos.

D) Haptenos.

138. Los Anticuerpos podemos dividirlos en:

A) Naturales.

B) Inmunes.

C) A y B son correctas.

D) Ninguna es correcta.

139. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es una Enfermedad Autoinmune Sistémica?:

A) Enfermedad de Graves.

B) Diabetes Mellitus tipo 1.

C) Anemia Perniciosa.

D) Síndrome Antifosfolípido.

140. De los parámetros de laboratorio siguientes, cuál NO es característico del Lupus Eritematoso Sistémico (LES):

A) Hipocomplementemia (C3, C4 o CH50).

B) Leucopenia y linfopenia.

C) Anticuerpos anti-ADN nativo-positivos.

D) Leucocitosis.

141. Respecto al Factor Reumatoide, señale la RESPUESTA CORRECTA:

A) Es un anticuerpo de tipo IgM principalmente, que se detecta por nefelometría o ELISA

B) Se detecta en todos los pacientes con Artritis reumatoide

C) Es un lípido perjudicial para la salud

D) Reconoce epítopos localizados en el fragmento Fab de la IgG

142. Señale cuál de las siguientes, NO es una de las principales funciones de los anticuerpos.

A) Neutralización de microorganismos y toxinas

B) Oponización y fagocitosis de microorganismos

C) Activación del complemento



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

D) Activación de la cascada de coagulación

143. ¿Qué tipo de inmunoglobulina aparece primero en la hipersensibilidad inmediata?

- A) IgA
- B) IgD
- C) IgM
- D) IgE**

144. Un paciente con presencia de Anticuerpos Antipéptidos Citrulinados es susceptible de padecer:

- A) Síndrome de Sjögren.
- B) Artritis Reumatoide (AR).**
- C) Esclerosis sistémica.
- D) Lupus eritematoso sistémico.

145. ¿Cuáles son las principales células que participan en la respuesta inmune adquirida?

- A) Macrófago
- B) Linfocitos**
- C) Neutrófilos segmentados
- D) Plaquetas

146. ¿Cuál de estas magnitudes no está relacionada con el diagnóstico del lupus eritematoso?

- A) ANAS
- B) ADN
- C) Anticuerpos antifosfolípido
- D) Renina**

147. ¿Cuál de las inmunoglobulinas séricas siguientes es la más abundante y, además, puede traspasar la barrera placentaria?

- A) IgM
- B) IgG**
- C) IgA
- D) IgE

148. ¿Qué anticuerpo se produce ante la primera exposición a un antígeno?

- A) IgA
- B) IgD

C) IgM

D) IgG

149. Señale cuál de estas inmunoglobulinas atraviesa la placenta:

- A) IgG**
- B) IgM
- C) IgE
- D) IgA

150. En una hepatitis por VHA, los primeros anticuerpos específicos que aparecen son de tipo:

- A) IgM**
- B) IgG
- C) IgE
- D) IgA

151. En la Cirrosis biliar primaria es característica la presencia de:

- A) Anticuerpos antinucleares (ANA).
- B) Anticuerpos antimitocondriales (AMA).**
- C) Anticuerpos antimúsculo liso (AML).
- D) Anticuerpos antiparietales (APA).

152. ¿Cómo se denominan los linfocitos encargados de inhibir la respuesta inmunitaria?

- A) Células T efectoras.
- B) Células T supresoras.**
- C) Células T citotóxicas.
- D) Células T enzimáticas

153. ¿Cómo se denomina la Hipersensibilidad de respuesta inmediata en la que intervienen antígeno, anticuerpo IgE, basófilos, mastocitos y eosinófilos?

- A) Hipersensibilidad tipo III o Anafiláctica.
- B) Hipersensibilidad tipo IV o Retardada.
- C) Hipersensibilidad tipo II o Citotóxica.
- D) Hipersensibilidad tipo I o Anafiláctica.**

154. ¿Qué son los Interferones?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

A) Son un grupo de proteínas importantes en la infección bacteriana, aumentando la expresión de moléculas HLA I y II.

B) Son una clase de leucocitos que pueden reconocer los cambios de la superficie que se producen en algunas células infectadas por virus.

C) Son un grupo de proteínas importantes en la infección vírica, activando células con capacidad para destruir las células diana infectadas.

D) Son un grupo de veinte proteínas séricas que controlan la inflamación.

155. El virus del SIDA se encuentra intracelularmente en:

A) Linfocitos T4.

B) Células de glía.

C) Macrófagos.

D) Todas son correctas.

156. Las IgE intervienen en:

A) Inmunidad fetal.

B) Inmunidad neonatal.

C) Hipersensibilidad inmediata.

D) Hipersensibilidad tardía.

157. ¿Qué tipo de Inmunoglobulina se produce con mayor actividad en mucosas?

A) IgE

B) IgA

C) IgM

D) IgG

158. ¿Qué tipo de anticuerpo es el único que puede atravesar la placenta?

A) IgG

B) IgM

C) IgE

D) IgD

159. Señales los principales fagocitos:

A) Macrófagos

B) Granulocitos neutrófilos

C) Monocitos

D) Todas las anteriores son correctas

160. Respecto al sistema mayor de histocompatibilidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A) Las moléculas HLA clase I forman parte del sistema del complemento.

B) Las moléculas HLA clase II se expresan en todas las células nucleadas del organismo.

C) Los genes del sistema HLA están ubicados en el cromosoma 9.

D) El antígeno HLA-DR2 está relacionado con la esclerosis múltiple.

161. La IgA se produce sobretudo en:

A) La médula ósea

B) El bazo

C) La piel

D) El MALT

162. En la médula de los ganglios linfáticos encontraremos:

A) Linfocitos T exclusivamente

B) Linfocitos T, B y macrófagos

C) Solamente linfocitos NK

D) Células T y macrófagos exclusivamente

163. Señale las principales regiones de una cadena de un anticuerpo:

A) Constante y variable

B) Ligera y pesada

C) Flexible e hipervariable

D) Ligera y flexible

164. ¿Cuál de las siguientes subclases de IgG tiene mayor capacidad de activación del Complemento?:

A) IgG 1.

B) IgG 2.

C) IgG 3.

D) IgG 4.

165. ¿Qué es el sistema HLA?:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

- A) Conjunto de células que permite diferenciar unos leucocitos de otros.
- B) Sistema de marcadores tumorales.
- C) Sistema de antígenos leucocitarios humanos.**
- D) Sistema de genes diferenciador de linfocitos.

166. ¿Qué inmunoglobulina es el principal anticuerpo que se secreta hacia la sangre en las primeras fases de la respuesta inmune primaria?:

- A) IgM.**
- B) IgG.
- C) IgA
- D) IgD

167. ¿Qué célula posee el receptor de IgE de alta afinidad?:

- A) Linfocitos T.
- B) Linfocitos B
- C) Eosinófilos.
- D) Basófilos.**

168. ¿Qué componente del complemento ejerce una función de opsonización?

- A) C3a
- B) C3b**
- C) C5a
- D) C5b
-

169. ¿Qué tipo de hipersensibilidad que se da en las reacciones transfusionales?

- A) Tipo I
- B) Tipo II**
- C) Tipo III
- D) Tipo IV

170. Cuando un individuo se pone en contacto con un antígeno va a ocurrir lo siguiente:

- A) Aparición precoz de anticuerpo específico IgM, cuya concentración es alta y su permanencia corta.
- B) Aparición más tardía de inmunoglobulina IgG.**

- C) Aparición más tardía de inmunoglobulina IgG y su concentración va disminuyendo.
- D) Aparición tardía de anticuerpo específico IgM

171. La anafilaxia se caracteriza por

- A) Presentarse de forma aguda y general.
- B) Se manifiesta por prurito y eritema generalizado.
- C) Puede llegar al colapso.
- D) Todas las respuestas son ciertas.**

172. ¿Qué inmunoglobulina puede transportarse a través de las barreras mucosas del organismo?

- A) IgA**
- B) IgG
- C) IgM
- D) IgE

173. Son antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II:

- A) HLA-B27, HLA-A, HLA-C.
- B) HLA-DR, HLA-DQ, HLA DP.**
- C) HLA-B27, HLA-Bw4, HLA-Bw6.
- D) HLA-E, HLA-F, HLA-G.

174. Las determinaciones de laboratorio más solicitadas desde una consulta de alergología son:

- A) Determinación de IgA, test de activación de basófilos y determinación de IgM específica.
- B) ECP, determinación de IgM, determinación de IgE total.
- C) Determinación de IgE total, determinación de IgE específica y test de activación de basófilos.**
- D) Determinación de IgA, determinación de IgM y ECP.

175. Sobre las inmunoglobulinas IgG podemos afirmar que:

- A) Se segregan en el sudor y la saliva.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

B) Se segregan en fases tempranas de la respuesta inmunitaria primaria.

C) Se asocian con enfermedades por hipersensibilidad inmediata como el asma.

D) Representan el anticuerpo principal de la respuesta inmunitaria secundaria.

176. ¿Cómo se denomina el complejo que expresan los linfocitos B en su membrana capaz de reconocer al antígeno?:

A) TCR.

B) BCR.

C) Sistema complemento.

D) HLA.

177. Señale cuál de las relaciones enfermedad / alelo que predispone a padecerla es correcta:

A) Enfermedad celiaca / HLA-A1.

B) Espondilitis anquilosante / HLA-B27.

C) Miastenia gravis / HLA-A5.

D) Diabetes mellitus / HLA-B3.

178. La principal función de los eosinófilos es:

A) Fagocitar bacterias.

B) Intervenir en la inmunidad antitumoral.

C) Pasar a los tejidos y transformarse en macrófagos.

D) Intervenir en reacciones alérgicas y antiparasitarias.

179. La inmunoglobulina M:

A) Suele aparecer en momentos precoces de la infección.

B) Es el anticuerpo que se produce en reacciones alérgicas agudas.

C) Solo indica que ha habido una infección pasada o crónica.

D) No se encuentra en la sangre.

180. Las células que atacan la membrana plasmática de células del propio organismo infectadas o que puedan ser cancerígenas, se denominan:

A) Células NK (Natural Killer).

B) Plaquetas.

C) Basófilos.

D) Eosinófilos.

181. Para realizar estudios de histocompatibilidad, se puede utilizar:

A) La técnica de microlinfocitotoxicidad.

B) La prueba cruzada o cross-match.

C) La detección de anticuerpos anti-HLA.

D) Hay más de una respuesta correcta.

182. ¿Qué célula puede producir anticuerpos?

A) Células NK

B) Células T

C) Macrófagos

D) Células plasmáticas

183. No se considera una vía de activación del sistema del complemento:

A) Vía clásica.

B) Vía linfocítica.

C) Vía alternativa.

D) Vía de las lectinas.

184. El antígeno es:

A) Un anticuerpo.

B) Una sustancia producida por los linfocitos.

C) Una sustancia extraña al organismo.

D) Un complejo antígeno-anticuerpo.

185. ¿Qué inmunoglobulina tiene la capacidad de traspasar la placenta humana?:

A) IgA.

B) IgD.

C) IgM.

D) IgG.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

186. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto a la Hipersensibilidad Tipo II?:

- A) Aparece cuando un Ac (IgG, IgM) se enfrenta a sus Ag correspondientes situados en la membrana de una célula provocando su destrucción.
- B) Son reacciones que aparecen en minutos u horas.
- C) Puede darse en trasplantes de órganos.
- D) Se libera histamina y heparina.

187. ¿Con qué componente se activa la vía alternativa del sistema complemento?:

- A) C1.
- B) C2.
- C) C3.
- D) C4.

188. Pedro, paciente de 52 años ingresado con Covid-19, ha participado en un estudio en el que se le administraba interferón beta (IFN-beta) como parte del tratamiento. El IFN-beta pertenece a un tipo de interferones ampliamente estudiados y que en la actualidad se utilizan como agentes terapéuticos para diversas enfermedades. Señale la respuesta correcta en relación al IFN- beta:

- A) El IFN - beta es un interferón de tipo II que se usa para tratar la hepatitis C.
- B) El IFN-beta es un interferón de tipo I que se usa para tratar la esclerosis múltiple.
- C) El IFN- beta es un interferón de tipo II y el que se usa con más frecuencia en el tratamiento del cáncer.
- D) El IFN- beta es un interferón de tipo I que junto con el IFN- gamma es una de las citoquinas más importantes de la inmunidad en la tuberculosis pulmonar.

189. Recientemente he sido diagnosticada de una deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Ha sido un hallazgo casual y afortunadamente soy

asintomática. En relación a la IgA soy conocedora de que:

- A) Esta inmunoglobulina atraviesa la placenta.
- B) La deficiencia selectiva de IgA es la inmunodeficiencia primaria más común.
- C) De las 5 inmunoglobulinas principales, es la que presenta menor concentración sérica.
- D) Se encuentra principalmente en las secreciones, en este caso en forma de monómero.

190. Señale la opción correcta en relación a la estructura de las inmunoglobulinas en una persona sana:

- A) Existen 5 tipos diferentes de cadenas ligeras: alfa, mu, delta, gamma y épsilon.
- B) Existen 2 tipos de cadenas pesadas: kappa y lambda.
- C) En una misma molécula de inmunoglobulina las cadenas ligeras son del mismo tipo.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

191. Señale la respuesta FALSA en relación al Sistema del Complemento:

- A) Existen tres vías de actuación: la clásica, la alternativa y la de las lectinas.
- B) Es un sistema termolábil.
- C) Una característica de la vía clásica es su capacidad de perpetuar la producción de C3b.
- D) Una vez que se forma C3b por cualquiera de las vías, la vía alternativa actúa como un bucle de amplificación, incrementando la producción de C3b rápidamente.

192. Sobre el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) NO es cierto que:

- A) Los genes que lo determinan se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6.
- B) Los linfocitos T CD8+ reconocen antígenos en el contexto de las moléculas de clase I del MHC.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

C) Los linfocitos T CD4+ reconocen antígenos en el contexto de las moléculas de clase II del MHC.

D) Las moléculas de clase II se localizan en la membrana de, prácticamente, todas las células nucleadas.

193. Todas EXCEPTO una son vías de activación del complemento:

A) Ruta de las lectinas.

B) Vía clásica.

C) Vía alternativa.

D) Ruta opsonizante.

194. La inmunoglobulina característica de las reacciones alérgicas es:

A) IgG.

B) IgE.

C) IgM.

D) IgA.

195. Un paciente que presenta Anticuerpos Antipéptidos Citrulinados Cíclicos (anti-CCP) es susceptible de padecer:

A) Artritis Reumatoide.

B) Lupus eritematoso sistémico.

C) Miastenia gravis.

D) Enfermedad de Graves.

196. De las reacciones de hipersensibilidad, ¿cuál está mediada por la IgE?

A) Hipersensibilidad tipo I.

B) Hipersensibilidad tipo II.

C) Hipersensibilidad tipo III.

D) Hipersensibilidad tipo IV.

197. ¿Cuál NO es una vía de activación del complemento?

A) Vías de las lectinas.

B) Vía alternativa.

C) Vía común.

D) Vía clásica.

198. En una infección vírica aguda, en sangre predominan:

A) Basófilos.

B) Neutrófilos.

C) Linfocitos.

199. ¿Cuál es la primera inmunoglobulina sintetizada implicada en la respuesta humoral primaria?:

A) IgD.

B) IgG.

C) IgM.

200. La acción de las inmunoglobulinas como anticuerpo es reconocer un determinado antígeno y combinarse con él. Esto depende de:

A) La región constante de la inmunoglobulina.

B) La región variable de la inmunoglobulina.

C) Las cadenas pesadas de la inmunoglobulina.

201. ¿Cuáles son las tres vías fundamentales de activación del complemento?:

A) Vía de las convertasas, vía adaptativa, vía innata.

B) Vía de las lectinas, vía clásica, vía alternativa.

C) Vía multiproteica, vía enzimática, vía lítica.

202. Cuando hablamos de hipersensibilidad de tipo Celular o retardada nos referimos a:

A) Hipersensibilidad de grado II.

B) Hipersensibilidad de grado III.

C) Hipersensibilidad de grado IV.

D) Ninguna es correcta.

203. ¿Cuál es la función principal de las células T citotóxicas?

A) Producción de anticuerpos.

B) Actuar como células presentadoras de antígenos.

C) Activar a los linfocitos B.

D) Destruir las células infectadas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

204. Las inmunoglobulinas están formadas por:

- A) Cuatro cadenas polipeptídicas: Dos pesadas y dos ligeras.
- B) Dos cadenas polipeptídicas: Una pesada y otra ligera.
- C) Tres cadenas polipeptídicas: Dos pesadas y una ligera.
- D) Cuatro cadenas polipeptídicas: Una pesada y tres ligeras.

205. ¿Cuál es la principal función de los neutrófilos?

- A) Controla las infecciones parasitarias.
- B) Vigilancia inmunitaria.
- C) La fagocitosis.
- D) Controla las reacciones anafilácticas.

206. ¿Qué sistema de grupo sanguíneo es el responsable de la enfermedad del injerto contra el huésped?

- A) ABO.
- B) Rh.
- C) HLA.
- D) HPA.

207. Algunos trastornos del sistema inmunitario se deben a una mala regulación de las interacciones entre las células del sistema inmune mediadas por citoquinas. ¿Cuál de las siguientes moléculas se incluye entre ellas?

- A) Interleukinas.
- B) Factores de necrosis tumoral.
- C) Interferones.
- D) Todas las anteriores.

208. Las enfermedades autoinmunes se caracterizan por:

- A) Producción de Ac o linfocitos T autorreactivos.
- B) Producción de Ac o linfocitos T hiperreactivos.
- C) Producción de Ac o linfocitos T hiporreactivos.
- D) Producción de Ag o linfocitos B autorreactivos.

209. ¿Qué son las opsoninas?

- A) Reguladores del desarrollo hematopoyético de la serie linfóide.
- B) Factores de la vía extrínseca de la coagulación.
- C) Antígenos de superficie de parásitos intracelulares.
- D) Moléculas que facilitan la unión del fagocito al microorganismo.

210. En el sistema inmunitario ¿cómo son conocidos los ganglios linfáticos, bazo y amígdalas?

- A) Órganos linfáticos primarios.
- B) Órganos linfáticos secundarios.
- C) Órganos linfáticos terciarios.
- D) Órganos linfáticos básicos.

211. ¿Qué tipo de linfocito se ve implicado en la respuesta inmunitaria innata?

- A) Linfocito B.
- B) Linfocito T.
- C) Linfocito NK.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

212. ¿Qué técnica se utiliza para determinar la tipificación del HLA?

- A) Aglutinación.
- B) Inmunodifusión.
- C) Precipitación.
- D) Microlinfocitotoxicidad.

213. Los anticuerpos son...

- A) ...lípidos.
- B) ...glúcidos.
- C) ...glucoproteínas.
- D) ...lipoproteínas.

214. ¿Cuál es la primera barrera contra las agresiones externas?

- A) El macrófago.
- B) La célula estrellada.
- C) Los anticuerpos monoclonales.
- D) La piel.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

215. ¿Cómo se encuentra la cifra de inmunoglobulinas en los enfermos con Lupus eritematoso sistémico?

- A) Aumentada.
- B) Disminuida.
- C) No experimenta variación.

216. ¿Cómo se denomina la máxima dilución de un Ac que da una reacción medible con un Ag?

- A) Afinidad.
- B) Especificidad.
- C) Título.

217. Una técnica adecuada para la determinación de los anticuerpos antinucleares es:

- A) Inmunodifusión radial.
- B) Inmunofluorescencia indirecta.
- C) Nefelometría.
- D) Hemaglutinación.

218. Señale la falsa:

- A) En los órganos linfoides primarios se originan los linfocitos B y T.
- B) Los linfocitos B maduran en la médula ósea.
- C) Los linfocitos T maduran en el timo.
- D) Los linfocitos T son células que se ocupan de la formación de anticuerpos.

219. ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas es una proteína pentamérica?

- A) IgA
- B) IgG
- C) IgM
- D) IgE

220. La inmunidad natural, también es conocida como:

- A) Inmunidad innata.
- B) Inmunidad específica.
- C) Inmunidad adquirida.
- D) Inmunidad adaptativa.

221. Los anticuerpos antitopoisomerasa I, son prácticamente específicos de la ES (Esclerosis Sistémica) también conocidos como:

- A) Scl-70.
- B) ICA.
- C) IAA.
- D) GADA.

222. ¿Cuál de los siguientes es un órgano linfoide primario?

- A) Timo.
- B) Bazo.
- C) Ganglios linfáticos.
- D) Amígdalas.

223. En la respuesta inmunitaria humoral primaria, al tiempo que tarda el organismo en seleccionar un clon específico de LB y producir células plasmáticas secretoras de anticuerpos se denomina:

- A) Periodo ventana.
- B) Seroconversión.
- C) Seroincremento.
- D) Fase de retardo.

224. ¿En qué células son producidas las inmunoglobulinas?

- A) Linfocitos NK
- B) Macrófagos
- C) Linfocitos T
- D) Linfocitos B

225. La enfermedad autoinmune caracterizada por cursar con debilidad muscular episódica, ptosis palpebral, diplopía y gran fatiga de los músculos tras realizar ejercicio, se denomina:

- A) Anemia perniciosa autoinmune.
- B) Miastenia gravis.
- C) Tiroiditis de Hashimoto.
- D) Síndrome de Goodpasture.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

226. La hipersensibilidad de Tipo 1 está mediada por:

- A) IgG
- B) IgM
- C) IgA
- D) IgE

227. En cuál de las siguientes enfermedades están significativamente elevados los anticuerpos antinucleares (ANA):

- A) Leucemia mieloblástica aguda
- B) Enfermedad de Van Willebrand
- C) Lupus eritematoso sistémico
- D) VIH

228. ¿Qué tipo de microscopio usaría para el estudio de enfermedades autoinmunes a través de la visualización de anticuerpos antinucleares (ANA) en portas con células Hep-2?

- A) Microscopio óptico
- B) Microscopio de luz polarizada
- C) Microscopio de fluorescencia
- D) Microscopio de contraste de fases

229. El eritema malar en "alas de mariposa" es una lesión característica de:

- A) Artritis Juvenil.
- B) Lupus Eritematoso Sistémico.
- C) Síndrome de Sjögren.
- D) Enfermedad de Still del adulto.

230. Con respecto a la inmunidad innata, señale la respuesta correcta:

- A) Integra a células fagocíticas y natural killer.
- B) Sus principales células son los linfocitos T y B.
- C) Da lugar a respuestas en las que produce la formación de anticuerpos.
- D) La vía del complemento no es uno de sus mecanismos efectores.

231. Las principales células presentadoras de antígeno son:

- A) Linfocitos B y neutrófilos.
- B) Linfocitos B, macrófagos y células dendríticas.
- C) Células de Langerhans, linfocitos B y macrófagos.
- D) Mastocitos y células dendríticas.

232. Los principales linfocitos T que interaccionan con los linfocitos B son:

- A) Linfocitos T citotóxicos.
- B) Linfocitos T supresores.
- C) Linfocitos T cooperadores.
- D) Linfocitos T de memoria.

233. ¿Cuál de las siguientes células inmunes NO suele circular en sangre?

- A) Monocito.
- B) Eosinófilo.
- C) Macrófago.
- D) Neutrófilo.

234. La maduración de los linfocitos T tiene lugar:

- A) En el timo.
- B) En la médula ósea.
- C) En el bazo.
- D) En los ganglios linfáticos.

235. Es la principal inmunoglobulina en el suero del adulto:

- A) IgM.
- B) IgG.
- C) IgA.
- D) IgE.

236. La enfermedad crónica e inflamatoria del músculo esquelético se denomina:

- A) Polimiositis.
- B) Poliartrosis.
- C) Poliartritis.
- D) Artritis reumatoide.

237. Tienen gran capacidad para fijar el complemento por la vía clásica:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

- A) IgE e IgA.
- B) IgM e IgE.
- C) IgM e IgG.**
- D) IgG e IgA.

238. Es la principal inmunoglobulina secretada durante los fenómenos de hipersensibilidad:

- A) IgG.
- B) IgM.
- C) IgA.
- D) IgE.**

239. NO es una función propia de las inmunoglobulinas:

- A) Neutralización de microorganismos patógenos.
- B) Activación de la vía del complemento.
- C) Opsonización.
- D) Mediadores de la inflamación.**

240. Las células naturales killer:

- A) No se consideran linfocitos.
- B) Son fundamentales en la respuesta inmune adaptativa.
- C) Ejercen su función por medio de la fagocitosis.
- D) Reconocen y destruyen células infectadas y tumorales.**

241. ¿Cuál de los siguientes órganos se considera linfoide primario?

- A) Bazo.
- B) Ganglios linfáticos.
- C) Tejido linfoide.
- D) Timo.**

242. La hipersensibilidad de tipo I -ó anafiláctica- está mediada por:

- A) IgG y respuestas citolíticas.
- B) Por linfocitos T.
- C) Por IgE y mastocitos.**
- D) Por inmunocomplementos.

243. La primera línea de defensa frente a agentes infecciosos esta mediada por:

- A) Inmunidad adaptativa.
- B) Inmunidad humoral.
- C) Inmunidad innata.**
- D) Inmunidad celular.

244. Cuando hablamos de un trasplante o injerto entre individuos de diferentes especies, nos referimos a:

- A) Trasplante entre mellizos.
- B) Trasplante del mismo individuo.
- C) Trasplante alogénico.
- D) Trasplante xenogénico.**

245. La hipersensibilidad de tipo I ó anafiláctica está mediada:

- A) Por IgG y respuestas citolíticas.
- B) Por linfocitos T.
- C) Por IgE y mastocitos.**
- D) Por inmunocomplementos.

246. La inmunoglobulina más abundante en el suero humano es:

- A) IgM.
- B) IgG.**
- C) IgE.
- D) IgA.

247. Señale las inmunoglobulinas que activan la vía clásica del complemento:

- A) IgG e IgA.
- B) IgM e IgG.**
- C) IgM e IgE.

248. ¿Cuál de las subpoblaciones de linfocitos T proporciona la ayuda necesaria a las células B para que estas proliferen y se diferencien hacia células productoras de anticuerpos?

- A) T4.**
- B) T5.
- C) T8.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

249. La inmunidad celular depende de los:

- A) Neutrófilos.
- B) Linfocitos T.**
- C) Linfocitos B.

250. El sistema mononuclear fagocitario hepático está compuesto por:

- A) Las células de Langerhans.
- B) Las células de Kupffer.**
- C) Los histiocitos.
- D) Las células dendríticas.

251. Señale la opción correcta en cuanto a las diferencias entre la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune secundaria:

- A) La respuesta inmune primaria es de mayor intensidad que la secundaria.
- B) En la respuesta primaria predomina la IgM mientras que en la secundaria predomina la IgG.**
- C) En la respuesta primaria predomina la IgG mientras que en la secundaria predomina la IgM.
- D) La respuesta primaria es cuantitativa y cualitativa, y la respuesta secundaria solamente cualitativa.

252. Las moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) clase I y II son reconocidas respectivamente por:

- A) El receptor de linfocitos Th1 y Th2.
- B) El receptor de linfocitos CD8+ y CD4+.**
- C) El receptor de los linfocitos B y receptor de los linfocitos T.
- D) El receptor de linfocitos CD4+ y CD8+.

253. ¿Qué células del sistema leucocitario poseen el fenómeno de la fagocitosis?

- A) Basófilos.
- B) Neutrófilos.**
- C) Eosinófilos.

254. Son órganos linfoides secundarios:

- A) Ganglios linfáticos, timo, bazo.
- B) Ganglios linfáticos, medula ósea, bazo.
- C) Médula ósea, timo y tejidos linfoides asociados a mucosas.
- D) Ganglios linfáticos, bazo, tejidos linfoides asociados a mucosas.**

255. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. ¿A qué células presentan los antígenos?

- A) A los linfocitos T CD4 y T CD8.**
- B) A los linfocitos T efectores.
- C) A los linfocitos B.
- D) A los macrófagos.

256. ¿Qué prueba farmacogenética se usa para el seguimiento del HIV?

- A) HLA B27.
- B) HLA DQ 2.
- C) HLA B5701.**

257. ¿Qué son las células de Kupffer?

- A) Células perisinusoidales.
- B) Células epiteliales de los conductos biliares.
- C) Células fagocíticas del sistema reticuloendoplásmico.**

258. La activación del complemento por la vía de las lectinas se inicia con:

- A) La unión de la proteína MBL a azúcares de la superficie de las bacterias.**
- B) La escisión espontánea de C3 en C3a y C3b.
- C) La unión de C1q a anticuerpos.
- D) La escisión del factor B en Ba y Bb por parte del factor D.

259. En el tratamiento de la infección por VIH con antivirales se realizará la determinación previa del antígeno HLA B*5701 para prevenir reacciones de hipersensibilidad graves de que fármaco?

- A) Lopinavir.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

B) Lamiduvina.

C) Ritonavir.

D) Abcavir

260. La enfermedad mixta del tejido conectivo se caracteriza por la presencia de los siguientes anticuerpos:

A) títulos elevados de anti-RNP.

B) títulos elevados de anti-sm.

C) títulos elevados de anti-ssb.

D) títulos elevados de anticuerpos antimitocondriales.

261. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos se usa para el diagnóstico de la anemia perniciosa?:

A) Anti células parietales.

B) Anti peroxidasa tiroidea.

C) Anti receptor de TSH.

D) Anti IgG Fc.

262. El HLA-B*27 positivo está altamente asociado a pacientes con:

A) Enfermedad inflamatoria intestinal con espondilitis.

B) Espondilitis anquilosante.

C) Uveítis anterior aguda.

D) En todas las anteriores

263. El antígeno HLA fuertemente asociado a la espondilitis anquilosante es:

A) HLA-B27

B) HLA-DR4

C) HLA-B5

D) HLA-B57

264. Respecto a la citometría de flujo, es FALSO:

A) Clasifica células en función de su tamaño y complejidad celular.

B) Es utilizado para la determinación de subpoblaciones leucocitarias.

C) Se puede utilizar para la determinación de subpoblaciones eritrocitarias.

D) No es posible la determinación del antígeno HLA B27 por citometría de flujo.

265. Qué parámetro sería la prueba más útil y sencilla en el diagnóstico de la anafilaxia desde el punto de vista del laboratorio:

A) Histamina.

B) IgE específica.

C) Triptasa.

D) Test de activación de basófilos.

266. En la actualidad se disponen de distintas pruebas in vitro para detectar una reacción de hipersensibilidad de tipo I o inmediata. De las pruebas que se detallan a continuación son todas válidas, excepto:

A) Triptasa.

B) Test de transformación linfoblástica (TTL).

C) Determinación de IgE específica.

D) Test de activación de Basófilos.

267. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos son los más específicos de la esclerodermia sistémica progresiva?:

A) Anticentrómero.

B) Anti-Scl 70.

C) Anti-Sm.

D) Anticentriolo.

268. La vía clásica de activación del complemento se inicia mediante la interacción del antígeno con el anticuerpo fijador de C1, esta reacción activa otra fracción del complemento. ¿Cuál es esta fracción?:

A) C2

B) C3a

C) C4

D) C3b



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

269. Las técnicas que se basan en la detección del interferón gamma (IGRA):
- A) No son fáciles de estandarizar ni de aplicar en el laboratorio.
 - B) No evita la subjetividad de la interpretación en la lectura del resultado.
 - C) No incorpora controles positivos, por lo que evitamos errores de lectura.
 - D) Permiten discriminar a los individuos infectados por *Mycobacterium tuberculosis* de los vacunados por BCG y de los infectados por la mayoría de otras especies de micobacterias.
270. La primera línea celular inmunológica de defensa es constituida por:
- A) Linfocitos B
 - B) Linfocitos T
 - C) Linfocitos NK
 - D) Macrófagos
271. ¿Cuántas cadenas tiene un anticuerpo?
- A) 1
 - B) 2
 - C) 3
 - D) 4
272. La inmunidad celular está mediada por:
- A) Los linfocitos T.
 - B) Los linfocitos B.
 - C) Los eosinófilos.
 - D) Los mielocitos.
273. Sobre qué tipo de célula se hace el estudio microscópico de una inmunofluorescencia indirecta de anticuerpos antinucleares:
- a) MRC-5
 - b) HeLa
 - c) HEp2
 - d) A549
274. En referencia a las hipersensibilidades inmunológicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) El tipo I da reacciones en las que los Ag son neutralizados por IgG.
 - b) El tipo III da reacciones Ag-Ac y produce inmunocomplejos circulantes.
 - c) El tipo IV da reacciones de anticuerpos tipo IgM e IgE.
 - d) El tipo IV da reacciones en las que los Ag se neutralizan específicamente con las IgA.
275. Muchas enfermedades autoinmunes se asocian a la presencia de moléculas de antígeno leucocitario humano (HLA). ¿Cuál de estas asociaciones es la correcta?
- a) HLA DR4 se relaciona con la esclerosis múltiple.
 - b) HLA DR2 se relaciona con la artritis reumatoide.
 - c) HLA DR4 se relaciona con el síndrome de Reteiter.
 - d) HLA DR3 se relaciona con la enfermedad de Graves.
276. En referencia a los tipos de inmunidades, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
- a) La innata es específica y mediada por anticuerpos.
 - b) La celular es adaptativa y mediada por linfocitos T.
 - c) La humoral es inmediata y está mediada por células fagocíticas.
 - d) La adquirida no es antígeno específica humoral, es inmediata y está células fagocíticas.
277. Estudiando la funcionalidad de los linfocitos T, podemos asegurar que:
- a) Los "natural killers" no expresan TCR en su membrana.
 - b) Los citotóxicos inician la cascada de la respuesta celular.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

- c) Los “helper” activan la apoptosis de la célula diana.
d) Los reguladores/supresores regulan el final la inmunidad humoral.

278. Respecto a los trasplantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Los trasplantes en un mismo individuo se llaman xenogénicos.
b) Los trasplantes entre individuos de la misma especie se llaman autógenos.
c) Los trasplantes entre individuos de diferentes especies se llaman xenogénicos.
d) Los trasplantes en un mismo individuo se llaman alogénicos.

279. En el estudio de la funcionalidad de los linfocitos B, podemos afirmar que:

- a) Derivan de células madre hematopoyéticas de la médula ósea y maduran en el timo.
b) Maduran en el bazo y otros tejidos linfoides secundarios.
c) El linfocito B citotóxico activa la apoptosis de la célula diana.
d) El linfocito B NK “natural killer” no expresa TCR a su membrana.

280. ¿Cuál de estos anticuerpos NO organoespecíficos van dirigidos contra el nucleosoma?

- a) Ac anti histonas**
b) Ac anti ScI70
c) Ac anti Ro/SSA
d) Ac anti La/SSB

281. Respecto a la actividad funcional de las citocinas, cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Actúan como señales de comunicación entre diferentes tipos de leucocitos.
b) Participan en procesos relacionados con la respuesta inmunitaria.

- c) Sólo ejercen efectos biológicos en las células del sistema inmunitario.**

- d) La redundancia es una característica funcional.

282. Los antígenos de clase I se localizan:

- A) En las células detriticas
B) En las células epiteliales y linfocitos T activados
C) En las células nucleadas y plaquetas
D) En los linfocitos B

283. La vía clásica de activación del complemento:

- A) No requiere formación de complejos antígeno-anticuerpo
B) Se activa por formación de complejos antígeno-anticuerpo
C) Se activa por los componentes bacterianos del tipo polisacáridos
D) Es activada por todas las inmunoglobulinas

284. Los antígenos de sustancias químicas como lanolina, metales que producen dermatitis de contacto, medicamentos tópicos y microorganismos intracelulares (protozoos, Mycobacterium TBC, hongos...) desencadenan reacciones del tipo:

- A) Hipersensibilidad tipo II
B) Hipersensibilidad tipo III
C) Hipersensibilidad I
D) Hipersensibilidad tipo IV

285. ¿Cuál es la célula con mayor capacidad fagocitaria?

- A) Mastocitos
B) Neutrófilos
C) Eosinófilos
D) Basófilos

286. Se conoce como factor estimulador de células B a:

- A) IL2
B) IL7
C) IL4



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

D) IL12

287. ¿Por qué componentes del sistema del Complemento está formada la unidad de ataque a la membrana que lleva a la lisis de la célula diana?

- A) Por todos
- B) Por C1, C2, C3, C4
- C) Por C5, C6, C7, C8 y C9**
- D) Por C1, C4, C2

288. Los órganos linfoides primarios son:

- A) Bazo y ganglios linfáticos
- B) Placas de Peyer y amígdalas
- C) El hígado y el bazo
- D) El timo, medula ósea y el hígado fetal**

289. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos es muy característico de la artritis reumatoide?

- A) Anticuerpos anti-tiroglobulina
- B) ANCA (anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo)
- C) Anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados**
- D) Anticuerpos anti-AON de doble cadena

290. ¿Qué tipo de inmunoglobulina se produce de forma preferente contra los helmintos?

- A) IgE**
- B) IgA
- C) IgM
- D) IgG

291. ¿Qué órgano o tejido linfoide drena los antígenos de la sangre?

- A) Medula ósea
- B) Bazo**
- C) Ganglio zonal
- D) MALT

292. ¿Cómo se llama el proceso por el que la fagocitación de los gérmenes es facilitada por la

unión a estos de sustancias como la IgG o fragmentos del complemento?

- A) Diapédesis.
- B) Quimiotactismo.
- C. Opsonización.**
- D. Marginación.

293. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad se produce en el test de la tuberculina o Mantoux?

- A. Tipo I.
- B. Tipo II.
- C. Tipo III.
- D. Tipo IV.**

294. ¿Qué anticuerpos circulantes son los que activan la aparición de los inmunocomplejos?:

- a) IgD.
- b) IgM ó IgG.**
- c) IgE.
- d) IgA.

295. ¿Qué tipo de alteración inmunitaria se produce en la enfermedad granulomatosa crónica?

- A. Deficiencia de la función fagocítica.**
- B. Deficiencia en el sistema del complemento.
- C. Deficiencia de anticuerpos.
- D. Deficiencias combinadas.

296. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un tipo de linfocito?

- A. Células dendríticas.**
- B. Células NK.
- C. Linfocitos B.
- D. Linfocitos T.

297. Los linfocitos T colaboradores helper presentan en su superficie el marcador:

- a) CD4 (T4).**
- b) CD8 (T8).
- c) Ninguno.
- d) Ambos.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

298. La hipersensibilidad de tipo I esta mediada por:

- a) Ig G.
- b) Ig M.
- c) Ig A.
- d) Ig E.

299. ¿En cuál de las siguientes enfermedades están significativamente elevados los anticuerpos antinucleares (ANA)?:

- a) Leucemia mieloblástica aguda.
- b) Enfermedad de Von Willebrand.
- c) Lupus eritematoso sistémico.
- d) VIH.

300. Al realizar la toma de muestra para la determinación del test IGRA (Interferón Gamma o quantiferon), en paciente con sospecha de infección por M. tuberculosis, nos llegará a recepción:

- A) Cuatro tubos que se habrán extraído en el siguiente orden: Gris, amarillo, verde y morado, llevándolos inmediatamente al laboratorio de microbiología ya que requiere una incubación a 37°C entre 18 y 24 horas.
- B) Cuatro tubos que se habrán extraído en el siguiente orden: Gris, amarillo, azul y verde a temperatura ambiente.
- C) Cuatro tubos que se habrán extraído en el siguiente orden: Amarillo, gris, verde y morado, llevándolos inmediatamente al laboratorio de microbiología en un recipiente con hielo, ya que necesita una temperatura no superior a 2°C.
- D) Tres tubos que se habrán extraído con el siguiente orden: Gris, verde y morado, no requiere una temperatura específica, pero sí hacer lo antes posible su análisis.

301. El trasplante entre individuos de la misma especie se denomina:

- A) Autólogo.

B) Singénico o isólogo.

C) Alogénico.

D) Xenogénico

302. De los siguientes, señala cuál no es un órgano linfoide secundario:

A) Médula ósea.

B) Ganglios linfáticos.

C) Apéndice vermiforme.

D) Adenoides.

303. El complejo molecular CD3

A) Es un conjunto de proteínas que interaccionan entre sí y tienen el papel de destruir enzimáticamente las dianas.

B) Llega a las regiones de inflamación por la acción de quicio-atrayentes.

C) Es un marcador de las células T que asiste en la traducción de la señal al interior de la célula, cuando un antígeno se une al TCR en la superficie linfocitaria

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

304. ¿Dónde se produce la activación de los linfocitos T específica para un antígeno?

A) En los ganglios linfáticos a través del contacto con las células dendríticas.

B) En cualquier sitio donde se encuentren con el antígeno.

C) En cualquier sitio que encuentren una célula dendrítica inmadura.

D) En el sitio de infección al entrar en contacto con el patógeno.

305. ¿Cuál es la función principal del timo?

A) Es el órgano donde los linfocitos T senescentes van a morir.

B) Es el órgano donde se produce la maduración de los linfocitos T.

C) Es el órgano linfoide donde maduran las células linfoides.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 11: Inmunología

D) Es el órgano donde residen los linfocitos de memoria hasta la senescencia.

306. ¿Cómo se llama los linfocitos CD8+?

A) Linfocitos T supresores

B) Natural Killer

C) Linfocitos T cooperadores

D) Linfocitos B

307. Respecto al sistema inmunitario, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

A) Las plaquetas desempeñan un papel en la respuesta inmune

B) Los linfocitos B son los responsables de la respuesta inmune celular

C) Los eosinófilos son muy efectivos contra los helmintos

D) Las células Nk lisan células tumorales

308. Linfocitos T:

A) Son los responsables de la inmunidad humoral.

B) Son los responsables de la inmunidad celular.

C) Intervienen en el marcaje de células para que sean atacadas por otros leucocitos.

D) Intervienen en la defensa contra gérmenes extracelulares.

309. Célula del sistema inmunitario que contiene granzimas en sus gránulos:

A) Células NK.

B) Células plasmáticas.

C) Linfocitos B.

D) Macrófagos.

310. Son zonas de un ganglio linfático:

A) Pulpa roja y pulpa blanca.

B) Seno subcapsular, corteza, paracorteza y médula.

C) Corteza y médula ósea.

D) Cuerpo y cola.

311. ¿Cuál de las siguientes células intervienen en la maduración de los linfocitos B?

A) Las células basales.

B) Las células pro – T.

C) Las células B₀.

D) Las células estromales.

312. El lugar dónde se destruyen los linfocitos B es

A) Riñón.

B) Médula ósea.

C) Bazo.

D) Timo.

313. ¿Cuál de los siguientes órganos linfoides es a la vez órgano linfóide primario y órgano linfóide secundario?

A) Timo.

B) Bazo.

C) Médula ósea.

D) Ganglios linfáticos.

314. ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta respecto a las técnicas inmunológicas para determinar la producción de citoquinas?

A. Los ensayos ELISA son más sensibles que los ELISPOT.

B. La prueba del interferón gamma se basa en la detección mediante ELISA tipo sandwich del interferón gamma producido por linfocitos Th1 tras su estimulación con el antígeno.

C. El ELISPOT es el ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas de puntos.

D. Se puede emplear la citometría de flujo para la detección de citoquinas intracelulares.

315. Los linfocitos B:

A) Maduran en la médula ósea y complementan este proceso en el bazo.

B) Maduran en el timo.

C) Maduran en el torrente circulatorio

D) Maduran en el hígado



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases